

AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES BUCais CAUSADAS PELO USO DE PRÓTESES REMOVÍVEIS

Caroline RUIZ, Luciana Cristina OLIVEIRA, Keli Cristina BERNARDO, Thayane Bertipaglia PIRES, Adriana Márcia BELOTI

A mucosa bucal é um local favorável para ocorrência de lesões descamativas, ulcerativas e vesiculosa. Podem ser causada por supressão da flora bucal normal, redução do fluxo salivar e por próteses inadequadas e/ou má higienizadas. O objetivo dessa pesquisa foi analisar as alterações bucais em pacientes usuários de próteses moveis atendidos pelo PROLEB do Curso de Odontologia do Cesumar. Os dados coletados referem-se à análise de prontuários clínicos de 132 pacientes no ano de 2007. Do total da amostra avaliada, 65,5% eram do sexo masculino e 34,5% do sexo feminino, com idade entre 10 a 75 anos. Entre os 132 pacientes investigados, 37 (27,20%) faziam uso de prótese, sendo esta observada em pacientes acima de 60 anos. Destes, todos apresentaram próteses em condições inadequadas ao uso. As regiões mais afetadas por lesões foram: Palato Duro (51,2%); Vestíbulo Inferior (18,5%); Vestíbulo Superior (16,3%); Assoalho e Mucosa Labial (04%). Em relação aos tipos de lesões diagnosticadas entre os usuários de próteses, as mais freqüentes foram: Candidíase (37,8%); Hiperplasia (32,4%); Fibroma (13,5%) e Lesão por Trauma (5,4%). Diante dos dados verifica-se a necessidade de programas educativos que orientem a auto-avaliação, higienização e manutenção de próteses no intuito de prevenir lesões bucais.

Palavras- chave: Odontologia Geriátrica, Mucosa Bucal, Candidíase.