

CARCINOMA MUCOEPIDERMÓIDE RELATO DE UM CASO COM 5 ANOS DE EVOLUÇÃO

Rafaela Gigliini ZAFALON, Vanessa Cristina VELTRINI, Cleverson Luciano TRENT

O Carcinoma Mucoepidermóide é um dos mais comuns tumores malignos das glândulas salivares. É mais freqüente na glândula parótida e, usualmente, se apresenta como uma tumefação assintomática. As glândulas salivares menores constituem o segundo sítio mais comum, especialmente no palato. Paciente D.A., 37 anos, sexo masculino, lavrador, compareceu à Clinica de Lesões Bucais do Cesumar, queixando-se de um “caroço no céu da boca”. Ao exame físico intrabucal, observamos uma tumefação no palato duro, deslocada para o lado esquerdo, firme à palpação, recoberta por mucosa íntegra, de superfície lisa, com mancha ligeiramente acastanhada, medindo aproximadamente 3cm e exibindo formato ovalado e base séssil. A lesão evoluía de forma assintomática, há cerca de cinco anos. O diagnóstico presuntivo foi Adenoma Pleomórfico. Foi realizada punção aspirativa e duas biópsias incisionais, sendo a última conclusiva para Carcinoma Mucoepidermóide. Essa hipótese diagnóstica deve ser considerada pelo clínico, mediante tumefações de palato duro, ainda que o tempo de evolução seja longo, como no caso em questão.