

FIBROMA OSSIFICANTE PERIFÉRICO PÓS GESTAÇÃO: RELATO DE CASO CLÍNICO

Rodrigo Anderson ESPÍRITO SANTO, Luiz Felipe Gomes SANTOS, Joanna Gomes CONCEIÇÃO, Maria Eliza Barbosa RAMOS, Mônica Simões ISRAEL

O fibroma ossificante periférico é um crescimento gengival benigno comum de natureza reacional, correspondendo à evolução do granuloma piogênico. Origina-se da membrana periostal/periodontal e a proliferação excessiva de tecido maduro representa uma resposta à irritação gengival causada por biofilme, cálculo subgengival, corpos estranhos no sulco gengival e restaurações mal adaptadas. Esta irritação crônica da membrana periostal/periodontal causaria metaplasia do tecido conjuntivo, resultando na calcificação distrófica com formação óssea. O granuloma piogênico resulta de uma inflamação crônica desencadeada a partir de fatores locais, e, na mulher grávida, também é decorrente das alterações hormonais inerentes à gravidez. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de evolução de um granuloma piogênico para um fibroma ossificante periférico. A lesão foi diagnosticada nove meses após o parto, em paciente melanoderma de 25 anos de idade, com queixa estética e de crescimento e sangramento gengivais desde o sétimo mês da gestação. Realizou-se terapia periodontal básica e excisão cirúrgica subperiosteal da lesão sob anestesia local e a peça foi submetida ao exame anátomo-patológico, que permitiu o diagnóstico conclusivo de fibroma ossificante periférico. A paciente foi submetida ao tratamento protocolado e após dois anos de acompanhamento não se observou sinal de recidiva da lesão.