SEMEADURA DE PINUS ELLIOTTII

I — Influência da profundidade da semente no grau de emergência e na uniformidade e tamanho das mudas.

II — Ocorrência de "tombamento" em função das diversas profundidades de semeadura.

Gil Reinaldo Glaser (*)

1. INTRODUÇÃO

A fim de melhor executarmos grandes programas de plantio de *Pinus elliotii*, sempre consideramos muito dispendioso, o emprêgo de mudas com embalagem individual, sendo mas indicado sempre que possível o plantio com mudas de raiz nua.

Este tipo de plantio, tem sido empregado já há algum tempo com resultados bastante animadores.

O Estado do Paraná, em virtude de possuir uma boa distribuição das chuvas se presta muito bem para este tipo de plantio, porquanto temos conseguido níveis de sobrevivência sempre superiores a 80,0%.

Admitindo-se, em virtude do bom comportamento, o plantio sem o emprêgo de embalagem individual, consideramos como uma das condições mais importantes para o seu emprêgo a confecção de um bom tipo de mudas.

Verificamos, por exemplo, uma grande variação no tamanho das mudas nos canteiros, apesar de serem as sementes todas do mesmo ano de colheita e procedência, semeadas na mesma ocasião e, terem recebido os mesmos tratos de viveiro.

Pensamos, que talvez o que ocasionasse isso fôsse a profundidade da semente no sulco e para constataremos tal fato, preparamos este trabalho para verificarmos se realmente a variação de profundidade da semente no sulco, traria alguma alteração no grau de emergência e, uniformidade no tamanho das mudas.

2. MATERIAL E MÉTODO

Empregamos sementes de *Pinus elliotii* importadas dos E.U.A., previamente selecionadas e tratadas da seguinte forma:

2.1 — a semente é mergulhada em água, para fazermos a retirada das flutuantes;

2.2 — a semente que afunda é deixada 24 horas em água e em câmara frigorífica, sendo após 5 dias, retirada da água e da câmara frigorífica e a seguir semeadas.

O ensaio foi conduzido em canteiros com um metro de largura, tendo uma camada de 30 centímetros de terra humo-argilosa.

Foram feitas 5 parcelas de 2 metros de canteiros cada uma, com as seguintes profundidades:

- I — 1 centímetro de profundidade
- II — 2 centímetros de profundidade
- III — 3 centímetros de profundidade
- IV — 4 centímetros de profundidade
- V — 5 centímetros de profundidade

A semeadura foi efetuada em sulcos, com as diversas profundidades citadas, distante um sulco do outro 10 centímetros, sendo de 1 centímetro separadas uma semente da outra.

Portanto, em cada sulco temos 100 sementes e nos 2 metros teremos 2.100 sementes.

(*) Engenheiro Agrônomo

TABELA A
QUANTIDADE DE MUDAS EMERGIDAS

DATA DA CONTAGEM	P A R C E L A S				
	I	II	III	IV	V
08.05.66	22	—	—	—	—
09	62	2	—	—	—
10	142	5	—	—	—
11	320	21	3	—	—
12	498	59	7	—	—
13	778	192	11	2	—
14	914	310	17	—	—
15	1.058	455	48	4	—
16	1.205	714	163	11	—
17	1.226	332	179	15	—
18	1.231	744	437	60	—
19	1.235	897	541	79	—
20	1.236	976	562	117	4
21	1.241	1.138	641	137	5
22	1.244	1.141	649	221	5
23	1.250	1.145	654	231	6
24	1.253	1.150	745	288	6
25	1.257	1.153	820	330	20
26	1.263	1.157	830	354	23
27	1.265	1.159	832	363	23
28	1.269	1.163	846	371	25
29	1.271	1.166	871	373	27
30	1.276	1.173	893	375	29
31	1.281	1.179	916	379	33
01.06.66	1.289	1.185	926	382	36
02	1.291	1.190	942	386	43
03	1.294	1.194	951	389	51
04	1.296	1.196	955	394	62
05	1.298	1.200	959	396	69
06	1.298	1.201	963	399	73
07	1.297	1.207	969	406	75
08	1.280	1.211	971	411	79
09	1.290	1.213	1.040	414	75
10	1.291	1.215	1.060	417	79
11	1.294	1.218	1.064	420	76
12	1.296	1.221	1.065	424	79
13	1.266	1.226	1.067	427	83
14	1.269	1.232	1.071	428	85
15	1.275	1.239	1.075	431	85
16	1.276	1.260	1.077	436	87
17	1.277	1.265	1.081	442	85
18	1.282	1.272	1.086	449	88
19	1.315	1.281	1.122	456	75
20	1.231	1.284	1.129	461	79
21	1.322	1.286	1.133	470	80

DATA DA CONTAGEM	P A R C E L A S				
	I	II	III	IV	V
22.06.66	1.326	1.287	1.133	481	81
23	1.329	1.291	1.144	493	80
24	1.333	1.294	1.156	521	83
25	1.335	1.309	1.156	545	83
26	1.336	1.311	1.159	555	80
27	1.336	1.313	1.161	561	76
28	1.337	1.315	1.163	571	81
29	1.340	1.335	1.164	573	82
30	1.344	1.339	1.169	570	75
01.07.66	1.346	1.341	1.172	581	76
02	1.347	1.344	1.180	584	76
03	1.347	1.345	1.181	588	76
04	1.348	1.345	1.183	587	76
05	1.352	1.350	1.190	591	76
06	1.350	1.351	1.194	593	75
07	1.360	1.361	1.197	596	77
08	1.361	1.363	1.199	597	78
09	1.363	1.366	1.199	599	80
10	1.364	1.368	1.199	598	78
11	1.365	1.369	1.200	560	79
12	1.367	1.369	1.201	562	80
13	1.367	1.370	1.204	561	78
14	1.369	1.372	1.208	566	76
15	1.271	1.372	1.209	571	76
16	1.371	1.374	1.212	576	71
17	1.372	1.375	1.212	580	73
18	1.372	1.375	1.215	550	75
19	1.371	1.376	1.221	540	77
20	1.373	1.377	1.225	541	79
21	1.372	1.379	1.231	540	78
22	1.372	1.378	1.235	540	75
23	1.372	1.378	1.235	540	75
24	1.373	1.378	1.237	541	74
25	1.376	1.378	1.237	541	75
26	1.377	1.379	1.240	544	77
27	1.390	1.380	1.240	545	80
28	1.390	1.381	1.240	546	80
29	1.390	1.380	1.241	549	83
30	1.390	1.380	1.242	551	85
31	1.396	1.382	1.241	548	84
01.08.66	1.388	1.383	1.241	544	85
02	1.389	1.383	1.243	548	88
03	1.430	1.391	1.249	565	84
04	1.433	1.396	1.253	571	76
05	1.488	1.429	1.254	594	86
06	1.496	1.440	1.255	603	87
07	1.510	1.499	1.256	608	85
08	1.549	1.485	1.257	637	86
09	1.553	1.491	1.258	643	83
10	1.620	1.503	1.259	649	83

DATA DA CONTAGEM	P A R C E L A S				
	I	II	III	IV	V
11.08.66	1.623	1.505	1.260	651	87
12	1.627	1.523	1.261	654	87
13	1.635	1.528	1.262	661	87
14	1.639	1.554	1.263	664	88
15	1.641	1.554	1.264	665	88
16	1.643	1.555	1.265	668	89
17	1.645	1.559	1.266	668	89
18	1.671	1.618	1.267	669	89
19	1.685	1.645	1.268	672	90
20	1.719	1.659	1.269	672	90
21	1.720	1.691	1.270	690	89
22	1.730	1.695	1.273	693	83
23	1.731	1.695	1.273	693	84
24	1.739	1.703	1.273	696	86
25	1.785	1.855	1.276	705	86
26	1.793	1.861	1.273	708	86
27	1.796	1.864	1.275	711	75
28	1.796	1.866	1.277	713	76
29	1.798	1.869	1.281	717	77
30	1.798	1.872	1.283	720	77
31	1.799	1.899	1.286	732	75
01.09.66	1.801	1.879	1.289	735	74
02	1.804	1.881	1.292	737	74
03	1.807	1.889	1.294	739	76
04	1.900	1.891	1.296	742	78
05	1.900	1.893	1.295	743	78
06	1.902	1.893	1.296	746	78
07	1.902	1.895	1.298	748	77
08	1.905	1.898	1.299	752	78
09	1.907	1.899	1.391	760	77
10	1.909	1.901	1.390	762	79
11	1.911	1.903	1.402	765	79
12	1.913	1.905	1.402	768	78
13	1.915	1.907	1.404	776	77
14	1.916	1.909	1.406	779	77
15	1.919	1.911	1.407	781	76
16	1.920	1.913	1.406	783	77
17	1.920	1.915	1.406	785	76
18	1.922	1.917	1.407	797	77
19	1.921	1.916	1.408	799	76
20	1.920	1.917	1.409	799	76
21	1.920	1.917	1.411	799	77
22	1.920	1.919	1.416	815	78
23	1.921	1.921	1.417	817	78
24	1.921	1.923	1.417	819	76
25	1.922	1.925	1.418	821	77
26	1.922	1.926	1.419	823	79
27.09.66	1.923	1.926	1.422	825	81

TABELA B
QUANTIDADE DE MUDAS TOMBADAS

DATA DA CONTAGEM	P A R C E L A S				
	I	II		IV	V
08.05.66	—	—	—	—	—
09	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—
17	30	6	4	—	—
18	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—
20	15	—	—	—	—
21	2	—	8	—	—
22	—	—	—	—	2
23	—	10	30	—	—
24	14	—	—	—	—
25	10	7	9	—	—
26	7	7	15	—	—
27	1	5	—	—	—
28	—	—	—	—	—
29	3	6	11	—	—
30	19	9	—	10	—
31	6	4	20	—	—
01.06.66	—	3	4	8	—
02	2	6	—	—	—
03	9	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—
05	—	—	—	—	—
06	12	—	21	10	—
07	4	—	—	—	—
08	—	—	25	—	—
09	—	—	—	—	—
10	—	—	—	3	—
11	—	—	—	—	9
12	—	—	—	—	—
13	32	5	4	7	4
14	—	—	—	—	2
15	4	6	2	4	1
16	—	—	—	—	—
17	5	—	—	8	5
18	—	—	—	—	1
19	—	—	—	—	12
20	—	—	—	—	—

DATA DA CONTAGEM	PARCELAS				
	I	II	III	IV	V
21.06.66	5	2	2	—	—
22	—	—	2	3	3
23	—	—	—	—	3
24	—	—	—	—	—
25	—	—	4	—	—
26	4	1	4	—	4
27	4	—	—	—	5
28	—	—	—	—	5
29	—	—	4	5	2
30	—	—	—	5	6
01.07.66	—	—	—	—	—
02	—	—	—	—	—
03	—	3	2	—	1
04	—	—	—	3	—
05	—	—	—	—	—
06	4	3	—	—	2
07	—	—	—	—	—
08	—	—	—	2	1
09	—	—	4	1	—
10	4	2	3	2	3
11	1	2	2	1	2
12	2	1	3	2	3
13	2	1	3	2	3
14	—	1	—	—	2
15	—	1	—	—	1
16	4	—	—	—	6
17	—	—	—	—	—
18	2	3	—	30	2
19	4	2	3	—	—
20	—	—	1	—	1
21	2	—	2	3	2
22	—	3	1	1	4
23	—	—	—	—	—
24	—	2	—	—	2
25	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—
27	—	—	6	15	2
28	1	3	2	2	2
29	2	3	2	1	1
30	2	1	2	1	2
31	2	—	3	4	2
01.08.66	5	2	2	5	1
02	1	—	2	—	1
03	—	2	—	2	6
04	—	—	—	—	6
05	—	1	2	—	—
06	4	—	3	—	—
07	—	3	—	—	2
08	3	5	4	1	1
09	2	1	3	1	4
10	6	—	3	2	—
11	1	—	2	—	1

DATA DA CONTAGEM	P A R C E L A S				
	I	II	III	IV	V
12.08.66	1	—	—	2	—
13	2	1	2	1	—
14	—	—	—	1	—
15	1	2	—	—	—
16	2	—	1	—	—
17	—	1	2	—	1
18	1	2	3	1	—
19	—	—	2	—	1
20	12	6	4	8	—
21	2	2	3	2	4
22	—	1	2	1	6
23	—	—	—	—	—
24	3	—	1	1	2
25	—	—	—	—	—
26	1	—	—	3	—
27	3	2	3	2	4
28	1	3	2	1	3
29	—	1	—	1	8
30	2	1	2	3	3
31	1	2	2	1	3
01.09.66	—	—	1	2	1
02	—	—	—	—	—
03	—	—	—	—	—
04	—	—	—	—	—
05	2	—	2	—	1
06	—	—	—	—	—
07	—	—	—	—	2
08	1	1	—	2	—
09	—	2	1	1	2
10	—	—	2	—	—
11	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	1
13	—	—	—	—	1
14	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—
19	1	2	4	1	3
20	2	—	—	2	—
21	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—
27.09.66	—	—	—	—	—
TOTAIS	280	151	268	180	177

TABELA C

TAMANHO DAS MUDAS — CM

DATA DA MEDIÇÃO	PARCELAS				
	I	II	III	IV	V
27.09.66	17	15	13	10	10

GRÁFICO—I
EMERGÊNCIA DE MUDAS GRÁFICO—II
TOMBAMENTO DE MUDAS

3. DISCUSSÃO DAS TABELAS

Podemos apreciar na tabela A, que a parcela que primeiro emergiu foi a parcela I e na ordem, as parcelas II, III, IV e V.

Assim, a parcela I emergiu após 11 dias da semeadura; a II com 12 dias; a III com 14 dias; a IV com 16 dias e a parcela V com 23 dias após a semeadura.

Por esta tabela verificamos que as parcelas I, II e III praticamente emergem ao mesmo tempo, havendo um certo atraso na emergência da parcela IV e um atraso bem evidente na parcela V.

Em cada parcela teríamos teoricamente 2.100 semente.

No final do ensaio, com 5 meses após a semeadura, tivemos as seguintes emergências:

GRÁFICO — III
TAMANHOS DE MUDAS

Parcela I — 280 mudas em 150 dias
Parcela II — 151 mudas em 150 dias
Parcela III — 268 mudas em 150 dias
Parcela IV — 180 mudas em 150 dias
Parcela V — 177 mudas em 150 dias

Comparando as tabelas A e B verificamos que a parcela I teve maior índice de tombamentos mas em compensação teve também um dos maiores índices de emergência. A parcela II teve um menor índice de tombamentos e o maior índice de emergência.

Na tabela C temos as alturas das mudas nas diversas parcelas após 150 dias da sementeira.

Parcela I — 17 centímetros
Parcela II — 15 centímetros
Parcela III — 13 centímetros
Parcela IV — 10 centímetros
Parcela V — 10 centímetros

Por aí vemos que a parcela I foi a que apresentou maior altura vindo logo a seguir as mudas da parcela II.

4. CONCLUSÕES

Analisando os dados obtidos, concluímos:

- 1º) — A profundidade mais adequada para a semente ser colocada no sulco, deve ser sempre entre 1 e 2 centímetros.
- 2º) — As sementes colocadas nos sulcos com profundidade entre 1 e 2 centímetros, se equivalem em altura e porcentagem de emergência, só havendo uma diferença acentuada na quantidade de mudas tombadas.
- 3º) — Notamos que o maior índice de tombamento ocorreu entre o 30º e 60º dia após a sementeira.
- 4º) — Recomendamos tratamento de solo para reduzirmos o número de mudas tombadas.

Parcela I — 1.923 mudas em 150 dias — 91,5%

Parcela II — 1.926 mudas em 150 dias — 91,7%

Parcela III — 1.422 mudas em 150 dias — 67,7%

Parcela IV — 825 mudas em 150 dias — 39,2%

Parcela V — 81 mudas em 150 dias — 3,8%, sem descontarmos as mudas tombadas.

Verificamos que as parcelas aconselháveis são a I e a II, com 1 e 2 centímetros, respectivamente, de profundidade da semente no sulco.

Na tabela B, verificamos a quantidade de mudas tombadas em cada parcela, bem como a época da ocorrência.