RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS: RESULTADO DE CINCO ANOS
DE MONITORAMENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO
PARANÁ.

MARLI SALETE ZANDONÁ**
VANIA REGINA SABÓIA ZAPPIA***

No período de 1987 a 1992, a Secretaria da Saúde monitorou produtos hortigranjeiros produzidos, comercializados e ou consumidos no Estado do Paraná. As amostragens foram realizadas diretamente nos centros comerciais de abastecimento em diversas regiões do Estado. A pesquisa dos resíduos de agrotóxicos foi realizada através de cromatografia gasosa investigando-se 26 princípios ativos em 27 culturas de hortigranjeiros. Das 523 amostras analisadas, 155 apresentaram resíduos, o que representa 29,63% de amostras de alimentos contaminados. Todas as culturas pesquisadas apresentaram resíduos destes produtos.

* Instituições colaboradoras: Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA); Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (SEAB); Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER); Central de Abastecimento do Paraná (CEASA); Universidade Federal do Paraná (UFPR); Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

** Eng. Agrôn. da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná/Centro de Saneamento e Vigilância Sanitária (CSVS).

*** Eng. Agrôn. da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/Instituto Ambiental do Paraná (IAP).

No Brasil, na década de 60 implantou-se um modelo de cultura através do 1º Plano Nacional de Desenvolvimento - cujo ponto principal era o aumento da produtividade de insumos modernos (5, 19, 20). A utilização de nos químicos, particularmente de agrotóxicos, era característica fundamental do padrão tecnológico introduzido.

A técnica de produção agrícola introduzida, trouxe como equência graves problemas ambientais e sociais. As rações produzidas nas relações de produção apenas ribuíram para reforçar a estrutura fundiária concentrada exodo rural (19).

A degradação dos recursos naturais renováveis resultou em desequilíbrio e destruição das áreas agriculturáveis, com a perda dos solos e águas e conseqüentemente dos alimentos.

No Brasil, atualmente 80% do consumo de agrotóxicos se encontra nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Grande do Sul (19). O Estado do Paraná é o segundo maior produtor destes produtos perdendo apenas para o Estado de São Paulo (12).

Os dados obtidos junto às Secretarias de Estado, da Saúde (SESA), da Agricultura e Abastecimento (SEAB) e do Meio Ambiente (SEMA), retratam a problemática do uso destes produtos. Assim, conforme os dados da SEAB, o Estado do Paraná comercializa uma média anual de 32.714,38 toneladas de produtos agrotóxicos, perfazendo um total de 425.287,00 toneladas comercializadas de 1978 a 1990 (12). A SESA indica que o número de intoxicações nos últimos anos foi de 7 e o número de óbitos ficou em 101 (12).

Os dados da SEMA retrataram as condições das águas das lagoas do Paraná, através de relatório técnico onde se observa que, 70% das amostras da água de abastecimento pública apresentaram resíduos de agrotóxicos. Estes valores não devem preocupar visto que foram constatados em águas tratadas e oferecidas para abastecimento da população (12).

A contaminação dos alimentos pode ser associada às seguintes causas: magnificação biológica, processamento industrial das matérias-primas, tratamento dos estoques durante o armazenamento (19), aplicação indiscriminada de agrotóxicos em todas as fases do cultivo, a não observação do período de carência e a utilização de misturas de ingredientes ativos muitas vezes utilizados em dosagens excessivas e não recomendadas.

O uso inadequado de agrotóxicos em hortifrutigranjeiros produzidos no Estado do Paraná, pode ser retratado por um levantamento realizado em 1987, na região de Morretes, que abastecer parte dos centros comerciais de Curitiba. Os resultados obtidos demonstraram que a produção tem caráter de exploração intensiva, resultando na utilização de agrotóxicos em escala bastante acentuada. A maioria dos produtores, não investigados, aplicam agrotóxicos de duas a três vezes por semana, ou seja, em uma cultura de 120 dias, são efetuadas de 40 a 60 aplicações. Os produtos utilizados abrangem inseticidas, fungicidas, herbicidas, nematocidas e outros. O intervalo entre as pulverizações e a colheita, adotado pelos produtores, não atende às recomendações dos intervalos de segurança. Afirmam esses autores, que a maior parte dos produtos hortifrutigranjeiros produzidos em Morretes são de alto risco, tanto para os que produzem e conseqüentemente consomem, quanto aos que adquirem no mercado em nível de consumidor urbano (21).

Os primeiros relatos sobre resíduos de inseticidas organoclorados nos alimentos datam da década de 50 (20). Um monitoramento limitado a resíduos de inseticidas organoclorados e organofosforados foi iniciado em hortaliças e frutas em 1978 no Instituto Biológico de São Paulo. Um primeiro trabalho indicou que 7% das frutas e 13% das hortaliças apresentavam resíduos não permitidos (20). Outros trabalhos, publicados em 1983, mostraram que 13% das frutas e 11% das hortaliças acusavam resíduos de produtos não permitidos (20).

Em 1971, o Instituto Adolfo Lutz analisou amostras de leite, queijo e carne bovina enlatada. Foram encontrados resíduos de BHC em todas as amostras (19). Em 1972,

usando clorados em alimentos diversos expostos ao ar em São Paulo, foi detectado BHC em todas as amostras em algumas (19). A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio de Janeiro constatou presença de ditiocarbamato em 56% produtos hortigranjeiros (19).

Esses exemplos apenas amostram um pequeno percentual do problema da contaminação de alimentos e induzem a afirmação de que as pessoas, ao se alimentarem, colocam em risco sua saúde, em função da presença de resíduos de agrotóxicos em alimentos.

A eliminação da contaminação dos alimentos, ou pelo menos uma redução dos níveis atuais depende de reformas estruturais no sentido da adoção de novas formas de produção de alimentos que não sejam tão prejudiciais ao homem e ao meio ambiente.

STÓRICO

Nos anos 1987 e 1988 a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Saneamento e Vigilância Sanitária (CSVs / DVAZ), recebeu de todo o Estado denúncias da população, de suspeitas de intoxicações com o consumo de alimentos que haviam sido produzidos com o uso de agrotóxicos. Com essas informações a

através do CSVs investigou as denúncias fazendo levantamento específico da situação relatada. Fazia parte do atendimento a investigação e a colheita da cultura dos agentes de saúde, que enviavam as amostras ao laboratório com os princípios ativos suspeitos definidos para análise. De posse dos resultados laboratoriais, a SESA avaliava as providências cabíveis e de sua responsabilidade, procurando atender sempre que possível as denúncias formuladas pela população.

Em 1989, o Estado de São Paulo denunciou a presença de resíduos de MERCÚRIO na cultura da batata produzida em seu território. Preocupado, o Estado do Paraná passou a monitorar a produção.

No mesmo ano detectou-se a presença de DICOFOL em maçãs no Estado do Paraná. A SESA realizou colheita em todas as regiões produtoras do Estado confirmando a presença indevida do uso do DICOFOL.

No ano de 1990 a Secretaria de Saúde elaborou um cronograma de colheita de amostras prevendo o monitoramento de 6 culturas durante 2 anos, onde o número de amostragens levava em conta a produção do Estado, os hábitos alimentares, a área plantada, os agrotóxicos usados na produção, a quantidade comercializada, a toxicidade dos princípios ativos usados, e as denúncias feitas pela população que indicavam o uso de agrotóxicos proibidos e ou não reconhecidos para as culturas. Estes parâmetros estimularam o Plano de Pesquisa de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos realizado pela SESA. A partir deste ano as amostragens passaram a seguir um cronograma de colheita de amostras com número e municípios estabelecidos pelo CSVs / DVAZ.

Este programa apresentou resultados satisfatórios durante sua execução e despertou o interesse das instituições ligadas ao setor produtivo e aos centros de abastecimento. Em setembro de 1991, técnicos da CEASA solicitaram reunião para discussão de um trabalho de Cooperação Técnica, onde a SEAB, CEASA, EMATER e SESA, desenvolvessem monitoramento de resíduos de agrotóxicos em produtos hortigranjeiros no Estado do Paraná. Desta forma assinou-se termo de Cooperação Técnica entre as Instituições acima citadas, onde se determinou as responsabilidades dos segmentos envolvidos.

Atualmente, este programa tem por objetivos principais a educação do produtor, a garantia da qualidade e sanidade dos alimentos e o diagnóstico do uso de agrotóxicos na produção hortigranjeira do Estado.

3 - OS DADOS E A LEGISLAÇÃO

As primeiras investigações de resíduos decorrentes deste monitoramento foram efetuadas pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A partir de 1991 o Centro de Pesquisa e Processamento de

os (CEPPA) da Universidade Federal do Paraná, através
ênio, ficou encarregado de realizar tal pesquisa.

lista de referências bibliográficas da metodologia
a adotada por estes laboratórios, não apresentada
função de sua extensão, poderá ser obtida junto às

dados apresentados neste estudo, representam os
os 5 anos de monitoramento de resíduos de agrotóxicos
higronjeiros (1987 a 1992). Conforme discutido no
co, a amostragem variou em função de situações
ciais. Assim sendo, a frequência de análise não
ca a regularidade desejável para uma avaliação
a. No entanto os resultados indicam a situação da
nação de produtos agrícolas no Estado.

cante o desenvolvimento do programa foram investigados
uras. Algumas embora façam parte do estudo não foram
as individualmente, uma vez que se considerou
iente o número de amostras analisadas. Entretanto
alturas integram a análise geral dos resultados.

janeiro de 1981, o Ministério da Agricultura publicou
ria nº 002, proibindo o registro de novos agrotóxicos
de BHC e determinou que os produtos já registrados
a ser comercializados sem restrições até dezembro de
).

20 de setembro de 1984, através do Decreto nº 3876,
alamentada a Lei nº 7827 de 29/12/83 - Lei Estadual de
icos. Este Decreto no seu artigo 4º, definiu que os
s organoclorados serão cadastrados, porém sua
alização na Estado do Paraná, dependerá de autorização
1 da Secretaria de Estado da Saúde e do Bem-Estar
Secretaria de Estado da Agricultura e Secretaria de
do Interior, respeitadas as respectivas áreas de
por tempo e quantidades determinadas em casos
ciais definidos no artigo 7º, parágrafo único da Lei

8 de março de 1985, através da Portaria nº 10 o
rio Nacional de Vigilância Sanitária, atribuiu a
a compilação da relação de substâncias com ação tóxica
nimalis ou plantas, cujo registro pode ser autorizado

no Brasil, em atividades agropecuárias e em produtos
domissanitários (3).

Os produtos organoclorados foram proibidos em todo
território Nacional pela Portaria nº 329 do Ministério da
Agricultura de 03/09/85.

Em 11 de julho de 1989, foi assinada a Lei nº 7802,
regulamentada em 1990, pelo Decreto nº 98816 - Lei Federal de
Agrotóxicos, que estabelece entre outras deliberações várias
restrições do uso de agrotóxicos, seus componentes e afins e
dá poderes aos Estados e Municípios para possuírem suas
legislações (3).

Conforme as Leis, Decretos e Portarias citadas,
considerou-se violação, a presença de qualquer quantidade de
resíduos de produto organoclorado encontrado nas análises de
alimentos. Também considerou-se violação as quantidades
residuais de qualquer princípio ativo que estivesse acima do
limite de tolerância estabelecido pela Portaria SNVS nº
10/85, e resíduos de princípios ativos que não possuem
registro para a cultura analisada.

Os princípios ativos com recomendação de uso para a
cultura analisada, cujas quantidades encontradas estavam
dentro dos limites de tolerâncias estabelecido pela Portaria
SNVS nº 10/85, foram considerados resíduos.

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

No período de 1987 foram colhidas e analisadas 523
amostras de produtos hortigranjeiros em várias regiões do
Estado. Destas, 155 apresentaram-se com resíduos de
agrotóxicos, perfazendo um percentual de 29,63% de amostras
contaminadas (Tabela I).

ME CIENTÍFICO	Nº ANALISADAS	TOTAL DE AMOSTRAS COM RES.	% COM RES.	P.A. DETECTADOS	TOTAL P.A. ANALISADOS DETECTADO NÃO DETECTADO
<u>ureubila pepo</u>	03	03	--	BHC	01 04
<u>eta vulgaris</u>	02	01	01	BHC/Aldrin	02 04
<u>astrutium</u>	01	01	--	BHC/Aldrin	02 04
<u>fficinale</u>					
<u>actuca</u>	08	07	01	BHC/Aldrin/Heptaclor	03 04
<u>liiva</u>					
<u>lium sativum</u>	01	01	--	BHC/Aldrin	02 04
<u>liamum</u>	193	23	170	BHC/Aldrin/Aldicarb/Diquat/Carbofuran/Forato/Lindane/Mercúrio/Paraquat	09 04
<u>uberosum</u>					
<u>zomea batatas</u>	02	02	--	BHC	01 04
<u>racacia</u>	01	01	--	BHC/Aldrin	02 04
<u>culenia</u>					
<u>eta vulgaris</u>	08	06	02	BHC/Aldrin	02 04
<u>assica oleracea</u>	02	02	--	BHC	01 04
<u>ucus carota</u>	17	13	04	BHC/Aldrin/DDT/DDE/Carbaril/Clorotalonil/Heptaclor	07 06
<u>assica oleracea</u>	07	05	02	BHC/Heptaclor	02 04
<u>inacia oleracea</u>	01	01	--	BHC	01 04
<u>ilus spp</u>	100	10	90	BHC/Dicofol/Irictlorfon	03 09
<u>trullus lanatus</u>	07	03	04	Carbofuran	01 --
<u>agaria x</u>	13	09	04	BHC/Dicofol/Iiofanato metílico	03 04
<u>anassa</u>					
<u>assica rapa</u>	01	01	--	Heptaclor	01 04
<u>unus persica</u>	01	01	--	BHC/Lindane	02 04
<u>iculis sativus</u>	05	03	02	BHC/Heptaclor/Lindane	03 06
<u>unus persica</u>	04	01	03	Irictlorfon	01 02
<u>ipicium annuum</u>	06	04	02	BHC/Dicofol/Clorotalonil	03 05
<u>iphanus sativus</u>	02	02	--	BHC/Aldrin/Heptaclor	03 04
<u>assica oleracea</u>	09	06	03	BHC/Heptaclor	02 04
<u>ycine max</u>	01	01	--	BHC/DDT/DDE/DDD/Aldrin/Lindane/Heptaclor	07 04
<u>copersicon</u>	26	10	16	BHC/Aldicarb/Metaxil/Meamidofos	04 09
<u>culentum</u>					
<u>lis spp</u>	99	37	62	Diazinon/Metaxil/Oxícl-cobre/Paration metílico	04 01
<u>asolus vulgaris</u>	03	02	01	BHC/Pirazofos	02 05
<u>io ativo</u>	523	196	367		74 115
	100%	29,83%	70,17%		14,15% 21,98%

As culturas investigadas foram: abobrinha, acelga, agrião, alface, alho, batata, batata-doce, batata-salsa, beterraba, brócoli, cenoura, couve-flor, espinafre, maçã, melancia, morango, nabo, nectarina, pepino, pêssego, pimentão, rabanete, repolho, soja, tomate, uva e vagem. Estas 27 culturas foram pesquisadas para diferentes princípios ativos (Tabelas 1 e 2).

Os princípios ativos monitorados e detectados foram: Aldicarb, Aldrin, BHC, Carbaril, Carbofuran, Clorotalonil, DDT e seus sub-produtos DDD e DDE, Diazinon, Dicofol, Diquat, Fention, Forato, Heptaclor, Lindane, Mercúrio, Metalaxil, Metamidofós, Oxícloroto de Cobre, Paraquat, Paration Metílico, Pirazofós, Tiofanato Metílico e Triclorfon (Tabela 1). Ainda, pesquisou-se os princípios ativos: Cartap, Deltametrina, Dissulfoton, Iprodiona, Mancozeb, Malation, Maneb, Paration e Trifluralin, os quais não foram detectados para as culturas analisadas (Tabela 2).

As 27 culturas investigadas apresentaram algum tipo de resíduo. Não houve cultura isenta de resíduo (Tabelas 1 e 2), sendo que em 24 culturas observou-se a contaminação por produtos organoclorados que possuem uso agrícola proibido no país. Verifica-se a presença do princípio ativo Carbofuran na melancia e do Metalaxil em maçã, considerados violações por não possuírem registro de uso para estas culturas. Também verificou-se quantidade superior ao limite de tolerância estabelecido para o princípio ativo Pirazofós na cultura da vagem e, para o Metamidofós na cultura do tomate (Tabela 2).

Os resíduos detectados acima dos limites de tolerância não foram expressivos neste monitoramento. Isto pode ser explicado em parte pela tolerância residual permitida na produção olerícola, que é elevada, com período de carência reduzido.

Exemplificando, para o princípio ativo Diazinon, o tomate e o pepino possuem prazo de carência de 4 dias e tolerância residual de 0,5 ppm, para as hortaliças folhosas a carência é de 4 dias e a tolerância residual é de 0,7 ppm. Para o café o prazo de carência é de 60 dias e a tolerância residual é de 0,05 ppm (12).

DESTRATIVO DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ANALISADOS POR CROMATOGRAFIA DE GASES

L	P.A. DE- TECTADO	Nº TOTAL DE AMOSTRAS C/ RESÍDUOS	Nº %	QUANTIFICAÇÃO DO RESÍDUO DE- TECTADO/ppm	INTERPRETAÇÃO DO RESÍDUO	P.A. PESQUI- SADO E NÃO DETECTADO
S						
	BHC	03	100	< 0.001 (02) 0.00153	Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Paration Met.
	BHC	01	50	< 0.001	Uso Proibido	Trifluralin Malation
	Aldrin	01	100	< 0.001	Uso Proibido	Paration Paration Met.
	BHC	01	100	< 0.001	Uso Proibido	Trifluralin Malation
	Aldrin	01	100	< 0.001	Uso Proibido	Paration Paration Met.
	BHC	02	87,5	< 0.001 (07)	Uso Proibido	Trifluralin Malation
	Aldrin	02	100	< 0.001 (02)	Uso Proibido	Paration Paration Met.
	Heptaclor	01	100	< 0.01 (01)	Uso Proibido	Paration Paration Met.
	BHC	01	100	< 0.001	Uso Proibido	Trifluralin Malation
	Aldrin	01	100	< 0.001	Uso Proibido	Paration Paration Met.
	BHC	04	80	< 0.001 (04)	Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met.
	Aldrin	03	100	< 0.001 (03)	Uso Proibido	Paration Met.
	Lindane	01	100	< 0.001	Uso Proibido	Paration Dissulfoton
	Mercurio	08	4,94	0.00081/0.000397 0.00124/0.00078 0.00076/0.00069 0.00056/0.00068	Uso Proibido	
	Forato	01	20	0.01	Liber. 0.05ppm	
	Aldicarb	01	20	0.75	Liber. 1.00ppm	
	Carbofuran	01	20	0.30	Liber. 0.50ppm	
	Diquat	04	100	0.05758/0.04894 0.03527/0.03772 0.03297/0.0453 0.03772	Liber. 0.20ppm 0.20 ppm	
	Paraquat	03	75			
	BHC	02	100	< 0.001 (02)	Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Paration Met.

continua...

continuação

Batata salsa	02	BHC	02	100	<0.001 (02)	Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met. Paration
Beterraba	08	BHC Aldrin	05 01	62,5 100	<0.001 (05) <0.001	Uso Proibido Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met. Paration
Brócoli	02	BHC	02	100	<0.001 (02)	Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met. Paration
Cenoura	17	BHC Aldrin Carbaril Clorotalonil	07 02 03 02	77,78 100 100 100	<0.001 (06) 0.001 <0.001 (02) 1.95/1.40/0.44 0.0595/0.057	Uso Proibido Uso Proibido Liber. 2 ppm Liber. 1 ppm	Trifluralin Malation Paration Met. Paration Mancozeb Maneb
Couve-flor	07	BHC Heptaclor	03 03	60 100	<0.001 (03) <0.001 (02) 0.00227	Uso Proibido Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met. Paration
Espinafre	01	BHC	01	100	<0.001	Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met. Paration
Maça	100	BHC Triclorfon Dicofol	01 01 08	100 100 13,8	0.001 0.053 1.51/0.47/0.39 0.53/0.29/0.54 0.24/0.23	Uso Proibido Liber. 2 ppm Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met. Paration Mancozeb Carbaril Fention Metalaxil Tiofanato Met.
Melancia	07	Carbofuran	03	42,86	0.005/0.23/0.12	Uso Proibido	--
Morango	13	Tiofanato metílico Dicofol	03 05	100 55-56	1.58/1.035/0.856 Lib. 0.01 (03)/0.29 0.18	Lib. 5 ppm Uso Proibido	Trifluralin Malation Paration Met.
Nabo	01	BHC Heptaclor	01 01	100 100	<0.01 <1.0	Uso Proibido Uso Proibido	Paration Trifluralin Malation Paration Met. Paration

continua ...

TABELA 4 - OCORRÊNCIA DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NAS TREZE CULTURAS ANALISADAS INDIVIDUALMENTE

CULTURAS DE AMOSTRAS	Nº TOTAL DE AMOSTRAS C/ RESÍDUOS	Nº TOTAL DE AMOSTRAS C/ RESÍDUOS			Nº TOTAL DE AMOSTRAS C/ RESÍDUOS		
		Nº	%	SEM RESÍDUO	C/1 RESÍDUO	C/2 RESÍDUOS	C/3 RESÍDUOS
Alface	08	07	87,50	01	04	02	01
Batata	193	23	11,92	170	20	03	--
Beterraba	08	05	62,50	03	04	01	--
Cenoura	17	13	76,47	04	08	04	01
Conve-flor	07	05	71,43	02	04	01	--
Maçã	100	10	10,00	90	10	--	--
Melancia	07	03	42,86	04	03	--	--
Morango	15	09	60,00	04	09	--	--
Pepino	05	03	60,00	02	--	03	--
Pimentão	06	04	66,67	02	04	--	--
Repolho	09	06	66,67	03	04	02	--
Tomate	26	10	38,46	16	10	--	--
Uva	99	37	37,37	62	37	--	--
TOTAL	498	135	--	363	117	16	02

OBSERVAÇÕES: 1) 72,89% sem resíduo; 2) 27,11% com resíduo; 3) 23,49% com 1 resíduo; 4) 3,21% com 2 resíduos; 5) 0,41% com 3 resíduos

Os dados obtidos demonstram que as atuais práticas agrícolas não preservam a isenção de resíduos de agrotóxicos em alimentos. Vale ressaltar que em algumas culturas (Tabela 4) foram encontrados até 3 tipos de diferentes resíduos em uma mesma amostra da cultura. Ou seja, o consumidor ao se alimentar ingere residuais de produtos comprovadamente tóxicos, cujos efeitos à saúde não são totalmente conhecidos. Nas Tabelas 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 estão relatadas as informações toxicológicas gerais sobre os grupos químicos detectados neste monitoramento.

continuação

Diquat	Batata	01	01	100
Fention	Maçã	02	02	100
Forato	Batata	01	01	100
Heptaclor	Alface, cenoura, conve-flor, nabo, pepino, rabanete, repolho e soja	08	08	100
Lindano	Batata, nectarina, pepino e soja	04	04	100
Mercúrio	Batata	01	01	100
Metalaxil	Tomate e uva	02	03	66,67
Metamidofós	Tomate	01	01	100
Oxicleto de cobre	Uva	01	01	100
Paraquat	Batata	01	01	100
Paration me-tílico	Uva	01	25	4
Pirazofós	Vagem	01	01	100
Liofanato metílico	Morango	01	02	50
Triclorfon	Maçã e pêssego	02	02	100

Na Tabela 4, está expressa a ocorrência de resíduos de agrotóxicos nas 13 culturas analisadas individualmente. Nesta observa-se que de um total de 498 amostras, 135 apresentaram resíduos, o que equivale a 27,11% de hortigranjeiros contaminados por agrotóxicos. Sendo que 23,49% das amostras apresentaram-se com apenas 1 tipo de resíduo, 3,21% com dois tipos de resíduos e 0,41% com 3 tipos de diferentes resíduos.

TABELA 5.3 - SINOPSE SOBRE TENDÊNCIAS

[illegible]

[illegible][illegible]

4.1 RESULTADOS DAS CULTURAS CUJOS DADOS PERMITIRAM ANÁLISE INDIVIDUAL

ALFACE (*Lactuca sativa*) (13, 14)

Os dados para a alface foram amostrados no período de novembro de 1987 a outubro de 1988. Neste período foram analisadas 8 coletas da cultura, todas na região metropolitana de Curitiba, no CEASA e outros centros comerciais (Tabelas 1, 2 e 4).

Para as colheitas realizadas, foram analisados os princípios ativos: BHC, ALDRIN, HEPTACLOR, TRIFLURALIN, PARATHION METÍLICO, MALATION E PARATHION.

De acordo com a sensibilidade das metodologias adotadas, 87.50% das amostras apresentam resíduos (Tabelas 1, 2 e 4 e Gráfico 4.1.1).

GRÁFICO 4.1.1 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DE ALFACE

Dos princípios ativos detectados, o ALDRIN e o HEPTACLOR estão presentes em 100% das amostras investigadas (Tabela 2 e Gráfico 4.1.2).

1.1.2 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE ALFACE

8 amostras analisadas, uma não apresentou resíduos, tiveram somente um tipo de resíduo, 2 apresentaram dois de resíduo e 1 amostra apresentou três tipos de resíduos de produtos agrotóxicos (Tabela 4).

Esta cultura só foram detectados organoclorados (1) cuja quantificação pode ser observada na Tabela 1, com valores menores que 0.01 ppm e 0.001 ppm.

Como já citado, qualquer quantidade de resíduo de organoclorado é considerada violação, uma vez que são de uso proibido no país.

lanun tuberosum (13, 14)

dados para a batata foram amostrados no período de 1987 a setembro de 1991. Neste período foram coletadas 193 amostras da cultura nos municípios da região de Curitiba: Araucária, Campo Largo, Balsa Nova, Almirante Tamandaré, Contenda e nos municípios de São Mateus do Sul, Lapa, Irati, Paula Freitas, Piraí, Guarapuava, Antônio Olinto e Pinhão.

segundo semestre de 1989, o Estado de São Paulo o uso de produtos à base de mercúrio na batata em seu território. Esta denúncia alertou o Estado determinando uma intensificação do monitoramento da batata, com ênfase na investigação de produtos. Como resultado, das 162 amostras investigadas para o uso de produtos à base de mercúrio, 8 amostras foram positivas (Tabelas 2 e 4). Estas amostras procedentes dos municípios de Guarapuava e São João do Sul e foram coletadas em abril de 1990.

Peñatejada R.Téc.Cient., Curitiba, v. 3, n. 3, 1993

Os residuais encontrados variaram entre 0.00056 ppm e 0.00124 ppm (Tabela 2).

Além dos mercuriais, também foram investigados o BHC, ALDRIN, MALATION, PARATHION METÍLICO, TRIFLURALIN, CARBOFURAN, PARAQUAT, DIQUAT, LINDANE, FORATO, PARATHION e ALDICARB.

Como pode ser observado nas Tabelas 1 e 4 e no Gráfico 4.1.3 11,92% das amostras apresentaram algum tipo de resíduo. As quantificações destes resíduos estão expressos na Tabela 03.

GRÁFICO 4.1.3 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS NA CULTURA DE BATATA

Segundo os limites de detecção dos métodos de análise para a cultura, dos 12 princípios ativos foram detectados 9 : BHC, ALDRIN, LINDANE, FORATO, ALDICARB, CARBOFURAN, DIQUAT, PARAQUAT e o MERCÚRIO (Tabelas 1, 2, 3 e Gráfico 4.1.4).

Os resíduos encontrados de BHC, ALDRIN, LINDANE e MERCÚRIO são considerados violações pelos motivos já expostos.

Para os outros princípios ativos detectados: FORATO, ALDICARB, CARBOFURAN, DIQUAT e PARAQUAT a quantificação do resíduo esteve abaixo do limite de tolerância fixada pela Portaria SNVS nº 10 de 8 de março de 1985.

Nestas 193 amostras pesquisadas, 170 não apresentaram resíduos, 20 apresentaram apenas um tipo de resíduo e 3 amostras apresentaram dois diferentes tipos de resíduos de agrotóxicos (Tabela 4).

FIGURA 4.1.4 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DA BATATA

- 1 Para o mercúrio, analisaram-se 162 amostras, sendo 8 positivas
- 2 Os dados para o Aldicarb são idênticos ao do Forato.

ERRABA (Beta vulgaris) (13, 14)

Os dados para a beterraba foram amostrados no período de agosto de 1987 a outubro de 1988. Nos 14 meses de monitoramento, foram realizadas 8 coletas da cultura, todas na região metropolitana de Curitiba, no CEASA e outros centros comerciais.

Nestas coletas foram analisados os princípios ativos: BHC, ALDRIN, PARATION, MALATION, PARATION METÍLICO e FLURALIN.

De acordo com a sensibilidade da metodologia adotada, 5% das amostras apresentaram resíduos, conforme as Tabelas 2, 4 e Gráfico 4.1.5.

FIGURA 4.1.5 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DE BETERRABA

Dos princípios ativos detectados, o BHC apareceu em 62.50% das amostras e o ALDRIN em 100% das amostras investigadas para os respectivos princípios ativos (Tabelas 2, 4 e Gráfico 4.1.6).

GRÁFICO 4.1.6 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE BETERRABA

Das 8 amostras investigadas, 3 não apresentaram nenhum tipo de resíduo, 4 apresentaram apenas um tipo de resíduo e uma amostra apresentou 2 diferentes tipos de resíduos de agrotóxicos (Tabela 4).

Para esta cultura só foram detectados os produtos organoclorados em resíduos inferiores a 0.001 ppm (Tabela 2). Conforme citado, qualquer quantidade de resíduo de produto organoclorado é considerada violação uma vez que são produtos de uso proibido no país.

CENOURA (Daucus carota) (13, 14)

Os dados para a cenoura foram amostrados no período de agosto de 1987 a outubro de 1988 e de julho a setembro de 1992. A interrupção de amostragens no ano de 1991 se deve à priorização do monitoramento da batata, maçã, tomate e uva, pelos motivos discutidos na exposição por cultura.

As coletas em número de 17 foram realizadas nos municípios da região metropolitana de Curitiba, diretamente na CEASA e outros centros comerciais.

Para esta cultura foram analisados 13 princípios ativos: BHC, ALDRIN, TRIFLURALIN, MALATION, PARATION METÍLICO, PARATION, MANEB, CARBARIL, MANCOZEB, CLOROTALONIL, HEPTACLOR, DDT e DDE.

De acordo com a sensibilidade da metodologia adotada, 76.47% das amostras apresentaram resíduos (Tabelas 1, 2, 4 e Gráfico 4.1.7).

4.1.1.7 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTOXICOS NA CULTURA DE CENOURA

princípios ativos HEPTACLOR, ALDRIN, CARBARIL, LONIL, DDT e subproduto DDE (Tabelas 3 e 5.1) foram dos em 100% das amostras investigadas para estes ios ativos, e o BHC em 77,78% das amostras em que foi ado (Tabela 2 e Gráfico 4.1.8)

4.1.1.8 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE AMOSTRAS TOTAL E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE CENOURA

as 17 amostras analisadas, 4 apresentaram-se isentas de os, 8 apresentaram apenas um tipo de resíduo, 4 com ipos, e uma com três tipos de diferentes resíduos de xicos (Tabela 4).

Os organoclorados detectados (BHC, ALDRIN, HEPTACLOR, DDT e seu subproduto DDE) apresentaram resíduos quantificados de menos que 0.001 ppm a 0.00355 ppm.

Para o CARBARIL, produto de uso liberado conforme Portaria SNVS nº 10 de 8 de março de 1985, esta quantificação variou de 0.44 ppm a 1.95 ppm. Conforme pode ser observado na Tabela 2, o limite de tolerância para esta cultura está fixado em 2 ppm. O CLOROTALONIL, também liberado para a cultura em questão, com limite de tolerância fixado pela mesma Portaria em 1.0 ppm, apresentou resíduos variando entre 0.057 ppm a 0.0595 ppm.

COUVE FLOR (Brassica oleracea) (13, 14)

A couve flor foi amostrada nos períodos de agosto a novembro de 1987 e de agosto a outubro de 1988. Nestes 5 meses de monitoramento, foram realizadas 7 coletas da cultura, todas na região metropolitana de Curitiba, no CEASA e outros centros comerciais.

Foram analisados 6 princípios ativos: BHC, HEPTACLOR, PARATION, MALATION, PARATION METÍLICO e TRIFLURALIN. De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 71.43% das amostras apresentaram resíduos (Tabelas 1, 4 e Gráfico 4.1.9).

GRÁFICO 4.1.9 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTOXICOS NA CULTURA DE COUVE-FLORE

Dos princípios ativos detectados, o BHC apareceu em 60% das amostras e o HEPTACLOR em 100% das amostras investigadas para os respectivos princípios ativos (Tabela 2 e Gráfico 4.1.10).

GRÁFICO 4.1.1.10 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE COUVE-FLORES

Das 7 amostras analisadas, 2 não apresentaram nenhum tipo de resíduo, 4 apresentaram apenas um tipo de resíduo e uma amostra apresentou 2 diferentes tipos de resíduos de agrotóxicos (Tabela 4).

Para esta cultura, só foram detectados produtos organoclorados (Tabela 5.1) cuja quantificação pode ser observada na Tabela 2, em valores de 0.00227 ppm a valores inferiores a 0.001 ppm. Qualquer quantidade de resíduo de produto organoclorado é considerada violação, uma vez que são produtos de uso proibido no país.

MAÇÃ (*Malus* spp) (13, 14)

Esta cultura foi amostrada em novembro de 1987 e nos períodos de julho a agosto de 1989 e de março a abril de 1992.

As coletas concentraram-se nos anos de 89 e 90, em virtude de denúncias feitas ao Centro de Saneamento e Vigilância Sanitária da SESA de que fruticultores utilizavam o DICOFOL (Tabela 5.1) como acaricida na cultura da maçã.

Conforme as denúncias, foram monitorados os municípios produtores de Guarapuava, Palmas, Pato Branco e os centros comerciais de Londrina e Curitiba, onde foram coletadas amostras que representavam regiões produtoras dos Estados de São Paulo e Santa Catarina. Também foram coletadas amostras da produção proveniente da Argentina (Mendoza, Rio Negro e Buenos Aires), onde o uso de DICOFOL na cultura de maçã é liberado pela legislação vigente.

Das 100 coletas realizadas para a cultura de maçã, 58 amostras foram pesquisadas para o DICOFOL. Como resultado, 8 apresentaram resíduos deste produto e eram provenientes dos centros comerciais e/ou produtores de Curitiba, Palmas, Guarapuava, Mendoza e Buenos Aires.

A quantificação dos resíduos de DICOFOL estão expressos na Tabela 2, variando de 0.23 ppm a 1.51 ppm.

Durante os períodos em que a maçã foi monitorada, também foram investigados os princípios ativos: BHC, TRICLORFON, MALATION PARATION, TRIFLURALIN, PARATION METÍLICO, TIOFANATO-METÍLICO, CARBARIL, MANCOZEB, FENTION, METALAXIL (Tabelas 1, 2, e 3).

De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 10% das amostras investigadas apresentaram algum tipo de resíduo (Tabelas 1, 2, 4 e Gráfico 4.1.1.11).

GRÁFICO 4.1.1.11 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DA MAÇÃ

Dos 3 princípios ativos detectados, o BHC e o TRICLORFON apareceram em 100% das amostras e o DICOFOL em 13.80% das amostras investigadas para os respectivos princípios ativos (Tabela 2 e Gráfico 4.1.1.12).

GRÁFICO 4.1.1.12 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE MAÇÃ

A quantificação dos resíduos pode ser observada na Tabela 2 e foram consideradas violações os resíduos do DICOFOL e do BHC.

O residual de TRICLORFON se encontra abaixo da tolerância adotada pela Portaria SNVS nº 10 de 8 de março de 1985 (Tabela 2).

Das 100 amostras analisadas, 90 não apresentaram nenhum tipo de resíduo e 10 apresentaram apenas um tipo de resíduo de agrotóxico, como pode ser observado na Tabela 4.

MELANCIA (*Citrullus lanatus*) (13, 14).

O tipo de monitoramento para esta cultura foi determinado por denúncias de uso do produto CARBOFURAN na melancia.

As denúncias recebidas pelo Centro de Saneamento e Vigilância Sanitária da SESA, não relatavam a modalidade de emprego deste produto na cultura de melancia. Admite-se que os produtores utilizavam o produto para tratamento de solo, o que não é permitido pela legislação vigente para esta cultura, segundo a Portaria nº 10 de 8 de março de 1985.

A amostragem foi realizada no período de janeiro a novembro de 1992. Neste intervalo foram coletados um total de 7 amostras da cultura; uma no município de Francisco Beltrão e 6 diretamente no CEASA de Curitiba. Destas 6 amostras coletadas no CEASA, 4 eram provenientes da região metropolitana de Curitiba, uma de Barreiras (Bahia) e uma da região produtora de São Paulo.

Todas as amostras foram pesquisadas somente para o princípio ativo CARBOFURAN (Tabela 5.3). Como resultado, 42,86% das amostras apresentaram resíduos de CARBOFURAN (Tabelas 1, 2, 4 e Gráfico 4.1.1.3).

GRÁFICO 4.1.1.13 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTOXICOS NA CULTURA DA MELANCIA

As amostras positivas eram provenientes da região metropolitana de Curitiba e de regiões produtoras da Bahia e São Paulo.

A quantificação dos resíduos encontrados está expressa na Tabela 2, em valores que variam de 0,005 ppm a 0,23 ppm. A sensibilidade do método cromatográfico relatado pelo laboratório responsável pela análise é de 0,005 p.p.m.

MORANGO (*Fragaria ananassa*) (13, 14)

Esta cultura foi amostrada em agosto de 1987 e no período de julho a setembro de 1992.

As 13 coletas foram realizadas no CEASA, amostrando-se a produção na região metropolitana de Curitiba e de centros produtores dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.

Foram analisados 7 princípios ativos: BHC, TRIFLURALIN, PARATHION METÍLICO, MALATHION, PARATHION, DICOFOL E TIOFANATO METÍLICO (Tabelas 1, 2 e 3).

De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 69,23% das amostras investigadas apresentaram algum tipo de resíduo (Tabelas 1, 4 e Gráfico 4.1.1.4).

GRÁFICO 4.1.1.14 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DA MORANGO

Dos princípios ativos detectados, o BHC e o TIOFANATO FÍLICO apareceram em 100% das amostras e o DICOFOL em 56% das amostras que foram investigadas para estes incípios ativos (Tabelas 2, 5.1, 5.5 e Gráfico 4.1.15).

GRÁFICO 4.1.1.15 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE MORANGO

A quantificação para o BHC e o DICOFOL (uso proibido no is) está expressa na Tabela 2 e teve os seus valores ciando de 0.29 ppm a valores inferiores a 0.1 ppm.

O TIOFANATO METÍLICO detectado em valores de 0.856 a 1.58 ppm, possui registro para a cultura de morango, sendo sua tolerância fixada em 5 ppm, conforme a Portaria SNVS nº 10 de 8 de março de 1985.

Das 13 amostras analisadas, 4 não apresentaram nenhum tipo de resíduo e 9 apresentaram apenas um tipo de resíduo de agrotóxico, como pode ser observado na Tabela 4.

PEPINO (*Cucumis sativus*) (13, 14)

As amostras para o pepino foram coletadas em novembro de 1987, dezembro de 1988 e em janeiro de 1992, totalizando 5 coletas distribuídas nestes três meses de amostragem.

As coletas realizadas no CEASA, amostraram a produção da região metropolitana de Curitiba, dos municípios de Morretes e Cerro Azul.

Foram analisados 9 princípios ativos: BHC, LINDANE, TRIFLURALIN, MALATION, PARATHION METÍLICO, PARATHION, MANEB, DELTAMETRINA e HEPTACLOR (Tabelas 1 e 2).

De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 60% das amostras investigadas apresentaram algum tipo de resíduo (Tabelas 1, 4 e Gráfico 4.1.16).

GRÁFICO 4.1.1.16 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O Nº DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DE PEPINO

Dos princípios ativos detectados, o BHC, o LINDANE e o HEPTACLOR apareceram em 100% das amostras que foram investigadas para estes princípios ativos (Tabelas 1, 4 e Gráfico 4.1.17).

GRÁFICO 4.1.17 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE PEPINO

A quantificação dos resíduos (Tabela 2) apresentou valores de < 0.0001 ppm, < 0.001 ppm e 0.0001 ppm. Das 5 amostras analisadas, 2 não apresentaram nenhum tipo de resíduo e 3 apresentaram dois tipos de resíduos diferentes (Tabela 4). Todos os princípios ativos detectados pertencem à classe organoclorados (Tabela 5.1) que têm o seu uso proibido no

PEPINO (*Capsicum annuum*) (13, 14)

Esta cultura foi amostrada em outubro de 1988, em julho 1989 e em janeiro e fevereiro de 1992. Nestes quatro meses foram realizadas 6 coletas da cultura, todas realizadas no CEASA, amostrando-se a produção região metropolitana de Curitiba e de centros produtores Estados de São Paulo. Foram analisados 8 princípios ativos: BHC, TRIFLURALIN, RATION METÍLICO, MALATION, PARATION, DICOFOL, CLOROTALONIL e DELTAMETRINA (Tabelas 1 e 2). De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 66,67% das amostras investigadas apresentaram algum tipo de resíduo (Tabelas 1, 2, 4 e Gráfico 4.1.18).

GRÁFICO 4.1.18 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DE PIMENTÃO

Dos princípios ativos detectados, o CLOROTALONIL, o BHC e o DICOFOL apareceram em 100% das amostras que foram investigadas para estes princípios ativos (Tabelas 1, 2 e Gráfico 4.1.19).

GRÁFICO 4.1.19 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE PIMENTÃO

Das 6 amostras analisadas, 2 não apresentaram nenhum tipo de resíduo e 4 apresentaram apenas um tipo de resíduo (Tabela 4). Os resíduos encontrados estão expressos na Tabela 2, nos valores de 0.001 ppm a 0.64 ppm.

O CLOROTALONIL (Tabela 5.5) detectado nos valores de 280 e 0.4550 ppm (Tabela 2), é liberado para o uso em área da cultura de pimentão e tem a tolerância provisória fixada em 1.0 ppm, conforme Portaria SNVS nº 10 de março de 1985.

O BHC e o DICOFOL (Tabela 5.1) não possuem liberação para o uso agrícola no país.

POLHO (*Brassica oleracea*) (13, 14)

Esta cultura foi amostrada no período de agosto a setembro de 1987 e de agosto a outubro de 1988.

Nestes períodos foram realizadas 9 coletas da cultura, região metropolitana de Curitiba, no CEASA e outros centros comerciais.

Foram analisados 6 princípios ativos: BHC, TRIFLURALIN, RATION METÍLICO, MALATION, PARATION, HEPTACLOR (Tabelas 1 e 2).

De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 66.67% das amostras investigadas apresentaram algum tipo de resíduo (Tabelas 1 e 2 e Gráfico 4.1.20).

GRÁFICO 4.1.20 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS NA CULTURA DE REPOLHO

Dos princípios ativos detectados, o HEPTACLOR apareceu em 100% das amostras e o BHC em 57.14% das amostras que foram investigadas para estes princípios ativos (Tabelas 2, 3 e Gráfico 4.1.21).

GRÁFICO 4.1.21 - COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE REPOLHO

Das 9 amostras analisadas, 3 não apresentaram nenhum tipo de resíduo, 4 apresentaram apenas um tipo de resíduo e duas apresentaram dois tipos diferentes de resíduos de agrotóxicos (Tabela 4).

Para esta cultura só foram detectados produtos organoclorados (Tabela 5.1) cuja quantificação pode ser observada na Tabela 2, em valores inferiores a < 0.001 ppm.

Qualquer quantidade de resíduo de produto organoclorado é considerada violação, uma vez que são produtos de uso proibido no país.

TOMATE (*Lycopersicon esculentum*) (13, 14).

Esta cultura foi amostrada em novembro de 1987, julho de 1989, setembro de 1990, julho e dezembro de 1991, janeiro, fevereiro, novembro e dezembro de 1992.

Nestes nove meses foram coletadas 26 amostras da cultura, no CEASA, nos centros comerciais de Curitiba e municípios de Cerro Azul e Ponta Grossa.

Foram investigados 13 princípios ativos: BHC, TRIFLURALIN, MALATION, PARATION, METAMIDOFÓS, METALAXIL, ALDICARB, CARTAP, IPRONONA, DICOFOL, CARBOFURAN, MANEB e PARATION METÍLICO (Tabelas 1 e 2).

De acordo com a sensibilidade da metodologia de análise adotada para a cultura, 38.46% das amostras investigadas apresentaram algum tipo de resíduo (Tabelas 1 e 2 e Gráfico 4.1.22).

ÁFICO 4.1.22 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS
E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE
AGROTÓXICOS NA CULTURA DE TOMATE

Foram detectados BHC, METAMIDOFÓS, METAXIL E ALDICARB em 00%, 40%, 80% e 42,86% respectivamente, nas amostras nvestigadas (Tabelas 1, 2 e Gráfico 4.1.23)

RÁFICO 4.1.23 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS
E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS
PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE
TOMATE

Das 26 amostras analisadas, 16 não apresentaram nenhum tipo de resíduo e 10 apresentaram apenas um tipo de resíduo (Tabela 4).
Os resíduos encontrados para o METAMIDOFÓS, METALAXIL e ALDICARB, podem ser observados na Tabela 2 e não ultrapassaram os limites de tolerância provisória fixados pela Portaria SNVS nº 10 de 8 de março de 1985.
O residual de BHC encontrado (Tabela 2) é considerado violação, conforme já explicitado.

UVA (*Vitis spp*)

Esta cultura foi amostrada no período de janeiro de 1991 a abril de 1992.
Nestes 16 meses de monitoramento, foram realizadas 99 coletas da cultura, distribuídas nos municípios de Londrina, Iraí, Assaí e São Sebastião da Amoreira.

Os municípios amostrados foram selecionados em função do número de denúncias sobre suspeitas de intoxicações recebidas pelas Regionais de Saúde de Cornélio Procopio e Londrina. Estas denúncias eram regulares e indicavam, principalmente, suspeitas de intoxicações em crianças. A sintomatologia relatada incluía cólicas abdominais, vômitos, tonturas, erupções cutâneas entre outras.

Foram investigados os seguintes princípios ativos: PARATION METÍLICO, DIAZINON, METALAXIL, OXICLORETO DE COBRE e IPRODIONA (Tabelas 1 e 2).

Conforme a sensibilidade da metodologia de análise adotada para esta cultura, 37,37% das amostras apresentaram resíduos, ou seja, das 99 amostras analisadas, 62 não apresentaram resíduos e 37 apresentaram somente um tipo de resíduo de agrotóxico (Tabelas 1, 2, 4 e Gráfico 4.1.24).

GRÁFICO 4.1.24 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS
E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DE
AGROTÓXICOS NA CULTURA DE UVA

Foram detectados resíduos de PARATION METÍLICO, DIAZINON, METALAXIL e OXICLORETO DE COBRE (Tabelas 1, 2, 3, 5.2, 5.5 e Gráfico 4.1.25).

FIG. 4.1.25 -COMPARAÇÃO ENTRE O NÚMERO TOTAL DE AMOSTRAS E O NÚMERO DE AMOSTRAS COM RESÍDUOS DOS PRINCÍPIOS ATIVOS ENCONTRADOS NA CULTURA DE UVA

A quantificação e a interpretação dos resíduos pode ser lida na Tabela 2, onde apenas para o princípio ativo LAXIL, detectou-se uma amostra com residual equivalente a rância provisória fixada pela Portaria SNVS nº 10 de 8 de o de 1985.

NCLUSÃO

atuais práticas de produção agrícola com o uso de protóxicos determinam a presença de resíduos destes produtos em alimentos.

ite monitoramento demonstra a necessidade de estruturação Estado e, ampliação das ações necessárias para cobrir níveis atuais de resíduos em alimentos.

imprescindível a ação conjunta dos órgãos do Estado, sponáveis pela produção, assistência técnica, scalização e comercialização, na orientação dos ricultores, na introdução e pesquisa de novas formas de dução agrícola e, na fiscalização da comercialização e io de agrotóxicos.

• Apesar da proibição pela legislação do uso agrícola dos organoclorados, constata-se a sua presença nos produtos hortigranjeiros.

ABSTRACT

Twenty-seven horticulture and farm products have been analysed for pesticides residues by gas chromatography in the province of Paraná, South Brazil, between 1987 and 1992. The action was promoted by the State Health Department; the samples have collected in the central establishment supplyings in different sites along the province and analysed for 26 active ingredients. The results showed that about 30% of 523 samples were contaminated and all the products presented pesticides residues.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 LARINIL, L. . Toxicologia. 2. ed. São Paulo : Manole, 1993. 281 p.
- 2 BRITO FILHO, D. Toxicologia Humana e Geral . Curitiba: Livraria Itaipu, 1983. 641 p.
- 3 PARANÁ. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Coordenadoria de Estudos e Defesa do Meio Ambiente. Coletânea de legislação ambiental federal e estadual. Curitiba : Imprensa Oficial do Estado do Paraná, 1990. 536 p.
- 4 CHARBONNEAU, J. P. et al. Enciclopédia de Ecologia. São Paulo : Ed. Pedagógica e Universitária, 1977. 479 p.
- 5 FOWLER, R. B. Deslocamento vertical e degradação do Endossulfan em latossolo vermelho escuro, textura média. Curitiba, 1989. 169 p. Dissertação, Livre Docência, Universidade Federal do Paraná.
- 6 CLARK JUNIOR, Donald. Dicofol (Kelthane) as an Environmental Contaminant : A review. Washington, D.C. : V.S. Fish and Wildlife Service, 1990. 37 p. Wildlife Technical Report, 29.
- 7 ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Guidelines for the Disposal of small quantites of unused pesticides. Cincinnati, 1975. 332 p.
- 8 BRASIL. Ministério da Agricultura. Pesticidas: métodos de análise & informações técnicas. Curitiba : Ministério da Agricultura/ Universidade Federal do Paraná, 1988. v. 2.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao professor Gabriel Guimarães da UFPR / CEPPA o apoio e incentivo sem o qual, não seria possível a realização deste trabalho.

Agradecemos a todos os nossos colegas da SESA e SEMA pelo estímulo e amizade.

- OLIVEIRA, J.V. Degradação de malonil, endossulfan e mancozeb em morangos cultivados a 5°C. Revista Brasileira de Toxicologia, Curitiba, v. 6, 1993. Suplemento referente ao VII Congresso Brasileiro de Toxicologia.
- OLIVEIRA, J.V. e ANDREI, A. Defensivos agrícolas. São Paulo : Andrei, 1983. 448 p.
- OLIVEIRA, J.V., VIANNA, P.C.G., FOWLER, R.B., ZAPPIA, S. Poluição das águas internas do Paraná por pesticidas. Curitiba : SUREHMA/PR, 1984.
- INTENDÊNCIA DOS RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE. Pesticidas, a realidade do Paraná. Secretaria do Ambiente, 1992. 94 p.
- EIRA, F.A.R. Manual de olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. São Paulo : Agronômica S, 1982. v. 2.
- P. Fruticultura brasileira. São Paulo : Nobel, 1983. 448 p.
- C. G., SCHMIDT, K. J. The Chemistry of phosphorus Pesticides: reactivity, synthesis, mode of action, toxicology. New York : Springer-Verlag, 1973. p.
- OLIVEIRA, J.V. Chemistry of Pesticides. [s.l.] : John Wiley, 1983. 518 p.
- OLIVEIRA, J.V. et al. Guia de Fungicidas Agrícolas, Curitiba : Livro Ceres, 1986. 281 p.
- OLIVEIRA, J.V. Doenças em agricultura, pecuária e produtos sanitários, nova classificação toxicológica. 2. ed. 1. São Paulo : Andrei, 1987. 229 p.
- OLIVEIRA, J.V. Agrotóxicos: a praga da dominação. Porto Alegre : Mercado Aberto, 1985. 85 p.
- OLIVEIRA, J.V. et al. Impacto dos agrotóxicos sobre o homem, a saúde e a sociedade. São Paulo : Ícone, 1983. 94 p.
- OLIVEIRA, J.V. et al. O uso indiscriminado de agrotóxicos, reflexões sobre o município de Morretes. Curitiba, 1985. 105 p. Monografia, Departamento de Ciências Sociais e Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.