ARCHIVES OF VETERINARY SCIENCE

<i>Arch. Vet. Sci., Curitiba</i>	<i>v. 17</i>	<i>Suplemento</i>	<i>p.0-000</i>	<i>2012</i>
--------------------------------------	--------------	-------------------	----------------	-------------

Comissão Organizadora do 33º. Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA realizado de 27 a 30 de Abril de 2012.

EXECUTIVA

Presidente: Alexandre Schmaedecke

Vice-Presidente: Stefan René Schwanz

Diretor Financeiro: Roberto Luiz Lange

Diretoria receptiva e social: Edgar Carvalho; Adolfo Sasaki; José Carlos e Jorge Schemiko

Diretor de Marketing: Gilson Rocha e Fabio Mitsunari

Diretoria Científica: Tilde Froes

EDITORIAL

No ano de 2012 o *Archives of Veterinary Science* (AVS) cumpriu seu papel de divulgadora científica, proporcionando a edição dos trabalhos apresentados no 33º. Congresso Brasileiro da ANCLIVEPA, Curitiba-PR. O AVS atua como facilitador da divulgação científica, congregando trabalhos submetidos das diferentes regiões do Brasil e do exterior. Esforços não foram medidos para que os resultados aqui apresentados fossem dignos da confiança depositada na administração deste veículo de divulgação científica. Desta forma apresentamos 190 resumos que serão disponibilizados em várias bases de dados para comunidade acadêmica, e com a certeza de estar contribuindo para o avanço da Medicina Veterinária. A todos os que colaboraram, para o sucesso do Congresso, queremos expressar nossos sinceros agradecimentos. Informamos, adicionalmente que o AVS permanece aberto à submissão de artigos inéditos, para tornar o ano de 2012, mais profícuo. Sucesso a todos!

Prof. Antônio Waldir Cunha da Silva
Editor Chefe do Archives of Veterinary Science

ÍNDICE ARTIGOS

- 001.** ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM CÃES ANESTESIADOS COM INFUSÃO CONTÍNUA DE PROPOFOL, ASSOCIADO OU NÃO AO TRAMADOL.
(*Hematologic changes in dogs submitted to continuous infusion of propofol associated, or not, to tramadol*).....001
- 002.** AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM QUESTIONÁRIO VIA INTERNET DE ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO.
(*Evaluation of the efficacy of an internet survey on the postoperative follow-up*).....004
- 003.** AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS COM O USO DA METADONA EM CÃES.
(*Electrocardiographic evaluation of the degree of isolated methadone use in healthy dogs*).....007
- 004.** BLOQUEIO MOTOR E SENSITIVO EM GATOS SUBMETIDOS À ANESTESIA EPIDURAL COM TRAMADOL ASSOCIADO À LIDOCAÍNA.
(*Sensory and motor blockade in cats using tramadol combined with lidocaine through the epidural anesthesia*).....010
- 005.** MORTALIDADE EM ANESTESIA DE CÃES E GATOS: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 5.366 PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS.
(*Mortality in anesthesia of dogs and cats: retrospective study of 5.366 anesthetic procedures*).....013
- 006.** O USO DA TÉCNICA DE FARMACOPUNCTURA NO PONTO YIN-TANG PARA REDUÇÃO DA DOSE DA XILAZINA NA SEDAÇÃO DE CÃES.
(*Pharmacopuncture technique in yin-tang point for reduction xylazine dose to sedation in dogs*).....016
- 007.** VARIAÇÃO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA E TEMPO DE PROTROMBINA DE ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ANESTÉSICO EM CÃES NO PERI-OPERATÓRIO.
(*Variation on activated partial thromboplastine time and prothrombin time according to asa anesthetic risk in perioperative dog*).....019
- 008.** CONSCIENTIZANDO E EDUCANDO TUTORES QUANTO A ADOÇÃO DE ANIMAIS DE DOMÉSTICOS -ESTUDO DE CASO.
(*Teaching guardians about the adoption of domestic animals –case study*).....022
- 009.** CORTISOL SALIVAR EM GATOS DOMÉSTICOS (*Felis catus* Linnaeus, 1758): MODELO DE AVALIAÇÃO.
(*Salivary cortisol in domestic cats (felis catus linnaeus, 1758): evaluation model*).....025
- 010.** DIAGNÓSTICO DE BEM-ESTAR DE CÃES DOMICILIADOS E SEMI-DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, PARANÁ.
(*Welfare assessment of owned and free-roaming dogs in the town of campo largo, Paraná*).....027
- 011.** ESTUDO RETROSPECTIVO DE ATENDIMENTOS À MAUS TRATOS A ANIMAIS DE COMPANHIA NO HCV-UFPEL.
(*Retrospective study of battered pets care at hcv-ufpel*).....031
- 012.** PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS DE CÃES E GATOS E A PRÁTICA DA GUARDA RESPONSÁVEL DOS ACADÊMICOS CEULJI-ULBRA.
(*Profile of the owners of dogs and practice of the guard charge of Academic Centro University a Ji-Paraná Ceuji-Ulbra*).....034
- 013.** ABORDAGEM CLÍNICA E TERAPÊUTICA DO TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL SISTÊMICO EM UM GATO COM CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA.
(*Clinical approach and treatment of thromboembolism arterial in a cat with hypertrophic cardiomyopathy*).....037
- 014.** DEFEITO DO SEPTO INTERVENTRICULAR ASSOCIADO À ESTENOSE PULMONAR EM CÃO - RELATO DE CASO.
(*Ventricular septal defect associated with stenosis pulmonary in dog – case report*).....041
- 015.** DEFEITO SEPTAL VENTRICULAR EM FELINO (DSV) – RELATO DE CASO.
(*Feline ventricular septal defect (vsd) – case report*).....044
- 016.** DISPLASIA DE TRICÚSPIDE EM CÃO DA RAÇA BEAGLE – RELATO DE CASO.
(*Tricuspid valve dysplasia in male beagle – case report*).....047
- 017.** ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E ALDOSTERONA COMO BIOMARCADORES NA DEGENERATIVA MIXOMATOSA DA VÁLVULA MITRAL EM CÃES.
(*Angiotensin converting enzyme and aldosterone as biomarker in degenerative disease myxomatous mitral valve in dogs*).....050
- 018.** IMPACTO DO VOLUME/MASSA VENTRICULAR ESQUERDA NA FUNÇÃO DIASTÓLICA EM CÃES COM DEGENERAÇÃO CRÔNICA DA VALVA MITRAL.

- (Impact of volume/mass in left ventricular in diastolic function in dogs with chronic degeneration of mitral valve).....053
- 019. ÍNDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO DE CÃES COM DOENÇA VALVAR MITRAL CRÔNICA EM DIFERENTES ESTÁGIOS.**
(Myocardial performance index of dogs with chronic mitral valve disease in different stages).....056
- 020. PRESSÃO SISTÓLICA ARTERIAL PELO MÉTODO DOPPLER EM GATOS PERSAS SAUDÁVEIS E COM CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA.**
(Arterial systolic pressure by doppler method in healthy persian cats and with hypertrophic cardiomyopathy).....059
- 021. ROTAÇÃO APICAL POR MEIO DA EOCARDIOGRAFIA SPECKLE TRACKING EM GATOS DOMÉSTICOS.**
(Apical rotation by speckle tracking echocardiography in domestic cats).....062
- 022. ADRENALECTOMIA EM CÃO APRESENTANDO HEMANGIOMA E MIELOLIPOMA EM ADRENAL.**
(Adrenalectomy in dogs presenting hemangioma e myelolipoma in adrenal gland).....065
- 023. AVALIAÇÃO DE CADÁVERES QUIMICAMENTE PRESERVADOS.**
(Chemically preserved corpses).....068
- 024. ESTUDO COMPARATIVO DA EFICÁCIA DA CISSUS QUADRANGULARIS E DA PHYLLANTHUS RETICULATUS POIR NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS INDUZIDAS NA PELE DE CÔBAIAS.**
(Comparative study of the effectiveness of cissus quadrangularis and phyllanthus reticulatus poir in healing of induced wounds on the skin of guinea pigs).....071
- 025. LEIOMIOSSARCOMA CECO - CÓLICO EM CÃO JOVEM- RELATO DE CASO.**
(Leiomyosarcoma ceco-colico in young dog - A case report).....074
- 026. NEFROBLASTOMA ECTÓPICO EM UM FELINO: RELATO DE CASO.**
(Ectopic nephroblastoma in a feline: a case report).....077
- 027. O USO DA TOMOGRAFIA CONVENCIONAL E HELICOIDAL COMO AUXÍLIO NO PLANEJAMENTO CIRÚRGICO INTRANASAL.**
(The use of conventional helical tomography as an aid in intranasal surgical planning).....080

- 028. RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE CÃES PARAPLÉGICOS SEM PERCEPÇÃO DA DOR PROFUNDA SUBMETIDOS AO TRATAMENTO CIRÚRGICO: 15 CASOS.**
(Functional recovery in paraplegic dogs without deep pain perception submitted to surgical treatment: 15 cases).....083
- 029. SOLUÇÃO DE LARSEN MODIFICADA EM CADÁVERES DE COELHOS.**
(Modified larssen solution in cadavers of rabbits).....086
- 030. USO DO BACLOFENO NA ESPASTICIDADE MUSCULAR DE ORIGEM NEUROLÓGICA EM CÃO: RELATO DE CASO.**
(Use of baclofen for muscle spasticity by neurologic source in dog: case report).....089
- 031. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ASSOCIADO À HEMOPARASITOSE EM CÃO: RELATO DE CASO.**
(Stroke associated with the dog in hemoparasitose: case report).....092
- 032. ANASARCA ASSOCIADA À VASCULITE CAUSADA POR ERLIQUIOSE CANINA- RELATO DE CASO.**
(Anasarca associated to vasculite caused by canine erlichiose: a case report).....095
- 033. ARTERITE PROLIFERATIVA DO FILTRO NASAL EM UM CÃO: RELATO DE CASO.**
(Dermal arteritis of the nasal philtrum in a dog: A case report).....098
- 034. AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS EM CÃES OBESOS.**
(Evaluation of cardiorespiratory parameters of obsess dogs).....101
- 035. CISTITE ENFISEMATOSA EM TRÊS CÃES SCHNAUZERES NÃO DIABÉTICOS.**
(Emphysematous cystitis in three no diabetic schnauzer dogs).....104
- 036. CURVA GLICÊMICA EM CÃES SAUDÁVEIS.**
(Glucose curve in healthy dogs).....107
- 037. DADOS CLÍNICOS DA INFECÇÃO NATURAL POR *Trypanosoma caninum*.**
(Clinical data of natural infection by *Trypanosoma caninum*).....110
- 038. DIAGNÓSTICO CLÍNICO, LABORATORIAL E EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE: RELATO DE CASO.**
(Clinical diagnosis, laboratory and epidemiological of canine visceral leishmaniasis in the city Caruaru-PE: A case report).....113
- 039. ESPINHA BÍFIDA OCULTA, HEMIVÉRTEBRAS E ESTENOSE DO CANAL**

**VERTEBRAL EM YORKSHIRE TERRIER:
RELATO DE CASO.**

(Spina bifida occulta, hemivertebrae and stenosis of the spinal canal in a yorkshire terrier: A case report).....117

**040. ESTUDO PROSPECTIVO DE ERLIQUIOSE
MONOCÍTICA CANINA: AVALIAÇÃO CLÍNICA E
LABORATORIAL.**

(prospective study of canine monocytes ehrlichiosis: clinical and laboratory evaluation).. 120

**041. HEPATOPATIA CRÔNICA ASSOCIADA AO
ACÚMULO DE COBRE EM UM CÃO DA RAÇA
AMERICAN PITBULL TERRIER - RELATO DE
CASO.**

(Chronic liver disease associated to copper accumulation in an american pitbull terrier – A case report)..... 123

**042. IMPORTÂNCIA DA MENSURAÇÃO DA
IMUNORREATIVIDADE SEMELHANTE À
TRIPSINA SÉRICA CANINA (cTLI) PARA
DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA
PANCREÁTICA EXÓCRINA – RELATO DE
CASO.**

(Regard of canine trypsin-like immunoreactivity (cTLI) seric mensuration for exocrine pancreatic insufficiency diagnosis: A case report).....126

**043. INCIDÊNCIA DE TRAUMAS EM GATOS
ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA
UFCG NO PERÍODO DE 2006 A 2010 NO
MUNICÍPIO DE PATOS – PB.**

(Incidence of trauma in cats attended in veterinary hospital of the UFCG on period of 2006 to 2010 in the city of Patos – PB).....0129

**044. LEVANTAMENTO CLÍNICO E PATOLÓGICO
RETROSPECTIVO DE PERITONITE
INFECCIOSA FELINA EM FELINOS
DOMÉSTICOS ATENDIDOS NO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA UFMT DURANTE O PERÍODO
DE 2006 A 2011.**

(Survey report and retrospective pathological of feline infectious peritonitis in domestic cats veterinary hospital UFMT during the period 2006 to 2011)..... 132

**045. LOXOSCELIISMO SISTÊMICO EM CÃO –
RELATO DE CASO.**

(Sistemic loxoscelism in dog – A case report)..... 136

**046. MIELOMA MÚLTIPLO COM
ENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO
CENTRAL EM UM CÃO: RELATO DE CASO.**

(Multiple myeloma with central nervous system involvement in a dog: A case report).....0139

**047. OCORRÊNCIA DE MICROFILAREMIA NA
ROTINA MÉDICA DO LABORATÓRIO DE
ANÁLISE CLÍNICA-ESTUDO DE CASO.**

(Presence of micro-filaremia in the daily routine of the clinical analysis laboratory–case report).....142

**048. PESQUISA DE AGROTÓXICOS EM
PRIMATAS NÃO-HUMANOS PARA
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA FEBRE
AMARELA DURANTE O PERÍODO DE 2009 A
2011.**

(Research of pesticides in non-human primates for differential diagnosis of yellow fever during the period of 2009 to 2011).....145

**049. RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM CÃES
COM DOENÇA DO DISCO INTERVERTEBRAL
SEM PERCEPÇÃO À DOR PROFUNDA: 37
CASOS.**

(Functional recovery in dogs with intervertebral disk disease without deep pain perception: 37 cases).....148

**050. SÍNDROME DE HORNER SECUNDÁRIA À
FIBROSSARCOMA SUBCUTÂNEO CERVICAL –
RELATO DE CASO.**

(Horner's syndrome secondary to subcutaneous cervical fibrosarcoma – a case report).....151

**051. VIABILIDADE DO PLASMA FRESCO
CONGELADO CANINO DE ACORDO COM
DIFERENTES PERÍODOS DE ESTOCAGEM-
RESULTADOS PREVIOS.**

(Viability of canine fresh frozen plasma in accord with different period of store- preview results).... 154

**052. ACURÁCIA DO EXAME CITOPATOLÓGICO
NO DIAGNÓSTICO DA ESPOROTRICOSE
FELINA.**

(Cytopathological examination accuracy in feline sporotrichosis diagnosis).....157

**053. DERMATOFITOSE EM PEQUENOS
ANIMAIS NA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO
SUL – BRASIL.**

(Ringworm in small animals in southern bra)....160

**054. DERMATOFITOSSES EM CÃES ATENDIDOS
NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
NO ANO DE 2011.**

(Ringworm in dogs treated at the veterinary hospital of federal university of mato grosso in 2011).....163

**055. DISPLASIA ECTODÉRMICA LIGADA AO
CROMOSSOMO X – APLASIA DO FOLÍCULO
PILOSO ASSOCIADA A DISPLASIA DENTÁRIA
EM CÃO: RELATO DE CASO.**

(X-linked ectodermal dysplasia - aplasia of the hair follicle with dental dysplasia in dog: case report).....166

**056. ESCLERODERMIA EM UM CANINO:
RELATO DE CASO.**

(Scleroderma in a dog: A case report).....169

- 057. LINFOMA EPITELIOTRÓPICO DESCAMATIVO E NÃO PRURIGINOSO EM CÃO – RELATO DE CASO.**
(*A non-pruriginous scaly epitheliotropic lymphoma in a dog – case report*).....173
- 058. LÚPUS ERITEMATOSO DISCÓIDE EM CAVIDADE ORAL DE CÃO – RELATO DE CASO.**
(*Lupus erythematosus, discoid oral cavity in the dog - case report*).....176
- 059. PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE *Staphylococcus* spp ISOLADAS DE PIODERMATITE CANINA.**
(*Antimicrobial resistance profile of staphylococcus spp. pyoderma of isolated canine*).....179
- 060. A ULTRASSONOGRRAFIA SIMPLES COMO DIAGNÓSTICO DA DISPLASIA RENAL CONGENITA EM CÃES DA RAÇA SHIH TZU NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA.**
(*the simple ultrasound as diagnosis of congenital renal dysplasia in shih tzu dog race in the city of Salvador – Bahia*).....182
- 061. ACOMPANHAMENTO ULTRASSONOGRÁFICO SERIADO DA EVOLUÇÃO DE HIDROPSIA FETAL EM CADELA BULLDOG FRANCÊS.**
(*hydrops fetalis in the french bulldog - case report*).....185
- 062. ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS DE PIONEFROSE UNILATERAL EM CADELAS: RELATO DE DOIS CASOS.**
(*Sonographic aspects of unilateral pyonephrosis in bitches: two case reports*).....189
- 063. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CEREBRAL DE FELINOS HÍGIDOS.**
(*Qualitative evaluation of brain computed tomography of healthy felines*).....192
- 064. DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DE HIDROCEFALIA FETAL EM FELINOS DOMÉSTICOS– RELATO DE DOIS CASOS.**
(*Sonographic diagnosis of fetal hydrocephaly in cats - two cases reports*).....195
- 065. DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DE VENTRICULOMEGALIA CEREBRAL EM CÃES – RELATO DE QUATRO CASOS.**
(*Ultrasonographic diagnosis of brain ventriculomegaly in dogs – four case reports*)..198
- 066. HISTEROCELE GESTACIONAL ASSOCIADA A HIDROCEFALIA FETAL EM CADELA – RELATO DE CASO.**
(*gestational hysterocele assoated with fetal hydrocephalus in bitch - case report*).....201
- 067. RADIOGRAFIA TORÁCICA EM CUTIAS**
(*Dasyprocta prymnolopha, WAGLER 1831*).
(*chest radiograph in agouti (Dasyprocta prymnolopha, Wagler 1831)*).....204
- 068. RADIOLOGIA CONVENCIONAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO DIAGNÓSTICO DE BULAS PULMONARES ASSOCIADAS A PNEUMOTÓRAX E PNEUMOMEDIASTINO EM UM CÃO.**
(*Conventional radiology and computed tomography in the diagnosis of pulmonary bullae associated to pneumothorax and pneumomediastinum in a dog*).....207
- 069. URETROCISTOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DE REFLUXO VESICoureTERAL: RELATO DE CASO.**
(*Cystourethrography in diagnostic of vesicoureteral reflux*)210
- 070. REABILITAÇÃO DE CÃO COM SEQUELA DA CINOMOSE ATRAVÉS DE FISIOTERAPIA: RELATO DE CASO.**
(*Rehabilitation of dog with sequel distemper by phisiotherapy: case report*).....213
- 071. TRATAMENTO POR ACUPUNTURA EM UM PASTOR BELGA COM MIELOPATIA DEGENERATIVA.**
(*Acupuncture treatment in a belgian shepherd dog with degenerative myelopathy*).....216
- 072. COLANGITE NEUTROFÍLICA CRÔNICA NUM CÃO – RELATO DE CASO.**
(*Chronic neutrofilic colangitis in one dog – case report*).....219
- 073. AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES COM CINOMOSE CANINA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**
(*Clinical features in dogs with canine distemper in Rio Grande do Sul State*).....222
- 074. CO-INFECÇÃO POR *Leishmania* (*Leishmania*) *chagasi* E *Trypanosoma caninum* EM CÃO DE CUIABÁ, MATO GROSSO – RELATO DE CASO.**
(*co-infection for Leishmania (leishmania) chagasi and Trypanosoma caninum in dogs of cuiabá, mato grosso – case report*).....225
- 075. CRIPTOCOCOSE INTESTINAL EM CÃO – RELATO DE CASO.**
(*Intestinal cryptococcosis in a dog – report case*).....227
- 076. ENTEROBACTÉRIAS ISOLADAS DE AMOSTRAS FECAIS DE CÃES JOVENS E ADULTOS SADIOS DA CIDADE DE BELÉM, PARÁ.**
(*Enterobacter isolated from samples of feces from adults and young dogs healthy of the city of Belém, Pará*).....231

- 077. ESTUDO DA MICROBIOTA BACTERIANA VAGINAL DE CADELAS E GATAS DOMÉSTICAS.**
(*Vaginal bacterial microbiota study of domestic dogs and cats*).....234
- 078. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ATÍPICAS DA LEISHMANIOSE VISCERAL EM UM CANINO DOMÉSTICO.**
(*atypical clinical manifestations of visceral leishmaniasis in a domestic canine*).....237
- 079. MICROBIOTA BACTERIANA AERÓBICA CONJUNTIVAL DE CÃES E GATOS SADIOS DA CIDADE DE BELÉM, PARÁ.**
(*Conjunctival aerobic bacterial microbiota of healthy dogs and cats of the city of Belém, Pará*).....240
- 080. SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE ISOLADOS DA CONJUNTIVA DE PACAS (*Agouti paca*) MANTIDAS EM CATIVEIRO.**
(*Antimicrobial sensivity of the conjunctival isolated from captive pacas*).....243
- 081. ASPERGILOSE SINO-NASAL E SINO-ORBITAL EM UM GATO PERSA.**
(*A persian cat with sino-nasal and sino-orbital aspergilosis*).....246
- 082. COLANGIOHEPATITE EM FELINOS: RELATO DE CASOS.**
(*Feline cholangiohepatitis: cases report*).....249
- 083. DESCRIÇÃO CLÍNICA E PATOLÓGICA DO TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL EM PACIENTE FELINO.**
(*Clinical and pathologic description of thromboembolism in a feline patient*).....252
- 084. DISAUTONOMIA FELINA – SÍNDROME DE KEY-GASKELL: RELATO DE CASO.**
(*Feline dysautonomia - key-gaskell syndrome: a case report*).....255
- 085. ESTERÓIDE ANTIPROGESTÁGENO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA FIBROEPITELIAL FELINA.**
(*Steroid synthetic progesterone in treatment of feline fibroepithelial hyperplasia mammary*).....259
- 086. HEMIMELIA RADIAL EM UM EXEMPLAR DA ESPÉCIE FELINA.**
(*Radial hemimelia in a case of feline species*).....262
- 087. INFECÇÃO NATURAL POR LEISHMANIA SPP. EM FELINO DOMÉSTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: RELATO DE CASO.**
(*Natural infection with Leishmania spp. in a domestic feline in Fortaleza city: case report*)...265
- 088. OCORRÊNCIA DE *Mycoplasma haemofelis* EM FELINOS DOMÉSTICOS DE CUIABÁ, MATO GROSSO, BRASIL.**
(*Occurrence of mycoplasma haemofelis in domestic felines from cuiabá, Mato Grosso, Brazil*).....269
- 089. PANCREATITE AGUDA EM UM FELINO PEDIÁTRICO: ACHADOS CLÍNICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS.**
(*Acute pancreatitis in a pediatric feline: clinical and pathological findings*).....272
- 090. PREVALÊNCIA DE IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA E LEUCEMIA VIRAL FELINA NO DISTRITO FEDERAL.**
(*Feline imunodeficiency virus and filine leukemia virus prevalences in distrito federal*).....275
- 091. RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.**
(*Shelter medicine residency in the Federal University of Paraná*).....278
- 092. NEFROPATIA JUVENIL ASSOCIADA À DISPLASIA RENAL – RELATO DE CASO.**
(*Nephropaty associated with renal dysplasia – case report*).....281
- 093. SÍNDROME NEFRÓTICA ASSOCIADO AO VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA EM GATO: RELATO DE CASO.**
(*Nephrotic syndrome associated with the virus of feline leukemia in a cat: case report*)...284
- 094. DEFEITO NA PAREDE TÓRACO-ABDOMINAL ASSOCIADO À MÁ-FORMAÇÃO EM MEMBROS TORÁDICOS DE NEONATO CANINO – RELATO DE CASO.**
(*Thoracic and abdominal wall closure defect associated to anterior limb malformation in a neonate dog – case report*).....287
- 095. MANEJO DO NEONATO CANINO COM FENDA PALATINA PRIMÁRIA - RELATO DE CASO.**
(*Management of the neonate canine with primary cleft palate - case report*).....290
- 096. COMPRIMENTO DA CAVIDADE PULPAR DE ACORDO COM OS FORMATOS DE CABEÇA DOS CÃES.**
(*Length of pulp cavity to the formats head of dogs*).....294
- 097. INTRUSÃO TRAUMÁTICA DE DENTE INCISIVO NA ARTICULAÇÃO INTERMANDIBULAR EM UM SHIH TZU.**
(*Traumatic incisor intrusion in intermandibular joint in a shih tzu*).....298

- 098. ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA MICROBIOTA PERIODONTAL DE CÃES DA CIDADE DE BELÉM, PARÁ.**
(*Isolation and identification of dogs periodontal microbiota of the city of Belém, Pará*).....301
- 099. TÉCNICA PARA ODONTOSECÇÃO DE RAIZ SUPRANUMERÁRIA BILATERAL EM CÃO DA RAÇA DACHSHUND.**
(*Odontosection technique for upper third premolar with supernumerary root in dog*).....304
- 100. UTILIZAÇÃO DE OBTURADOR PARA CORREÇÃO DE FENDA PALATINA ADQUIRIDA EM UM FELINO: RELATO DE CASO.**
(*Use of shutter for correction of acquired cleft palate in a feline: a case report*).....307
- 101. ACHADOS OCULARES HISTOPATOLÓGICOS EM UM COELHO INFECTADO POR ENCEPHALITIZOON CUNICULI.**
(*Ocular histopathology of a rabbit infected by Encephalitozoon cuniculi*).....310
- 102. AVALIAÇÃO DE IMPLANTE MUCO-CONJUNTIVAL DE QUITOSANA E OFLOXACINO PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES OCULARES EXTERNAS.**
(*Development of mucoconjunctival chitosan films with ofloxacin for treatment ocular external infections*).....314
- 103. CIRCULAÇÃO RETINIANA EM COELHOS TRATADOS COM CITRATO DE SILDENAFIL.**
(*Retinal circulation in rabbits treated with sildenafil citrate*).....318
- 104. DISPLASIA DE RETINA BILATERAL EM CÃO - RELATO DE CASO.**
(*bilateral retinal dysplasia in dog - case report*).....322
- 105. DUPLO SEPULTAMENTO DE GLÂNDULA DA TERCEIRA PÁLPEBRA: MODIFICAÇÃO DA TÉCNICA DE MORGAN E MOORE EM 10 CÃES.**
(*Double burial of the third eyelid gland: use of modified technique of morgan and moore: in 10 dogs*).....325
- 106. EPITELIOMA E ADENOMA CONCOMITANTES DAS GLÂNDULAS SEBÁCEAS TARSIS EM UMA CADELA.**
(*Palpebral sebaceous gland epithelioma over sebaceous gland adenoma in a bitch*).....328
- 107. IMPLANTE MUCO-CONJUNTIVAL DE QUITOSANA E MALEATO DE TIMOLOL PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA.**
(*Mucoconjunctival chitosan coated timolol maleate film for treatment of glaucoma*).....331
- 108. MELANOMA COROIDAL EM CÃO - RELATO DE CASO.**
(*Choroidal melanomas in dog - case report*)...335
- 109. ADENOCARCINOMA APÓCRINO MISTO NASAL CANINO: RELATO DE CASO.**
(*Nasal mixed apocrine adenocarcinoma in dog: case report*).....338
- 110. CARCINOMA INTESTINAL DIFUSO EM CÃO COM ENTERITE CRÔNICA - RELATO DE CASO.**
(*Difuse intestinal carcinoma in dog with chronic enteritis – case report*).....341
- 111. ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS PELA TÉCNICA DE ACETATO DE CELULOSE EM FELINOS COM LINFOMA.**
(*Serum proteins electrophoresis by the technique of cellulose acetate in cats with lymphoma*)....343
- 112. EPIDEMIOLOGIA E APRESENTAÇÃO CLÍNICA DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS CANINAS.**
(*Epidemiology and clinical presentation of canine mammary neoplasms*).....347
- 113. ESTUDO RETROSPECTIVO DAS NEOPLASIAS ORAIS DE PEQUENOS ANIMAIS ATENDIDOS NO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS.**
(*Retrospective study of oral neoplasm of small animals seen in Department of Veterinary Medicine, Federal University of Lavras*).....350
- 114. ESTUDO RETROSPECTIVO DOS CASOS DE TUMOR VENEREO TRANSMISSÍVEL (TVT) CANINO ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFBA NO PERÍODO DE 2009 A 2011.**
(*A retrospective study of cases of canine transmissible venereal tumor (TVT) treated at the hospital veterinary da UFBA from 2009 to 2011*).....354
- 115. MIELOPATIA COMPRESSIVA POR LIPOMA DE CÉLULAS FUSIFORMES INFILTRATIVO EM CÃO.**
(*Compressive myelopathy by infiltrative spindle cell lipoma in a dog*).....358
- 116. NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS HEPATÓIDES EM CÃES: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA EM REGIÕES EXTRAPERIANAIS.**
(*Hepatoid gland tumors in dogs : prevalence in regions extraperianais evaluation*).....361
- 117. NEOPLASIAS EM CÃES, ESTUDO RETROSPECTIVO DE 535 CASOS.**
(*Neoplasms in dogs, retrospective study of 535 cases*).....365
- 118. NEOPLASMAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE CÃES: 26 CASOS.**
(*Neoplasms in the central nervous system of dogs: 26 cases*).....368

- 119. NÍVEIS DE CÁLCIO IONIZADO EM CADELAS COM CARCINOMA MAMÁRIO - ESTUDO DE 16 CASOS.**
(*Ionized calcium levels in dogs with carcinoma mamarium: study of 16 cases*).....371
- 120. OCORRÊNCIA DE SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS EM 29 CÃES COM NEOPLASIAS LINFOPROLIFERATIVAS.**
(*Occurrence of paraneoplastic syndromes in 29 dogs with lymphoproliferative neoplasia*).....374
- 121. OSTEOSARCOMA CONDROBLÁSTICO EXTRAESQUELÉTICO EM CADELA: RELATO DE CASO.**
(*Extraskeletal chondroblastic osteosarcoma in a bitch: case report*).....377
- 122. PRINCIPAIS AFECÇÕES EM CÃES IDOSOS DIANOSTICADAS EM UM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE 2000 a 2010.**
(*Older dogs most frequent diseases at a diagnostic laboratory during the period of 2000 to 2010*)...380
- 123. QUIMIOTERAPIA NEO-ADJUNVANTE, SEGUIDA DE REMOÇÃO CIRÚRGICA E QUIMIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA NO TRATAMENTO DE MASTOCITOMA DE LÍNGUA EM CÃO - RELATO DE CASO.**
(*Chemotherapy neo-adjuvante, followed by surgical removal and postoperative chemotherapy in the treatment of dog in language mastocytoma - case report*).....383
- 124. TRATAMENTO COM SULFATO DE VINCRISTINA E POSTERIOR RESSECÇÃO DE ADENOCARCINOMA ANORRETAL EM UM CANINO - RELATO DE CASO.**
(*treatment with vincristine sulfate and subsequent resection of anorectal adenocarcinoma in a canine - a case report*).....387
- 125. TRATAMENTO E PROGNÓSTICO DO CARCINOMA DE TIREOIDE CANINO - RELATO DE DOIS CASOS.**
(*treatment and prognosis of canine thyroid carcinoma - two cases report*).....391
- 126. AGENESIA DE METACARPO, METATARSO E FALANGE EM DOIS CÃES - RELATO DE CASO.**
(*Agenesis of metacarpus, metatarsus and phalanx in two dogs - case report*)394
- 127. AVULSÃO DO LIGAMENTO CRUZADO CAUDAL E FRATURA DE SALTER-HARRIS TIPO I EM UM LOBO-GUARÁ (*Chrysocyon brachyurus*)**
(*Avulsion of the caudal cruciate ligament and salter-harris type i fracture in a maned wolf (Chrysocyon brachyurus)*).....397
- 128. CALCIFICAÇÃO DO TENDÃO SUPRA-ESPINHOSO EM CÃO - RELATO DE CASO.**
(*Calcification of the supraespinatus tendon in one dog: case report*).....401
- 129. OSTEOSÍNTESE COM PLACA MINIMAMENTE INVASIVA EM FRATURA COMINUTIVA DA DIÁFISE TIBIAL EM CÃO: RELATO DE CASO.**
(*Minimally invasive plate osteosynthesis for diaphyseal tibial comminuted fracture in a dog: case report*).....404
- 130. OSTEOSÍNTESE DE OLÉCRANO EM LOBO-GUARÁ (*Chrysocyon brachyurus*) - RELATO DE CASO.**
(*Olecranon osteosynthesis in a free-ranging maned wolf (Chrysocyon brachyurus) - case report*).....408
- 131. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO DE JOELHO EM UM GATO.**
(*Surgical treatment for stifle joint displacement in a cat*).....412
- 132. CITOLOGIA SANGUÍNEA NO DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES DA BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO.**
(*Blood cytology in the diagnosis of visceral leishmaniasis in dogs of baixada cuiabana, state of Mato Grosso*).....415
- 133. FREQUÊNCIA DE PARASITAS GASTROINTESTINAIS EM CÃES (*Canis lupus familiares*) DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.**
(*Frequency of gastrointestinal parasites in dogs (Canis lupus familiaris) domiciled in the city of Aracaju/SE*).....418
- 134. INFECÇÃO POR RANGELIA VITALLI EM CANINO - RELATO DE CASO.**
(*Rangelia vitalli infection in dog - case report*)..421
- 135. OCORRÊNCIA DE HEPATOZOONOSE EM CÃES DA ZONA RURAL DE TERESINA, PIAUÍ.**
(*Occurrence of hepatozoonosis in dogs of the rural area in Teresina, Piaui*).....424
- 136. PESQUISA DE FORMAS AMASTIGOTAS DE LEISHMANIA SPP. PELA CITOLOGIA DE LINFONODO E MEDULA ÓSSEA EM CÃES DA BAIXADA CUIABANA.**
(*Research amastigotes of Leishmania spp. cytology of the marrow and lymph in dogs of lower cuiabana*).....427
- 137. ANÁLISE HEMATOLÓGICA DE ARARAS DE CATIVEIRO EM MATO GROSSO DO SUL.**
(*Hematologic analyses of macaws in captivity in Mato Grosso do Sul*).....430
- 138. COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS RDW-CV, RDW-SD E VCM EM CÃES COM ANEMIA NÃO RESPONSIVA.**

(Parameters behavior, rdw-cv, rdw-sd and vcm in dogs with anemia).....433

139. CRIPTOCOCOSE DISSEMINADA EM UM CÃO.
(Disseminated cryptococose in a dog).....436

140. EFEITO DE TRÊS DIFERENTES DOSES DO FATOR ESTIMULANTE DE COLÔNIA DE GRANULÓCITOS RECOMBINANTE HUMANO (RHG-CSF) SOBRE O NÚMERO DE LEUCÓCITOS E PLAQUETAS DE CÃES SADIOS.
(Effect of three different doses of rhg-csf on the values of leukocytes and platelets of healthy dogs).....439

141. EFEITO DO FATOR ESTIMULANTE DE COLÔNIA DE GRANULÓCITOS RECOMBINANTE HUMANO (RHG-CSF) NA MOBILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOIÉTICAS CD34+ PARA O SANGUE PERIFÉRICO DE CÃES SAUDÁVEIS.
(Effect recombinant human granulocyte colony stimulating factor (rhg-csf) in the mobilization of hematopoietic stem cell cd34+ to the peripheral blood of healthy dogs).....442

142. ESTUDO RETROSPECTIVO DOS RESULTADOS CITOPATOLÓGICOS DE TUMORES MAMÁRIOS EM CADELAS ATENDIDAS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA PUCPR (UHAC).
(Cytopathology retrospective study of results in breast tumors of bitches answered in hospital unit of pet animals of PUCPR (UHAC)).....445

143. FREQUÊNCIA DOS GRUPOS SANGÜÍNEOS A, B E AB EM GATOS DOMÉSTICOS MESTIÇOS NA CIDADE DE PATOS, PARAÍBA, BRASIL.
(Frequency of blood groups a, b and ab in mixed breed domestic cats in the city of Patos, Paraíba, Brazil).....448

144. INCLUSÃO DE HEPATÓZOON EM CÉLULAS DE TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL CANINO.
(Inclusion of hepatozoon in canine transmissible venereal tumor cells).....451

145. ÍNDICES DE ATIVIDADE DE GAMAGLUTAMILTRANSPEPTIDASE URINÁRIA EM CÃES ADULTOS SAUDÁVEIS.
(Index of urine glutamyltranspeptidase activity in clinically normal adult dogs).....454

146. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA EM FILHOTE – RELATO DE CASO.
(Leukemia in chronic lymphocytic puppy - case report).....457

147. PAINEL DE PCR EM TEMPO-REAL NA DETECÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE DIARRÉIA EM CÃES E SUAS CO-INFECÇÕES.
(Panel of real-time pcr for detection of agents in causing diarrhea in dogs and co-infections).....460

148. PRESENÇA DE GAMETÓCITO EM HEMÁCIAS DE TUIUIU (Jabiru myceria) DE VIDA LIVRE.
(Presence of tuiui gametocytes in red blood cell (Jabiru myceria) free life).....463

149. “VARIAÇÃO DOS ÍNDICES RDW (AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS ERITRÓCITOS) E PDW (AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS PLAQUETAS) EM CÃES COM ERLÍQUIOSE”.
(“Variation in rdw (red cell distribution width) and pdw (platelet distribution width) in dogs with ehrlichiosis”).....466

150. GESTAÇÃO ECTÓPICA ASSOCIADA À MUMIFICAÇÃO FETAL EM CADELA.
(Ectopic pregnancy associate to fetal mummification in dog).....469

151. MALFORMAÇÃO FETAL APÓS O USO DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA NO INÍCIO DA GESTAÇÃO EM CADELA E GATA.
(Fetal malformation after the use of medroxyprogesterone acetate in early pregnancy in bitch and queen).....472

152. PSEUDO HERMAFRODITISMO EM CÃO: RELATO DE CASO.
(Pseudohermaphroditism in a dog: case report).....475

153. ACIDENTES DE TRABALHO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE UBERABA.
(Accidents at work of a veterinary hospital Uberaba).....478

154. ANÁLISE BACTERIANA E PARASITOLÓGICA DAS ÁGUAS DE PARQUES PÚBLICOS DE CURITIBA, COMO INDICADORES DOS NÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E DE SUSTENTABILIDADE.
(Bacterial and parasitologic wastewaters analysis of public parks of Curitiba, as indicators of contamination levels and environmental sustainability).....481

155. DONOS COM MENOS RENDA NÃO POSSUEM MAIS CÃES: MODELAGEM NA CONTAGEM DE ANIMAIS DE ACORDO COM SEUS DONOS.
(Low income owners do not have more dogs: modeling animal count according to their owners).....485

156. ESTUDO SOROLÓGICO DA TOXOPLASMOSE CANINA PELA PROVA DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA EM JATAÍ – GO.

(Seroological study of canine toxoplasmosis by the indirect haemagglutination test, in Jataí – GO)..488

157. FREQUÊNCIA DE HELMINTOS EM FEZES DE CÃES ERRANTES COLETADAS DO SOLO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE CASTANHAL – PA.

(Frequency of helminths in feces of stray dogs found on the ground squares of the city of Castanhal – PA).....491

158. INFECÇÃO PELA VARIANTE 4 DO VÍRUS RÁBICO EM MORCEGO INSETÍVORO, *Myotis nigricans*, NO BAIRRO DE ITAPUÃ, SALVADOR-BAHIA - PRIMEIRO RELATO.

(Infection by the 4 variant rabies virus in insectivore bat, *Myotis nigricans*, in the neighbourhood of Itapuã, Salvador-Bahia - first report).....494

159. INFECÇÃO POR *Leishmania* sp EM CÃES DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL – RESULTADOS PRELIMINARES.

(*Leishmania* sp infection in dogs of Florianópolis, Santa Catarina, Brazil – preliminary results).....497

160. LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE LEISHMANIOSE CANINA NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA (JAN/ 2009 – JUN/2011).

(Epidemiological survey of canine leishmaniasis cases in the city of São Luís - MA (Jan / 2009 - Jun/2011).....500

161. OCORRÊNCIA DE AGLUTININAS ANTI - LEPTOSPIRA INTERROGANS EM CÃES DE APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS, 2008.

(Anti - *Leptospira interrogans* agglutinins occurrence in dogs serum from Aparecida de Goiânia, Goiás, 2008).....503

162. PEERFIL DE SENSIBILIDADE IN VITRO AOS ANTIMICROBIANOS DE ISOLADOS DE STAPHYLOCOCCUS SPP. OBTIDOS DA SALIVA DE CÃES.

(Peerfil sensitivity in vitro of isolated to antimicrobial of *Staphylococcus* spp. obtained from the saliva of dogs).....506

163. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO ANTERIOR E UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE EM *Chelonoidis carbonaria* (LINNAEUS, 1766) - RELATO DE CASO.

(Limb amputation and prosthesis in *Chelonoidis carbonaria* (Linnaeus, 1766) - case report).....509

164. ANAPLASMOSE EM *Procyon cancrivorus*: RELATO DE CASO.

(Anaplasmosis in *Procyon cancrivorus*: case report).....512

165. ANATOMIA DO CORAÇÃO DO TAMANDUA-MIRIM (*Tamandua tetradactyla*).

(The lesser anteater's heart anatomy (*Tamandua tetradactyla*).....515

166. AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA GESTACIONAL DE SERPENTE

(*Epicrates cenchria* (JIBÓIA VERMELHA). (Sonographic pregnancy evaluation of snake *Epicrates cenchria* (Rainbow boas)).....518

167. CORRELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS CITOLÓGICAS VAGINAIS E OS PERFIS DE PROGESTINAS FECALIS DURANTE O CICLO ESTRAL EM VEADO-CATINGUEIRO (*Mazama gouazoubira*).

(Correlation between the vaginal cytology features and profiles of fecal progesterone during the estrous cycle in brown brocket deer (*Mazama gouazoubira*) on captive).....521

168. DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO DIAFRAGMA DO SAGUI-DE-TUFO-BRANCO (CALLITHRIX JACCHUS).

(Morphological description of diaphragm of white-tufted-ear-marmoset (*Callithrix jacchus*).....525

169. ESTUDO ANATÔMICO DA TRAQUEIA E PULMÕES DO SAUIM *Saguinus midas* (Linnaeus, 1758)

(Anatomical study of the trachea and lungs of *Sauim saguinus midas* (Linnaeus, 1758).....527

170. EXOFTALMIA POR ABSCESSO INTRA-ORBITAL ODONTOGÊNICO EM *Cebus apella*.

(*Exophthalmos* by intraorbital odontogenic abscess in *Cebus apella*).....531

171. HEMATOLOGIA DO JURARÁ (*Kinosternon scorpioides*, LINNAEUS, 1766).

(Morfology of the blood cells of jurará (*Kinosternon scorpioides*, Linnaeus, 1766))....534

172. INFLUÊNCIA DO SEXO NA BIOQUÍMICA SÉRICA DE JIBOIAS AMAZÔNICAS (*Boa constrictor constrictor*), PARÁ, BRASIL.

(Gender influence on amazon serum biochemistry *boa constrictors* (*Boa constrictor constrictor*), Pará, Brazil).....537

173. LEVANTAMENTO DE ENDOPARASITOSE DE FELÍDEOS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE TERESINA-PIAUÍ.

(Rising of endoparasitoses of felídeos of the parque zoobotânico of Teresina-Piauí).....540

174. Linfoma Multicêntrico Espontâneo Em Hamster Sírio (*Mesocricetus auratus*).

(Spontaneous multicentric lymphoma in syrian hamster (*Mesocricetus auratus*).....544

- 175. MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO EM COELHOS.**
(*Measurement of the systemic blood pressure in rabbits by oscillometric method*).....547
- 176. MORFOMETRIA MACROSCÓPICA DO CORAÇÃO DO SAGUI-DE-CARA-BRANCA**
(*Callithrix geoffroyi*).
(*Macroscopic morphometry of heart of white-fronted-marmoset (Callithrix geoffroyi)*).....550
- 177. PERFIL COPROPARASITOLÓGICO DE AVES SILVESTRES MANTIDAS EM CATIVEIRO EM CRIADOURO CONSERVACIONISTA, CAMPINA GRANDE DO SUL-PR.**
(*Coproparasitological profile of wild birds kept in conservation breeding, Campina Grande do Sul – PR*).....553
- 178. PSEUDO-HERMAFRODITISMO EM JABUTI PIRANGA (CHELONOIDIS CARBONARIA): RELATO DE CASO.**
(*Pseudohermaphroditism in red-footed tortoise (Chelonoidis carbonaria): case report*).....556
- 179. RAMIFICAÇÕES DA ARTÉRIA CELÍACA DO SAGUI-DE-TUFO-PRETO (Callithrix penicillata).**
(*Branches of celiac artery of black-tufted-ear-marmoset (Callithrix penicillata)*).....559
- 180. SÍNDROME VESTIBULAR EM FILHOTES DE ONÇA-PINTADA (PANTHERA ONCA) CAUSADA POR ENROFLOXACINA: RELATO DE CASO.**
(*Vestibular syndrome in young jaguars (Panthera onca) caused by enrofloxacin: case report*)..562
- 181. STRAIN E STRAIN RATE LONGITUDINAL EM LOBO-GUARÁ**
(*Chrysocyon brachyurus*)
(*Longitudinal strain and strain rate in maned wolf (Chrysocyon brachyurus)*).....565
- 182. SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DA CAPARAÇA E PARCIAL DO PLASTRÃO EM Chelonoidis carbonaria (LINNAEUS, 1766) POR RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - RELATO DE CASO.**
(*Complete replacement of the carapace and partial replacement in plastron Chelonoidis carbonaria (Linnaeus, 1766) by acrylic resin - case report*).....568
- 183. SURTO DE MEGABACTERIOSE EM PERIQUITOS (Melopsittacus undulatus) EM ITAPORANGA D'AJUDA – SERGIPE – BRASIL.**
(*megabacteriosis in budgerigars (Melopsittacus undulatus) in the municipality of itaporanga d'ajuda – Sergipe – Brazil*).....571
- 184. VASCULARIZAÇÃO ARTERIAL DO SISTEMA GENITAL FEMININO DO GATO MARACAJÁ (Leopardus Wiedii).**
(*Vascularization system of female genital margay (Leopardus wiedii)*).....574
- 185. ANFOTERICINA B SUBCUTÂNEA NO TRATAMENTO DA ESPOROTRICOSE FELINA.**
(*Subcutaneous amphotericin b for the the treatment of feline sporotrichosis*).....577
- 186. AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA AO IODETO DE POTÁSSIO NA ESPOROTRICOSE FELINA.**
(*Evaluation of therapeutic response to potassium iodide in feline sporotrichosis*).....580
- 187. NOVO PROTOCOLO PARA PRODUÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS EM CÃES.**
(*New protocol for production of platelet-rich plasma in dogs*).....583
- 188. ANÁLISE DE FATORES DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS EM CÃES: ESTUDO DE CASO-CONTROLE PAREADO.**
(*Analysis of risk factors of canine diabetes mellitus: a matched case-control study*).....586
- 189. DISRUPTORES ENDÓCRINOS E HIPERTIREOIDISMO FELINO.**
(*Endocrine disruptors and feline hyperthyroidism*).....589
- 190. ESTUDO DO DHEA-S EM CÃES COM ERLIQUIOSE.**
(*Estudo do dhe-s em cães com erliquiose*).....591

001. ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS EM CÃES ANESTESIADOS COM INFUSÃO CONTÍNUA DE PROPOFOL, ASSOCIADO OU NÃO AO TRAMADOL

Paula Ferreira da Costa, Newton Nunes, José Antônio Marques, Patrícia Cristina Ferro Lopes, Emílio de Almeida Belmonte, Pâmela Bongiovanni Catandi

Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Jaboticabal, São Paulo, Brasil. e-mail: cidinhavet@yahoo.com.br

RESUMO

Oito cães foram submetidos a 2 anestésias, com 15 dias de intervalo, para avaliação hematológica, tendo-se 2 grupos: controle (GC) e tramadol (GT). O propofol foi empregado na indução (10mg/kg) e na manutenção anestésica (0,7 mg/kg/min). Iniciou-se ventilação controlada a pressão. No GT, os animais receberam tramadol (2 mg/kg), seguido de infusão contínua (0,5 mg/kg/h), enquanto no GC, administrou-se solução de cloreto de sódio 0,9%. Para as variáveis, uma amostra de sangue foi coletada antes da indução (Mbasal), 30 minutos após a indução (M0) e em intervalos de 30 minutos (M30 e M60). O método estatístico foi a Análise de Perfil ($P < 0,05$). A anestesia promoveu diminuição da contagem de hemácias, hemoglobina e hematócrito, leucócitos totais e linfócitos. Conclui-se que, a associação propofol e tramadol deve ser utilizada com cautela em cães com potencial de imunossupressão.

PALAVRAS - CHAVE: Anestesia total intravenosa, células sanguíneas, opióide

HEMATOLOGIC CHANGES IN DOGS SUBMITTED TO CONTINUOUS INFUSION OF PROPOFOL ASSOCIATED, OR NOT, TO TRAMADOL

ABSTRACT

Eight dogs underwent two anesthetics, with 15 days interval for hematologic evaluation and to two groups: control (CG) and tramadol (GT). Propofol was used for the induction (10mg/kg) and maintenance of anesthesia (0.7 mg / kg / min). He began to pressure controlled ventilation. In GT, the animals received tramadol (2 mg / kg), followed by continuous infusion (0.5 mg / kg / h), while the GC, we administered sodium chloride solution 0.9% for the variables. A blood sample was collected before induction (Mbasal), 30 minutes after induction (M0) and at intervals of 30 minutes (M30 and M60). The statistical method was Profile analysis ($p < 0.05$). Anesthesia caused a reduction of blood counts, hemoglobin and hematocrit, total leukocytes and lymphocytes. It is concluded that the association propofol and tramadol should be used with caution in dogs with potential immunosuppression.

KEYWORDS: Blood cells, opioid, total intravenous anesthesia.

INTRODUÇÃO

Os agentes anestésicos podem alterar a contagem de células sanguíneas periféricas, como os linfócitos, devido às reações oxidativas, levando à supressão da imunidade. O propofol destaca-se, pois, estudos demonstram que a imunidade de pacientes recém-operados não é suprimida após seu uso (Delogu et al., 2004) e por apresentar efeito antioxidante (Tsuchiya et al., 2002).. Assim, objetivou-se avaliar os efeitos da infusão contínua de propofol, associado ou não ao tramadol sobre as variáveis hematológicas em cães.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizaram-se oito cães adultos, sem raça definida, submetidos a duas anestésias com intervalo de 15 dias, formando dois grupos: tramadol (GT) e controle (GC). O propofol foi empregado na indução (10 mg/kg, IV) e na manutenção anestésica (0,7 mg/kg/min). Após a intubação orotraqueal, iniciou-se a ventilação controlada ciclada a pressão (15 cmH₂O), com 60% de O₂, fixando-se a capnometria entre 35 e 45 mmHg.

Em seguida, no GT, foi administrado *bolus* de tramadol (2 mg/kg, IV), seguido por infusão contínua (0,5 mg/kg/h), enquanto, no GC, foi injetado *bolus* e infusão contínua de solução de NaCl a 0,9% no mesmo volume calculado para o tramadol. Através de um cateter na veia jugular esquerda coletou-se amostras de sangue (3 mL).

As observações das variáveis hemácias (He), hematócrito (Ht) e leucócitos totais (Le) foram realizadas antes do início da anestesia (Mbasal), em M0 (30 minutos após *bolus* de propofol) e em intervalos de 30 minutos durante 60 minutos (M30 e M60), sendo submetidas à Análise de Perfil ($p < 0,05$).

RESULTADOS

Tabela 1. Valores médios e desvios padrão de He, Ht e Le em cães anestesiados com propofol associado à infusão de solução de NaCl a 0,9% (GC) ou de tramadol (GT) e mantidos em ventilação controlada.

Parâmetros	Grupos	Momentos			
		Mbasal	M0	M30	M60
He ($\times 10^6/\mu\text{L}$)	GC	$6,48 \pm 1,12^a$	$5,27 \pm 0,85^b$	$5,19 \pm 0,86^b$	$5,16 \pm 0,90^b$
	GT	$6,20 \pm 1,00^a$	$5,01 \pm 0,71^b$	$5,00 \pm 0,70^b$	$4,98 \pm 0,76^b$
Ht (%)	GC	$45,4 \pm 8,0^a$	$36,5 \pm 5,7^b$	$35,9 \pm 6,0^b$	$35,7 \pm 6,2^b$
	GT	$43,7 \pm 7,5^a$	$34,9 \pm 4,9^b$	$34,8 \pm 4,8^b$	$34,6 \pm 5,3^b$
Le ($\times 10^3/\mu\text{L}$)	GC	$6,48 \pm 1,12^a$	$5,27 \pm 0,85^b$	$5,19 \pm 0,86^b$	$5,16 \pm 0,90^b$
	GT	$6,20 \pm 1,00^a$	$5,01 \pm 0,71^b$	$5,00 \pm 0,70^b$	$4,98 \pm 0,76^b$

Não há diferenças entre grupos. Médias seguidas por letras minúsculas diferentes na coluna diferem entre si pela Análise de Perfil ($P < 0,05$).

DISCUSSÃO

Para He e Ht houve diminuição dos valores após a anestesia. Esse evento foi atribuído ao emprego do propofol, pois não foram observadas diferenças entre os grupos. Assim, acredita-se que houve sequestro sanguíneo não esplênico, pois Wilson et al. (2004), em caninos que receberam propofol, encontraram diminuição no Ht, sugerindo a ocorrência de sequestro sanguíneo em sítios não esplênicos, já que não foram observados aumentos do baço.

A contagem de Le decresceu em GC e GT após Mbasal (Tabela 1). Portanto, propõe-se que essas alterações deveram-se aos efeitos dos *bolus* dos fármacos. Os anestésicos podem atrapalhar o balanço na função dos radicais livres (ROS), causando linfopenia (Bauer et al., 1998).

CONCLUSÃO

Em cães, a anestesia com propofol associado ou não ao tramadol causa decréscimo da contagem eritrocitária e deve ser usada com cautela em animais imunossuprimidos.

AGRADECIMENTOS: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda

Nota: Projeto aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) protocolo nº 014978-07.

REFERÊNCIAS

BAUER, M.K.A. et al. Role of reactive oxygen intermediates in activation-induced CD95 (Apo1-Fas) ligand expression. **J. Biol. Chem**, v. 273, p.8048-8055, 1998.

DELOGU, G. et al. Oxidative stress and mitochondrial glutathione in human lymphocytes exposed to clinically relevant anesthetic drug concentrations. **J. Clin. Anest.** v.16, p.189 –194, 2004.

TSUCHIYA, M. et al. Antioxidant protection of propofol and its recycling in erythrocyte membranes. **Am. J. Resp. Crit. Care Med.**, v.16, p. 54–60, 2002.

WILSON, D.V. et al. The effect of four anesthetic protocols on splenic size in dogs. **Vet. Anaesth. Analg.**; v. 31, p. 102-108, 2004.

002. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DE UM QUESTIONÁRIO VIA INTERNET DE ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO

Sílvia Oliveira Battastini¹, Wanessa Krüger Beheregaray Gianotti¹, Erika Pinto de Azevedo¹, Giordano Cabral Gianotti¹, Emerson Antonio Contesini¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Avaliação da eficácia de um questionário aplicado via internet no acompanhamento do pós-operatório de animais atendidos no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS com objetivo de criar uma ferramenta de comunicação entre veterinários e proprietários de animais de companhia. Foi aplicado questionário com 19 perguntas sobre dor e avaliação do tratamento pós-cirúrgico. Dos 62 questionários aplicados, 36 foram respondidos. O meio mostrou-se eficaz no acesso aos proprietários, possibilitando a obtenção de informações mesmo após a saída do paciente do ambiente hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: dor, pós-operatório, pesquisa, internet

EVALUATION OF THE EFFICACY OF AN INTERNET SURVEY ON THE POSTOPERATIVE FOLLOW-UP

ABSTRACT Evaluation of the efficacy of an internet survey applied to the Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS patients, aiming the creation of a communication tool between owners of companion animals and veterinarians. A survey with 19 questions about pain and postoperative treatment evaluation was applied. From the 62 questionnaires that were sent, 36 were answered. The internet proved to be effective in reaching the owners, enabling veterinarians to obtain information even after the patients left the hospital.

KEYWORDS: pain, postoperative, survey, internet

INTRODUÇÃO

O tratamento da dor no pós-operatório de animais tem grande influência na sua recuperação, e grande parte deste tratamento é realizado pelos proprietários (Väisänen et al., 2004). Conhecer as atitudes de proprietários após a alta dos pacientes é de extrema importância, porém de difícil acesso ao médico veterinário (Väisänen et al., 2008). A internet apresenta alta praticidade e baixo custo (Fan e Yan, 2010), e pode ser utilizada a fim de aprimorar a comunicação entre proprietários e médicos veterinários no pós-operatório de cães e gatos. O objetivo deste estudo é avaliar a eficácia da aplicação de questionários por meio da internet na avaliação do período pós-operatório, bem como apontar a ocorrência de atitudes dos proprietários decisivas na recuperação dos pacientes.

MATERIAL E MÉTODOS

Desde junho de 2011, está sendo realizada pesquisa de opinião e avaliação da dor com proprietários, selecionados aleatoriamente, de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS. Os participantes são convidados a informar um endereço eletrônico para posterior envio dos questionários, compostos por 19 perguntas acerca do grau de familiaridade dos proprietários com a dor em pequenos animais, da importância dada ao seu tratamento, e da impressão sobre a eficácia da analgesia no período pós-operatório. Os questionários são enviados por *e-mail* dois dias após a alta do paciente, e o acesso pode ser feito por meio de qualquer computador conectado à internet, por tempo indeterminado.

RESULTADOS

Dos 62 questionários enviados até o momento, 36 foram respondidos (58%). Dentre os proprietários, 84% sabiam o significado do termo “analgesia”. Todos os participantes afirmaram que consideram importante o controle da dor em animais, e a grande maioria sabia identificar sinais de dor em seus animais. Nem todos os proprietários conseguiram administrar a medicação analgésica corretamente, e 80% afirmaram que deveriam receber maiores orientações sobre o controle da dor nos seus animais. Além disso, 25% dos proprietários afirmaram ter utilizado medicação para dor em seus animais sem orientação de um médico veterinário, porém 97% informaram que entram em contato com o veterinário responsável quando o tratamento para a dor não parece eficaz.

DISCUSSÃO

As pesquisas via internet normalmente têm taxas de resposta abaixo de 30%, além de eliminar sujeitos sem acesso à internet (Kittleson, 1997; Cook et al., 2000; Fan e Yan, 2010). O valor de 58% encontrado neste estudo mostrou que a aplicação deste tipo de questionário na rotina de pós-operatório do Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS pode ser eficaz no acesso aos proprietários. As respostas obtidas até o momento apontam que ainda há um grande número de proprietários que utilizam fármacos sem o conhecimento do veterinário, e que gostariam de maiores informações sobre dor e analgesia, indicando que a comunicação ainda é incipiente.

CONCLUSÃO

A internet pode ser utilizada como um meio de comunicação consistente e confiável entre veterinários e proprietários, melhorando o acompanhamento de pacientes no pós-operatório. Desta forma, facilitará a identificação do comportamento dos proprietários e dos sinais que os pacientes apresentarão na ausência do veterinário durante a recuperação pós-operatória.

REFERÊNCIAS

- COOK, C.; HEATH, F.; THOMPSON, R.L. A Meta-Analysis of Response Rates in Web- or Internet-Based Surveys. **Educational and Psychological Measurement**, v.60, n.6, p.821-836, 2000.
- FAN, W.; YAN, Z. Factors affecting response rates of the web survey: A systematic review. **Computers in Human Behavior**, v.26, p.132-139, 2010.
- KITTLESON, M. Determining effective follow-up of e-mail surveys. **American Journal of Health Behavior**, v.21, n.3, p.193-196, 1997.
- VÄISÄNEN, M.; OKSANEN, H.; VAINIO, O. Postoperative signs in 96 dogs undergoing soft tissue surgery. **Veterinary Record**, v.155, p.729-733, 2004.
- VÄISÄNEN, M. A. -M.; TUOMIKOSKI-ALIN, S. K.; BRODBETL, D. C.; VAINIO, O. M. Opinions of Finnish small animal owners about surgery and pain management in small animals. **Journal of Small Animal Practice**, v.49, p.626–632, 2008.

003. AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS COM O USO DA METADONA EM CÃES.

Thais Mayara Menegheti¹, Juliana Tessália Wagatsuma¹, Acácio Duarte Pacheco¹, Cynara Marlize Pacheco¹, Caio José Xavier Abimussi¹, Valéria Nobre Leal de Souza Oliva¹

¹Dep. de Clínica, Cirurgia e Reprodução Animal, FMVA-UNESP, Araçatuba-SP.

RESUMO

O objetivo deste estudo foi avaliar as alterações eletrocardiográficas com o uso da metadona. Utilizaram-se oito cães submetidos a diferentes doses de metadona, com intervalo de sete dias entre as aplicações, constituindo-se os grupos: G 0,3, G 0,5 e G 1,0 (0,3; 0,5; 1mg/kg/IM). Não foram observadas alterações eletrocardiográficas relevantes na maioria dos animais, sendo que, dois animais apresentaram ritmo de escape.

PALAVRAS-CHAVE: opióide, cão, arritmia, bradicardia

ELECTROCARDIOGRAPHIC EVALUATION OF THE DEGREE OF ISOLATED METHADONE USE IN HEALTHY DOGS.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the electrocardiographic changes with the use of methadone. Eight dogs were used with different doses of methadone, with an interval of seven days between applications, making the groups: G 0,3, G 0,5 e G 1,0 (0,3; 0,5; 1mg/kg/IM). No relevant electrocardiographic changes were observed in most animals, of which two animals showed escape rhythm.

INTRODUÇÃO

A metadona é um opioide agonista de receptores μ , atuando também como antagonista de receptores N-metil-D-aspartato da medula espinhal (Monteiro, 2008), sendo portanto, um bom analgésico. Entretanto, pode provocar sedação e depressão cardiorrespiratória (Leibetseder et al, 2006). Em um estudo onde duas doses de metadona foram administradas pela via intravenosa em cães, observou-se bradicardia, distúrbios de condução como *sinus arrest* e bloqueio atrioventricular de terceiro grau, além de escapes ventriculares (Credie et al, 2010). É relatado que a metadona provoca arritmias cardíacas consideráveis em seres humanos e fibrilação ventricular diagnosticada pelo aumento no intervalo QT (Zuñkler e Wos-Maganga, 2010).

Com base na literatura consultada, hipotetizou-se que a administração de metadona pela via intramuscular nas doses 0,3mg/kg, 0,5mg/kg e 1 mg/kg promoverá alterações elétricas cardíacas dose-dependente em cães e objetivou-se verificar se as doses utilizadas provocam alterações elétricas importantes sobre a função cardíaca de cães.

MATERIAL E METÓDOS

Foram utilizados oito cães de diferentes raças, pesos e idades, que foram submetidos ao exame físico geral, hemograma, ECG, e sorologia para Leishmaniose, excluindo os animais que apresentassem alterações nos exames referidos. Foram constituídos três grupos: G0,3: 0,3 mg/kg, G0,5: 0,5 mg/kg e G1: 1mg/kg de metadona pela via intramuscular, sendo que cada animal participou de todos os grupos com intervalo mínimo de sete dias entre os tratamentos. Os cães foram submetidos à avaliação do traçado cardíaco por meio do aparelho de eletrocardiograma TEB, na derivação DII nos seguintes momentos: M0: momento basal (antes da aplicação do fármaco) e a cada 30 minutos decorridos da aplicação até o restabelecimento dos parâmetros basais (MF). Para análise estatística utilizou-se M0, M30, M60 e MF.

RESULTADOS

Não houve diferença estatística em relação à FC, extensão da onda P, amplitude/ extensão do complexo QRS e intervalo QT entre os grupos. Porém, houve diferença estatística na amplitude da onda P entre grupos e o intervalo PR diferiu entre momentos, estando, porém dentro da normalidade. Onda T patológica foi observada em M30, M60 e MF em três animais do G0,3; um, dois e dois em M30, M60 e MF, respectivamente, no G0,5 e em um animal (M30 e MF) no G1,0. No G0,3 dois cães apresentaram bradicardia em M30 e três em M60. Um animal apresentou alteração rítmica sugestiva de ritmo de escape isolado (REI), que permaneceu até M60. Um animal apresentou bradicardia em M30 (G0,5) e em M60 (G1,0). Reverteu-se o efeito da metadona utilizando butorfanol (0,5 mg/kg/IV) em um animal do grupo G1,0 devido ocorrência de ritmo de escape sustentado (RES), não sendo avaliado nos demais momentos.

DISCUSSÃO

Em um estudo, Credie et al (2010) observaram efeitos cronotrópicos negativos mais evidentes com o incremento da dose de metadona, recomendando-se a dose de 0,5mg/kg para uso clínico. Segundo Maiante et al (2008) houve redução significativa da

FC média entre 9% a 28% e entre 32% a 46% quando utilizaram 0,5 e 1,0 mg/kg de metadona, respectivamente. Alterações na morfologia da onda T são atribuídas às seguintes causas: hipóxia miocárdica, aumento ventricular, anormalidades na condução intraventricular, alterações metabólicas, intoxicação por fármacos cardiotoxicos e hipercalemia (Ware, 2006).

No G1,0 um cão apresentou redução da FC e RES com ausência de onda P, no G0,3 um animal apresentou três REI não indicando intervenção medicamentosa. Complexos de escape originam-se de células automáticas nos átrios, na junção átrio-ventricular ou nos ventrículos, com FC inferior a 40-50 bpm em cães (Ware, 2006).

CONCLUSÃO

A metadona, nas doses empregadas, causou mínimas alterações elétricas no miocárdio na maioria dos animais, entretanto variações individuais devem ser consideradas.

REFERÊNCIAS

MONTEIRO, R. E. *et al.* Effects of methadone, alone or in combination with acepromazine or xylazine, on sedation and physiologic values in dogs. **Veterinary Anaesthesia and Analgesia**, v. 35, 519–527, 2008.

LEIBETSEDER, E. N. *et al.* A comparison of extradural and intravenous methadone on intraoperative isoflurane and postoperative analgesia requirements in dogs. **Veterinary Anaesthesia and Analgesia**, v. 33, p. 128–136, 2006.

CREDIE, R. G. *et al.* Effects of methadone on the minimum alveolar concentration of isoflurane in dogs. **Veterinary Anaesthesia and Analgesia**, v.37, p. 240–249, 2010

ZUÑKLER, B. J.; WOS-MAGANGA, M. Comparison of the Effects of Methadone and Heroin on Human ether-a`-go-go-Related Gene Channels. **Cardiovascular Toxicology**, v. 10, p. 161–165, 2010.

MAIANTE, A. A. *et al.* Comparison of the cardio-respiratory effects of methadone and morphine in conscious dogs. **Veterinary Pharmacology and Therapeutics**, v. 32, p. 317–328, 2008.

WARE, W.A. Exames diagnósticos do sistema cardiovascular. In: NELSON, R.W.; COUTO, C.G. **Medicina interna de pequenos animais**. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.p.13-47.

004. BLOQUEIO MOTOR E SENSITIVO EM GATOS SUBMETIDOS À ANESTESIA EPIDURAL COM TRAMADOL ASSOCIADO À LIDOCAÍNA

FRANCISCO CLÁUDIO DANTAS MOTA¹, ELOI SANTOS PORTUGAL², ANDERSON LUIS TREVISAN², NICILENE CARDOSO SILVA¹, JOÃO PAULO ELSSEN SAUT¹, DUVALDO EURIDES¹.

1-Universidade Federal de Uberlândia (UFU) dantasmota@famev.ufu.br

2- Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO).

RESUMO

Este estudo avaliou a atividade motora e sensitiva em gatos após aplicação do tramadol associado à lidocaína via epidural. Divididos em dois grupos, após sedação e indução, foi utilizada a anestesia epidural (Grupo I – lidocaína, Grupo II - tramadol e lidocaína) e em seguida realizou-se a orquiectomia. Avaliou-se a duração do bloqueio motor e sensitivo até o retorno da nocicepção. O tempo de bloqueio motor e sensitivo foi significativamente maior no grupo II. A associação entre o tramadol e lidocaína via epidural, demonstrou bloqueio motor e sensitivo acima de 2 horas em felinos.

PALAVRAS-CHAVE: tramadol, anestesia, epidural, gatos

SENSORY AND MOTOR BLOCKADE IN CATS USING TRAMADOL COMBINED WITH LIDOCAINE THROUGH THE EPIDURAL ANESTHESIA

ABSTRACT

This study evaluated the sensory and motor activity in cats after application of tramadol associated with lidocaine through the epidural. Divided into two groups after sedation and induction, epidural anesthesia was used (Group I - lidocaine, Group II - tramadol and lidocaine) and then held orchiectomy. The duration of sensory and motor block was assessed until the return of nociception. The duration of sensory and motor block was significantly higher in group II and the association between the tramadol and epidural lidocaine showed sensory and motor block over 2 hours in cats.

KEYWORDS: tramadol, anesthesia, epidural, cats

INTRODUÇÃO

A administração de substâncias pela via epidural vem sendo utilizada com frequência em pequenos animais, a fim de evitar hiperalgesia pós-operatória, proporcionando analgesia intensa e prolongada (McMurphy, 1993). O tramadol é um agente opióide com atividade analgésica mista. Possui fraca afinidade pelo receptor μ e inibe a recaptação de norepinefrina e liberação de serotonina, o que lhe confere analgesia semelhante à morfina (Kukanich; Papich, 2004). Objetivou-se com esse

estudo, avaliar a atividade motora e sensitiva em gatos após aplicação do tramadol associado à lidocaína pela via epidural.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se 16 gatos, machos, divididos em dois grupos e submetidos à anestesia epidural, grupo I com lidocaína 2% sem vasoconstritor, na dose de 1 mL/4 kg e o grupo II à associação de tramadol (1,0 mg/kg) e lidocaína 2% sem vasoconstritor até atingir um volume de 1 mL/4 kg. Todos os animais receberam como medicação pré-anestésica acepromazina (0,1 mg/kg) pela via intramuscular, e após 15 minutos propofol (5,0 mg/kg) por via endovenosa. Imediatamente após a aplicação do propofol administrou-se os fármacos em estudo pela via epidural com agulha hipodérmica de 25 mm x 8 mm, introduzida no espaço sacrococcígeo. A orquiectomia foi realizada imediatamente após a anestesia epidural. Os bloqueios motor e sensitivo foram avaliados por pinçamento cutâneo com uma pinça hemostática do tipo Kocher Reta. O tempo do bloqueio motor foi determinado pela perda completa dos movimentos da cauda, membros e tônus do esfíncter anal, e o de bloqueio sensitivo pela resposta dolorosa frente ao pinçamento da área incisional e membrana interdigital. Para análise estatística, utilizou do Teste de Mann-Whitney com nível de significância igual a 5% ($p \leq 0,05$).

RESULTADOS

Todos os animais apresentaram perda de propriocepção e nocicepção. No entanto, o grupo II apresentou tempos de bloqueios sensitivo e motor significativamente maior que o grupo I (Figura 1).

DISCUSSÃO

A duração de ação de um agente opióide por via epidural é determinada pela quantidade deste que se mantém no líquido cefalorraquidiano e tecido espinhal (Valle et al., 2001). O tramadol por ser um agente hidrossolúvel é eliminado lentamente do

líquido cefalorraquidiano, permitindo uma concentração suficiente para substituir constantemente as moléculas dissociadas dos receptores, mantendo desta forma longos períodos de analgesia (Chrubasik et al., 1993), o que explica os resultados encontrados nesta pesquisa.

CONCLUSÃO

A associação entre o tramadol e a lidocaína à por via epidural, apresenta bloqueio motor e sensitivo acima de 2 horas em felinos.

REFERÊNCIAS

Chrubasik, J., Chrubasik, S., Martin, E. The ideal epidural opioid - Fact or fantasy?. **European J Anaesth**, v.10, p.79-100, 1993.

Kukanich, B.; Papich, M.G.; Drugs acting on the central and peripheral nervous systems pharmacokinetics of tramadol and the metabolite Odesmethyltramadol in dogs. **Journal of Veterinary Pharmacology & Therapeutics**. v.27, n.4, p.239, 2004.

McMurphy, R.M., Postoperative epidural analgesia. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v.23, n.4, p.703-716, 1993.

Valle, L.B.S., Teixeira, M.J., Cavalcante, V.O. Drogas de ação analgésica por via espinhal: aspectos farmacológicos. **Revista da Sociedade Brasileira para o estudo da dor**, v.3, n.3, p. 83-88, 2001.

005. MORTALIDADE EM ANESTESIA DE CÃES E GATOS: ESTUDO RETROSPECTIVO DE 5.366 PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS

Luiz Carlos da Luz¹, Marcelo de Souza Muccillo¹, Alessandra van der Laan Fonini¹, Gabriela Reis Ledur¹, Priscila Natasha Kasper¹, Emerson Antônio Contesini¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul - luizcarlosdaluz@yahoo.com.br

RESUMO

Este estudo tem como objetivo reportar a incidência de óbitos durante procedimentos anestésicos em um período de quatro anos (2007-2011). Foram avaliados os registros de 5.366 pacientes, dentre os quais 1.532 eram da espécie felina e 3.834 da espécie canina. O estudo demonstrou que a incidência de óbitos no período avaliado foi de 0,96% do total dos procedimentos, sendo 0,55% para pacientes hígidos e 1,32% para os doentes, comprovando que a classificação ASA é importante para estabelecer o risco anestésico em procedimentos cirúrgicos.

PALAVRAS-CHAVE: Óbito, risco anestésico, fator de risco, cão, gato

MORTALITY IN ANESTHESIA OF DOGS AND CATS: RETROSPECTIVE STUDY OF 5.366 ANESTHETIC PROCEDURES

ABSTRACT

This study aims to report the incidence of deaths during anesthetic procedures in a period of four years (2007-2011). Were evaluated the records of 5,366 patients, among which 1,532 were of feline species and 3,834 were of canine species. The study showed that the incidence of deaths on the measured period was 0.96% of total procedures, being 0.55% for healthy patients and 1.32% for sick patients, proving that the ASA classification is important to establish the anesthetic risk in surgical procedures.

KEYWORD: Death, anaesthetic risk, risk factors, dog, cat

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de fármacos e técnicas anestésicas, com o objetivo de aumentar a segurança de procedimentos anestésicos, tem apresentado grande ênfase em estudos experimentais nas últimas décadas. Entretanto, observa-se pouco interesse a estudos do risco de mortalidade apresentado por estes procedimentos na rotina de clínicas e hospitais veterinários (Brodbelt, 2009). Brodbelt et al. (2008) e Bille et al. (2012) afirmam que uma importante variável a ser avaliada é o escore *American*

Society of Anesthesiologists (ASA) apresentado pelo paciente que veio a óbito, devendo ser classificado como hígido (ASA I e II) ou doente (ASA III, IV E V).

Este trabalho tem como objetivo relatar o índice de mortalidade em procedimentos anestésicos em cães e gatos, bem como comparar esse índice em pacientes hígidos ou doentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram avaliados registros de 5.366 procedimentos anestésicos, sendo 1.532 felinos e 3.834 caninos. Estes procedimentos foram realizados entre 2007 e 2011, incluindo apenas as cirurgias da rotina hospitalar. Foram contabilizados os óbitos ocorridos durante o período trans-anestésico. Foi utilizada a classificação ASA, para estabelecer a incidência de óbitos em cada classe de risco e a diferença entre elas.

RESULTADOS

O estudo revelou que 52 pacientes vieram a óbito no período estudado perfazendo 0,96% do total dos procedimentos. Em relação à espécie, 14 de 1532 gatos vieram a óbito (0,91%) e 39 de 3834 cães morreram (1,01%). Do total de pacientes estudados, 2.387 foram classificados como hígidos, contabilizando 13 óbitos nesse grupo refletindo o índice de 0,55%. Já, 2.979 pacientes foram classificados como doentes, sendo verificados 39 óbitos nesse grupo e índice de 1,32%.

DISCUSSÃO

Estudos demonstram que o índice de óbitos durante procedimentos anestésicos de pequenos animais varia entre 0,1% e 0,2% para pacientes saudáveis e 0,5% e 2% para pacientes doentes (Brodelt, 2009), discordando do encontrado neste estudo para pacientes hígidos e corroborando com o verificado para pacientes doentes. Bille et al. (2012) obtiveram índice de óbitos de 0,12% para pacientes saudáveis e de 4,77% para pacientes comprometidos, demonstrando que o risco de óbito para o paciente doente é superior ao saudável. Carareto et al. (2005) obtiveram resultados com porcentagens menores em que 0,43% foi o índice para pacientes hígidos e 0,7% para doentes.

Corrêa et al. (2009) chegaram a porcentagem de 0,89% de mortalidade em cães e 0,92% em gatos. Gaynor et al. (1999) obtiveram 0,43% de mortes relacionadas a anestesia tanto em felinos quanto em caninos. Os resultados desses últimos trabalhos contrapõem-se aos valores obtidos no presente estudo em relação ao risco entre as espécies apresentando risco para gatos superior ou igual ao de cães. Esse dado pode

ser explicado pelo fato de que nesta avaliação o número de procedimentos em pacientes doentes foi maior em cães do que em gatos.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a incidência de óbitos durante procedimentos anestésicos no período avaliado é de 0,96%, sendo 0,55% para pacientes hígidos e 1,32% para doentes. O estudo demonstra que a porcentagem de óbitos é maior em cães do que em gatos. Além disso, comprova que a classificação ASA é importante para o prognóstico de risco anestésico em cães e gatos.

REFERÊNCIAS

- BILLE, C.; AUVIGNE, V.; LIBERMANN, E. et al. Risk of anaesthetic mortality in dogs and cats: an observational cohort study of 3546 cases. **Veterinary Anaesthesia and Analgesia**, v. 39, p. 59–68, 2012.
- BRODBELT, D. Perioperative mortality in small animal anaesthesia. **The Veterinary Journal**, v. 182, p. 152–161, 2009.
- BRODBELT, D.; BLISSITT, K. J.; HAMMOND, R. A. et al. The risk of death: the Confidential Enquiry into Perioperative Small Animal Fatalities. **Veterinary Anaesthesia and Analgesia**, v. 35, p. 365–373, 2008.
- CARARETO, R.; ROCHA, L. S.; GUERRERO, P. N. H. et al. Estudo retrospectivo da morbidade e mortalidade associada com anestesia geral inalatória em cães. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 26, n. 4, p. 569-574, 2005.
- CORRÊA, A. L.; OLESKOVICZI, N.; DE MORAES, A. N. Índice de mortalidade durante procedimentos anestésicos: estudo retrospectivo (1996-2006). **Ciência Rural**, v. 39, n. 9, p. 2519-2516, 2009.
- GAYNOR, J. S.; DUNLOP, C. I; WAGNER, A. E.; WERTZ, E. M; GOLDEN, A. E.; DEMME, W. C. Complications and mortality associated with anesthesia in dogs and cats. **Journal of the American Animal Hospital Association**, v.35, p.13-17, 1999.

006. O USO DA TÉCNICA DE FARMACOPUNTURA NO PONTO YIN-TANG PARA REDUÇÃO DA DOSE DA XILAZINA NA SEDAÇÃO DE CÃES

Vanessa Gozzer Viegas¹, Vanessa Bastos de Castro², Débora Passos Hinojosa Schaffer³, Talita dos Santos Lima¹

1. Médica Veterinária Autônoma
2. Professora de Anestesiologia e Farmacologia da Universidade Federal do Recôncavo Baiano - UFRB
3. Médica Veterinária do Programa de Residência da União Metropolitana para o Desenvolvimento da Educação e Cultura (UNIME). E-mail: debi_schaffer@yahoo.com.br

RESUMO

O uso de fármacos nos pontos de acupuntura promove parâmetros vitais mais estáveis que a indução farmacológica. O objetivo deste trabalho foi comparar duas doses da xilazina por via intramuscular (IM) ou aplicada no acuponto Yin-Tang. Dez cães receberam cloridrato de xilazina via IM no G1 ou no acuponto Yin-Tang (G2). Houve menor oscilação da TR no G2 (1,15%) em relação ao G1 (2,94%). O G1 apresentou diferença significativa em relação ao diâmetro abdominal (13,86%) quando comparados ao G2 (8,9%). O tempo de sedação foi maior em G1 (53,7 minutos). A utilização da farmacopuntura com a dose reduzida de xilazina promoveu o mesmo grau de sedação com menos efeitos deletérios quando comparado com a dose tradicionalmente utilizada.

Palavras-chave: acupuntura, alfa-2 agonista, tranquilização

PHARMACOPUNCTURE TECHNIQUE IN YIN-TANG POINT FOR REDUCTION XYLAZINE DOSE TO SEDATION IN DOGS

ABSTRACT

The use of drugs into acupoints promotes vital parameters more stable than the pharmacological induction. This study was to compare the dose of xylazine intramuscularly (IM) with reduced administration in the Yin-Tang acupoint. Ten dogs received xylazine IM in G1 or in the Yin-Tang acupoint (G2). There was less fluctuation of TR in G2 (1.15%) compared to G1 (2.94%). G1 showed a significant difference in relation to the abdominal diameter (13.86%) compared to G2 (8.9%). The duration of sedation was higher in G1 (53.7 minutes). The use of pharmacopuncture with reduced dose of xylazine promoted the same degree of sedation with fewer deleterious effects when compared with the traditionally dose.

KEYWORD: acupuncture, alfa-2 agonist, tranquilization

INTRODUÇÃO

A xilazina é um potente sedativo frequentemente utilizado em cães (FANTONI E CORTOPASSI, 2005). Apresenta propriedades benéficas, como analgesia, sedação e miorrelaxamento, apresenta efeitos indesejáveis importantes como bradicardia, bloqueio átrio-ventricular, bradipnéia, êmese, timpanismo e alteração da temperatura corpórea (MASSONE, 2008;OTERO, 2005). A aplicação de fármacos nos pontos de acupuntura (farmacopuntura) potencializa os efeitos de alguns fármacos sem, contudo, aumentar os efeitos colaterais levando a parâmetros vitais mais estáveis (LUNA *et al.*,2006). O ponto Yin-Tang tem sido utilizado para promover efeitos ansiolíticos e sedativos em seres humanos (CHEN, 2005; CHANG, HOU E FENG, 2005). O objetivo deste experimento foi comparar a dose da xilazina por via intramuscular (IM) com a administração reduzida aplicada no acuponto Yin-Tang. Em cães, o uso subdoses de acepromazina no ponto Yin tang reduzem em 30% a dose de tiopental para perdas de reflexos interdigitais (LUNA *et al.*, 2006).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados dez cães jovens, sem raça definida, de ambos os sexo, com peso entre 6,7 e 16,5kg. O G1 recebeu por via IM a xilazina (1mg/kg). No G2, os mesmos animais receberam 0,5mg/kg do mesmo fármaco aplicado no acuponto Yin-Tang. O animais foram avaliados em duas ocasiões distintas, com intervalo de 7 dias.

Foram avaliados o tempo para ocorrência de decúbito, presença ou não de êmese, freqüências respiratória (FR) e cardíaca (FC), variação da temperatura retal (TR), aumento do diâmetro abdominal e período de sedação. Os parâmetros foram avaliados a cada 15 minutos até que os animais reassumirem a posição quadrupedal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os animais apresentaram o mesmo grau de sedação nos dois grupos, estes resultados são semelhantes aos de Faria (2008), indicando a potencialização do efeito farmacológico, uma vez que a dose utilizada foi menor. Não houve diferença significativa em relação ao tempo de decúbito, os animais de ambos os grupos atingiram o decúbito esternal em aproximadamente $7 \pm 1,4$ minutos. No que se refere a presença de êmese, o G2 apresentou percentual menor quando comparado ao G1, os quais apresentaram 10 e 20%, respectivamente. Os parâmetros cardiorrespiratórios não apresentaram diferença significativa, ao teste T Student ($t < 2,101$). As alterações de FC não foram consideradas significativamente ($t = 1,72$) entre os grupos, no entanto, houve a necessidade de administrar atropina em um animal do G1, que apresentou

bradicardia severa (40 bpm) 30 minutos após a aplicação do fármaco estudado. Fato este, não observado no G2 possivelmente atribuído a dose reduzida, condizendo com a ação dose-efeito da xilazina (Massone, 2008). Em relação à FR, os animais do G2 apresentaram redução maior quando comparada ao G1, porém os valores não foram significativos estatisticamente ($t=0,62$). Houve significativamente ($t=6,39$) menor oscilação da TR no G2 (1,15%) em relação ao G1 (2,94%). Em relação ao diâmetro abdominal, houve diferença significativa ($t=2,75$) entre os grupos, o G1 apresentou valores maiores (13,86%) quando comparados ao G2 (8,9%). Quanto ao período de sedação, os animais do G1 apresentaram valores expressamente maiores do que o G2, 53,7 e 37 minutos, respectivamente, corroborando com Kim et al., (2004) ao relatar que a duração do efeito da xilazina está diretamente relacionada à dose utilizada.

CONCLUSÃO

Diante do presente experimento, pode-se concluir que a utilização da quimiopuntura no ponto Yin-Tang com a dose reduzida de xilazina é válida, pois os animais apresentaram menos efeitos deletérios com o mesmo grau de sedação do que a técnica tradicionalmente utilizada.

REFERÊNCIAS

- CHANG, H.X.; HOU, L.; FENG, Y. Clinical observation on Yin-Tang (Ex-HN 3) point-injection for treatment of obstinate hiccup. **Zhongguo Zhen Jiu**, vol 25, n. 3, 2005.
- CHEN, L. Controlled study on acupoint group prescriptions for electroacupuncture treatment of insomnia. **Zhongguo Zhen Jiu**, vol 25, n. 10, 2005.
- FANTONI, D.; CORTOPASSI, S. **Anestesia em Cães e Gatos**. São Paulo: ROCA, 2002.
- FARIA, A.B. **A farmacopuntura com xilazina para sedação em cães**. Dissertação apresentada ao Instituto de Homeopatia e Acupuntura Jaqueline Peker, Campinas/SP, 2008. Acesso 10 jan 2012. Disponível em: http://www.institutojp.com.br/monografias/mestrado_FARIA_campinas.pdf
- KIM, J.K.; JEONG, S.M.; YI, N.Y.; JEONG, M.B.; LEE, E.S.; NAM, T.C.; SEO, K.M. Effect of intratesticular injection of xylazine/ketamine combination on canine castration. **J. Vet. Sci.**, Suwon (Korea), v. 5, n. 2, p. 151-5, Jun. 2004.
- LUNA, S.P.L.; ANGELI, A.L.; FERREIRA, C.L.; LETTRY, V.; SCOGNAMILLOSZABÓ, M. Comparison of pharmacopuncture, aquapuncture and acepromazine for sedation of horses. **Evid. Based Complement. Alternat. Med.**, Oxford, December 1, 2006.
- MASSONE, F. **Anestesiologia Veterinária**. Farmacologia e Técnicas. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 571.
- OTERO, P. **DOR: Avaliação e tratamento**. São Paulo: INTERBOOK, 2005.

007. VARIAÇÃO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA E TEMPO DE PROTROMBINA DE ACORDO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO ANESTÉSICO EM CÃES NO PERI-OPERATORIO

Ludmila Rodrigues Moroz¹; Luciana Kiyomi Kinoshita²; Fabio Hozoi Rezende³; Selene Aparecida de Oliveira²; Aline Magalhães Ambrosio²; Denise Tabacchi Fantoni²

¹ Universidade de São Paulo – ludymoroz@usp.br

² Universidade de São Paulo

³ Médico Veterinário autônomo de São Paulo

RESUMO

A classificação de risco anestésico guia anestesistas a prevenirem complicações, incluindo coagulopatias. Os tempos de protrombina (TP) e de tromboplastina parcial ativada (TTPA) são parâmetros *in vitro* rotineiramente utilizados na avaliação do perfil hemostático. Esse estudo teve intuito de avaliar os valores de TP e TTPA nos tempo pré (T-Pré) e pós-anestésico (T-Pós) de cães. Foram estudados 67 cães distribuídos em ASA I, II e III. Não houve diferenças entre os valores de TTPA e TP, comparando-se os quatro diferentes grupos entre grupos ou entre momentos. Conclui-se que a categoria de risco anestésico por si só não tem impacto na coagulação.

PALAVRAS-CHAVE: canino, coagulação, anestesia, hemostasia, TTPA; TP

VARIATION ON ACTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTINE TIME AND PROTHROMBIN TIME ACCORDING TO ASA ANESTHETIC RISK IN PERIOPERATIVE DOGS

ABSTRACT

The anesthetic risk classification guides anesthetists to prevent complication, including coagulopathies. The prothrombin time (PT) and activated partial thromboplastine time (APTT) are *in vitro* parameters used routinely to assess the haemostatic profile. This study aimed to evaluate the values of PT and APTT in the time before (T-Pre) and post-anesthesia (T-Post). Were studied 67 animals divided in ASA I, II e III. There were no differences between the values of APTT and PT, comparing the four different groups, both in times. There were also no differences when analyzing the moments within the same group. It is concluded the anesthetic risk by itself has no impact on coagulation.

KEYWORD canine, coagulation, anesthesia, hemostasia, PT; APTT

INTRODUÇÃO

A incisão de estruturas durante o procedimento cirúrgico consome fatores de coagulação, fato que aliado à hipotermia causada pela anestesia pode alterar a

hemostasia (DIRKMANN *et al.*, 2008). A classificação de risco anestésico definida pelo American Society of Anesthesiologists (ASA) norteia o anesthesiologista a prevenir futuras complicações durante o ato anestésico-cirúrgico, inclusive em coagulopatias, mas para isso são necessários valores de referencia pré-anestésicos individuais para orientar o anestesista quanto à existencia ou desenvolvimento de uma alteração hemostática (MOROZ, 2008). Esse estudo teve o intuito de avaliar os valores de tempo de protrombina e tempo de tromboplastina parcial ativadas antes e depois da anestesia, de acordo com a classificação ASA.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados 67 cães submetidos a procedimentos cirúrgicos distribuídos de acordo com seu grau de risco anestésico em: ASA I (22); ASA II (15) e ASA III (30). F foram coletadas amostras sanguíneas antes da fluidoterapia e da medicação pré-anestésica (T-Pré) e após a recuperação do estado de alerta (T-Pós). Os valores de TTPA e TP foram analisados comparando valores de média e desvio padrão. Para a análise da hipótese de igualdade de médias entre os momentos de avaliação foi utilizada a Análise de Variância com medidas repetidas. Empregou-se o teste de Student para comparar as variáveis em T-Pré e T-Pós, sendo $p < 0,05$.

RESULTADOS

Não houve diferenças significativas nos parâmetros hemostáticos entre os diferentes ASA, tão pouco entre T-Pré e T-Pós (Tabela 1).

ASA	I				II				III			
	TTPA		TP		TTPA		TP		TTPA		TP	
	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós	Pré	Pós
Média	11	13	8	8	14	15	8	9	13	14	8	8
Desvio padrão	2,38	3,97	0,9	0,82	1,74	3,43	1,39	2,06	3,16	3,5	1,78	1,58

DISCUSSÃO

Embora tenha ocorrido uma tendência a aumento de TTPA entre T-Pré e T-Pós em todos os grupos, a classificação inicial de risco anestésico não teve impacto significativo nos parâmetros hemostáticos *in vitro*. Deve-se ressaltar, entretanto, que a hemostasia é uma complexa relação entre proteínas séricas e estruturas vasculares.

Os parâmetros estudados, TTPA e TP, informam sobre a atividade dos fatores de coagulação plasmáticos, mas esta análise *in vitro* é apenas parcial, não avaliando o

quadro do paciente como um todo. Diferentes doenças de base podem se comportar de formas distintas aos mesmos valores de TTPA e TP. O TTPA aumenta apenas quando a eficiência dos fatores de coagulação das vias intrínsecas e comuns estão abaixo de 30%. Por exemplo, se um cão possuir 40% da atividade destas vias terá TTPA normal, mas se sua doença de base incluir insuficiência renal com acidose, a anestesia poderá descompensar este delicado equilíbrio, resultado em sangramentos.

Outro exemplo seriam animais com hemofilia A leve sem sinais clínicos que ao serem submetidos à procedimentos cirúrgicos, como castração eletiva (ASA I), sangrarão profusamente, sendo que este quadro poderia ser prevenido com a realização de TTPA.

CONCLUSÃO

Não houve diferenças significativas nos valores de TTPA e TP entre as classificações de risco anestésico I e III, tão pouco entre T-Pré e T-Pós.

Os valores de TTPA e TP servem de guia para o anestesista, entretanto este deve conhecer as interações entre a doença de base e a hemostasia a fim de prevenir ou evitar complicações hemorrágicas durante a cirurgia.

REFERÊNCIAS

DIRKMANN, D.; HANKE, A. A.; GÖRLINGER, K.; PETERS, J. Hypothermia and acidosis synergistically impair coagulation in human whole blood. **Anesthesia and analgesia**, v. 106, n. 6, p. 1627-32, jun 2008.

JARK, P. C.; TAKAHIRA, R. K.; MACHADO, L. H. DE A.; MATTOSO, C. R. S. Hemofilia A em cão - RELATO DE CASO. **Clínica Veterinária**, v. 84, p. 20-24, 2010.

MOROZ, L. R. **Avaliação de parâmetros hemostáticos em cães de diferentes categorias de risco anestésico no período peri-operatório**. [S.l.]: Universidade de São Paulo, 2008.

008. CONSCIENTIZANDO E EDUCANDO TUTORES QUANTO A ADOÇÃO DE ANIMAIS DE DOMÉSTICOS -ESTUDO DE CASO

Orrana Targino Galamba Fernandes¹, Aderaldo Alexandrino de Fretitas¹, Mirella Bezerra de Melo Colaço Dias¹, Telga Lucena Alves Craveiro de Almeida¹, Marília de Albuquerque Bonelli¹, Simone Gutman Vaz¹

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco – ranagalamba_@hotmail.com

RESUMO

O projeto foi desenvolvido na 70ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, no período de 06 a 13 de novembro de 2011, em Recife - PE. Foram utilizados: exposição oral, banners informativos e ilustrativos, folders, dinâmicas educativas, oficinas e teatro, vídeos educativos e estímulo à adoção de animais abandonados. Para adoção era necessário ser maior de dezoito anos, estar de posse da carteira de identidade e preencher um termo de responsabilidade pelo animal, comprometendo-se a assumir a guarda e a responsabilidade sobre o animal e todo e qualquer cuidado que lhe seja necessário durante sua vida e ainda, a castrá-lo na idade oportuna, somaram-se 77 cães e 60 gatos adotados.

PALAVRAS-CHAVES Bem-estar, Abandono, teoria das 5 liberdades.

TEACHING GUARDIANS ABOUT THE ADOPTION OF DOMESTIC ANIMALS –CASE STUDY

ABSTRACT

The Project was developed at the 70th Northeastern Exposition of Animals and Derived Products, from November 06 to 13 of 2011, in Recife - PE. Talks, educational and illustrated posters, workshops, flyers, teaching dynamics, theater, educational videos and incentive to the adoption of abandoned animals were put in place. To adopt, it was necessary to be over eighteen years of age, with an identification card, and fill out a responsibility form, declaring a commitment to acquiring guardianship of the animal and responsibility for the animal and every and all care it might need during its life, and also castration when it reached the appropriate age. Seventy-seven dogs and 60 cats were adopted.

KEYWORD Well-being, abandonment, 5 liberties theory

INTRODUÇÃO

As discussões envolvendo bem-estar animal não são recentes, esse interesse vem aumentando significativamente nas últimas três décadas (Paixão, 2001). Guarda responsável se configura como uma das práticas para promoção do bem-estar animal,

sendo de fundamental importância e diretamente relacionada ao papel do médico veterinário na sociedade, que fornece subsídios para conscientização quanto às necessidades básicas para uma relação saudável tanto para os animais, quanto para seus tutores (Silvano et al., 2010).

Em 1993 foi criada a teoria das 5 liberdades, que consiste de que todo animal deve ser livre de fome, sede e desnutrição; deve estar livre de medo e de estresse; deve estar livre de dor, doenças e ferimentos; deve ter liberdade de movimentos em ambientes adequados à sua espécie; e deve ter liberdade para expressar o comportamento natural da sua espécie (Paula, 2010).

Objetivou-se esclarecer e orientar o público da 70ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados do Recife sobre os temas de Guarda Responsável, Bem Estar Animal, Direito dos animais, Controle populacional e Zoonoses e, ainda, estimular a adoção.

MATERIAL E MÉTODOS

O projeto foi desenvolvido na 70ª Exposição Nordestina de Animais e Produtos, no período de 06 a 13 de novembro de 2011, em Recife - PE. Foram utilizados: exposição oral, banners informativos e ilustrativos, folders, dinâmicas educativas, oficinas e teatro, vídeos educativos e estímulo à adoção de animais abandonados. Os animais foram advindos de abrigos de cães e gatos, ONGs e das redondezas da Universidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cerca de 2000 pessoas visitaram o stand em busca de informações sobre os temas abordados e também a procura de adoção animais. De acordo com os dados observados 91,6% das pessoas possuem animal em casa, resultado esperado uma vez que se trata de uma região rural-urbana. O animal mais comum entre os entrevistados é o cão (61,2%), seguido pelo gato (15,3%) e os demais (23,5%) divididos entre outras espécies domésticas. Através de questionamentos pode-se descobrir que (48,8%) das famílias permite o acesso dos seus animais à rua, devido à condição habitacional dessas famílias, porém muitas vezes não era possível restringir o acesso a rua, pois teria que manter o animal preso a uma coleira, afligindo assim uma das teorias das 5 liberdades.

Quanto à adoção, somaram 77 cães e 60 gatos. A preferência pelos cães era maior que pelos gatos, justificando o maior número de caninos adotados. Para adoção era necessário ser maior de dezoito anos, estar de posse da carteira de identidade e preencher um termo de responsabilidade, comprometendo-se assim, a assumir a

guarda, a responsabilidade e qualquer cuidado que seja necessário ao animal durante sua vida e ainda, castrá-lo na idade oportuna.

A temática abordada foi maus tratos, os vídeos sensibilizaram os ouvintes quanto à questão do abandono dos animais, estimulando a adoção. Muitos casos de maus tratos foram relatados, porém muitas dessas pessoas não sabiam que atitude tomar diante dessas situações, sendo desta forma, orientadas sobre os direitos dos animais, as leis que regem esses direitos e onde denunciar tais fatos ocorridos.

CONCLUSÃO

Com políticas de orientação sobre bem-estar e campanhas de doação, associado com a castração desses animais, acredita-se que pode diminuir a quantidade de abandonos.

REFERÊNCIAS

PAIXÃO, R. L. Experimentação Animal: Razões e Emoções para uma Ética. 2001. 189 f. Tese (Doutorado em Medicina Veterinária) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2001.

PAULA, P. M.C. Estratégias Adicionais no Controle Populacional de Cães de Rua. 2010 Disponível em:
<<http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/23726/ESTRATEGIAS%20ADICIONAIS%20NO%20CONTROLE%20POPULACIONAL%20DE%20CAES%20DE%20RUA.pdf?sequence=1>>

009. CORTISOL SALIVAR EM GATOS DOMÉSTICOS (*Felis catus* Linnaeus, 1758):

MODELO DE AVALIAÇÃO

Bianca Pacheco Limberti da Silva¹, Norma Labarthe², Flavya Mendes-de-Almeida³

¹ Mestranda, Universidade Federal Fluminense - biancamedvet@gmail.com

² Profa. Dra., Universidade Federal Fluminense - labarthe@fiocruz.br

³ Profa. Dra. Universidade Federal Fluminense – fma@centroin.com.br

RESUMO

Níveis de cortisol refletem a atividade hipotálamo-hipófise-adrenal, cujo sistema responde a variações ligadas ao estresse. A mensuração do cortisol em amostras sanguíneas é comumente realizada na clínica para avaliar o funcionamento da adrenal. Entretanto, a obtenção de amostras sanguíneas demanda manipulação intensa, o que interfere nos resultados. Na busca por alternativas, 63 amostras de saliva felina foram obtidas com suabes especiais e analisadas por método imunoenzimático. Obteve-se volume suficiente para mensuração de cortisol em todas as amostras e a média dos níveis detectados foi 1,92 nmol/L, demonstrando que a técnica usada pode ser aplicada para avaliação de estresse em gatos.

PALAVRAS-CHAVES: estresse, cortisol, gatos

SALIVARY CORTISOL IN DOMESTIC CATS (*Felis catus* Linnaeus, 1758):

EVALUATION MODEL

ABSTRACT

Cortisol levels reflect the activity of hypothalamic-pituitary-adrenal system which responds to changes associated to stress. The measurement of cortisol in blood samples is usually performed to assess the functioning of the adrenal; however, the intense manipulation to obtain blood samples interferes with the results. In the search for alternative methods for assessment of cortisol, 63 feline saliva samples were obtained with special swabs and analyzed by enzyme immunoassay. Enough volume for the test was obtained in all samples and the average level detected was 1.92nmol/L, showing that the technique used is useful for stress evaluation in cats.

KEYWORDS: stress, cortisol, cats

INTRODUÇÃO

Níveis de cortisol refletem a atividade hipotálamo-hipófise-adrenal, cujo sistema responde a variações ligadas à sobrevivência e à qualidade de vida. Considerando-se que o estresse é uma ruptura do bem-estar que pode ser passageira ou duradoura,

avaliar corretamente os níveis do hormônio contribuirá no diagnóstico das condições do paciente, principalmente dosagens seriadas (Beerda et al., 1996).

Animais apresentam alterações detectáveis de cortisol em 4 minutos quando estressados (Kobelt et al., 2003), o que dificulta a avaliação quando técnicas invasivas que demandam manipulação intensa são empregadas. Sabe-se que as mensurações de cortisol plasmático ou urinário são comprometidas pela manipulação do paciente durante a coleta da amostra clínica (Carlstead et al., 1993). Assim, em diversas espécies animais a avaliação de cortisol salivar é utilizada como alternativa menos estressante e mais fidedigna (Beerda et al., 1996).

Uma das dificuldades para utilização de amostras de saliva é o volume necessário para análise laboratorial. Como gatos são pequenos, obter pelo menos 0,15mL de saliva demanda cuidados, o que pode impedir sua utilização. Atualmente o uso de suabes especiais para coleta de saliva (*kit salivette®*) possibilita a coleta de volume suficiente com o mínimo de esforço despendido (Dreschel e Granger, 2009).

Assim, decidiu-se avaliar o sistema de obtenção de saliva bem como a detecção de cortisol salivar em gatos domésticos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram incluídos 63 gatos independentemente do sexo, raça, idade ou sinais clínicos. As amostras salivares foram colhidas pela manutenção de suabes macios e absorventes (*kit salivette®*) na cavidade oral por no mínimo 2 e no máximo 4min. Os suabes foram centrifugadas a 1000xg por 5min. As amostras foram mantidas a -20°C até o processamento imunoenzimático (*Kit Salivary Cortisol Sallimetrics®*).

RESULTADOS

O *kit salivette®* permitiu a obtenção de volume suficiente para mensuração de cortisol em todas as amostras. Além disso, os níveis de cortisol detectados apresentaram média de 1,92 nmol/L $\pm$ 1,01 (0,57 nmol/L a 4,58 nmol/L) com 10 amostras apresentando valores abaixo de 1,0 nmol/L.

DISCUSSÃO

Os níveis de cortisol encontrados, em sua maioria, apresentavam-se dentro dos valores descritos anteriormente para gatos (1,1 a 5,5 nmol/L) (Siegford et al., 2003), sugerindo que a técnica utilizada foi adequada. Assim, a utilização do *kit salivette®* e a mensuração de cortisol salivar pelo método imunoenzimático pode ser indicada na avaliação de estresse em gatos domésticos.

CONCLUSÃO

O *kit* salivette® mostrou-se eficaz para coleta de amostras de saliva de gatos domésticos; amostras de saliva avaliadas pelo método imunoenzimático apresentaram resultados consistentes.

REFERÊNCIAS

BEERDA, B.; SCHILDER, M.B.H.; JANSSEN, N.S.C.R.M. et al. The use of salivary cortisol, urinary cortisol, and catecholamine measurements for a noninvasive assessment of stress response in dogs. **Hormones and Behavior**. n.30 p.272-279 1996.

CARLSTEAD, K.; BROWN, J.L.; STRAWN, W. Behavioral and physiological correlates of stress in laboratory cats. **Applied Animal Behavior Science**. n.38 p. 143-158 1993.

DRESCHEL, N.A.; GRANGER, D.A. Methods of collection for salivary cortisol measurement in dogs. **Hormones and Behavior**. n.55 p.163-168 2009.

KOBELT, A.; HEMSWORTH, P.H.; BARNETT, J.L. et al. Sources of sampling variation in saliva cortisol in dogs. **Res. Vet. Sci**. n.73 p.157-161 2003.

SIEGFORD, J.M.; WALSHAW, S.O.; BRUNNER, P. et al. Validation of a temperament test for domestic cats. **Anthrozoos**. n.16 p.332-351 2003.

010. DIAGNÓSTICO DE BEM-ESTAR DE CÃES DOMICILIADOS E SEMI-DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO, PARANÁ

Janaina Hammerschmidt¹, Gisele Sprea², Carla Forte Maiolino Molento³

¹Mestranda do Programa de Pós Graduação em Ciências Veterinárias, UFPR

²Médica Veterinária do município de Campo Largo, Paraná

³Docente do Programa de Pós Graduação em Ciências Veterinárias, Coordenadora do Laboratório de Bem-estar Animal (LABEA / UFPR).

RESUMO

Pouco se sabe acerca das condições de bem-estar dos cães que vivem como animais de estimação. O objetivo desse trabalho foi mensurar e comparar o grau de bem-estar e a probabilidade de sofrimento de cães domiciliados (CD) e semi-domiciliados (CS). O grau de bem-estar foi medido por meio de um laudo baseado no conceito das Cinco Liberdades do Bem-estar Animal. Em 42,0% (21/50) dos CD e em 71,4% (15/21) dos CS o grau de bem-estar foi considerado ruim ou muito ruim. A probabilidade de sofrimento foi alta ou muito alta para 54,0% (27/50) dos CD e para 95,2% (20/21) dos CS. O baixo grau de bem-estar foi determinado por fatores relacionados ao não comprometimento com a guarda do animal, como o não fornecimento de água fresca e de alimentação adequada, acesso à rua sem supervisão e carência de atendimento veterinário, situações que caracterizam negligência. Os CS tiveram mais baixo grau de bem-estar e maior probabilidade de sofrimento que CD.

PALAVRAS CHAVE: laudo, sofrimento, cinco liberdades

WELFARE ASSESSMENT OF OWNED AND FREE-ROAMING DOGS IN THE TOWN OF CAMPO LARGO, PARANÁ

ABSTRACT

Little is known about the conditions of welfare of dogs living as pets. The aim of this study was to measure and compare the level of welfare and the chances of suffering from owned (OD) and free-roaming dogs (FD). The welfare was measure by a protocol based on the concept of the Five Freedoms of animal welfare. In 42.0% (21/50) of OD and in 71.4% (15/21) of FD the welfare was considered poor or very poor. The chances of suffering were high or very high for 54.0% (27/50) of OD and 95.2% (20/21) of FD. The poor welfare was determined by factors related to non-commitment to responsible pet guardianship, as the absence of fresh water and adequate food supply, access to the street without supervision and lack of veterinary care, situations that characterize

neglect. The FD showed worse levels of welfare and more chances for suffering than OD.

KEYWORDS: protocol, suffering, five freedoms

INTRODUÇÃO

Pouco se sabe acerca das condições de bem-estar dos cães que vivem como animais de estimação. A possibilidade de alto grau de bem-estar dependerá, além do ambiente que lhe é oferecido, do nível de compreensão e comprometimento do proprietário com as necessidades físicas, psicológicas e comportamentais do animal.

Pode-se medir o grau de bem-estar por meio do conceito das Cinco Liberdades (FAWC, 1993). Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi mensurar o grau de bem-estar e a probabilidade de sofrimento de cães domiciliados e semi-domiciliados, comparando os indicadores de bem-estar identificados entre os grupos de cães.

MATERIAL E MÉTODOS

O diagnóstico do grau de bem-estar foi realizado em 71 cães inseridos no Projeto “Cuide de Seu Animal” do Setor de Controle de Zoonoses e Bem-estar Animal da Prefeitura de Campo Largo, Paraná, de março a agosto de 2011. Os cães foram qualificados em cães domiciliados (CD) e cães semi-domiciliados (CS). O grau de bem-estar foi medido por meio de um laudo baseado no conceito das Cinco Liberdades do Bem-estar Animal dividido em uma escala de cinco graus: muito bom, bom, regular, ruim e muito ruim. À cada liberdade foi conferido um grau de restrição, que compreendeu três níveis de categorias: respeitada, moderadamente restrita e severamente restrita. Foi então deliberado acerca da probabilidade de sofrimento do animal, de muito baixa a muito alta. O banco de dados foi analisado por estatística não-paramétrica, com os testes Qui-quadrado e Mann Whitney.

RESULTADOS

Foram avaliados 71 cães, compreendendo 50 CD (70,4%) e 21 CS (29,6%). Em 42,0% (21/50) dos CD, o grau de bem-estar foi considerado ruim ou muito ruim, enquanto que em CS esse número foi de 71,4% (15/21). A probabilidade de sofrimento foi alta ou muito alta para 54,0% dos CD e para 95,2% (20/21) dos CS. Ocorreu disponibilidade de água fresca para 96,0% (48/50) dos CD e para 42,9% (09/21) dos CS. Cerca de 6,0% (06/50) dos CD e 42,9% (09/21) dos CS estavam com baixo escore corporal. Os CD tiveram melhores resultados que CS para vacinação, desverminação e atendimento veterinário. Os resultados para “espaço disponível para execução do

comportamento natural” foram satisfatórios para 64,0% (32/50) dos CD e para 76,2% (16/21) dos CS. A ocorrência de comportamentos anormais foi considerada baixa e não diferiu entre CD (12,0%, 06/50) e CS (9,5%, 2/21). A liberdade psicológica diferiu no item “comprometimento severo de alguma liberdade”, no qual o grupo de CS apresentou maior comprometimento das liberdades (66,7%, 14/21) que CD (38%, 19/50). Os CD (14,3%, 07/49) apresentaram-se menos hesitantes na presença do proprietário que CS (42,1%, 08/19), bem como com maior número de CD (50,1%, 25/49) aparentemente felizes em relação aos CS (10,5%, 02/19).

DISCUSSÃO

O grau de bem-estar de CS pareceu mais baixo que aquele de CD por fatores relacionados ao não comprometimento com a guarda do animal, como o não fornecimento de água fresca e de alimentação adequada, acesso à rua sem supervisão e carência de atendimento veterinário, situações que caracterizam negligência (Munro e Munro, 2008). O acesso à rua sozinho comprometeu o parecer da liberdade ambiental, pois de acordo com Thornton (1992) pode submeter o animal a muitos riscos. A hesitação na presença do proprietário pode sugerir que o vínculo entre proprietário e CS pode não ser o desejável.

CONCLUSÃO

Os CS apresentaram mais baixo grau de bem-estar e maior probabilidade de sofrimento que CD, evidenciado pela restrição das liberdades. Entretanto, os resultados da avaliação de bem-estar de todos os cães não foram satisfatórios com relação aos animais, pois muitos fatores contribuíram para a ocorrência de sofrimento.

REFERÊNCIAS

FAWC - FARM ANIMAL WELFARE COUNCIL. Second report on priorities for research and development in farm animal welfare. London: Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, 1993.

MUNRO, R.; MUNRO, H. M. C. **Animal abuse and unlawful killing: forensic veterinary pathology**. China: Saunders, 2008. 106 p.

THORNTON, G. W. The welfare of excess animals: Status and needs. **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 200, n. 5, p. 660-662, 1992.

011. ESTUDO RETROSPECTIVO DE ATENDIMENTOS À MAUS TRATOS A ANIMAIS DE COMPANHIA NO HCV-UFPeI

Luiza Figueiró ROSSI¹, Daniela Jardim LOPES², Ceres Tempel NAKASU², Karina GUTERRES³, Marlete Brum CLEFF⁴

¹ Graduanda de Medicina Veterinária UFPeI – luizafrossi@hotmail.com

² Graduanda de Medicina Veterinária UFPeI

³ Residente PPG de Medicina Veterinária – FV/UFPeI

⁴ Profa. Departamento de Clínicas Veterinária – FV/UFPeI

RESUMO

No Brasil, publicações tratando da violência humano-animal, ainda são incipientes. Assim, o trabalho reúne uma retrospectiva de atendimentos à maus tratos a cães e gatos no HCV-UFPeI. De abril a dezembro de 2011, 23 caninos e 4 felinos foram atendidos vítimas de violência confirmada. Devido à gravidade e ao número de casos, julgou-se importante dar início a coleta de informações e quantificar a sua ocorrência, para alertar sobre a importância do Veterinário frente à problemática e expor a necessidade de um sistema de notificação e investigação destes casos.

PALAVRAS-CHAVES: violência, cães, gatos.

RETROSPECTIVE STUDY OF BATTERED PETS CARE AT HCV-UFPeI

ABSTRACT

In Brazil, publications about human-animal relation are incipient. The present study conducts a retrospective study of battered pets care at HCV-UFPeI. From April to December 2011, 23 dogs and 4 cats were received by violence victims. Analyzing the gravity and the high number of this cases, it was deemed important start to get information and quantify this occurrence, to alert the importance of Veterinarian prepare against this problematic and expose the need of a notification and investigation program on this cases.

KEYWORDS: violence, dogs, cats

INTRODUÇÃO

O termo maus tratos se refere à violência, ao ultraje ou insulto, que provoque sofrimento para pessoas ou animais, ainda que não ocorram lesões físicas no mesmo (Marlet, 2010). A crueldade contra animais é um sinal de alerta e uma possibilidade de identificação de outros tipos de violência, sendo utilizada como indicadora de tendência a agressividade em pessoas (Santana, 2004; Faraco, 2006).

Existem fatores que dificultam a abordagem deste tema em Veterinária, entre eles está a limitação na formação do Veterinário, tanto para avaliar o envolvimento humano nos casos de crueldade, quanto para a formação de provas periciais, o que leva a subnotificação dos casos (Santana, 2004; Marlet, 2010).

Embora publicações tratando da violência humano-animal sejam crescentes, no Brasil sua abordagem ainda é incipiente (Faraco, 2006)

Diante desta realidade, faz-se necessária a contribuição do Médico Veterinário em colher dados relacionando esses quadros com seu contexto social, além da necessidade de notificação destes. O trabalho reúne uma contagem retrospectiva de atendimentos à maus tratos a cães e gatos no HCV-UFPeL.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um levantamento retrospectivo de atendimentos no HCV-UFPeL no período de abril a dezembro de 2011. Esta casuística inclui animais agendados, oriundos do sistema de recolhimento da prefeitura e de comunidades carentes.

Durante este período foram registrados 27 animais com diagnóstico definitivo de maus tratos, e outros pertencentes a um grupo suspeito de vítimas de maus tratos (debilitados, desidratados ou caquéticos, intoxicados, com múltiplas lesões, fraturados, muitas vezes chegando a óbito), porém, a falta de histórico e de melhor caracterização do quadro clínico não permitiu incluí-los no estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos casos confirmados de vítimas de maus tratos, 23 eram caninos e 4 felinos. De acordo com outros trabalhos, as denúncias envolvendo cães e gatos são maioria, possivelmente devido ao maior vínculo com o proprietário (Santana, 2004).

Destes, 4 foram trazidos pelo proprietário agressor, 12 pelo proprietário que não era o agressor e 11 foram trazidos pelo serviço da prefeitura. Devido à gravidade e alto número dos casos atendidos, julgou-se importante dar início a coleta de informações e quantificar a sua ocorrência, pois segundo Arluke & Lockwood (1997), os pesquisadores ainda precisam estabelecer a verdadeira incidência das várias formas de abuso e negligência aos animais.

Do total de atendimentos, 16 casos foram recebidos pelo ambulatório de atendimento à comunidade carente CEVAL. O que confere com dados de literatura que associam a violência animal à doméstica, sendo que a violência física é comum entre famílias que residem na periferia (Faraco, 2006; Peruhype, 2011). Segundo Arluke e

Lookwood (1997), informações sobre os agressores são importantes, tais como a demografia dos infratores, bem como a frequência e gravidade de seus atos.

Os principais sinais nos animais agredidos foram lesões superficiais por agentes físicos, fraturas, queimaduras, lesões por armas de fogo e perfuro-cortantes, seguido por intoxicações. Estes sinais devem ser considerados nas suspeitas de maus tratos, pois podem servir como provas criminais. O Veterinário tem posição privilegiada, pois tem como reconhecer esses atos, além do acesso ao ambiente familiar, porém os profissionais precisam de melhor formação para formarem laudos que sirvam como provas consistentes, para a notificação dos maus tratos (Marlet, 2010; Faraco, 2006). Reunindo estes dados será possível fazer um alerta sobre a necessidade de um sistema de notificação e investigação, a fim de intervir diretamente nos pontos deficientes.

CONCLUSÃO

O trabalho constatou que a ocorrência de casos de maus tratos, é alta no HCV-UFPel, sendo o maior número de vítimas originário de áreas menos favorecidas. Entretanto, ainda é necessário uma atualização quantitativa e qualitativa sobre esta incidência em nossa região, a fim de definir-se metas para a resolução ou minimização do problema.

REFERÊNCIAS

- ARLUKE, A.; LOCKWOOD, G. R. Understanding cruelty to animals. **Society and Animals**, v.3, n.5, p. 83-93, 1997.
- FARACO, C. B.; SEMINOTTI, N. A crueldade com animais: como identificar seus sinais? O Médico Veterinário e a prevenção da violência doméstica. **Revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária**, ano 12, n. 37, p. 66-71, 2006
- MARLET, E. F.; MAIORKA, P. C. Análise retrospectiva de casos de maus tratos contra cães e gatos na cidade de São Paulo. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, São Paulo, v. 47, n. 5, p. 385-394, 2010.
- PERUHYPE, N. C.; HALBOTH, N.V.; ALVES, P.A.B. Uso da violência doméstica como prática educativa: conhecendo a realidade em Diamantina – MG/ Brasil. **Textos & Contextos**. Porto Alegre, v. 10, n. 1, p. 170 - 178, jan./jul. 2011
- SANTANA, L. R. Posse Responsável e Dignidade dos animais. **Anais do 8º Congresso Internacional de Direito Ambiental**. São Paulo, 2004.

012. PERFIL DOS PROPRIETÁRIOS DE CÃES E GATOS E A PRÁTICA DA GUARDA RESPONSÁVEL DOS ACADÊMICOS CEULJI-ULBRA

Luiz Felipe Gibim Rezende¹, Thiago Vaz Lopes¹, Camila Aparecida De Almeida Maia¹, Wilson Reis Teixeira¹, Sandro de Vargas schons².

¹CEULJI/ULBRA - thiagovlopes@hotmail.com

²Universidade Federal de Rondônia/UNIR

RESUMO

A guarda responsável prevê que o proprietário deve proporcionar uma vida sadia, onde esteja inclusa todas as necessidades psicológicas e fisiológicas do animal, zelando pelo seu bem estar, assistindo o animal desde o nascimento até a morte e se preocupando com o controle populacional, através de acasalamentos programados, e castração, evitando assim, animais errantes condenados a própria sorte. Neste estudo foram aplicados questionários entre os alunos do CEULJI-ULBRA com a intenção de inventariar o conhecimento dos acadêmicos em relação à posse responsável.

PALAVRAS-CHAVES: Guarda Responsável, Bem Estar Animal, Controle Populacional

PROFILE OF THE OWNERS OF DOGS AND PRACTICE OF THE GUARD CHARGE OF ACADEMIC CENTRO UNIVERSITY A JI-PARANÁ CEULJI-ULBRA

ABSTRACT

The responsible guard means that the owners must provide a healthy life to their pets, which includes the psychological and physiological needs of the animal, caring for their well being since the birth to death and worrying about population control to prevent stray animals to their fate application were applied to CEULJI/ULBRA with the intention to make an inventory of academic knowledge in relation to responsible ownership

KEYWORDS: Responsible Guard, Animal Welfare, Population Control.

INTRODUÇÃO

A crescente urbanização implica diferentes hábitos, os quais cada vez mais levam as pessoas a se isolarem em seus lares criando assim fortes laços com outras espécies, como cães e gatos transformando-os em membros de suas famílias (Lima et al., 2010). A preocupação com o bem-estar animal é crescente. O termo bem estar animal há muito tempo esta presente na sociedade humana como também em sua história, e na sua ligação com os animais (Molento et al., 2005). O termo guarda responsável há pouco tempo vem sendo utilizado para substituir a expressão posse responsável, que implica de forma implícita em sua semântica uma ideologia de objeto,

ou coisa que teria um proprietário ou possuidor (Sampaio et al., 2010). Os animais sentem diversas sensações, tais como a fome, sede, dor, medo, alegria, tristeza, depressão, dentre outras, as quais um proprietário consciente e responsável deve prover, resguardando o animal das mesmas suprimindo as suas necessidades (Santana et al., 2009).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram aplicados 397 questionários entre os acadêmicos do CEULJI-ULBRA, dos cursos de ciências biológicas, ciências humanas e exatas, com enfoque nos conceitos relacionados à guarda responsável e o controle populacional de animais de companhia, durante o mês de setembro de 2011. Os dados obtidos foram tabulados e analisados através de planilha eletrônica Microsoft Excel.

RESULTADOS

Dentre os entrevistados, 69,8% possuem animais de estimação, sendo 89,7% cães e 35,2% gatos. A vacina anti-rábica é dada aos animais por 89% dos proprietários, 70% em campanhas de vacinação por órgãos públicos e 30% levam seus animais em clínicas veterinárias. Apenas 9,5% das pessoas realizam o reforço anual da vacina polivalente e 19% não sabiam de tal necessidade. Em relação ao uso de anticoncepcionais como método contraceptivo, 66,7% nunca utilizaram, o método contraceptivo mais aceito foi separar macho e fêmea, 50,2% acreditam que toda cadela ou gata necessita procriar pelo menos uma vez na vida. A captura e eutanásia foram condenadas por 63% dos entrevistados.

DISCUSSÃO

Quanto às visitas ao médico veterinária, 52,7% dos entrevistados afirmam que só levam seus animais quando os mesmos estão doentes, um dado parecido é indicado por Gallani et al, (2010) onde 48,38% têm a mesma atitude. A vacinação anual é dada por 32% dos proprietários, bem próximo ao encontrado por Gallani et al, (2010) que foi de 28%. Um dado contrastado é em relação aos proprietários que nunca levaram seus animais a um médico veterinário, que pra Gallani et al, (2010) apenas 6% nunca levaram e entre os entrevistados foi de 19,8%. Os *pets* foram ganhados por 59,7% das pessoas, o que para Rossi,(2011) pode ser um problema, pois muitas pessoas acabam adquirindo cães que são incompatíveis com seus estilos de vida e disponibilidade de cuidado, gerando maior número de abandono ou comprados por

impulso e escolhem o cão pela “raça da moda” não conhecendo de verdade as necessidades desses animais.

CONCLUSÃO

Este inquérito epidemiológico demonstrou que os acadêmicos a qual acredita-se ter acesso a mais informações que muitas pessoas de baixa escolaridade, há muitas dúvidas e informações errôneas quando se trata do cuidado animal. Isto nos leva a concluir que tanto veterinários quanto acadêmicos de medicina veterinária devem investir em campanhas sobre a guarda responsável, pois a população em geral é ainda desprovida de alguns conceitos básicos envolvendo a saúde e bem estar animal.

REFERÊNCIAS

- GALLANI, S. U.; QUEIROZ, L. H.; VALLADÃO, G. M. R; RODRIGUES, T. O.; PIRES, M. M.; PIRES, M. C. **Conceitos e práticas de posse responsável e controle populacional de cães e gatos dos moradores de bairros próximos ao campus do curso de medicina veterinária da UNESP – Araçatuba**, São Paulo, 2010.
- LIMA, A. M. A.; ALVES, L. C.; FAUSTINO, M. A. G.; LIRA, N. M. S.; **Percepção sobre o conhecimento e profilaxia das zoonoses e posse responsável em pais de alunos do pré-escolar de escolas situadas na comunidade localizada no bairro de dois irmãos na cidade do Recife (PE)**. Ciência & Saúde Coletiva, 15(Supl. 1):1457-1464, 2010
- MOLENTO, C.F.M.; INOE, A.P.; REGO, M.I.C.; LAGO, E.; MEZA, S.K.L.; LEME, M.C.; MOLENTO, M.B. **Controle populacional de cães e gatos em dez vilas rurais do Paraná, Brasil**. Arq. ciên. vet. zool. UNIPAR, n. 8, ano 1, p.25-31, 2005.
- ROSSI, A. **Westies em perigo**. Revista Cães & Cia, n. 309, 2005. Disponível em: <http://www.caocidadao.com.br/artigos_caes.php?id=101>. Acesso em 27/10/2011
- SAMPAIO, G. R.; SILVA, F. R. C.; SALAN, M. O.; **Projeto melhor amigo**. 2010.
- SANTANA, L. R.; OLIVEIRA, T. P.; **Guarda responsável e dignidade dos animais**. 2009.

013. ABORDAGEM CLÍNICA E TERAPÊUTICA DO TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL SISTÊMICO EM UM GATO COM CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA

Vanessa Kutz de Arruda¹, Maria Lúcia Gomes Lourenço¹, Fernanda Chicharo Chacar¹, Amanda Resende Duarte¹, ¹Karen Maciel Zardo², Maria Jaqueline Mamprim²

¹-Serviço de Clínica Médica de Pequenos Animais, FMVZ - Unesp-Botucatu

²-Serviço de Diagnóstico por Imagem, FMVZ - Unesp-Botucatu

RESUMO

O tromboembolismo arterial sistêmico (TEA) é uma complicação grave da cardiomiopatia hipertrófica felina (CMHF), decorrente da estase sanguínea que se estabelece no interior da câmara atrial esquerda dilatada secundariamente à hipertrofia primária do ventrículo esquerdo. A terapia antitrombótica e analgésica deve ser iniciada imediatamente, para impedir a formação de novos trombos e para o controle da dor. O objetivo do presente relato foi descrever a abordagem clínica e terapêutica de um paciente com tromboembolismo decorrente da CMHF.

PALAVRAS CHAVE: Trombo, cardiopatia, hipertrofia, felino, clopidogrel

CLINICAL APPROACH AND TREATMENT OF THROMBOEMBOLISM ARTERIAL IN A CAT WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

ABSTRACT

The systemic arterial thromboembolism (TEA) is a serious complication of feline hypertrophic cardiomyopathy (CMHF) due to blood stasis that establishes itself within the left atrial chamber secondarily to hypertrophy of primary dilated left ventricle. An antithrombotic activity and analgesic therapy should be initiated immediately, to prevent the formation of new thrombi and for pain control. The goal of this report was to describe the clinical approach and therapy of a patient with thromboembolism arising out of the CMHF.

KEY WORDS: Thrombus, cardiopathy, hypertrophy, feline, clopidogrel

INTRODUÇÃO

A etiologia da cardiomiopatia hipertrófica felina (CMHF) ainda é desconhecida (TILLEY & GOODWIN, 2004; WARE, 2010). O animal acometido apresenta hipertrofia principalmente da parede livre do ventrículo esquerdo e/ou do septo interventricular. A hipertrofia é concêntrica reduzindo a luz ventricular esquerda levando à hipóxia de miocárdio, arritmias (TILLEY & GOODWIN, 2004; CESTA *et al.*, 2005; WARE, 2010, NÓBREGA, 2011) e formação de trombos que podem se desprender e se alojar em qualquer artéria (TILLEY & GOODWIN, 2004; WARE, 2010). Os sinais clínicos são

variáveis dependendo das alterações cardíacas decorrentes da hipertrofia, e os sinais de tromboembolismo dependem da localização do trombo (WARE, 2010; NÓBREGA, 2011). Segundo um estudo a taxa de sobrevivência de gatos após um episódio de TEA é de 37% (SMITH *et al.*, 2003; HAMEL-JOLETTE, 2009), sendo que os animais que sobrevivem ao primeiro episódio apresentam cerca de 25 a 45 % de recorrência do quadro (LASTE e HARPSTER, 1995; HAMEL-JOLETTE, 2009). O tratamento a ser instituído depende do estágio de evolução da doença. No caso de tromboembolismo, além do tratamento da cardiopatia, faz-se necessário a utilização de analgésicos potentes e fármacos antitrombóticos para impedir a formação de novos trombos (WARE, 2010).

RELATO DE CASO

Foi atendido um gato, fêmea, sem raça definida, com seis anos de idade, com histórico de apatia, anorexia, distrição respiratória e paraparesia de membros pélvicos com evolução de aproximadamente duas a três semanas. Ao exame físico detectaram-se distrição expiratória acentuada exibindo padrão respiratório restritivo, bulhas cardíacas hiperfonéticas e aumento de sons bronquiais à auscultação, frequência cardíaca de 220 bpm, presença de sopro cardíaco em foco mitral (III/VI), ausência de pulso femoral direito, leve algesia em membros pélvicos, coxins plantares cianóticos, temperatura retal de 35°C, pressão arterial sistólica de 145 mmHg e tempo de preenchimento capilar de três segundos. Diante das alterações clínicas encontradas instituiu-se terapia ambulatorial com oxigenoterapia, fluidoterapia (glicose 2,5%), furosemida com solução de glicose 5% (4 mg/kg por via intravenosa), morfina (0,2 mg/kg por via intramuscular) e maleato de enalapril (0,25 mg/kg por via oral). Após a estabilização do quadro respiratório, os exames complementares de triagem foram realizados sendo que apenas o hemograma demonstrou alteração, com trombocitopenia (45.450 plaquetas/ μ L), discreta hipoproteïnemia (5,2 mg/dL) e linfopenia ($0,6 \times 10^3/\mu$ L). Ao eletrocardiograma observou-se taquicardia sinusal (240 bpm), sem demais alterações. No exame radiográfico de tórax se observou aumento generalizado da silhueta cardíaca, deslocamento dorsal de traquéia e opacificação difusa de lobos pulmonares com padrão alveolar (edema). Ao exame ultrassonográfico de abdômen (Color Doppler) detectou-se fluxo turbulento em diversos segmentos da artéria aorta, notando-se a presença de um trombo medindo 0,61 cm por 0,24 cm causando obstrução parcial do fluxo sanguíneo no segmento entre a artéria renal direita e a bifurcação para as artérias ilíacas. O índice de resistividade e a velocidade do fluxo sanguíneo anterior e posterior ao trombo foram de 0,79 e 64 cm/segundo e

0,70 e 61 cm/segundo respectivamente. O ecocardiograma demonstrou hipertrofia concêntrica moderada, relação átrio esquerdo/aorta aumentada ($AE/Ao=2,1$), obstrução dinâmica discreta da via de saída do ventrículo esquerdo, função contrátil aumentada (fração de ejeção=99%; fração de encurtamento=81%) e insuficiência moderada de válvula mitral. O tratamento prescrito consistiu de diltiazem (1,75 mg/kg a cada 12 h), ácido acetilsalicílico (10 mg/kg a cada 72 horas), maleato de enalapril (0,25 mg/kg a cada 12 horas), furosemida (1 mg/kg a cada oito horas). Um dia após o atendimento, o animal retornou ao hospital sem distrição respiratória e com paresia persistente de membro pélvico direito. Seis dias após o primeiro atendimento o exame ultrassonográfico controle do abdômen ainda revelou a presença de trombos e obstrução parcial do fluxo sanguíneo em aorta caudal. Adicionou-se à terapia anteriormente prescrita o clopidogrel (18,75 mg, a cada 24 horas) e suspendeu-se à furosemida. O animal respondeu bem à terapia instituída voltando a se locomover normalmente e não apresentando mais distrição respiratória. Atualmente o animal encontra-se sob tratamento e em bom estado geral, sem recidivas do quadro tromboembólico há três meses.

DISCUSSÃO

Em nosso relato, o paciente acometido tratava-se de uma gata fêmea, sem raça definida com quadro clínico de TEA secundário à CMHF. Contrariamente ao descrito por grande parte dos autores, a incidência desta complicação é maior em gatos machos, sendo as raças Persa, Maine coon e Ragdoll mais acometidas (FOX, 2004; WARE, 2010). Em relação à idade de acometimento, nosso paciente também se encontrava dentro da faixa etária descrita de cinco a sete anos para o aparecimento da afecção. O animal deste relato apresentava os sinais clínicos descritos pela literatura como distrição respiratória, paresia de membros pélvicos, pulso femoral fraco, coxins e leitos ungueais arroxeados (WARE, 2010). O diagnóstico foi feito com base no histórico, achados do exame físico e confirmado pelos exames complementares, particularmente o ecocardiograma com color Doppler para detecção do trombo e obstrução parcial do fluxo sanguíneo. As alterações encontradas no hemograma neste caso (discreta hipoproteinemia, trombocitopenia e linfopenia) não são enfaticamente descritas pelos autores, apenas Ware (2010) cita que nos casos de tromboembolismo pode haver coagulação intravascular disseminada com diminuição de plaquetas. No tratamento prescrito, a associação com o clopidogrel foi eficaz no controle dos sinais de tromboembolismo arterial. Seu uso em gatos com TEA é discretamente descrito pela literatura consultada por exercer efeitos antiplaquetários significativos (HAMEL-

JOLETTE *et al.*, 2009), podendo ser utilizado diariamente, contudo a dose ainda permanece incerta bem como a descrição de testes para avaliação de função plaquetária mediante seu uso em gatos. O animal deste relato encontra-se até o presente momento clinicamente estável, sem recidivas do quadro tromboembólico contrariando a literatura (HAMEL-JOLETTE *et al.*, 2009)

CONCLUSÃO

O diagnóstico do TEA secundário a cardiomiopatia hipertrófica em gatos é realizado pelo histórico e exame físico do paciente, contudo, o exame ultrassonográfico com color Doppler é essencial para a localização e determinação da gravidade do quadro clínico. Mais estudos são necessários no que se refere ao perfil hematológico e plaquetário, bem como ao uso do clopidogrel. Embora este fármaco seja indicado no tratamento do TEA, existem poucos relatos sobre sua utilização e eficácia na prevenção de recidivas da doença.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CESTA, M. F.; BATY, C. J.; KEENE, B. W. SMOAK, I. W.; MALARKEY, D. E. Pathology of End-stage Remodeling in a Family of Cats with Hypertrophic Cardiomyopathy. **Veterinary Pathology**. v. 42. 2005. p. 458-467.
- FOX, P. R. Miocardiopatias felinas. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. **Tratado de medicina interna veterinária**. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan. 2004. Cap. 117. p. 949-956.
- HAMEL-JOLETTE A.; DUNN M.; BÉDARD C. Plateletworks: a screening assay for clopidogrel therapy monitoring in healthy cats. **Can J Vet Res**. v. 73, n. 1. 2009. p. 73-76.
- LASTE N. J.; HARPSTER N. K. A retrospective study of 100 cases of feline distal aortic thromboembolism: 1977–1993. **J Am Anim Hosp Assoc**. v. 31. 1995. p. 492–500.
- NÓBREGA, S. C. C. **Cardiomiopatia hipertrófica felina: a propósito de 5 casos clínicos**. 2011. p. 93. Tese (Mestrado Integrado em Medicina Veterinária) - Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.
- SMITH S. A.; TOBIAS A. H.; JACOB K. A.; FINE D. M.; GRUMBLES P. L. ARTERIAL thromboembolism in cats: Acute crisis in 127 cases (1992–2001) and long-term management with low-dose aspirin in 24 cases. **J Vet Intern Med**. v. 17. 2003. p. 73–83.
- TILLEY, L. P.; GOODWIN, J.K.; Miocardiopatia hipertrófica. In: NORSWORTHY, G. D.; CRYSTAL, M. A.; GRACE, S. F.; TILLEY, L. P. **O paciente felino**. 2 ed. São Paulo: Manole. 2004. Cap. 79. p. 342-343.
- WARE, W. A. Doenças do sistema cardiovascular. In: NELSON, R, W.; COUTO, C. G. **Medicina interna de pequenos animais**. 4 ed. São Paulo: Elsevier. 2010. Cap. 8. p. 141-142.

014. DEFEITO DO SEPTO INTERVENTRICULAR ASSOCIADO À ESTENOSE PULMONAR EM CÃO - RELATO DE CASO

Priscilla Regina Nasciutti¹, Isabela Bittar², Moisés Caetano e Souza³, Rosângela de Oliveira Alves⁴

¹ Mestranda - Universidade Federal de Goiás – UFG - prinasciutti@gmail.com

² Graduanda – Universidade Federal de Goiás - UFG

³ Residente – Universidade Federal de Goiás - UFG

⁴ Professor adjunto - Universidade Federal de Goiás – UFG

RESUMO

Uma poodle, quatro meses, apresentando episódios de síncope foi atendida pelo Serviço de Cardiologia Veterinária. Ao exame clínico, foi observado sopro contínuo na base do coração, mais audível no foco pulmonar. O exame eletrocardiográfico foi sugestivo de sobrecarga ventricular direita. Comunicação interventricular e estenose pulmonar foram diagnosticadas por meio de ecocardiografia. O tratamento preconizado foi o uso de atenolol, associado à dieta hipossódica e repouso.

Palavras-chave: cardiopatia, congênita, filhote.

VENTRICULAR SEPTAL DEFECT ASSOCIATED WITH STENOSIS PULMONARY IN DOG – CASE REPORT

ABSTRACT

A poodle, four months, with episodes of syncope was treated in the Veterinary Cardiology Service. On clinical examination a continuous murmur was noted at the base of the heart, most audible in the pulmonary. The electrocardiographic examination was suggestive of right ventricular overload. Interventricular communication and pulmonary stenosis were diagnosed by echocardiography. The recommended treatment was the use of atenolol, associated with a low sodium diet and rest.

KEYWORDS: heart disease, congenital, puppy

INTRODUÇÃO

A cardiopatia congênita é a alteração cardíaca mais freqüente nos animais com menos de um ano e sua prevalência tem sido estimada em 0,67% a 0,85%. Os defeitos mais comuns incluem Persistência de Ducto Arterioso (PDA), Estenose Aórtica Subvalvular (ESA), Estenose Pulmonar (EP), Displasia Mitral e Tricúspide, Defeitos Septais Atriais e Ventriculares (DAS e DSV) e a Tetralogia de Fallot (SILVA FILHO et al., 2011).

Intolerância ao exercício e evidência de insuficiência cardíaca são as manifestações clínicas mais comuns de DSV, embora muitos animais sejam assintomáticos. Na radiografia torácica os defeitos levam ao aumento do coração

esquerdo, porém um aumento ventricular direito ocorre na presença de grandes defeitos. O eletrocardiograma (ECG) pode ser normal ou sugestivo de aumento ventricular esquerdo ou direito; o ecocardiograma revela a localização do defeito e mostra também a direção do *shunt*. Cães com defeitos pequenos a moderados podem ter uma expectativa de vida relativamente normal. Ocasionalmente, o defeito fecha espontaneamente dentro dos primeiros dois anos de vida. Em animais com grandes defeitos é provável que se desenvolva insuficiência cardíaca congestiva, embora hipertensão pulmonar com *shunt* reverso também possa acontecer. O tratamento definitivo requer cirurgia intracardíaca (SILVA et al, 2005; WARE, 2006). A Estenose

Pulmonar (EP) é definida por FLORES & MORAES (2008) como uma malformação congênita valvar, que consiste em um estreitamento localizado em qualquer ponto desde o trato de saída do ventrículo direito até a artéria pulmonar principal, sendo mais comum a estenose valvar ou subvalvar. O sopro da EP é mais audível no lado esquerdo do tórax na base do coração na área da valva pulmonar. Nos casos mais graves, o ECG pode ser sugestivo de aumento de ventrículo direito. A radiografia torácica pode revelar ventrículo direito proeminente e uma dilatação pós-estenótica do tronco pulmonar. A ecocardiografia mostra hipertrofia septal e ventricular, estenose muscular secundária da via de saída do ventrículo direito e dilatação do tronco pulmonar. A terapia inclui o uso de β -bloqueador ou ainda correção cirúrgica (SILVA FILHO et al., 2011).

RELATO DE CASO

Uma poodle, de quatro meses, foi atendida com histórico de episódios de síncope e cianose. Durante o exame físico, observou-se sopro contínuo na base do coração, mais audível no foco pulmonar, de grau 3/6. Foi realizado eletrocardiograma evidenciando taquicardia sinusal e aumento de amplitude de ondas S, sugestivo de sobrecarga ventricular direita, além de desvio do eixo cardíaco à direita. Ao exame ecocardiográfico foram observados hipertrofia concêntrica ventricular direita, presença de defeito de septo interventricular (7,3mm), função sistólica ventricular esquerda preservada e presença de fluxo turbulento no tronco pulmonar, com dilatação da artéria pulmonar esquerda, confirmando o diagnóstico de comunicação interventricular e estenose pulmonar. O tratamento preconizado foi o uso de atenolol, uma vez ao dia, associado a dieta hipossódica e repouso.

DISCUSSÃO

Segundo WARE (2006) um sopro, especialmente se for de alta intensidade, num jovem filhote de cão pode ser uma indicação de doença congênita, o que foi observado no caso descrito. O diagnóstico da cardiopatia congênita foi realizado no quarto mês de vida da cadela, o que condiz com o descrito por SILVA FILHO (2011).

Para filhotes com sinais semelhantes ao relatado (síncope e cianose), a melhor forma de diagnóstico é a avaliação ecocardiográfica. Porém a auscultação cardíaca e ECG fornecem os primeiros indícios de cardiopatia congênita. Os achados de sopro contínuo mais audível no foco pulmonar aliado aos episódios de síncope constituem indício de estenose pulmonar (SILVA FILHO et al., 2011). O ECG revelou aumento de amplitude de onda S, sugestivo de sobrecarga ventricular direita, o que ocorre nos casos de EP devido à obstrução do fluxo sanguíneo na saída do ventrículo direito, gerando o desenvolvimento da hipertrofia ventricular direita concêntrica em virtude do aumento na sobrecarga de pressão intraventricular. Essa hipertrofia miocárdica origina-se com a finalidade de manter a função sistólica ventricular, permitindo que o volume ventricular direito adequado (SILVA FILHO et al., 2011). A ecocardiografia confirmou o diagnóstico de DSV e a presença de hipertrofia concêntrica ventricular direita assemelha-se ao descrito por WARE (2006) em animais com grandes defeitos. A observação de fluxo turbulento no tronco pulmonar e dilatação da artéria pulmonar confirmaram o diagnóstico de estenose pulmonar. O tratamento instituído utilizando atenolol é o recomendado por SILVA FILHO et al. (2011), com o objetivo de reduzir a demanda de oxigênio pelo miocárdio com o aumento na perfusão coronária.

CONCLUSÃO

A avaliação cardíaca de filhotes é grande importância uma vez que anomalias congênitas podem levar a morte súbita. O ECG e o ecocardiograma fornecem todas as informações necessárias para o diagnóstico definitivo, contudo o tratamento ainda é bastante discutido.

REFERÊNCIAS

FLORES, F. N.; MORAES, A. N. Conduta anestésica para procedimentos de correção de estenose pulmonar em cães – Revisão. **Revista da FZVA**, v.15, n.1, p.141-151, 2008.

SILVA FILHO, J. C.; JORGE, P. S.; FRANCO, R. P. Alterações eletrocardiográficas de um cão com estenose da valva pulmonar, antes e após terapia a base de maleato de enalapril e atenolol. **Acta Veterinária Brasilica**, v.5, n.1, p.92-99, 2011.

WARE, W. A. Anomalias cardíacas congênitas comuns. In: NELSON, R. W.; COUTO, C. G. **Medicina Interna de Pequenos Animais**. 3ed. São Paulo: Elsevier, 2006. cap.9. p.147-164.

015. DEFEITO SEPTAL VENTRICULAR EM FELINO (DSV) – RELATO DE CASO

Anna Carolina Saldanha¹, James Andrade², Carlos Eduardo Vasconcelos da Silva³

¹ Clínica Veterinária Baboo (DF)

² CAV, Universidade do Estado de Santa Catarina (SC)

³ Médico Veterinário Autônomo (DF)

RESUMO

O defeito septal ventricular (DSV) é uma doença cardíaca congênita relativamente incomum em pequenos animais, caracterizada por comunicação e desvio de fluxo sanguíneo entre as câmaras ventriculares com sobrecarga da circulação pulmonar. O trabalho relata um gato de aproximadamente um ano de idade diagnosticado com DSV grave por meio de exame clínico, radiografias torácicas e ecocardiografia. Este foi submetido a tratamento cirúrgico paliativo com o objetivo de reduzir o fluxo sanguíneo da circulação pulmonar e o remodelamento vascular que poderia resultar em hipertensão pulmonar irreversível.

PALAVRAS CHAVES:DSV, doença congênita, coração, felino.

FELINE VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (VSD) – CASE REPORT

ABSTRACT

The ventricular septal defect (VSD) is an uncommon congenital heart disease in small animals, characterized by communication and shunt of blood flow between the ventricular chambers with over load of the pulmonary circulation. The paper reports a one year old cat diagnosed with severe VSD through clinical examination, chest radiography and echocardiography. The surgical treatment was palliative with the aim of reducing the blood flow in the pulmonary circulation and vascular remodeling that could result in irreversible pulmonary hypertension.

KEY- WORDS: VSD, congenital disease, heart, feline

INTRODUÇÃO

O defeito septal ventricular (DSV) é uma doença cardíaca congênita caracterizada por má formação no septo interventricular, o qual divide os ventrículos direito e esquerdo (Birchard e Sherding, 2008). A alteração promove desvio de sangue do ventrículo esquerdo (VE) para o direito (VD) e sobrecarga da circulação pulmonar e das câmaras cardíacas esquerdas (Gomes et al., 2009). Defeitos pequenos geralmente não acarretam alterações hemodinâmicas importantes e são bem toleradas durante toda a vida do animal. Entretanto, grandes defeitos podem provocar desvio sanguíneo considerável do VE para o VD, com sobrecarga de volume da circulação pulmonar e ICC esquerda (Cunningham e Rush, 2008). Pode ocorrer desvio reverso no qual o

sangue desoxigenado é enviado para o lado esquerdo do coração e aorta, ocasionando hipoxemia e cianose, caracterizando o complexo de Eisenmenger (Gomes et.al., 2009).

Os achados clínicos incluem sopro sistólico de intensidade variável sobre o bordo esternal direito (Ware, 2007, Martin e Corcoran, 2006). A ecocardiografia bidimensional permite visualização do defeito. Grandes defeitos e comprometimento hemodinâmico requerem tratamento cirúrgico, por meio de circulação extracorpórea (CEC) ou banda pulmonar (Cunningham e Rush, 2008). O trabalho tem como objetivo relatar o caso diagnosticado em um felino com a realização do tratamento cirúrgico por meio de banda pulmonar.

RELATO DE CASO

Felino de 1 ano de idade, macho castrado, 4,0kg, apresentava dispnéia após exercício, cianose e taquicardia, com melhora após repouso. Apresentava sopro cardíaco em hemitorax direito e ritmo regular. A ecocardiografia revelou DSV membranoso de 6 mm, com o fluxo laminar com velocidade de pico de aproximadamente 1,1 m/s do VE para o VD, cuja parede estava moderadamente hipertrofiada, concluindo-se o diagnóstico de DSV grave, da esquerda para direita. Procedeu-se MPA com morfina, indução e manutenção anestésica com isoflurano. Após toracotomia, com auxílio de uma fita cardíaca cirúrgica, realizou-se a banda pulmonar, promovendo estenose do vaso. No primeiro dia de pós-operatório, o gato apresentava dor, mas se alimentou. Foram administrados antibiótico, antiinflamatório e analgésico. No segundo dia entrou em quadro de dispnéia progressiva e veio a óbito por parada cardiorrespiratória. O fluxo da esquerda para a direita cessou, ecocardiograficamente, no pós-operatório imediato.

DISCUSSÃO

O DSV do gato era consideravelmente grande, necessitando-se de reparação cirúrgica, a qual é delicada e exige CEC. Optou-se pelo método de banda pulmonar, criando-se uma estenose do mesmo, para diminuir o fluxo sanguíneo para os pulmões e evitar a hipertensão pulmonar, devido ao aumento da pressão no VD, pela estenose pulmonar criada. O óbito pode ter ocorrido devido pneumotórax após a cirurgia ou há possibilidade do gato não ter se adaptado ao fluxo sanguíneo pulmonar reduzido.

CONCLUSÃO

O tratamento paliativo com banda pulmonar reduziu o fluxo sanguíneo da esquerda para direita. Estudos futuros são necessários para se verificar o efeito da técnica na sobrevida e melhora clínica dos animais.

REFERÊNCIAS

BIRCHARD, S.J.; SHERDING, R.G. **Manual Saunders de clínica de pequenos animais**. 3ªed. São Paulo: Roca, 2008. 2048 p.

CUNNINGHAN, S.; RUSH, J. Procedimientos intervencionistas cardiovasculares. **Veterinary Focus**, v 18, n. 3, p. 16-24, 2008.

GOMES, V.; MEDICI, K. M.; BITTENCOURT, M. C.; et.al. Defeito do septo ventricular em bezerro neonato – RELATO DE CASO. **Ensaio e Ciência**.v. XIII, n. 2,p. 47-55, 2009.

MARTIN, M.; CORCORAN, B. **Notes on cardiorespiratory diseases of the dog and cat**. 2nd ed. Iowa: Blackwell Publishing, 2006.

WARE, W. A. **Cardiovascular disease in small animal medicine**. Iowa: Manson Publishing, 2007. 396p.

016. DISPLASIA DE TRICÚSPIDE EM CÃO DA RAÇA BEAGLE RELATO DE CASO

Stephanie Elise Muniz Tavares Branco¹, Guilherme Albuquerque de Oliveira Cavalcanti¹, Rubens Antônio Carneiro¹, Roberto Baracat De Araújo¹

1- Universidade Federal de Minas Gerais. Email: stephbranco@yahoo.com

RESUMO A displasia de tricúspide (DT) é uma alteração congênita na valva tricúspide, culminando com insuficiência cardíaca direita. É mais comum em cães machos de raças puras e de grande porte. Este trabalho relata os achados clínicos, hematológicos, radiográficos, ecocardiográficos e necroscópicos em cão macho da raça Beagle acometido por DT em Belo Horizonte.

PALAVRAS-CHAVE: cão, displasia de tricúspide, insuficiência cardíaca direita

TRICUSPID VALVE DYSPLASIA IN MALE BEAGLE – CASE REPORT

ABSTRACT Tricuspid valve dysplasia (TVD) is classified as a set of congenital abnormalities in the tricuspid valve, leading to right heart failure. It is more common in large purebred male dogs. This paper reports clinical, hematological, radiographic, echocardiographic and necroscopic findings in male Beagle with TVD in Belo Horizonte.

KEYWORDS: dog, tricuspid valve dysplasia, right heart failure

REVISÃO DE LITERATURA

Displasia da valva tricúspide (DT) é definida como uma má formação congênita da valva e ou de suas estruturas de suporte (Kittleson, 1998). A maioria dos cães afetados são cães jovens de raças puras de grande porte, com destaque para as raças Retriever do Labrador, Pastor Alemão e Boxer, sendo os machos mais acometidos (Oliveira et al., 2011). Segundo Tidholm (1997), a DT representa 7% das doenças cardíacas congênitas, porém Oliveira et al. (2011) cita frequência de 3,1%. No Brasil, a frequência desta afecção não é conhecida (Sousa et al., 2006), podendo haver variação na incidência e nas raças mais acometidas de acordo com a região. O diagnóstico baseia-se nos achados clínicos e exames complementares. Os achados clínicos comuns incluem intolerância ao exercício, ascite, mucosas pálidas e murmúrio cardíaco sistólico, geralmente mais alto no ápice direito. As radiografias torácicas evidenciam cardiomegalia como resultado do aumento do coração direito. A avaliação

ecocardiográfica demonstra aumento do coração direito e insuficiência de tricúspide (Kittleson, 1998; Sousa et al., 2006). Em geral, o tratamento é paliativo, voltado para melhora na qualidade de vida do animal. O presente relato mostra a ocorrência de DT em cão macho da raça Beagle em Belo Horizonte.

DESCRIÇÃO DO CASO

Cão da raça Beagle de 11 meses de idade foi atendido com histórico de aumento de volume abdominal e letargia. Sinais clínicos de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) direita foram observados no exame clínico, além de sopro sistólico V/VI no hemitórax direito. Amostras de sangue e líquido abdominal foram coletadas. Foi observada anemia, grande aumento de alanina aminotransferase (ALT), aumento de fosfatase alcalina (FA), bilirrubinas totais e uréia, e hipoalbuminemia. O líquido ascítico foi classificado como transudato modificado. Ao raio-x torácico foi possível evidenciar cardiomegalia. No ecocardiograma, observou-se grande aumento do átrio e ventrículo direitos, diminuição da câmara ventricular esquerda, função sistólica normal, folheto septal da valva tricúspide espessado e com movimentação reduzida. Ao modo Doppler colorido da ecocardiografia evidenciou-se grande regurgitação em valva tricúspide.

Adotou-se como tratamento Benazepril (0,34mg/kg, uma vez ao dia), aquecimento do animal, furosemida (3 mg/kg a cada 8 horas) e dieta especial para cardiopatas. Apesar do tratamento, o animal foi a óbito três dias após a entrada no hospital. Durante a necrópsia foram encontradas ascite serosanguinolenta, congestão hepática, discreta efusão pleural, cardiomegalia direita, displasia de tricúspide com a cúspide septal espessada e avermelhada, além das cordoalhas tendíneas apresentarem-se encurtadas.

DISCUSSÃO

A DT é uma doença caracterizada por alterações congênitas da válvula tricúspide, e o presente relato descreve sua ocorrência em cão macho da raça Beagle, com 11 meses de idade, concordando com a literatura em relação à maior prevalência em machos de raças puras e apresentação em animais jovens (Oliveira et al., 2011).

Porém, não foi encontrado relato desta afecção em cão da raça Beagle, o que ressalta a importância da sua divulgação na comunidade científica brasileira, já que as afecções congênitas podem variar regionalmente (Sousa et al., 2006). As alterações clínicas indicaram insuficiência cardíaca direita inespecífica. Os achados radiográficos ajudaram na obtenção do diagnóstico, porém a ecocardiografia foi a ferramenta que forneceu diagnóstico definitivo em vida. Relata-se no meio científico que os níveis de

ALT, FA, bilirrubinas séricas, fósforo e de uréia podem aumentar devido à congestão hepática ou devido à redução no fluxo sanguíneo renal que ocorre nas ICC, principalmente as direitas (Cavalcanti et al., 2011). Anemia discreta, trombocitopenia, hipoalbuminemia e a presença de líquido abdominal do tipo transudato modificado podem ser observados nos achados laboratoriais (Sousa et al., 2006), portanto as anormalidades hematológicas e do líquido ascítico encontrados no presente relato corroboram com os dados da literatura específica.

CONCLUSÃO

A DT pode ocorrer em cão da Beagle e, apesar de ser uma das anormalidades cardíacas congênitas mais comuns, no Brasil poucos casos são relatados. Para que possamos conhecer a real prevalência da DT no Brasil e garantir diagnóstico mais precoce e preciso, são necessários mais trabalhos sobre o tema.

REFERÊNCIAS

- CAVALCANTI, G.A.O., TATIBANA, L.S., VARASCHIN, M.S. et al. Atrial septal defect in an elderly dog. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia.**, v.63, n.2, p.503-507, 2011.
- KITTLESON, M.D. Congenital abnormalities of the atrioventricular valves. In: KITTLESON, M.D., KIENLE, R.D. **Small animal cardiovascular medicine**. Saint Louis: Mosby, 1998. Cap. 17. p.273-281.
- OLIVEIRA, P., DOMENECH, O., SILVA, J., et al. Retrospective Review of Congenital Heart Disease in 976 Dogs. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v.25, p.477-483, 2011.
- SOUSA, M.G., GERARDI, D.G., ALVES, R.O. et al. Tricuspid valve dysplasia and Ebstein's anomaly in dogs: case report. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia.**, v.58, n.5, p.762-767, 2006.
- TIDHOLM, A. Retrospective study of congenital heart defects in 151 dogs. **Journal of Small Animal Practice**, v.38, p.94-98, 1997.

017. ENZIMA CONVERSORA DE ANGIOTENSINA E ALDOSTERONA COMO BIOMARCADORES NA DEGENERATIVA MIXOMATOSA DA VÁLVULA MITRAL EM CÃES.

Rodrigo P. Franco^{1,2}, Carla R. Massufaro², Carolina H. Giroto², Aparecido A. Camacho¹

¹ FCAV- UNESP/Campus Jaboticabal- vetrpf@yahoo.com.br

² Universidade de Marília-UNIMAR

RESUMO

A cardiologia veterinária vem pesquisando biomarcadores da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) para fins de prognóstico. Para isso, utilizaram-se 36 cães portadores da degeneração mixomatosa da válvula mitral, com dois grupos compostos por cães pertencentes à classe funcional Ib, um recebendo maleato de enalapril (0,5mg/kg) e o segundo furosemida (2mg/kg); mais dois grupos pertencentes à classe funcional II, com o primeiro recebendo enalapril e furosemida, e o segundo, enalapril associado à espironolactona (1mg/kg) e furosemida. Ambos na mesma dosagem, uma vez ao dia por 56 dias. Os resultados evidenciaram valores diferenciados ($p < 0,05$) de ECA e aldosterona entre as classes funcionais; com os cães que receberam enalapril isoladamente ou associado a diuréticos, apresentaram redução ($p < 0,01$) em ambas variáveis. Desta forma, os valores séricos de ECA e aldosterona podem ser considerados biomarcadores na evolução da ICC e terapêutica.

PALAVRAS CHAVE: Inibidores da ECA, diuréticos, endocardiose, canino

ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME AND ALDOSTERONE AS BIOMARKER IN DEGENERATIVE DISEASE MYXOMATOUS MITRAL VALVE IN DOGS

ABSTRACT

Veterinary cardiology has been researching biomarkers of heart failure (CHF) for purposes of prognosis. For this, we used the 36 dogs with myxomatous mitral valve, with two groups consisting of dogs belonging to functional class Ib, a receiving enalapril (0.5 mg / kg) and the second furosemide (2mg/kg), more two groups belonging to functional class II, with the first receiving enalapril and furosemide, and second, associated with enalapril spironolactone (1mg/kg) and furosemide. Both at the same dose, once daily for 56 days. The results showed different values ($p < 0.05$) between ACE and aldosterone functional classes, with dogs receiving enalapril alone or in combination with diuretics, had decreased ($p < 0.01$) in both variables. Thus, serum ACE

activity and aldosterone may be considered in the development of biomarkers and therapeutic ICC

KEYWORDS: ACE inhibitors, diuretics, endocardiosis, canine

INTRODUÇÃO

A doença degenerativa mixomatosa da válvula mitral (DDMVM) caracteriza-se por uma insuficiência valvular, levando cronicamente à ativação do sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) e do sistema nervoso simpático (Ortega e Gómez, 2007); desenvolvendo sinais clínicos de ICC que podem ocasionar o óbito de pacientes não diagnosticados ou tratados corretamente (Kitagawa et al., 1997). Dessa forma, partindo da hipótese que a ECA e aldosterona podem ser consideradas biomarcadores cardíacos, objetivou-se avaliar cães com DDMVM quanto as classes de ICC, a partir dos valores séricos de ECA e aldosterona, antes e após terapias distintas.

MATERIAL E MÉTODOS

Avaliaram-se 36 cães portadores da DDMVM, com dois grupos compostos por cães pertencentes à classe funcional Ib da ICC, onde o primeiro (n=8) recebeu maleato de enalapril (0,5mg/kg) e o segundo (n=8), furosemida (2mg/kg); e mais dois grupos pertencentes à classe funcional II, com o primeiro (n=10) recebendo maleato de enalapril (0,5mg/kg) e furosemida (2mg/kg) e o segundo (n=10), enalapril associado à espironolactona (1mg/kg) e furosemida. Todos os medicamentos administrados uma vez ao dia durante 56 dias. Antes (T0) e após (T56) as terapias, amostras de sangue total foram coletadas por meio de punção venosa e encaminhadas para a determinação dos valores séricos de ECA e aldosterona. Os valores séricos de aldosterona foram obtidos por radioimunoensaio em duplicata, com os valores da ECA pelo método enzimático simplificado. Os resultados obtidos foram analisados pelo método de variância por medidas repetitivas nos fatores grupo e tempo, utilizando o Teste de Tukey a $p < 0,05$.

RESULTADOS

Os valores séricos da ECA e aldosterona não evidenciaram variações significativas entre os grupos da mesma classe funcional. Porém, evidenciaram diferenças significativas ($p < 0,05$) entre os grupos e classes funcionais de ICC, com redução dos valores ($p < 0,01$) após terapias nos grupos G2, G3 e G4. (Figura 1).

FIGURA 1. Representação gráfica das médias obtidas para a variável ECA e aldosterona em cães com DDMVM classes funcionais Ib e II da ICC, antes e após os protocolos terapêuticos.

DISCUSSÃO

Como a ação farmacológica dos inibidores da ECA é no SRAA promovendo a redução da pré e pós-carga cardíaca, como demonstrado por Kitagawa *et al.* (1997) em cães com DDMVM, os grupos G2, G3 e G4 confirmaram essa ação quando receberam terapias a base de maleato de enalapril, um inibidor da ECA, associado ou não a diuréticos. Porém, no G1 que recebeu furosemida, a redução não foi significativa em virtude do mecanismo de ação do fármaco. No G4, os valores de aldosterona foram menores com adição da espironolactona (Ortega e Gómez, 2007). Já as diferenças nos valores basais entre as classes funcionais estudadas, demonstram a evolução da ICC na valvulopatia (Tidholm *et al.*, 2001).

CONCLUSÃO

Os valores séricos de ECA e aldosterona podem ser considerados biomarcadores no prognóstico da ICC, conforme as classes funcionais e terapia empregada.

REFERÊNCIAS

- KITAGAWA, H., WAKAMIYA, H., KITO, K. *et al.* Efficacy of monotherapy with benazepril, an angiotensin-converting enzyme inhibitor, in dogs with naturally acquired chronic mitral insufficiency. **The Journal of the Veterinary Medical Science**, Tokyo. v. 59, p. 513-20, 1997.
- ORTEGA, M.; GÓMEZ, L. Comparación en el manejo de pacientes con degeneración mixomatosa mitral con enalapril e con la combinación enalapril-espironolactona. 2007. Disponível em "www.cardiologiaveterinaria.com". Acesso no dia 05 de setembro de 2008.
- TIDHOLM, A., HAGGSTRÖM, J.; HANSSON, K. Effects of dilated cardiomyopathy on the renin-angiotensin-aldosterone system, atrial peptide natriuretic activity, and thyroid hormone concentrations in dogs. **American Journal of Veterinary Research**, Chicago. v.62, n.6, p.961-67, 2001.

018. IMPACTO DO VOLUME/MASSA VENTRICULAR ESQUERDA NA FUNÇÃO DIASTÓLICA EM CÃES COM DEGENERAÇÃO CRÔNICA DA VALVA MITRAL

Rosane Marques de Resende¹, Ruthnéa Aparecida Lazaro Muzzi², Matheus Matioli Mantovani^{1*}, Adriana Cristina da Silva¹, Rodrigo B Nogueira², Gisele F M dos Reis¹

1. Universidade Federal de Lavras - * matheus2mvet@gmail.com

RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi avaliar alterações no volume e massa ventricular esquerda em cães acometidos por DCVM e a influência desta relação sobre a função diastólica, por meio do índice velocidade de propagação do fluxo mitral (Vp). A relação índice do volume ventricular esquerdo sistólico/índice da massa ventricular esquerda (IVVEs/IMVE) foi correlacionada com a Vp. Não houve uma correlação significativa entre a relação IVVEs/IMVE e os índices diastólicos Vp, mostrando que este não foi influenciado pela hipertrofia miocárdica em cães com DMVM.

PALAVRAS-CHAVES: Canino, Endocardiose, Ventrículo esquerdo

IMPACT OF VOLUME/MASS IN LEFT VENTRICULAR IN DIASTOLIC FUNCTION IN DOGS WITH CHRONIC DEGENERATION OF MITRAL VALVE

ABSTRACT

The aim of this research was to evaluate changes in volume and left ventricular mass in dogs affected by CMVD and the influence of this relation on the diastolic function, by the mitral flow propagation velocity (Vp) index. The ratio of left ventricular systolic volume/left ventricular mass index (IVVEs / LVMI) was correlated with Vp. There was no significant correlation between the ratio IVVEs/LVMI and Vp diastolic indices, showing that it was not influenced by myocardial hypertrophy in dogs with CMVD.

KEYWORDS: Canine, Endocardiosis, Left Ventricle

INTRODUÇÃO

A disfunção ventricular esquerda pode se desenvolver na doença valvar mitral crônica (DVMC) sendo que a disfunção diastólica geralmente precede a disfunção sistólica (BUAKHAMSRI et al., 2009).

Vários índices ecocardiográficos convencionais de enchimento ventricular esquerdo têm sido investigados na regurgitação mitral (RM) crônica. A utilização da velocidade de propagação do fluxo mitral (Vp) reflete o grau de relaxamento diastólico inicial e não sofre alteração significativa com mudanças de pré-carga (PEDONE et al.,

2004). Entretanto, foi observado que a relação volume/massa ventricular esquerda causa influência sobre a Vp, independente da função diastólica intrínseca e pressões de enchimento (BUAKHAMSRI et al., 2009).

Objetivou-se avaliar a ocorrência de alteração no volume e na massa ventricular esquerda (MVE) em cães acometidos por DMVM e, ainda, a maneira como a função diastólica, por meio da Vp, pode ser afetada na presença de hipertrofia miocárdica.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para obtenção da MVE foram selecionados 22 cães, de ambos os sexos, sendo oito com diagnóstico de DMVM e assintomáticos, oito com diagnóstico ecocardiográfico de DMVM e com sinais clínicos de ICC, e seis clinicamente saudáveis (grupo controle).

Com o auxílio do Doppler por mapeamento em cores associado ao modo M, foi calculada a Vp de fluxo mitral, na visão paraesternal esquerda apical quatro câmaras. O método de Simpson foi utilizado para obtenção do volume ventricular esquerdo sistólico final (VVEs) e volume ventricular esquerdo diastólico final (VVEd). Os índices dos VVEs e VVEd (IVVEs e IVVEd) foram obtidos dividindo o VVEs e o VVEd, pela área de superfície corporal do animal, respectivamente.

A MVE foi calculada pela área transversal no plano dos músculos papilares, na fase diastólica final, como recomendado por Schiller et al. (1989). Devido à grande variação da conformação corporal em cães, utilizou-se o IVVEs e o IMVE para o cálculo da relação volume/massa ventricular esquerda (IVVEs/IMVE).

As médias foram comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$) e a correlação entre as variáveis Vp e IVVEs/IMVE foram investigadas por meio do teste de Pearson.

RESULTADOS

A Vp e a MVE não diferiu entre os grupos estudados, embora os cães do grupo com DMVM e ICC apresentaram maior MVE ($49,97 \pm 16,08$ gramas), se comparado com o grupo DMVM sem ICC ($30,53 \pm 16,95$ gramas) e controle ($31,26 \pm 18,92$ gramas). Entretanto, o IMVE diferiu significativamente entre os grupos, de forma que os cães com DMVM e ICC apresentaram aumento do IMVE ($133,6 \pm 40,31$ g/m²), em relação ao grupo DMVM sem ICC ($30,53 \pm 16,95$ g/m²) e controle ($86,27 \pm 27,58$ g/m²).

A correlação entre o grau de IVVEs/IMVE não se mostrou significativa com a variável Vp ($r = 0,15$, $p = 0,498$), de forma que, a relação IVVEs/IMVE não causa influência sobre este parâmetro de avaliação da função diastólica.

DISCUSSÃO

O aumento do IMVE foi um achado esperado nos animais do grupo DMVM e ICC, uma vez que esta doença induz um remodelamento cardíaco caracterizado por hipertrofia excêntrica do miocárdio e alterações na matriz intercelular (PEDONE et al., 2009).

Ao contrário do descrito por BUAKHAMSRI et al. (2009) que observaram uma relação inversa significativa entre o grau de IVVEs/IMVE e Vp, a correlação entre o grau de IVVEs/IMVE não se mostrou significativa com a variável Vp em cães, provavelmente pelo fato do mesmo ter sido realizado com seres humanos, os quais eram divididos em grupos acometidos por cardiomiopatia hipertrófica e cardiomiopatia dilatada.

CONCLUSÃO

A Vp não é influenciada pela relação IVVEs/IMVE e não difere entre os cães com e sem ICC afetados por DMVM.

REFERÊNCIAS

- BUAKHAMSRI, A.; POPOVIC, Z. B.; LIN, J. et al. Impact of left ventricular volume/mass ratio on diastolic function. **European Heart Journal**, v. 30, n. 10, p. 1213-1221, 2009.
- PEDONE, M. D.; CASTRO, I.; HATEM, D. et al. Variações de parâmetros da função diastólica do ventrículo esquerdo de acordo com a idade através da ecocardiografia com Doppler tecidual. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 83, n. 6, p. 462-465, 2004.
- SCHILLER, N. B.; SKIOLDEBRAND, C. G.; SCHILLER, E. J. et al. Canine left ventricular mass estimation by two-dimensional echocardiography. **Circulation**, v. 68, n. 1, p. 210-216, 1983.

019. ÍNDICE DE PERFORMANCE MIOCÁRDICO DE CÃES COM DOENÇA VALVAR MITRAL CRÔNICA EM DIFERENTES ESTÁGIOS

Matheus Matioli Mantovani¹, Ruthnéa Aparecida Lazaro Muzzi¹, Rosane M de Resende¹, Adriana Cristina da Silva¹, Rodrigo B Nogueira¹, Gisele F M dos Reis¹

1- Universidade Federal de Lavras - matheus2mvet@gmail.com

RESUMO

Objetivou-se determinar o índice de performance miocárdico (IPM) de cães com doença valvar mitral crônica (DVMC) em diferentes estágios. Os valores do IPM apresentaram diferença significativa entre os grupos de cães com ($0,69 \pm 0,11$) e sem ICC. Conclui-se assim, que IPM foi significativamente maior no grupo com ICC sendo um bom indicador da disfunção ventricular global.

PALAVRAS-CHAVES: Canino, Disfunção ventricular, Regurgitação mitral

MYOCARDIAL PERFORMANCE INDEX OF DOGS WITH CHRONIC MITRAL VALVE DISEASE IN DIFFERENT STAGES

ABSTRACT

The aim of this study was to determine the myocardial performance index (MPI) of dogs with chronic mitral valve disease (CMVD) at different stages. The values of MPI showed a significant difference between groups of dogs with (0.69 ± 0.11) and without CHF. Accordingly, MPI was significantly higher in patients with CHF being a good indicator of global ventricular dysfunction.

KEY-WORDS: Canine, Ventricular Dysfunction, Mitral Regurgitation

INTRODUÇÃO

A doença mitral valvar crônica (DMVC) é a cardiopatia adquirida mais frequente em cães e a principal causa de regurgitação mitral (RM) nessa espécie (BONAGURA e SCHOBBER, 2009). A disfunção ventricular esquerda pode se desenvolver associada ao aumento da pressão venosa e arterial pulmonar.

A ecocardiografia fornece grande variedade de informações sobre as funções sistólicas e diastólicas do ventrículo esquerdo. Um índice que incorpora em uma só medida a performance sistólica e diastólica do ventrículo, denominado de índice de performance do miocárdio (IPM) foi proposto por TEI et al., (1997), podendo ser usado como indicativo de ICC em cães com cardiomiopatia dilatada. Entretanto, o valor diagnóstico do IPM como indicativo de ICC em cães com regurgitação mitral permanece

desconhecido. Assim, o objetivo desse estudo é avaliar o valor do índice de performance miocárdico em cães acometidos por regurgitação mitral secundário a doença valvar crônica na presença ou ausência de insuficiência cardíaca congestiva.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram estudados 18 cães de diferentes raças de pequeno porte (até 15 kg de peso corporal), de ambos os sexos, sendo seis clinicamente saudáveis (grupo controle), seis com DVMC assintomáticos (grupo sem ICC) e seis com DVMC apresentando sinais clínicos de ICC.

O exame ecocardiográfico foi realizado, sem sedação, em aparelho Esaote MyLab 40. A fração de ejeção foi estimada pelo método de Simpson e a relação onda E/onda A do fluxo mitral determinada pelo fluxo transmitral. Para o cálculo do IPM do ventrículo esquerdo foi utilizado a fórmula $(a-b)/b$, sendo “a” = intervalo intermitral (tempo entre o final de um fluxo mitral e o início do subsequente) e “b” = medida do intervalo de tempo do fluxo de ejeção aórtico, obtido em via de saída de VE.

Todas as variáveis foram submetidas ao teste de normalidade (Shapiro Wilk) e as médias foram comparadas pelo teste Tukey ($P < 0,05$).

RESULTADOS

Os valores médios e desvio-padrões do índice de performance miocárdico esquerdo, fração de ejeção e relação onda E/onda A do fluxo mitral dos três diferentes grupos estão representados na tabela 1.

Tabela 1. Médias e desvio padrões dos índices de performance miocárdico do ventrículo esquerdo (IPM VE), fração de ejeção (FE) e relação onda “e”/onda “a” de cães hígidos (n=6), acometidos com doença valvar mitral crônica (DVMC) sem (n=6) e com insuficiência cardíaca congestiva (ICC) (n=6).

	Cães hígidos	Cães com DVMC sem ICC	Cães com DVMC com ICC
IPM VE*	0,37±0,13 ^b	0,43±0,19 ^b	0,69±0,11 ^a
FE	71,83 ± 10,68 ^a	69,83 ± 9,66 ^a	70,66 ± 6,62 ^a
Relação E/A	1,05 ± 0,13 ^a	1,30 ± 0,15 ^a	1,32 ± 0,30 ^a

* Letras diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey ($p < 0,05$)

DISCUSSÃO

O parâmetro convencional para avaliação da função diastólica (relação E/A do fluxo transmitral) e sistólica (fração de ejeção) não detectou distinção entre cães com e sem ICC. Este achado pode ser atribuído a “pseudonormalização” do fluxo mitral, sendo resultado da redução na complacência ventricular esquerda levando a elevação

da pressão atrial esquerda (BIERIG e HILL, 2011), e ao encurtamento hipertínâmico das câmaras ventriculares que pode ocorrer em cães com DVMC (BONAGURA e SCHOBER, 2009).

Na presença de insuficiência cardíaca congestiva, as disfunções sistólicas e diastólicas podem coexistir (SCHOBER et al., 2010). Este estudo demonstrou que o IPM VE pode ser utilizado como um indicador da disfunção cardíaca global em cães com ICC secundária a DVMC, resultados semelhantes aos descritos por BRUCH et al., (2000) em seres humanos.

CONCLUSÃO

O IPM foi significativamente maior no grupo com ICC do que nos grupos de cães saudáveis e sem ICC, sendo indicador da disfunção ventricular mais fidedigno do que os índices ecocardiográficos convencionais.

REFERÊNCIAS

BONAGURA, J. D.; SCHOBER, K. E. Can ventricular function be assessed by echocardiography in chronic canine mitral valve disease? **Journal of Small Animal Practice**, v. 50, suppl. 1, p. 12-24, 2009.

BRUCH, C.; SCHMERMUND, A.; MARIN, D. et al. Tei-Index in patients with mild-to-moderate congestive heart failure. **European Heart Journal**, v. 21, n.22, p. 1888-1895, 2000.

SCHOBER, K. E.; HART, T. M.; STERN, J. A. et al. Detection of congestive heart failure in dogs by Doppler echocardiography. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v. 24, n. 6, p. 1358-1368, 2010.

TEI, C.; LING, L. H.; HODGE, D. O. et al. New index of combined systolic and diastolic myocardial performance: a study in normal and dilated cardiomyopathy. **Journal of Cardiology**, v. 26, n.4, p. 357–366, 1997.

020. PRESSÃO SISTÓLICA ARTERIAL PELO MÉTODO DOPPLER EM GATOS PERSAS SAUDÁVEIS E COM CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA

Adriana Cristina da Silva¹, Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi¹, Leonardo Augusto Lopes Muzzi¹, Guilherme Oberlender¹, Gisele Fabrícia Martins dos Reis¹, Matheus Matioli Mantovani¹

¹Universidade Federal de Lavras – adrianagudi@gmail.com

RESUMO

A cardiomiopatia hipertrófica felina pode ocorrer secundariamente a hipertensão sistêmica. Desta forma, o objetivo do presente estudo, foi avaliar a pressão arterial sistêmica por meio do método Doppler esfigmomanométrico, de forma a comparar os valores obtidos entre animais com hipertrofia e animais saudáveis.

PALAVRAS-CHAVES Felinos, Hipertensão, Ecocardiografia

ARTERIAL SYSTOLIC PRESSURE BY DOPPLER METHOD IN HEALTHY PERSIAN CATS AND WITH HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY

ABSTRACT

The feline hypertrophic cardiomyopathy may occur secondary to systemic hypertension. Thus, the objective of this study was to evaluate the blood pressure by Doppler sphygmomanometry method in order to compare the values obtained from cats with hypertrophy and healthy cats.

KEYWORDS Felines, Hypertension, Echocardiography

INTRODUÇÃO

A cardiomiopatia hipertrófica felina (CHF) se caracteriza por um aumento na musculatura cardíaca associado à um ventrículo hipertrofiado e não dilatado. A hipertrofia ventricular pode ocorrer devido a um aumento da pressão como em casos de hipertensão sistêmica ou estenose sub-aórtica, além de alterações hormonais como hipertireoidismo (Abbott, 2010). No entanto, um adequado controle da pressão arterial sistêmica em gatos e suas implicações nos sistemas orgânicos ainda é pouco definida (Jepson et al., 2007). Este trabalho tem por objetivo avaliar a pressão sistólica pelo método Doppler em gatos da raça Persa saudáveis e com CHF, de forma a comparar os resultados e definir variações entre doentes e saudáveis, além de correlacionar os dados com a idade e o sexo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados um total de 20 gatos da raça Persa, provenientes da rotina do Serviço de Cardiologia do Hospital Veterinário da instituição. Os animais foram clinicamente examinados e foram obtidas cinco medidas da pressão arterial sistólica (PAS) no membro anterior esquerdo em cada animal (Sparkes et al., 1999), usando o aparelho Doppler Medpej® DV2000. Foi realizado também avaliação cardíaca e ecoDopplercardiografia para se determinar a presença ou ausência de CHF. Os animais foram divididos em dois grupos (n=10), sendo grupo 1 (G1) com animais saudáveis e grupo 2 (G2) com CHF. A idade e a PAS foram submetidas a análise descritiva, com detalhamento das médias e desvio-padrão. Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e as médias foram comparadas por testes estatísticos adequados. A variável sexo foi submetida a análise de frequência. As médias de idade e PAS foram comparadas entre animais dos dois grupos pelo teste t não-pareado ($P < 0,05$). Todas as análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico *SPSS for Windows versão 17.0*.

RESULTADOS

Para os animais saudáveis, quatro eram fêmeas (40%) e seis eram machos (60%) e para os animais com CHF três eram fêmeas (30%) e sete eram machos (70%). As médias de PAS (mmHg) não diferiram entre os grupos pelo teste t ($P > 0,05$), sendo que os valores para G1 e G2 foram, respectivamente, $123,20 \pm 14,79$ e $133,10 \pm 17,27$ mmHg. Quanto à idade foi observada diferença pelo teste t ($P < 0,05$) entre os grupos estudados e os valores para o G1 e G2 foram, $31,30 \pm 27,00$ e $106,00 \pm 56,32$ meses, respectivamente.

DISCUSSÃO

Entre os animais com CHF foi observado um número maior de machos, sendo que está relatada na literatura uma maior prevalência de machos doentes comparado as fêmeas (Fox, 2003). Em relação à idade, foi observado que o grupo de animais com CHF apresentou valores superiores aos saudáveis. É observado na literatura, que a idade média ao diagnóstico dos animais com CHF é de cerca de seis anos (Abbott, 2010), o que justifica a idade mais elevada do G2 do presente estudo. Entre os grupos estudados não houve diferença estatística com relação aos dados da PAS obtidos.

Este dado corrobora com a ausência de hipertensão sistêmica como causa de CHF. No entanto, a observação dos dados permite inferir que o G2 apresentou um

maior valor para a PAS que o G1. Isto pode ser devido a quadros mais graves da CHF, uma vez que alguns animais apresentavam obstrução da via de saída do VE.

CONCLUSÃO

A CHF é uma das cardiomiopatias mais frequentes em felinos. Desta forma, o diagnóstico precoce e definição das causas secundárias que podem levar ao seu desenvolvimento são essenciais para o correto manejo clínico. Desta forma, o presente estudo demonstrou a importância da obtenção da pressão arterial sistêmica em felinos, exame muitas vezes negligenciado na rotina clínica, mas que é de grande auxílio no diagnóstico e prognóstico da CHF.

REFERÊNCIAS

ABBOTT, J.A. Feline hypertrophic cardiomyopathy: an update. **Veterinary Clinics Small Animal**. v. 40, n.4, p.685-700.

JEPSON, R. E.; ELLIOTT, J.; BRODBELT, D.; et al. Effect of Control of Systolic Blood Pressure on Survival in Cats with Systemic Hypertension. **Journal of Veterinary Internal Medicine**. v. 21, n.3, p. 402-409, 2007.

SPARKES, A. H.; CANEY, S. M. A.; KING, M. C. A.; et al. Inter- and Intraindividual Variation in Doppler Ultrasonic Indirect Blood Pressure Measurements in Healthy Cats. **Journal of Veterinary Internal Medicine**. v. 13, n.4, p. 314-318, 1999.

021. ROTAÇÃO APICAL POR MEIO DA ECOCARDIOGRAFIA *SPECKLE TRACKING* EM GATOS DOMÉSTICOS

Adriana Cristina da Silva¹, Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi¹, Guilherme Oberlender¹, Leonardo Augusto Lopes Muzzi¹, Gisele Fabrícia Martins Dos Reis¹, Matheus Matioli Mantovani¹

¹Universidade Federal de Lavras – adrianagudi@gmail.com

RESUMO

A rotação apical é considerada como fundamental na torsão ventricular. O estudo demonstrou que os valores obtidos pelo *speckle tracking* para a rotação apical e velocidade de rotação apresentaram-se inferiores aos dados apresentados na literatura para outras espécies. Desta forma, novos índices sistólicos são apresentados para a espécie felina (*Felis catus*).

PALAVRAS-CHAVES Felinos, Cardiopatias, Torsão Ventricular

APICAL ROTATION BY SPECKLE TRACKING ECHOCARDIOGRAPHY IN DOMESTIC CATS

ABSTRACT

The apical rotation is considered as central role in ventricular torsion. The study showed that the values obtained by speckle tracking for apical rotation and rotation velocity were lower than data of literature for other species. Thus, new systolic index were presented in this work to felines (*Felis catus*).

KEYWORDS: Felines, Cardiopathies, Ventricular Twist

INTRODUÇÃO

A torção ventricular esquerda é o movimento de rotação cardíaco onde o ápice gira em relação à base em torno do eixo longitudinal do ventrículo esquerdo (VE) (Opdahl et al., 2008). A ecocardiografia bidimensional *Speckle Tracking* (2D STE) permite a mensuração, de forma não invasiva da rotação e velocidade de rotação ventricular (Kim et al., 2009). Em cães e em humanos, a rotação apical representa uma grande porcentagem da torsão ventricular total, desempenhando papel determinante em diversas condições hemodinâmicas (Opdahl et al., 2008). Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é descrever valores de velocidade e rotação apical ventricular esquerda, obtida por meio da 2D STE, em gatos domésticos saudáveis, uma vez que não há na literatura dados semelhantes.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados seis gatos saudáveis não sedados provenientes do serviço de cardiologia do Hospital Veterinário da instituição. Os animais foram examinados clinicamente, foi obtida a pressão sistólica e realizada a eletrocardiografia e ecoDopplercardiografia. O exame ecocardiográfico foi realizado em um aparelho Esaote® MyLab 40, com transdutores de varredura setorial eletrônica multifrequencial de 4-10 Hz. Para a análise *off line* com o STE foi utilizado o software xstrain Esaote®10.0. Durante a ecocardiografia imagens bidimensionais compatíveis com o STE foram obtidas no plano apical eixo-curto direito. Foram realizadas seis medidas em dois ciclos cardíacos diferentes para cada animal e obtida a média. Foi realizada análise descritiva (médias e desvio-padrão), análise estatística não paramétrica visto que não atingiram a normalidade ($P < 0,05$) mesmo após a transformação dos dados pela opção raiz quadrada, comparação entre médias pelo teste Mann-Whitney ($P < 0,05$). Todas as análises foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS for Windows versão 17.0. O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da instituição.

RESULTADOS

As médias de idade e peso obtidas foram $19 \pm 11,01$ meses e $4,33 \pm 0,98$ kg, respectivamente. Entre os animais dois eram fêmeas (33,33%) e quatro machos (66,67%). Não foram observadas alterações na ecoDopplercardiografia, estando todos os índices de função sistólica e diastólica dentro da normalidade. Quanto a velocidade de rotação (°/s) os valores médios para a região endocárdica e epicárdica foram $66,58 \pm 20,61$ e $20,59 \pm 6,73$, respectivamente, sendo a média geral de $43,59 \pm 27,66$. Por sua vez, os valores para a rotação (°) foram $3,83 \pm 2,30$ e $1,44 \pm 0,86$, para a região endocárdica e epicárdica, respectivamente, e a média geral de $2,64 \pm 2,10$.

DISCUSSÃO

Não foram observadas alterações na ecoDopplercardiografia. Para valores de rotação e velocidade de rotação houve diferença estatística entre a região endocárdica e epicárdica, sendo que para as duas variáveis a região endocárdica apresentou maiores valores. E a média geral para as regiões quanto a rotação apresentou valor menor em cerca de 50% do descrito para cães (Opdahl et al., 2008) e humanos (Van Dalen et al., 2008). Quanto à velocidade de rotação (°/s) os valores foram muito inferiores aos encontrados em cães (Kim et al., 2009). Neste estudo, deve-se levar em

consideração que a frequência cardíaca em gatos não sedados é mais elevada, sendo que isto pode interferir nos resultados.

CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou valores obtidos em gatos domésticos para a rotação e velocidade de rotação apical do VE, sendo que estes valores podem ser úteis, como novos índices sistólicos para a espécie uma vez que não há dados semelhantes na literatura.

REFERÊNCIAS

KIM, W. J.; LEE, B. H.; KIM, Y. W.; et al. Apical Rotation Assessed by Speckle-Tracking Echocardiography as an Index of Global LeftVentricular Contractility. **Circulation: Cardiovascular Imaging**. v.2, p.123-131, 2009.

OPDAHL, A.; HELLE-VALLE, T.; REMME, E. W.; et al. Apical Rotation by Speckle Tracking Echocardiography: A Simplified Bedside Index of Left Ventricular Twist. **Journal of the American Society of Echocardiography**. v.21, n.10, p.1121-1128, 2008.

022. ADRENALECTOMIA EM CÃO APRESENTANDO HEMANGIOMA E MIELOLIPOMA EM ADRENAL

Gabriela Reis Ledur¹; Anelise Bonilla Trindade¹; Priscila Natasha Kasper¹; Luiz Carlos da Luz¹; Marcelo Meller Alievi¹; Daniel Guimarães Gerardi¹.

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul – gabirledur@hotmail.com

RESUMO

Hemangiomas e os mielolipomas são neoplasias benignas de ocorrência rara em animais domésticos. Sendo assim, o presente trabalho objetiva relatar um caso de hemangima e mielolipoma em um canino, macho, da raça Chow-chow, oito anos de idade, com histórico de vômitos e diarreia crônica desde filhote. Ao exame ultrassonográfico foi evidenciado uma massa em adrenal direita de maneira que a adrenalectomia total da glândula realizada através de acesso mediano epigástrico foi a conduta cirúrgica de escolha. O exame histopatológico da glândula confirmou a associação de duas neoplasias benignas: hemangioma e mielolipoma. O paciente apresentou boa recuperação pós-operatória com redução nos sinais gastrintestinais.de maneira que a escolha do tratamento cirúrgico escolha terapêutica mostrou-se efetiva uma vez que a boa evolução pós-operatória respalda a conduta adotada.

PALAVRAS-CHAVE: canino, sistema endócrino, neoplasia

ADRENALECTOMY IN DOGS PRESENTING HEMANGIOMA E MYELOLIPOMA IN ADRENAL GLAND

ABSTRACT

Hemangiomas and myelolipomas are benign neoplasms of rare occurrence in domestic animals. This paper aims to report a case of a male dog, race Chow-chow, eight years with chronic vomiting and diarrhea as a puppy. The ultrasound exam showed a mass in the right adrenal gland and the total adrenalectomy performed by a median epigastric approach was the therapeutic. Histopathological exam was suggestive of and association between hemangioma and myelolipoma. In the post operative conduct were prescribed medications for pain control, antibiotics and topical dressings. In revision, the patient had complete wound healing, good general condition and reduction in gastrointestinal symptoms. In these sense, the choice of therapy has proven effective as a good outcome after surgical was noticed, supporting the conduct adopted.

KEYWORDS: Canine, endocrine system, neoplasm

INTRODUÇÃO

As neoplasias do sistema endócrino são de ocorrência incomum nos animais domésticos, sendo que apenas 2 % são primárias da glândula adrenal. Hemangiomas e mielolipomas ocorrem de forma rara neste órgão apesar de ambos serem neoplasmas benignos e afuncionais (Bichard, 1998; Martínéz et. al., 2006). Desta maneira, o presente trabalho visa relatar um caso da associação de duas neoplasias benignas de ocorrência rara em adrenal de cão, enfatizando os sinais clínicos, o diagnóstico e o tratamento.

RELATO DO CASO

Um cão, macho, da raça Chow-Chow, com 8 anos de idade foi atendido no HCV-UFRGS, apresentando diarreia e vômitos intermitentes desde filhote. Ao exame clínico, não foram observadas alterações, exceto a presença de muco nas fezes que foi constatada através do toque retal. Foram solicitados hemograma, albumina, ALT, FA, Na, K, colesterol, triglicérides, creatinina e glicemia de jejum, além de exame parasitológico de fezes, os quais resultaram todos dentro da normalidade. À ultrassonografia abdominal foi evidenciada uma massa arredondada de bordos irregulares, medindo aproximadamente 3,7 cm x 3,2 cm em adrenal direita com hiperplasia tecidual na adrenal esquerda. O paciente foi estabilizado e encaminhado para a adrenalectomia total direita. Sob anestesia geral, o cão foi posicionado em decúbito lateral esquerdo e através do acesso paracostal direito localizou-se a adrenal direita alterada. Realizou-se dissecação cuidadosa e a ligadura dos vasos. O órgão foi removido e encaminhado para estudo histopatológico. A cavidade abdominal foi suturada de forma rotineira. O animal apresentou excelente recuperação pós-operatória, recebendo antibioticoterapia, analgésicos e curativos diários. À revisão, apenas a persistência do muco nas fezes foi constatada, porém uma colonoscopia diagnóstica não foi autorizada pela proprietária.

DISCUSSÃO

Os hemangiomas e mielolipomas são tumores que cursam geralmente de maneira assintomática, podendo acometer diversos órgãos (Martínéz et. al., 2006) A adrenalectomia é o método de escolha no tratamento de neoplasias que acometem esta glândula (Lezoche et. al., 2008) I., 1999). No presente relato, optou-se pela realização do acesso mediano epigástrico associado a exérese paracostal, uma vez que a grande diferença entre eles diz respeito ao porte do animal. Por se tratar de um

cão de médio a grande porte, esse tipo de acesso se fez necessário para melhor exposição e dissecação da glândula adrenal (Lezoche et. al., 2008). Não houve a necessidade da utilização de glicorticóides por se tratar de neoplasmas afuncionais e neste caso não é recomendada terapia de suplementação (Birchard, 1998).

CONCLUSÃO

A adrenalectomia total da glândula apresentando mielolipoma e hemangioma foi efetiva, visto que a evolução pós-operatória respalda a conduta cirúrgica adotada.

REFERÊNCIAS

BIRCHARD S. J. Adrenalectomia. *In*: Slatter D. **Manual de cirurgia de pequenos animais**. 2ª ed. São Paulo: Manole, p. 2830, 1998.

LEZOCHÉ E., GUERRIERI M., CROSTA F. et. al. Flank approach versus anterior sub-mesocolic access in left laparoscopic adrenalectomy: a prospective randomized study. **Surgical Endoscopy and other Interventional Techniques**, New York, v. 22, n. 11, p. 2373-2378, 2008.

MARTINÉZ J. P., LIMAS F., RUBIO E. L. et al. Mielolipoma suprarrenal gigante: hipertensión, insuficiencia renal y rotura espontánea. **Nefrología**, v. 26, p. 132-5, 2006.

023. AVALIAÇÃO DE CADÁVERES QUIMICAMENTE PRESERVADOS

Joelma Jesus da Silva¹, João Moreira da Costa Neto¹, Vinicius de Jesus Moraes¹,
Diana Mello Teixeira¹, Emanuel Ferreira Martins Filho², Deusdete Conceição Gomes
Junior²

Universidade Federal da Bahia¹ – silvajoelma_12@yahoo.com.br

Universidade Estadual Paulista²

RESUMO

Cadáveres quimicamente preservados podem ser utilizados visando garantir a destreza do cirurgião, para tanto, suas características devem se apresentar semelhantes à de um animal vivo. Diversas formulações podem ser utilizadas buscando este fim, contudo, os estudos existentes se limitam a experimentação, não se buscando a opinião de usuários finais. Este trabalho traz a opinião de 24 Médicos Veterinários sobre experiência vivida em um curso de ortopedia veterinária, utilizando cães preservados quimicamente.

PALAVRAS-CHAVE: cirurgia veterinária; ensino; cadáver

CHEMICALLY PRESERVED CORPSES

ABSTRACT

Chemically preserved corpses can be used to assure the dexterity of the surgeon, for both, their characteristics should present itself like a living animal. Various formulations can be used for this purpose, however, the existing studies are limited experimentation, not seeking the opinion of end users. This work brings the view 24 Veterinarians about lived experience in a course of veterinary orthopedics, using chemically preserved dogs.

KEYWORDS: veterinary surgery; education; corpse

INTRODUÇÃO

Os métodos alternativos visam reduzir ou substituir o uso de animais vivos em treinamentos profissionais (ANDRADE, 2002). Dentre eles está a utilização de cadáveres para aprendizagem cirúrgica. Alvarenga (1992) indica que há séculos vem-se procurando por métodos de conservação tecidual que possibilitem o cadáver parecer semelhante ao animal vivo. De acordo com Silva (2003) cadáveres quimicamente preservados em solução de Larssen modificada vêm tendo boa aceitabilidade no treinamento de técnicas cirúrgicas (SILVA, 2003). Através de formulários padronizados obteve-se a opinião de Médicos Veterinários a respeito de

seus conhecimentos relativos aos métodos alternativos ao uso de animais e sua experiência com cadáveres conservados pela solução de Larssen modificada.

MATERIAL E MÉTODOS

Vinte e quatro Médicos Veterinários participantes do curso de ortopedia veterinária opinaram através do preenchimento de formulários, a respeito de seus conhecimentos relativos ao bem-estar animal e métodos alternativos ao uso de animais. Ainda sobre sua experiência com cadáveres conservados pela solução de Larssen modificada. No primeiro formulário as perguntas eram referidas ao conhecimento dos participantes sobre bem estar animal e métodos alternativos de ensino. Já o segundo foi direcionado a comprovação da eficácia da solução de Larssen. Cada grupo composto por quatro Médicos Veterinários avaliou um cadáver. Para a análise estatística foi utilizado o Teste de U de Mann-Whitney.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste estudo o interesse dos profissionais em relação às questões éticas e bem estar animal alcançou 95% dos entrevistados. Além disso, 89% destes tinham o conhecimento sobre métodos alternativos utilizados no ensino. Embora todos concordassem como uso de cadáveres para o ensino das técnicas cirúrgicas propostas, 67% dos profissionais entrevistados ainda acreditavam que o emprego de animais melhor se adéqua a proposição, no entanto após treinarem em cadáveres conservados com a solução de Larssen modificada, apenas um participante manteve esta opinião.

Todos os entrevistados relataram ter tido facilidade na execução das abordagens e correções cirúrgicas ortopédicas. Além disso, disseram que os animais mantiveram características próximas a de um animal vivo conforme descrito por Silva (2003) e que puderam treinar repetidas vezes sem o medo que teriam de causar dano a um animal vivo, corroborando com Diniz (2005) o qual afirma que a experiência obtida em treinamentos cadavéricos fornece adequada visão dos procedimentos cirúrgicos, possibilitando maior segurança quando diante da situação real.

CONCLUSÃO

Os cadáveres quimicamente preservados mostraram-se adequados ao treinamento das técnicas cirúrgicas. Os Médicos Veterinários se disseram impressionados com a conservação dos animais e recomendaram a aplicação da

solução de Larssen modificada em cadáveres utilizados para o ensino das disciplinas curriculares.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, J. ; DALECK, C. R.. ; BAPTISTA, L. C. et al. Possibilidades e limitações da utilização de membranas biológicas preservadas em cirurgia. In: **Tópicos em cirurgia de cães e gatos**, Jaboticabal FUNESP-UNESP, v. 2, n. 1, p. 33-42, 1992.

ANDRADE, J. O uso de animais em laboratório. **Revista de Bem-Estar Animal**, Rio de Janeiro, v. 3,n. 2,p. 198-239, 2002.

DINIZ R. Animais em Aulas Práticas: Podemos Substituí-los com a Mesma Qualidade de Ensino. **Revista Brasileira de Educação Medica**, v.2, n.1, p.31-40, 2005.

SILVA R. M. G. **Avaliação do método de ensino da técnica cirúrgica utilizando cadáveres quimicamente reservados**. 2003. São Paulo, 127f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Curso de Pós-graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

024. ESTUDO COMPARATIVO DA EFICÁCIA DA *CISSUS QUANDRANGULARIS* E DA *PHYLLANTHUS RETICULATUS POIR* NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS INDUZIDAS NA PELE DE COBAIAS

Ivan F. Charas dos Santos^{1,2}, André Paulo Nhambirre³, Otilia Bambo⁴
José Manuel da Mota Cardoso⁵, Cláudio laisse⁶

¹Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho". Botucatu. São Paulo. ²Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. ivansantos7@hotmail.com

³Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. nyambyr@yahoo.com.br

⁴Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. otiliabambo@hotmail.com

⁵Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. j.cardoso@tvcabo.co.mz

⁶Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. claudiolaisse@gmail.com

RESUMO

O objetivo do estudo foi comparar a eficácia da *Cissus quandrangularis* e da *Phyllanthus reticulatus poir* na cicatrização de feridas induzidas na pele de cobaias. Foram utilizadas 12 cobaias, machos, raça Abissínia, 6 meses de idade, pesando entre 550 a 850g. Três grupos com quatro cobaias foram criados. Depois de anestesiadas, três feridas cirúrgicas foram realizadas em cada animal. A F1 foi tratada com a *Cissus quandrangularis*, a F2 foi grupo controle (soro fisiológico) e a F3 com a *Phyllanthus reticulatus poir*. O Grupo I foi eutanasiado ao sétimo dia após a cirurgia; o Grupo II ao décimo quarto dia e o Grupo III ao vigésimo primeiro dia após a cirurgia e as lesões submetidas ao exame histológico. Foi usado o programa SPSS®, com a análise de variância (ANOVA), seguido do Teste de Tukey com 5% de significância para comparação das médias. As feridas tratadas com a *Cissus quandrangularis* cicatrizaram mais rápido em relação à *Phyllanthus reticulatus poir*.

PALAVRAS-CHAVES Cicatrização, feridas, plantas, *Phyllanthus reticulatus poir*, *Cissus quandrangularis*.

COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF *Cissus quandrangularis* AND *Phyllanthus reticulatus POIR* IN HEALING OF INDUCED WOUNDS ON THE SKIN OF GUINEA PIGS

ABSTRACT

The aim of the study was to compare the effectiveness of *Cissus quandrangularis* and *Phyllanthus reticulatus poir* in healing at induced wound in guinea pigs skin. Were used 12 guinea pigs, male, Abyssinian, with 6 months old and weighing 550 to 850g. Three groups of four animals were created. Once anesthetized, three surgical wounds were performed on each animal. The F1 was treated with *Cissus quandrangularis*; F2 was group control (saline solution) and F3 with *Phyllanthus reticulatus poir*. Group I was

euthanized on the seventh day after surgery; Group II on the fourteenth day and the Group III on the twenty-first day after surgery and the lesions submitted to histological examination. Were used SPSS[®], with analysis of variance (ANOVA) followed by Tukey test at 5% of significance. The lesions treated with *Cissus quandrangularis* healed faster and higher than *Phyllanthus reticulatus* *poir*.

KEYWORDS: Cicatrization, wounds, plants, *Phyllanthus reticulatus* *poir*, *Cissus quandrangularis*.

INTRODUÇÃO

Existe atualmente em todo mundo uma tendência para o aproveitamento, como alternativa, de recursos naturais na terapêutica (Toyang et al., 2007, Braga, 2008). A pesquisa tem como objetivo comparar a eficácia da *Cissus quandrangularis* e da *Phyllanthus reticulatus* *poir*, na cicatrização de feridas induzidas na pele de cobaias, avaliando e comparando o tempo de cicatrização e o aspecto macroscópico e microscópico do tecido cicatricial.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizadas 12 cobaias, divididas em três grupos de quatro animais, machos, raça Abissínio, com 6 meses de idade, pesando entre 550 a 850g. Após anestesia, foram realizadas três feridas cirúrgicas em cada animal, de 1,5cm² e 1,5cm de distância entre elas, na região dorsal. A F1 foi tratada com as folhas da *Cissus quandrangularis*, F2 foi o grupo controle (soro fisiológico) e a F3 foi tratada com o extrato da *Phyllanthus reticulatus* *poir*. O Grupo I foi eutanasiado ao 7º dia após a cirurgia; o Grupo II ao 14º dia e o Grupo III ao 21º dia após a cirurgia, e as lesões submetidas ao exame histológico. Foi usado o programa SPSS[®], com a análise de variância (ANOVA), seguido do Teste de Tukey com 5% de significância para comparação das médias.

RESULTADOS

No 7º dia de tratamento as feridas tratadas com a *Cissus quandrangularis* apresentaram um aspecto seco e com maior contração dos bordos em relação às tratadas com a *Phyllanthus reticulatus* *poir*. No 14º dia de tratamento, as feridas tratadas com a *Cissus quandrangularis* cicatrizaram por completo e no 21º primeiro dia observou-se a cicatrização completa nas tratadas com a *Phyllanthus reticulatus* *poir* (Tabela 1).

Tabela 1 - Evolução macroscópica das feridas tratadas com a *Cissus quandrangularis*, soro fisiológico e com a *Phyllanthus reticulatus* poir, no dia da cirurgia, 7º, 14º e 21º dias de tratamento.

Dias pós-cirurgia	<i>Cissus quandrangularis</i>	Soro fisiológico	<i>Phyllanthus reticulatus poir</i>
0
7
14
21

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Comparando as duas plantas, constatou-se ao 7º dia de tratamento uma intensa presença de tecido de granulação nas feridas tratadas com a *Cissus quandrangularis* e moderada presença nas tratadas com a *Phyllanthus reticulatus poir*, mesmo citado por Navarro (2009). As feridas tratadas com a *Cissus quandrangularis* cicatrizam mais rápido, com menor reação inflamatória e maior estimulação do tecido de granulação em relação à *Phyllanthus reticulatus poir*.

REFERÊNCIAS

- BRAGA, T.V. *Avaliação da atividade farmacológica de Cissus Verticillata Nicolson & C.E jarvis Subsp. Verticillata como Antioxidante, Antifúngico, Hipoglicemiante e Cicatrizante*. 2008. 141p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Ouro Preto, Brasil.
- NAVARRO, F.F. *Cissus gongylodes: caracterização farmacognóstica e investigação de aspectos preliminares da seguridade da utilização de extratos aquosos das folhas e caules*. 2009. 101p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Estadual Paulista " Júlio de Mesquita Filho", Brasil.
- TOYANG, N.J.; WANYAMA, J.; NUWANYAKPA, M., et al. *Medicina Etnoveterinária – Uma abordagem prática do tratamento de doenças de gado na África Sub-sahariana*. 1ª ed Wageningen: Editora Fundação Agrmisa, 2007, 33p.

025. LEIOMIOSSARCOMA CECO - CÓLICO EM CÃO JOVEM– RELATO DE CASO

Otilia Bambo¹, José Manuel da Mota Cardoso², Ivan F. Charas dos Santos^{3,4}
Gaby Monteiro⁵, Ângelo Lampeão⁶

¹Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. otiliabambo@hotmail.com.

²Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. j.cardoso@tvcabo.co.mz

³Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. FMVZ – UNESP – Botucatu. São Paulo.

⁴Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. ivansantos7@hotmail.com

⁵Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. monteirog2002@gmail.com

⁶Universidade Eduardo Mondlane. Moçambique. kikaslampeao@yahoo.com.br

RESUMO

O objetivo do trabalho foi relatar um caso de leiomiossarcoma ceco-cólico em um cão jovem de 1 ano de idade. O animal apresentava diarreia hemorrágica e emagrecimento progressivo. Durante a palpação do abdômen, confirmou-se a presença de uma massa na região do cólon e posteriormente foi realizado um exame ultrassonográfico abdominal, com evidência de uma massa vascularizada na região do ceco, sugestivo a formação tumoral. À pedido do proprietário foi realizado a eutanásia. O resultado dos exames histopatológicos foi de leiomiossarcoma ceco-cólico e classificado como raro devido à idade do animal.

PALAVRAS-CHAVES: Leiomiossarcoma, ceco, cão jovem

LEIOMYOSARCOMA CECO- COLICO IN YOUNG DOG – A CASE REPORT

ABSTRACT

The aim of the work was to report a case of caecum - colic leiomyosarcoma in a dog with one year old. The animal had blood diarrhea and progressive weight loss. During the abdomen palpation was confirmed the presence of a mass in the colon and was subsequently conducted an abdominal ultrasound examination, with evidence of a high vascular mass in the region of the cecum, suggesting a cancer. At the request of the owner euthanasia was performed. The result of the pathological examination was leiomyosarcoma cecum-colon and classified as rare because the animal's age.

KEYWORDS: Leiomyosarcoma, caecum, young dog

INTRODUÇÃO

Os sarcomas do tecido mole formam um grupo heterogêneo de neoplasias malignas, que podem ser classificados coletivamente, pois, possuem histogênese e comportamentos biológicos semelhantes (Luong et al., 2006; Riggi et al., 2007). O leiomiossarcoma é classificado como sarcoma do tecido mole, uma neoplasia maligna

do músculo liso (Meuten, 2002; Sandberg, 2005; Liptak e Forrest, 2007). O tratamento de eleição é a cirúrgica, principalmente para as complicações obstrutivas e hemorrágicas (Rangel et al., 2000). O leiomiossarcoma apresenta um mau prognóstico, devido ao diagnóstico tardio (Luong et al., 2006). Sendo uma neoplasia que afeta cães com idade acima de 10 anos, o objetivo do trabalho é relatar um caso raro de leiomiossarcoma ceco-cólico em um cão de 1 ano de idade.

RELATO DE CASO

Foi atendido no HV, um cão, sem raça definida, com 1 ano de idade, pesando 15kg. O animal apresentava diarreia hemorrágica e emagrecimento progressivo, com duração de 15 dias. Durante a palpação do abdômen, evidenciou-se uma massa na região do cólon. Posteriormente, foi realizado um exame ultrassonográfico abdominal e confirmou-se a presença de uma massa vascularizada de aproximadamente 15 a 20cm de diâmetro na região do cólon ascendente, sugestivo a formação tumoral. O resultado do hemograma foi uma leucocitose com neutrofilia com desvio a esquerda regenerativa.

À pedido do proprietário foi realizado a eutanásia. Na necropsia, observou-se uma massa, localizada entre o ceco e o cólon ascendente, de consistência dura e 15cm de diâmetro (Figura 1A) com projeção da serosa para o lúmen intestinal. Histopatologicamente evidenciou-se a proliferação de células de aspecto fusiforme, com pleomorfismo evidente e intensa proliferação tecidual ao nível das fibras musculares lisas (Figura 1B) e foi classificado como leiomiossarcoma ceco-cólico. O RELATO DE CASO tem o protocolo de ética nº 265/2011 – CEUA – FMVZ –UNESP – Botucatu.

Figura 1 - Leiomiossarcoma ceco-cólico, com o epíplon aderido à serosa (A), fibras musculares lisas substituídas por tecido neoplásico (B) - H/E (400x) (Arquivo pessoal, 2011).

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Este tipo de neoplasia está pouco descrito na literatura, especialmente no que se refere aos aspectos indicativos de grande malignidade afetando animais jovens. Segundo Meuten (2002), Liptak e Forrest (2007), este tipo de tumor ocorre em cães com idade superior a 10 anos, e no presente caso o animal possuía 1 ano de idade. A etiologia do tumor no o presente caso é desconhecida, podendo ser de origem genética. O diagnóstico definitivo de leiomiossarcoma ceco-cólico foi por meio da histopatologia *post-mortem*.

REFERÊNCIAS

- LIPTAK, J.M.; FORREST, L.J. Soft Tissue Sarcomas. In: WITHROW, S.J.; VAIL, D.V. (Eds). *Small Animal Clinical Oncology*. 4th ed. St Louis:Elsevier, 2007, p. 846.
- LUONG R.H.; BAER K.E.; CRAFT D.M. et al. Prognostic and significance of Intratumoral micro vessel density in canine soft tissue sarcomas. *Vet Path*, n.43, pp. 622– 631, 2006.
- MEUTEN D.J. *Tumors in domestic animals*. 4th ed. Iowa: Iowa State Press, 2002, p. 786.
- RANGEL, M. F. (2000). Tumores malignos do intestino delgado. *Rev Colégio Bras Cir*, vol.27, n.6, Pp.385-388, 2000.
- RIGGI, N.; CIRONI, L.; SUVÁ, M.L.; STAMENKOVIC, I. Sarcomas: genetics, signaling and cellular origins. *J Path*, vol. 213, n.1, pp. 4-20, 2007.
- SANDBERG, A.A. Updates on the cytogenetic and molecular genetics of bone and soft tissue tumors: leiomyosarcoma. *Cancer Gen and Cytogen*, n.161, pp. 1–19, 2005.

026. NEFROBLASTOMA ECTÓPICO EM UM FELINO: RELATO DE CASO

Gabriela Marques Sessegolo¹, Simone Scherer², Kairuan Camera Kunzler³, Pâmela Garcia de Almeida³, Fernanda Velente⁴, Afonso Castro Beck⁵

¹Mestranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Veterinária (FAVET) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – gabisessegolo@hotmail.com

²Doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Veterinária (FAVET) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) –

³Aluno da graduação da FAVET-UFRGS

⁴Médica Veterinária residente do Hospital de Clínicas Veterinárias – UFRGS (HCV-UFRGS)

⁵Professor da FAVET-UFRGS

RESUMO

O nefroblastoma é um tumor renal primário, de ocorrência frequente em animais jovens. O presente trabalho relata um caso de nefroblastoma em um felino um caso de nefroblastoma ectópico em um felino de seis anos de idade.

PALAVRAS-CHAVES: nefroblastoma, rim, ectópico, felino

ECTOPIC NEPHROBLASTOMA IN A FELINE: A CASE REPORT

ABSTRACT

The nephroblastoma is a primary renal tumor, frequently occurring in young animals. This article reports a case of ectopic nephroblastoma in a feline six years old.

KEYWORDS: nephroblastoma, kidney, ectopic, feline

INTRODUÇÃO

O nefroblastoma é um tumor embrionário, de origem primária. É uma neoplasia considerada congênita, que se desenvolve a partir da transformação das células renais em células neoplásicas durante a nefrogênese. Muitos animais que possuem essa patologia são assintomáticos e o tumor na maioria das vezes é descoberto somente na necropsia.

RELATO

Foi atendido um felino, macho, inteiro, sem raça definida, com 6 anos de idade, pesando 3,5 Kg. O proprietário relatou que o animal apresentava hiporexia, emagrecimento e aumento de volume da região abdominal, de crescimento rápido. No exame clínico observou-se um aumento de volume intra-abdominal, desconforto a palpação, e uma leve desidratação. A ultrassonografia evidenciou massa de grande extensão, porém sem indícios de origem e implantação do tumor. Foi realizada uma biópsia aspirativa com agulha fina, cujo laudo foi sugestivo de fibrossarcoma. Diante da

leve neutrofilia encontrada no leucograma e considerando o fato de que a radiografia torácica não apresentou alterações sugestivas de metástase. optou-se pela realização de uma laparotomia exploratória.

Durante o procedimento cirúrgico foi visualizado uma massa intra-abdominal, que ocupava aproximadamente 80% da cavidade (Fig. 1a). O tumor estava aderido a alças intestinais, baço, estômago e ao epíplon. Foi possível observar que a irrigação do tumor era realizada por uma veia oriunda diretamente da veia cava caudal, sendo necessária a oclusão desse desvio, através de ligadura. Foi necessária a realização de esplenectomia, devido à mudança de coloração do baço, possivelmente causada pela ligadura de vasos intimamente aderidos ao tumor. Após a remoção do tumor, foi visualizada implantação tumoral no fígado, epíplon e pâncreas. O diagnóstico do exame histopatológico do material enviado (Fig. 1b) foi de nefroblastoma.

Após sete meses, foi evidenciado aparecimento de tumor hepático e em parede abdominal, de provável origem metastática. O felino foi submetido a uma nova cirurgia para remoção dos tumores. O paciente veio a óbito, um mês e meio após a realização do segundo procedimento cirúrgico.

DISCUSSÃO

O nefroma embrionário é um tumor de comum ocorrência em filhotes, e também em jovens de até 4 anos de idade. O nefroblastoma apresenta crescimento rápido, gerando efeito de massa intra-abdominal. É desenvolvida metástase em 65% dos casos, segundo Aguirre (2010), principalmente nos pulmões, fígado, rim contralateral e gânglios linfáticos periféricos e sub-lombares (Prado et al., 2008)

Os sinais clínicos desse tumor são: presença de massa renal palpável, hematúria intermitente, distensão e dor abdominal, edema de membros pélvicos devido à compressão do sistema linfático, e ataxia. Além disso, os animais apresentam sinais inespecíficos de anorexia, prostração, perda de peso, entre outros.

O procedimento cirúrgico indicado é a ureteronefrectomia, desde que o rim contralateral não esteja com sua integridade funcional comprometida. O rim deve ser removido com sua cápsula e a manipulação cirúrgica deve ser reduzida para impedir disseminação tumoral intravascular, e a capsula não deve ser rompida para evitar disseminação peritoneal de células tumorais segundo Aguirre (2010); Morgan et al (2004). É importante remover os linfonodos regionais, mesmo que não estejam alterados (Morgan et al., 2004). No presente relato, não foi necessária a ressecção renal, devido a integridade destes órgãos, e à localização do tumor, que se encontrava

fora das delimitações renais, aderido a vísceras como baço, estômago, intestino e epíplon, e a vasos importantes como a veia cava caudal.

A sobrevida desses animais é em média de 6 a 12 meses após a nefrectomia, e em casos de disseminação metastática ou vascular, o prognóstico se torna ruim, diminuindo a expectativa de vida (Morgan et al., 2004).

CONCLUSÃO

Em relação ao caso descrito, os dois rins do felino estavam normais. Não havendo qualquer alteração em seu parênquima cortical, caracterizando essa alteração tumoral como um nefroblastoma ectópico.

REFERÊNCIAS

- AGUIRRE, L.S. Nefroblastoma **em felino: Descripción de um caso clínico**. In: Holliday News Newsletter. Chile, 2010 (web site).
- MORGAN, R.V., BRIGHT, R.M., SWARTOUT, M.S. **Clinica de Pequeños Animales**. 4 ed. Espanha: Elsevier. p. 524 – 525. 2004.
- PRADO, R.N.A., SIMÕES, M.M., PARRA, B.C., LOT, R.F.E. **Nefroma embrionário em um cão: Relado de caso**. Revista científica eletrônica de medicina veterinária. Ano VI, n.10, periódico semestral. ISSN 1679 – 7353, 2008.

027. O USO DA TOMOGRAFIA CONVENCIONAL E HELICOIDAL COMO AUXILIO NO PLANEJAMENTO CIRURGICO INTRANASAL

Eros Luiz de Sousa¹; Sabrina M. Rodigheri²; Monica Eloise Marchioro³; Luiz Gustavo Wosch de Carvalho⁴; Ana Paula Faraco⁵

^{1, 2} Serviço de Cirurgia do Hospital Veterinário Batel – contato@hvbatel.com.br

^{3,4} Acadêmicos da Faculdade Evangélica do Paraná

⁵ Serviço de Clínica Médica do Hospital Veterinário Batel

RESUMO

A tomografia computadorizada é amplamente utilizada na medicina veterinária, permitindo diagnósticos e planejamentos cirúrgicos precisos. A qualidade do exame é influenciada pela técnica e principalmente pelo equipamento utilizado. O tomógrafo helicoidal apresenta imagens de melhor qualidade quando comparadas ao equipamento convencional. Desta forma, a mesma estrutura examinada por ambos os tomógrafos podem ser abordadas de forma diferente.

PALAVRAS-CHAVE: tomografia computadorizada, radiologia, cavidade nasal

THE USE OF CONVENTIONAL HELICAL TOMOGRAPHY AS AN AID IN INTRANASAL SURGICAL PLANNING

ABSTRACT

The computed tomography is very well used in the veterinary medicine, allowing diagnosis and precise surgeries. The quality of the exam is under the influence of the technique and mainly by the quality of the equipment being used. The helical computed tomography scan shows better quality images when compared to the conventional equipment. With that being said, when the same structure is being examined by both computed tomography scanners it might get different results.

KEYWORDS: Computed tomography, x-ray, nasal cavity

INTRODUÇÃO

Os tomógrafos estão na sua quarta geração tecnológica e oferecem imagens de alta definição após sua reconstrução. Desde 1980 os tomógrafos helicoidais estão disponíveis, porém, a partir de 1998, a medicina faz uso de aparelhos de tomografia computadorizada espiral ou helicoidal *multislice*. Este último equipamento permite a obtenção de imagem de uma extensa área de tecido a partir de uma única exposição (Farfallini, 2003). O resultado desta tecnologia é o tempo consideravelmente reduzido de anestesia e exposição aos raios-X (Cavalcanti, 2008). Segundo Miraldi (2003) a

qualidade da imagem é superior em equipamentos de última geração como os tomógrafos helicoidais *multislice*.

RELATO DE CASO

Uma paciente da espécie canina, fêmea, Golden Retriever, 11 anos, foi submetida à tomografia computadorizada convencional para avaliação da cavidade nasal esquerda como exame pré-operatório de biópsia de tumor intranasal. Como o resultado não esclareceu os limites da lesão, foi necessário novo exame para obtenção de imagens passíveis de exploração pela equipe cirúrgica. Estas imagens foram obtidas por um equipamento helicoidal *multislice*. A riqueza de detalhes das imagens reconstruídas definiu a localização do acesso cirúrgico, o tamanho da incisão e as estruturas comprometidas.

DISCUSSÃO

A tomografia computadorizada é um componente importante do diagnóstico por imagem nos centros de referência de medicina veterinária e, segundo Tidwell (2007), também se faz necessário a atualização do equipamento e da equipe na mesma velocidade da renovação tecnológica, para que os resultados obtidos sejam valiosos. A insatisfação pelo exame em tomógrafo convencional pode, segundo Tidwell (2007), ter sido influenciada pelos fatores anteriormente citados. Price et al (2003) afirma que o advento da tomografia *multislice* facilita a interpretação dos planos anatômicos que podem ser obtidos no pré-operatório. A fidelidade das imagens estudadas no caso relatado sela a união da técnica operatória à modernidade da tecnologia médica (Lee et al., 2002).

CONCLUSÃO

A tomografia computadorizada helicoidal *multislice* permite reconstruir imagens fiéis, respeitando os planos anatômicos. A escolha do equipamento e a atualização do radiologista são primordiais no auxílio ao cirurgião e na segurança do paciente.

REFERENCIAS

PRICE, D.L., SHERRIS D.A., KERN, E.B. **Computed tomography for constructing custom nasal septal buttons.** Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003, 129(11):1236-9.

LEE, K.S., YANG C.C., HUANG J.K., et al. **Congenital pyriform aperture stenosis: surgery and evaluation with threedimensional computed tomography.** Laryngoscope. 2002, 112(5):918-21.

TIDWELL, A. S. **Principles of computed tomography and magnetic resonance imaging.** In: THRALL, D. E. Textbook of veterinary diagnostic radiology. 5. Ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2007. P. 50-56.

FARFALLINI, D. **Tomografia computadorizada.** In: PELLEGRINO, F.; SURANITI, A.; GARIBALDI, L. El libro de neurologia para La práctica clínica. Buenos Aires: Intermédica, 2003. p. 475-481.

MIRALDI, F.; SIMS, M. S.; WIESEN, E. J. Imaging principles in computed tomography. In: HAAGA, J. R.; LANZIERI, C. F.; GILKESON, R.C. **CT and MR imaging of the whole body.** 4. Ed. St. Louis: Mosby, 2003.

CAVALCANTI, M. G.; SALES, M. A. Tomografia computadorizada. In: CAVALCANTI, M. G. **Diagnóstico por imagem da face.** São Paulo. 2008. p. 3-43.

028. RECUPERAÇÃO FUNCIONAL DE CÃES PARAPLÉGICOS SEM PERCEPÇÃO DA DOR PROFUNDA SUBMETIDOS AO TRATAMENTO CIRÚRGICO: 15 CASOS

Rosmarini Passos dos Santos¹; Alexandre Mazzanti³; Diego Vilibaldo Beckmann¹;
Graciane Aiello¹; Bruna Marquardt²; Verônica Weber²

¹Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Centro de Ciências Rurais (CCR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

²Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária, CCR, UFSM.

³Professor Dr., Departamento de Clínica de Pequenos Animais, CCR, UFSM.

RESUMO

O objetivo deste estudo retrospectivo foi avaliar a recuperação funcional de cães paraplégicos sem percepção à dor profunda (PDP) com doença do disco intervertebral (DDIV) toracolombar submetido ao tratamento cirúrgico. Foi observada recuperação funcional satisfatória em 73,3% dos cães. Cinco cães recuperados apresentavam ausência da PDP entre 12 e 48 horas e seis acima de 48 horas. Conclui-se que cães paraplégicos sem PDP podem apresentar recuperação funcional satisfatória quando submetidos ao tratamento cirúrgico mesmo sem PDP com tempo superior a 48 horas.

PALAVRAS-CHAVES: Paraplegia, cirurgia, neurologia, dor, cão

FUNCTIONAL RECOVERY IN PARAPLEGIC DOGS WITHOUT DEEP PAIN PERCEPTION SUBMITTED TO SURGICAL TREATMENT: 15 CASES

ABSTRACT

This retrospective study was to evaluate the functional recovery of paraplegic dogs without deep pain perception (DPP) with intervertebral disc disease underwent surgical treatment. Satisfactory functional recovery was observed in 73.3%. The duration of the absence of the DPP before surgery in five dogs recovered was 12 to 48 hours, and six dogs, over 48 hours. It can be concluded that paraplegic dogs without DPP may have satisfactory functional recovery when submitted to surgical treatment even without deep pain perception with more than 48 hours.

KEYWORDS Paraplegia, surgery, neurology, pain, dogs

INTRODUÇÃO

A DDIV pode ocasionar compressão da medula espinhal (ME) e os sinais clínicos variam de hiperestesia espinhal a paraplegia com ausência da PDP, indicador confiável de prognóstico desfavorável. O tratamento cirúrgico é indicado aos pacientes com paraplegia com ou sem PDP e vários trabalhos mostram o seu resultado satisfatório em cães paraplégicos sem PDP. Porém, no Brasil poucos estudos são encontrados. Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar a recuperação funcional de cães paraplégicos sem PDP com DDIV toracolombar submetidos ao tratamento cirúrgico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram revisados os registros neurológicos de cães com DDIV toracolombar sem PDP, atendidos entre os anos de 2006 e 2011 no Hospital Veterinário Universitário (HVU) da Instituição. A ausência da PDP foi classificada em <12 horas, entre 12 e 48 horas e >48 horas. A suspeita clínica foi confirmada através da mielografia e todos os pacientes foram submetidos à técnica de hemilaminectomia para descompressão da ME associada à fenestração do disco intervertebral. A recuperação funcional foi classificada como satisfatória (RFS) para cães que recuperaram a habilidade de caminhar sem quedas em até seis meses do procedimento cirúrgico. O tempo de recuperação foi definido em < 15 dias, entre 15 e 30 dias e maior de 30 dias.

RESULTADOS

A RFS ocorreu em 73,3% (n=11) dos cães. A RFS ocorreu em um cão (9,1%) com menos que 15 dias, em sete (63,6%) entre 15 e 30 dias e, em sete (63,6%) acima de 30 dias. Dos onze cães que tiveram RFS, em cinco deles, a ausência da PDP foi entre 12 e 48 horas e, em seis, acima de 48 horas. Em três dos quatro cães que não apresentaram RFS a duração da perda da PDP ocorreu até 12 horas após o início da paraplegia. Todos os cães antes de recuperarem funcionalmente apresentaram o abano voluntário da cauda. Não foi constada recidiva do quadro.

DISCUSSÃO

O tempo para RFS varia na literatura e de acordo com Olby et al. (2003), o peso e a idade são fatores que influenciam na duração do tempo de retorno à deambulação. Kazakos et al. (2005) verificaram que o prognóstico é mais favorável para aqueles com perda progressiva da função motora. No nosso estudo os cães com ausência de PDP até 12 horas apresentaram pior prognóstico, o que pode ser justificado pelo início

rápido dos sinais clínicos associado à repentina extrusão do núcleo pulposo em direção à ME causando concussão medular. O abano voluntário da cauda nos cães com RFS precede o retorno à deambulação e pode indicar prognóstico favorável (Olby et al., 2003). Mais pesquisas sobre a eficiência do tratamento cirúrgico são necessárias, visto que, Santos et al. (2011) observaram RFS em 55% dos cães em grau V com perda da PDP superior a 48 horas não submetidos à cirurgia.

CONCLUSÃO

A RFS pode ocorrer nos cães submetidos ao tratamento cirúrgico mesmo sem percepção a dor profunda com tempo superior a 48 horas. Futuras pesquisas são necessárias para avaliar a eficiência do tratamento cirúrgico para DDIV, principalmente para aqueles que perderam a PDP acima de 48 horas.

REFERÊNCIAS

KAZAKOS, G.; POLIZOPOULOU, Z.S.; PATZICAS, M.N. et al. Duration and severity of clinical signs as prognostic indicators in 30 dogs with thoracolumbar disk disease after surgical decompression. **Journal of veterinary medicine. A Physiology, pathology, clinical medicine**, v. 52, p. 147-152, 2005.

OLBY, N.; LEVINE, J; HARRIS, T. et al. Long-term functional outcome of dogs with severe injuries of the thoracolumbar spinal cord: 87 cases (1996-2001). **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 222, p.762-769, 2003.

SANTOS, R.P.; MAZZANTI, A.; BECKMANN, D.V. et al. Recuperação funcional em cães com doença do disco intervertebral toracolombar sem percepção á dor profunda: 37 casos. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 31, p. 345-349, 2011.

029. SOLUÇÃO DE LARSSEN MODIFICADA EM CADÁVERES DE COELHOS

Deusdete Conceição Gomes Junior¹, João Moreira da Costa Neto², Joelma Jesus da Silva², Vinicius de Jesus Moraes², Diana Mello Teixeira², Carlos Roberto Daleck¹

¹ Universidade Estadual Paulista – veterinarioufba@yahoo.com.br

² Universidade Federal da Bahia

RESUMO

A utilização de métodos alternativos ao treinamento com animais é preponderante. Para isso cadáveres podem ser utilizados visando garantir a destreza do jovem cirurgião. Diversos métodos de conservação cadavérica vêm sendo testados ao longo do tempo. Avaliou-se a solução de Larssen modificada em seis cadáveres de coelhos, ao longo de setenta e cinco dias. Aspectos organolépticos permaneceram próximos ao animal vivo. A solução em questão é prática, de baixo custo e permite o treinamento de técnicas cirúrgicas para jovens cirurgiões.

PALAVRAS CHAVE: experimentação animal; cirurgia veterinária; ensino

ABSTRACT

The use of alternative methods to substitute live animals is an very important issue today. For that objective corpses can be employed to ensure the skills of the young surgeon. Various conservation methods have been tested for conservation of cadavers over time. Evaluated the modified Larssen solution in six corpses of rabbits over seventy-five days. Organoleptic aspects remained similar to live animals. The solution in question is practical, low cost and allows the training of surgical techniques for young surgeons.

KEYWORDS: animal experimentation, veterinary surgery, teaching

INTRODUÇÃO

A experiência obtida em treinamentos cadavéricos fornece adequada visão dos procedimentos cirúrgicos, possibilitando maior segurança quando diante da situação real (DINIZ, 2005). Segundo Silva (2003) a solução conservadora de Larssen modificada tem sido apontada como adequada na conservação de cadáveres caninos, visando treinamento em técnica cirúrgica. Este trabalho foi realizado propendendo avaliar em cadáveres de coelhos a técnica proposta por Silva (2003).

MATERIAL E MÉTODOS

Seis cadáveres de coelhos, pesando de 2,0-2,7Kg, foram utilizados no experimento. Para conservação cadavérica foi utilizada a solução de Larssen modificada, composta por 100 ml de formalina a 10%, 400 ml de glicerina líquida, 200 g de hidrato de cloral, 200 g de sulfato de sódio, 200 g de bicarbonato de sódio, 180 g de cloreto de sódio e 2000 ml de água destilada (solução padrão). A artéria carótida comum foi canulada e a veia jugular externa foi seccionada. Procedeu-se a lavagem do sistema com água destilada correspondente a 10% do peso vivo animal. Seguiu-se então a ligadura das extremidades seccionadas da veia jugular externa e infusão da solução padrão diluída em água destilada (1/3) correspondendo a 5% do peso vivo. Prosseguiu-se a ligadura da artéria carótida comum. Os animais foram identificados e congelados em freezer a -20°C.

Os cadáveres foram submetidos a cinco avaliações (7, 15, 30, 45 e 60 dias) quando foram tomadas observações a cerca da presença de odor, coloração, consistência e textura dos tecidos (órgãos abdominais e sistema musculoesquelético) relacionando-se o último a flexibilidade articular. Na primeira avaliação foi executada a celiotomia para observação dos órgãos abdominais, empregando-se para o fechamento da cavidade, a fixação de um zíper nas bordas da ferida cirúrgica visando possibilitar a avaliação dos órgãos nos tempos supracitados. Para avaliar as características organolépticas do tecido musculoesquelético foram realizadas diferentes abordagens aos ossos e articulações. As abordagens foram avaliadas no momento de sua realização e ao longo dos períodos subsequentes.

RESULTADOS

Durante os períodos de observação não foi notado presença de odor. Quanto a cor da musculatura das abordagens cirúrgicas todos os animais inicialmente apresentaram coloração rósea, contudo em dois animais ocorreu escurecimento a partir da quarta semana, e em dois, clareamento ao longo do período avaliado. A consistência e textura da musculatura e pele adjacente se mantiveram próximas as de um animal vivo ao longo das avaliações. As articulações mostraram-se flexíveis em todos os períodos avaliados. A pele da região abdominal e inguinal encontrava-se íntegra e com coloração clara na primeira avaliação, no entanto, a partir da quarta semana mostrou-se descamada em dois animais variando coloração pálida a cinza-esverdeada. A observação da cavidade abdominal revelou aumento de volume nos órgãos que compõem o intestino grosso, sobretudo o ceco, em quatro animais. A

musculatura da cavidade abdominal se comportou identicamente a das abordagens cirúrgicas.

DISCUSSÃO

Silva (2003) comenta que existem questionamentos sobre o efetivo aprendizado dos alunos quando utilizam peças anatômicas para o seu estudo, uma vez que elas não simulam a situação real quanto à consistência, cor, odor e sangramento tecidual, contudo a experiência obtida nesses modelos corroborou com Diniz (2005), uma vez que forneceu uma satisfatória execução das abordagens cirúrgicas, possibilitando maior segurança quando diante da situação real, já que os alunos puderam executar as manobras cirúrgicas repetidamente e consequentemente maximizar a capacitação cirúrgica intensificando o processo de aprendizagem.

CONCLUSÃO

Os métodos alternativos em aplicação necessitam ainda de avaliação mais abrangente, no entanto os autores não possuem dúvidas que o uso de cadáveres conservados em solução de Larssen modificada melhora a qualidade do ensino de técnicas cirúrgicas uma vez que o estudante não apresenta receio a execução do procedimento cirúrgico, podendo treinar intensamente.

REFERÊNCIAS

DINIZ R. Animais em Aulas Práticas: Podemos Substituí-los com a Mesma Qualidade de Ensino. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v.2, n.1, p.31-40, 2005.

SILVA R. M. G. **Avaliação do método de ensino da técnica cirúrgica utilizando cadáveres quimicamente reservados**. 2003. São Paulo, 127f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Curso de Pós-graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

030. USO DO BACLOFENO NA ESPASTICIDADE MUSCULAR DE ORIGEM NEUROLÓGICA EM CÃO: RELATO DE CASO

Benito Juarez Nunes Alves de Oliveira¹, Giselle Bonifácio Neves Mendonça¹,
Danilo Rodrigues Ferreira¹, Antônio Dionísio Feitosa Noronha Filho¹,
Sabrina Lucas Ribeiro de Freitas¹, Morgana Fontes Abreu¹

¹ Universidade Federal de Goiás - EV/UFG. benito@ortoneurovet.com

RESUMO

A vértebra transicional lombossacra é uma deformidade congênita em cães que pode levar a síndrome da cauda equina e, em determinados casos, está associada à espasticidade dos músculos dos membros pélvicos. Este relato descreve a presença de espasticidade muscular em um cão com vértebra transicional por compressão da cauda equina, sendo tratado mediante cirurgia, fisioterapia e uso do miorrelaxante baclofeno na dose de 2mg/kg. Com 26 dias de pós-operatório, o paciente já apresentava deambulação normal. Conclui-se que o baclofeno foi eficaz no miorrelaxamento, levando a uma evolução positiva dos sinais neurológicos e função locomotora.

PALAVRAS-CHAVE: miorrelaxante, vértebra transicional, cauda equina

USE OF BACLOFEN FOR MUSCLE SPASTICITY BY NEUROLOGIC SOURCE IN DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

The lumbosacral transitional vertebra is a congenital abnormality in dogs that can lead to cauda equina syndrome, and in some cases, is associated to muscle spasticity of pelvic limbs. This report show the muscle spasticity in a dog with transitional vertebrae occurred by cauda equina compression, and treated by surgery, physiotherapy and baclofen at a dose of 2mg/kg. Twenty-six days after surgery, the patient already had normal ambulation. Concludes that the use of baclofen was effective for muscle relaxation, leading to a positive evolution of neurologic signs and locomotive function.

KEYWORDS: muscle relaxant, transitional vertebra, cauda equina

INTRODUÇÃO

A vertebra transicional lombossacra é uma deformidade congênita que ocorre entre a última vértebra lombar e a primeira sacral, onde geralmente estão presentes

alterações morfológicas dos processos transversos e dos corpos vertebrais (Morgan, 1999). Essas alterações levam a síndrome da cauda equina, as quais estão diretamente relacionadas à vertebra transicional (Flückiger et al., 2006). O baclofeno é um relaxante muscular esquelético de ação central, utilizado no controle da espasticidade e da dor em pacientes com múltiplas escleroses e desordens espinhais, como a cauda equina (Wisner, 2004). Este relato descreve o caso de um cão apresentando espasticidade dos músculos dos membros pélvicos, decorrente de uma síndrome da cauda equina, tratado por intervenção cirúrgica, fisioterapia e miorrelaxante baclofeno.

RELATO DE CASO

Foi atendido um cão macho, SRD, quatro anos, com paresia não ambulatoria e espasticidade dos músculos dos membros pélvicos, apresentando uma posição incomum de hiperextensão dos membros e apoio do abdome ao solo. Os exames radiográficos revelaram a presença de vértebra transicional lombossacra, ou seja, sacralização da sétima vértebra lombar com obstrução dos forames intervertebrais. O paciente foi submetido à cirurgia de laminectomia dorsal para descompressão dos nervos da cauda equina, sendo observado estenose do canal medular na região lombossacra. No pós-operatório imediato, o animal foi encaminhado para sessões de fisioterapia e foi fornecido baclofeno na dose de 2mg/kg, duas vezes ao dia por 10 dias, sendo a dose reduzida para 1mg/kg durante cinco dias.

DISCUSSÃO

Além dos efeitos de miorrelaxamento, o baclofeno é ansiolítico e diminui a atividade do músculo detrusor da bexiga e do esfíncter uretral externo, atuando no controle da micção. É a primeira opção no tratamento medicamentoso sistêmico da espasticidade, porém não apresenta efeitos sobre a hiperreflexia, clônus ou sobre a deambulação diária (Gracies et al., 2002). No caso relatado, observamos que o uso do miorrelaxante auxiliou nas sessões de fisioterapia pela melhoria na amplitude dos movimentos, bem como foi eficaz na eliminação de urina. Quagliato et al., (2006) cita que os principais efeitos colaterais do baclofeno são depressão do SNC, náuseas, vertigens, confusão mental e depressão respiratória, porém com menores reações quando comparado ao diazepam ou o dantrolene. No paciente em questão, não foram observadas reações adversas pelo uso do baclofeno. O relaxamento parcial e total dos músculos do quadríceps, semitendinoso, semimembranoso e gastrocnêmio foram

constatados aos sete e 12 dias de pós-operatório, respectivamente, e a deambulação normal atingida aos 26 dias.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a espasticidade muscular e a retenção urinária decorrentes de lesão neurológica da medula espinhal, podem ser controladas com o uso do baclofeno. Ainda, além de causar poucos efeitos colaterais, favorece a realização da fisioterapia pós-operatória e o retorno da atividade muscular.

REFERÊNCIAS

- FLÜCKIGER, M.A.; DAMUR-DJURIC, N.; HÄSSIG, M. et al. A lumbosacral transitional vertebra in the dog predisposes to cauda equina syndrome. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, v.47, n.1, p.39-44, 2006.
- GRACIES, J.M.; ELOVIC, E.; MCGUIRE, J.R. et al. Traditional pharmacologic treatments for spasticity part II: systemic treatments. In: MAYER, N.H.; SIMPSON, D.N. **Spasticity: we move self-study activity**. p.65-93, 2002.
- MORGAN, J.P. Transitional lumbosacral vertebral anomaly in the dog: a radiographic study. **Journal of Small Animal Practice**, v.40, p.167-172, 1999.
- WISMER, T. Baclofen overdose in dogs. **Veterinary Medicine**, p.406-408, 2004.
- QUAGLIATO, E.; BANG, G.; BOTELHO, L.A. et al. Espasticidade: tratamento medicamentoso. **Projeto Diretrizes: Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina**, 2006. 17p.

031. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ASSOCIADO Á HEMOPARASITOSE EM CÃO: RELATO DE CASO

Rodrigo P. Franco¹; Renan Médico Silva¹; Carolina Hagy Giroto¹; Carla R. Massufaro¹;
Alessandre Hataka¹; Fábio Fernando Ribeiro Manhoso¹

¹ Universidade de Marília-UNIMAR-vetrpf@yahoo.com.br

RESUMO

A hemoparasitose pode ser causada em associação da *Ehrlichia* e *Basesia canis* sp., levando a ocorrência de sinais clínicos graves com risco de óbito para o animal portador. Um canino, macho, SRD, seis anos, 26kg de peso, foi atendido com histórico de hemoparasitose crônica e apresentando ao exame físico sinais clínicos neurológico de origem central com evolução clínica aguda e epistaxe. O diagnóstico definitivo da hemoparasitose foi confirmado por meio da reação em cadeia de polimerase (PCR), iniciando a terapia clínica mais adequada para o controle e remissão dos sinais clínicos. Entretanto, o proprietário optou pela eutanásia com o animal encaminhado para necropsia, que evidenciou um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH) em região de tronco cerebral e cerebelo. Com isso, o presente trabalho buscou relatar e descrever as alterações clínicas da ocorrência do AVCH em um cão portador de *Ehrlichia* e *Basesia canis*.

PALAVRAS-CHAVE: hemoparasitose, hemorragia, cerebral, canino

STROKE ASSOCIATED WITH THE DOG IN HEMOPARASITOSE: CASE REPORT

ABSTRACT

The hemoparasitose can be caused in association of bases *Ehrlichia* and *Basesia canis* sp. Leading to occurrence of severe clinical signs with risk of death for the animal carrier. A dog, male, SRD, six years, weight 26kg, was admitted with a history of chronic hemoparasitose physical examination and presenting clinical signs of central neurological with acute clinical and epistaxis. The definitive diagnosis of hemoparasitose was confirmed by polymerase chain reaction (PCR), initiating the most appropriate medical therapy to control and remission of clinical signs. However, the owner opted for euthanasia with the animal sent for autopsy, which showed a hemorrhagic stroke (AVCH) in the region of the brainstem and cerebellum. Therefore, this article aims to report and describe the clinical AVCH in a dog carrier of *Ehrlichia* e *Basesia canis* sp.

KEYWORDS: hemoparasitose, hemorrhage, brain, canine

INTRODUÇÃO

A hemoparasitose canina são doenças infecciosas, transmitida pelo carrapato *Rhipicephalus sanguineus* portador da *Ehrlichia* e *Babesia canis sp.* (Gieg, et al., 2009). O diagnóstico definitivo é confirmado por meio das alterações clínicas-patológicas e exames complementares, com o (PCR) (Nakaghi et al. 2008). As hemorragias, sinal clínico característico, pode ser observada na fase aguda ou crônica da afecção devido a combinação da trombocitopenia, vasculite e consumo dos fatores de coagulação (Nelson et al. 2010). Quando ocorrida em estruturas ao redor do sistema nervoso central (SNC) denomina-se de acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH), com a formação de um hematoma, aumento da pressão intracraniana, hipóxia e morte celular (Correia 2009). Com isso, o presente trabalho buscou relatar e descrever as alterações clínicas e patológicas de um AVCH em um cão portador de *Ehrlichia* e *Babesia canis sp.*

RELATO DE CASO:

Foi atendido um cão, macho, SRD, seis anos de idade, 26kg de peso, apresentando anorexia, epistaxe, emagrecimento progressivo e episódios convulsivos a dois dias. Ao exame físico observou-se grau de desidratação a 5%, mucosas hipocoradas, presença de carrapatos, nistagmo horizontal e midríase bilateral pouco responsiva a luz, episódios convulsivos, posição de opistótomos em decúbito lateral e movimentos rotativos da cabeça em decúbito externo; suspeitando-se do comprometimento neurológico devido uma hemoparasitose. O hemograma evidenciou anemia normocítica normocrômica, trombocitopenia severa, soro icterico, hiperproteinemia e discreto desvio à esquerda regenerativo. Já os bioquímicos séricos renais, hepáticos e glicemia demonstraram valores normais, com o lactato aumentado.

Com o exame de PCR confirmando a infecção concomitante por *Ehrlichia sp.* e *Babesia sp.* O tratamento inicial consistiu-se na reposição volêmica a base de ringer com lactato endovenoso (EV), diazepam (2mg/kg-EV) e fenobarbital (3mg/kg) intramusculares, doxiciclina (7,5mg/kg-) e piracetam (10mg/kg) subcutâneo (SC), dexametasona (1mg/kg), omeprazol (0,5mg/kg) e manitol (1g/kg) EV e um babesicida (Diminazeno - 3,5 mg/kg- SC). Após três dias de terapia intensiva e prognóstico desfavorável, o proprietário optou pela eutanásia, com o mesmo encaminhado para necropsia que revelou a presença de um coágulo em região do tronco encefálico e cerebelo, confirmando a ocorrência de um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCH).(Figura 1).

Figura 1: Cérebro de um cão, macho, SRD, evidenciando coágulo sanguíneo em região do tronco encefálico e pétéquias generalizadas caracterizando o AVCH por *Ehrlichia* e *Babesia canis sp.*

DISCUSSÃO

Com os dados obtidos na avaliação clínica e com a realização do PCR pode-se confirmar o diagnóstico definitivo do animal, como referido por Gieg et. al. (2009) e Nakaghi et al. (2008), quando estudaram cães portadores de erliquiose canina. Entretanto, os sinais clínicos neurológicos que indicam o comprometimento do SNC com evolução aguda e irresponsiva a terapia, foi confirmado por meio da necropsia com a evidência macroscópica de um AVCH em tronco encefálico e cerebelo, justificando os sinais clínicos apresentados (Correia, 2009). Com o quadro severo de trombocitopenia associada a vasculite, e por tratar-se de um caso crônico, hemorragias podem ocorrer do organismo, justificando a ocorrência de um AVCH agudo (Nelson et al 2010); com posterior confirmação na necropsia do animal.

CONCLUSÃO

Posteriormente a avaliação dos dados pode-se concluir que o AVCH foi secundário a associação das hemoparasitoses *Ehrlichia sp.* e *Babesia SP.*

REFERÊNCIAS

- CORREIA, D.J.D; AVC Hemorrágico: Relação entre a mortalidade precoce e o volume inicial de hemorragia e edema, 2009. Covilhã, 34f. Dissertação – Mestrado Integrado em Medicina, Universidade da Beira Interior.
- GIEG, J. et al. Diagnosis of *Ehrlichia ewingii* infection by PCR in a puppy from Ohio. **Veterinary Clinical Pathology**, v. 38, n.3, p. 406-410, Set., 2009.
- NAKAGHI, A. C. H. et al. Canine ehrlichiosis: clinical, hematological, serological and molecular aspects. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.38, n.3, p. 766-770, Mai./Jun., 2008.
- NELSON, R. W. et al. Doenças Riquetsiais Polissistêmicas. In NELSON, R. W.; COUTO, C. G. **Medicina interna de pequenos animais**. 4. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 96, p.1325-1328.

032. ANASARCA ASSOCIADA À VASCULITE CAUSADA POR ERLIQUIOSE CANINA- RELATO DE CASO

Daniel Diola Bento¹, Fernanda Chicaro Chacar¹, Vanesa Kutz de Arruda¹, Tácia Tavares de Aquinas², Luiz Henrique Araújo Machado³, Priscylla Tatiana Chalfun Guimarães³

¹ Residente do Depto Clínica Veterinária –FMVZ-UNESP, Botucatu

² Aluna de Iniciação Científica/FAPESP – FMVZ-UNESP, Botucatu

³ Prof.Ass.Dr. – Depto Clínica Veterinária-UNESP, Botucatu –tatiana@fmvz.unesp.br

RESUMO

Anasarca é o edema subcutâneo generalizado, que é provocado pela alteração das pressões que controlam o movimento dos fluidos orgânicos. O presente relato descreve o caso de um cão, sem raça definida, com sinais clínicos de prostração, anorexia e anasarca. Os exames complementares revelaram infecção por *Ehrlichia canis*, na ausência de hipertensão, hipoalbuminemia grave ou síndrome nefrótica, sendo a causa do edema generalizado atribuída à vasculite.

PALAVRAS-CHAVE: edema, cão, *Ehrlichia canis*

ANASARCA ASSOCIATED TO VASCULITE CAUSED BY CANINE ERLICHIOSE: A CASE REPORT

ABSTRACT

Anasarca is the generalized subcutaneous edema caused by the alteration of the physiologic forces that controlled the movement of the fluids. This report describes a case of a dog, mixed breed, with history of apathy, anorexia and edema. Selection examinations revealed *Ehrlichia canis* infection, in absence of arterial hypertension, severe hypoalbuminemia or nephritic syndrome, been attributed to vasculite as the cause of the generalized edema.

KEYWORDS: Edema, dog, *Ehrlichia canis*

INTRODUÇÃO

Edema é a coleção anormal de líquido no espaço intersticial (COELHO,2004). É ocasionado pela alteração nas pressões que controlam o movimento dos fluidos no leito capilar (STARLING, 1896;HERNDON, 2010). A erliquiose monocítica canina, transmitida pelo carrapato *Rhipicephalus sanguineus*, é causada por bactérias do gênero *Ehrlichia* (GREENE, 2006). Dentre as manifestações clínicas distintas em cada

fase (aguda, subclínica e crônica) da enfermidade, edemas intersticiais ou alveolares, decorrentes da vasculite e hemorragia pulmonar, ou síndrome nefrótica, associada à deposição de imunocomplexos, podem ser observados (NELSON e COUTO, 2010). O edema subcutâneo generalizado é pouco observado na clínica de pequenos animais em decorrência de vasculite, assim, o presente trabalho tem como objetivo descrever um caso de anasarca em decorrência do aumento da permeabilidade vascular em cão acometido por erliquiose.

RELATO DE CASO

Um cão, fêmea, sem raça definida, de três anos de idade foi atendido com histórico de prostração e anorexia há 30 dias, além de oligúria, anasarca e decúbito lateral com evolução de sete dias. Ao exame físico, foram detectadas palidez de mucosas, anasarca, hipertermia (39,9°C) e ixodidiose. O paciente não apresentava alterações à auscultação cardiopulmonar, além de pressão arterial sistêmica normal.

Nos exames complementares foram observados, pancitopenia (500 leucócitos/ μ L, 22.000 plaquetas/ μ L e 22% de volume globular), além de hipoproteïnemia (4,8 g/dL) com hipoalbuminemia (2,2 g/dL). As demais análises bioquímicas se encontravam dentro dos valores de referência (KANEKO, 1997). A urinálise demonstrou densidade urinária de 1.042, proteinúria acentuada e sangue oculto. O exame da reação em cadeia polimerase (PCR) demonstrou positividade para *Erlichia canis*. Foi instituído tratamento ambulatorial com furosemida (2 mg/kg; SID) e após estabilização de débito urinário adequado, infusão de manitol (500 mg/kg), dipropionato de imidocarb, (5 mg/kg) precedido de atropina (0,033 mg/kg) além de doxiciclina (15 mg/kg) e hidrocortisona (10 mg/kg) Prescreveu-se dipirona (25 mg/kg a cada 12 horas) A anorexia e o decúbito foram revertidos após 24 horas do início da terapia observando-se melhora progressiva do edema subcutâneo.

DISCUSSÃO

A diminuição da pressão oncótica, aumento da pressão hidrostática, redução da drenagem linfática, aumento da permeabilidade vascular ou a combinação desses fatores são responsáveis pela geração de edema localizado, cavitário ou generalizado (ETTINGER e BARRETT, 1995). O aumento da pressão hidrostática, traduzido como anormalidades cardiovasculares e aumento da pressão arterial sistólica, assim como a redução na drenagem linfática devido compressão neoplásica intracavitária, não foram observados no presente relato. A proteinúria, na presença de sangue oculto sem hemácias no sedimento, foi de origem pré-renal, uma vez que hemólise imunomediada

ou coinfeção com *Babesia canis* possa ocorrer em alguns casos de erliquiose. A hipoalbuminemia discreta, provocada pela anorexia prolongada ou por perdas para o terceiro espaço, não justifica o quadro de anasarca, mas pode ter colaborado para sua instalação. Assim, a causa da anasarca foi atribuída principalmente ao aumento da permeabilidade vascular desencadeada pela vasculite da infecção por *Ehrlichia canis*.

CONCLUSÃO

O aumento da permeabilidade vascular decorrente de um processo infeccioso pode, apesar de raramente observado na rotina de pequenos animais, desencadear um quadro de anasarca, devendo, por tanto, ser levado em consideração em casos de edema subcutâneo generalizado.

REFERÊNCIAS

- COELHO, E.B. Mecanismos de formação de edemas. **Simpósio de Semiologia**, Ribeirão Preto, v. 37, p.189-198, 2004
- ETTINGER, S.T.; BARRETT, K.A. Ascites, peritonitis, and other causes of abdominal distention. In: Ettinger, S.T.; Feldman, E.C. (Ed.4). **Textbook of Veterinary Internal Medicine**, Philadelphia: Saunders, 1995, p.64
- GREENE, C. E. **Infectious diseases of the dog and cat**. Philadelphia: Elsevier, 2006. 1387 p.
- HERNDON, W.E. Edema. In: Ettinger, S.T.; Feldman, E.C. (Ed.7). **Textbook of Veterinary Internal Medicine**, Philadelphia: Saunders, 2010, cap.24, p.110-112
- KANEKO, J.J. Lipids and ketones. In: Clinical biochemistry of domestic animals. 5.ed. San Diego: Academic, 1997. p.83-115.
- NELSON, R.W.; COUTO, C.G. **Medicina interna de pequenos animais**, 4ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1504 p.
- STARLING, EH. Physiologic forces involved in the causation of dropsy. **Lancet**, v. 1, p. 1267-1270, 1896.

033. ARTERITE PROLIFERATIVA DO FILTRO NASAL EM UM CÃO

RELATO DE CASO

Luciano Jose Eigio Isaka¹; Thais de Almeida Knopf¹; Luiz Andre Sorbello¹; Mayron Tobias da Luz¹; Juliane Possebom¹; Marconi Rodrigues de Faria²

1. Médico veterinário residente UHAC-PUCPR,
2. Docente do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

RESUMO

A arterite proliferativa do filtro nasal é uma doença rara de origem vascular que acomete exclusivamente o filtro nasal de cães. O objetivo deste trabalho é descrever um RELATO DE CASO da doença em um cão da raça Cocker. Foi atendido no UHAC-PUCPR, São José dos Pinhais, PR, um cão da raça Cocker, macho, de idade desconhecida com histórico de apresentar lesões úlcero-crostosas, hiperqueratóticas, com secreção purulenta atingindo o filtro nasal e evolução de aproximadamente um ano. O diagnóstico definitivo se deu através do exame histopatológico do filtro nasal do cão. Foi observado infiltrado inflamatório com presença de êmbolos de fibrina nas arteríolas profundas da derme. O tratamento esta sendo realizado há uma semana com prednisona.

PALAVRAS-CHAVE: Vasculite, filtro nasal, arterite.

DERMAL ARTERITIS OF THE NASAL PHILTRUM IN A DOG: A CASE REPORT

ABSTRACT

The nasal filter proliferative arteritis is a rare disease of vascular origin that affects only the nasal filter of dogs. The propose of this paper is to describe a case of the disease in a dog's breed Cocker. Was seen at UHAC-LST, Pinhais, PR, a dog breed Cocker male of unknown age with a history of ulcerative, crusted, hyperkeratotic lesion at nasal filter. The evolution of condition was approximately one year. The definitive diagnosis was made by histopathological examination of the nasal filter of the dog. Inflammatory infiltrate was observed in the presence of fibrin emboli in the arterioles of the deep dermis. The treatment is being held a week ago with prednisone.

KEYWORDS: Vasculitis, nasal filter, arteritis

INTRODUÇÃO

A arterite proliferativa do plano nasal é uma afecção vascular rara que acomete exclusivamente o filtro nasal de cães, sendo descrita em apenas sete cães no mundo (Torres et.al.2002, Gross et.al.2005).

A doença é caracterizada por uma lesão circunscrita, não prurítica, indolor e de aspecto úlcero-crostoso e hemorrágico afetando exclusivamente o filtro nasal. O diagnóstico da doença é baseado nos sinais clínicos e no exame histopatológico da lesão. As lesões são caracterizadas pela proliferação de células fusiformes nas artérias e arteríolas profundas da derme subjacentes a úlcera, o que leva a estenose arterial e ao aparecimento das úlceras.

O tratamento é baseado em drogas imunossupressoras (Torres et.al.2002) à longo prazo, ou cirúrgico através da ressecção e reconstrução do filtro nasal (Pratschke e Hill, 2009). Em todos os trabalhos publicados a interrupção do tratamento resultou no reaparecimento dos sinais clínicos.

O objetivo desse trabalho é descrever um relato de arterite proliferativa do filtro nasal em um cão da raça Cocker.

RELATO DE CASO

Foi atendido na UHAC-PUCPR um cão da raça Cocker, macho, adulto com histórico de lesões úlcero-crostosas e hiperqueratóticas em filtro nasal, com evolução de aproximadamente dois anos. O animal apresentava leve dispnéia inspiratória e sangramento recorrente pelo filtro nasal, sem prurido ou dor local. O exame histopatológico revelou espessamento da parede, presença de êmbolos e proliferação linfocítica e neutrofílica nas arteríolas profundas da derme. Através do exame histopatológico e dos sinais clínicos, o diagnóstico foi fechado como arterite proliferativa do filtro nasal. Como tratamento, foi utilizado prednisona na dose de 1.1mg/kg SID por 15 dias como o proposto por TORRES Et. Al. 2001. Com 6 meses de tratamento, houve melhora significativa, não havia mais sangramento e a hiperqueratose haviam desaparecido.

DISCUSSÃO

A única doença que afeta exclusivamente o filtro nasal é a arterite proliferativa do filtro nasal (Torres et.al. 2002).

A doença se manifesta na idade adulta, como no caso descrito. As lesões são caracterizadas por úlceras hiperqueratóticas e descamativas localizadas no filtro nasal. As alterações histopatológicas consistem de inflamação das arteríolas da derme do

filtro nasal, com deposição de matriz extracelular, o que causa a estenose do vaso. Com a progressão da doença, a estenose leva à isquemia, ulceração e necrose do tecido (Torres et.al.2002).

Poucos métodos terapêuticos foram desenvolvidos para a afecção. Torres et.al. utilizou tratamentos a base de prednisona, niacinamida, tetraciclina e óleo de peixe e obteve sucesso. A terapia com prednisona na dose de 1.1mg/kg foi efetiva havendo melhora considerável nas lesões e sinais clínicos.

CONCLUSÃO

Com esse trabalho podemos concluir que a arterite proliferativa do filtro nasal é a única doença que acomete exclusivamente o filtro nasal e responde bem a terapia imunossupressora.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

TORRES, S.M.F.; BRIEN, T.O.; SCOTT, D.W. Dermal arteritis of the nasal philtrum in a Giant Schnauzer and three Saint Bernard dogs. *Veterinary Dermatology*. v.1, p. 275-281, 2002.

PRATSCHKE, K.M.; HILL, P.B. Dermal arteritis of the nasal philtrum: surgery as an alternative to long-term medical therapy in two dogs. *Journal of Small Animal Practice*. v.50, p. 99–103, 2009.

GROSS, T.L.; IHRKE, P.J.; WALDER, E.J.; AFFOLTER, V.K. *Skin diseases of the dog and cat – clinical and histopathologic diagnosis*. 2. ed. Oxford: Blackwell Science, chap 10, p.255-56, 2005.

034. AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS CARDIORRESPIRATÓRIOS EM CÃES OBESOS

Lidia Silva de Oliveira¹; Jamille Marques Nascimento Barros², Emanuelle de Almeida Gomes³; Anne Schirley Dias Chagas³; Stella Maria Barrouin Melo⁴

1. Doutoranda em Ciência Animal nos Trópicos-UFBA, 2. Médica Veterinária Autônoma, 3. Graduanda em medicina veterinária-UFBA, 4. Profa. Adjunta-UFBA

RESUMO

O objetivo desse estudo foi avaliar os parâmetros cardiorrespiratórios em cães obesos. Foram analisados 25 cães obesos, através de exames eletrocardiográficos, ecocardiográficos e através de teste de esforço. Os sinais clínicos mais encontrados nestes animais foram tosse e cansaço. Foi observada taquicardia em 8% (2/25) dos animais, sinais de hipertensão pulmonar em 1/25 (8%) cão e hipertrofia ventricular em 1/25 (4%) cão. O teste de esforço demonstrou que 2/25 cães apresentaram desempenho reduzido, com interrupção do teste previamente, devido apresentação de sinais de disfunção respiratória. Tais achados indicam que a obesidade pode estar relacionada a disfunção cardiorrespiratória em cães.

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade, avaliação cardiorrespiratória, teste de esforço

EVALUATION OF CARDIORESPIRATORY PARAMETERS OF OBESS DOGS

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the cardiorespiratory parameters in obese dogs. It was analyzed 25 obese dogs, by electrocardiographic, echocardiographic exams and through treadmill. The clinical signs most commonly found in these animals were coughing and fatigue. It was observed tachycardia in 8% (2 / 25) of animals, signs of pulmonary hypertension in 1 / 25 (8%) dog and ventricular hypertrophy in 1 / 25 (4%) dog. The evaluation by treadmill showed that 2 / 25 dogs had reduced performance by interruption of the testin advance because of presentation of signs of respiratory dysfunction. These findings indicate that obesity may be related to cardiac dysfunction in dogs.

KEYWORDS: obesity, cardiorespiratory evaluation, treadmill

INTRODUÇÃO

A obesidade é o acúmulo excessivo de tecido adiposo corpóreo resultante de um desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto de energia (Jericó, Albinati & Fusco, 2009). Considerada um problema crescente na população canina, há indícios de que a

obesidade possa causar disfunção cardiorrespiratória e agravar quadros de doenças respiratórias tais como colapso de traquéia e paralisia de laringe (Bach, 2007; Zoran, 2010). Em cães a relação entre obesidade e alterações cardíacas ainda não é bem estabelecida. Nesse contexto, o objetivo ao realizar esse estudo foi avaliar parâmetros cardiorrespiratórios de cães obesos.

MATERIAL E MÉTODOS

Nesse estudo foram avaliados 25 cães, com peso corporal entre 4 a 57Kg. Foi realizado anamnese e exame físico a fim de investigar a apresentação de sinais clínicos cardiorrespiratórios. A eletrocardiografia e ecocardiografia foram realizadas em 21 e 25 animais, respectivamente, e o teste de esforço em esteira ergométrica foi realizado nos animais sem cardiopatia importante e doença ortopédica. A eletrocardiografia computadorizada foi realizada conforme Tilley (1992), a ecocardiografia de acordo com Boon (1998) e o teste de esforço em esteira ergométrica conforme Ferasin e Marcora, 2007.

RESULTADOS

Foram incluídos 25 cães obesos, com escore corporal entre 8 e 9, segundo Laflamme (1997), e peso entre 4 a 57Kg (média 14,3Kg), de diferentes raças. Foram observados sinais de cansaço, cianose, dispnéia ou tosse em 64% (16/25) dos cães. Apresentavam cardiopatia 24% (6/25) dos animais, sendo cinco insuficiências valvar e um cardiomiopatia dilatada. Verificou-se ritmo sinusal em 7/21 (33,3%), arritmia sinusal em 12/21 (57,1%) e taquicardia sinusal em dois (9,5%). Sinais de hipertensão pulmonar foram encontrados em um cão e hipertrofia ventricular esquerda foi observada em outro. O teste de esforço em foi realizado em sete animais obesos e sem doença cardíaca, destes dois interromperam o teste devido sinais de cansaço. Dois animais obesos e sem doença cardíaca não foram submetidos ao teste de esforço por apresentar cianose e desconforto respiratório apenas à manipulação e realização dos exames anteriores.

DISCUSSÃO

Foi observado maior frequência de obesidade em fêmeas, corroborando os achados por Jericó (2009). A amostra foi composta principalmente por cães de pequeno porte, (24/25) 96%, provavelmente pela maior socialização destes em relação aos de grande porte (Jericó e Scheffer, 2002). A tosse foi o sintoma clínico mais freqüente, seguido pelo cansaço fácil. Apenas 24% (6/25) dos animais apresentavam

doença cardíaca, 3 destes não apresentavam remodelamento cardíaco, mas apresentavam tosse e cansaço fácil. Tal condição respiratória pode ser um agravante na progressão da doença cardíaca. As disfunções respiratórias em cães obesos são pouco estudadas, porém a ocorrência de disfunção expiratória foi demonstrada (Bach et al.,2007). A taquicardia sinusal pode ter ocorrido devido estresse secundário ao desconforto respiratório. Em cães, a espessura das parede ventricular estão relacionadas com o peso corporal (Pereira Neto, 2010). Um cão apresentou hipertrofia ventricular provavelmente relacionada a obesidade. A apresentação de intolerância ao exercício em teste de esforço foi um achado que corroborou os descritos em estudos com humanos (Ulsefer, Magalhães & Santos, 2010).

CONCLUSÃO

Cães obesos apresentam alterações cardiorrespiratórias e sinais de desconforto respiratório em graus variados que podem diminuir a capacidade de realização de esforço. Houve indícios de que a obesidade ocasionou a hipertrofia ventricular em um cão. Novos estudos devem ser conduzidos no intuito de estabelecer o real papel da obesidade nas alterações cardíacas.

REFERENCIAS

BACH, J. F.; ROZANSKI, E. A.; BEDENICE, D.; CHAN, D. L.; FREEMAN, L. M.; LOFGREN, J. L. S.; OURA, T. J.; HOFFMAN, A. M. Association of expiratory airway dysfunction with marked obesity in healthy adult dogs. *American Journal Veterinary Research*, v. 68, n. 6, p. 670–675, 2007.

FERASIN, L., MARCORA, S. A Pilot Study to Assess the Feasibility of a Submaximal Exercise test to measure individual response to cardiac medication in dogs with acquired heart failure. *Veterinary Research Communications*, v. 31, p. 725-737, 2007.

JERICÓ, M. M.; SCHEFFER, K. C. Aspectos epidemiológicos dos cães obesos na cidade de São Paulo. *Clínica Veterinária*, v. 7, n. 37, p. 25-29, 2002.

JERICÓ, M.M.; ALBINATI, J. M.; FUSCO, F.B.; Estudo sobre os hábitos alimentares e as atividades físicas de cães obesos da cidade de São Paulo e seus reflexos no balanço metabólico. *Clínica Veterinária*, n.81, p. 54-60, 2009.

035. CISTITE ENFISEMATOSA EM TRÊS CÃES SCHNAUZERES NÃO DIABÉTICOS

Jakeline Paola Zanon¹; Lucas Alécio Gomes²; Fernando Felipe de Carvalho³;
Bianca Gonçalves Trevisan⁴; Ricardo Pantaleão⁵; Gisele Simões Pires⁶

¹Médica Veterinária, Setor de Nefrologia Hospital Veterinário Rebouças – EVER

²Prof. Dr. Clínica Médica de Animais de Companhia, Departamento de Clínicas Veterinárias, Universidade Estadual de Londrina

³Médico Veterinário, Setor de Nefrologia Hospital Veterinário Rebouças – EVER. Mestrando

⁴Médica Veterinária, Setor de Ultrassonografia Hospital Veterinário Rebouças

⁵Médico Veterinário autônomo

⁶Médica Veterinária, Setor de Patologia Clínica – Mello e Macedo Análises Clínicas Veterinárias

RESUMO

Cistite enfisematosa usualmente é relatada em animais portadores de diabetes mellitus e glicosúria renal primária, sendo incomum em pacientes não diabéticos e imunocompetentes. Na ausência de glicosúria tal problema está associado à infecção crônica de trato urinário, presença de divertículo vesical ou administração crônica de corticóides, além de obstrução do trato urinário. Objetiva-se com o presente trabalho relatar três casos de cães não diabéticos com cistite enfisematosa (achado incomum).

PALAVRAS-CHAVES: cães, schnauzer, cistite enfisematosa, glicosúria

EMPHYSEMATOUS CYSTITIS IN THREE NONDIABETIC SCHNAUZER DOGS

ABSTRACT

Emphysematous cystitis usually has been reported in animals with diabetes mellitus and renal glycosuria primary, but it is uncommon in immunocompetent and nondiabetic patients. Such problem is associated with chronic urinary tract infection, presence of diverticulum in the bladder or chronic administration of corticosteroids, and urinary tract obstruction. The aim of this study is to report three cases of dogs with nondiabetic emphysematous cystitis.

KEYWORDS: dogs, schnauzer, emphysematous cystitis, glycosuria

INTRODUÇÃO

Cistite enfisematosa é usualmente relatada em animais portadores de diabetes mellitus e glicosúria renal primária, sendo incomum em pacientes não diabéticos e imunocompetentes. Em cães sem glicosúria, seu desenvolvimento está associado à infecção crônica de trato urinário, presença de divertículo em trígono vesical ou

administração crônica de corticóides, além de obstrução do trato urinário em qualquer grau ou causa. Microorganismos associados a essa condição incluem *E. coli*, *A. aerogenes*, *Proteus ssp* e *Clostridium sp* (Aizenberg et al., 2003; Kelesidis et al. 2009; Petite et al., 2005; Quint et al, 1992), entretanto, o agente mais comum nesses casos é a *E. coli*, nesse caso utilizando a albumina ao invés da glicose. O diagnóstico é feito através de exame radiográfico, ultrassonografia ou tomografia computadorizada. O tratamento geralmente é clínico, utilizando-se antibióticos com base nos resultados de cultivo e antibiograma (Aizenberg et al., 2003; Kelesidis et al., 2009).

RELATO DE CASO

Relatam-se três casos de cistite enfisematosa em cães não diabéticos, todos da raça Schnauzer, média de 6 anos de idade, sendo duas fêmeas e um macho, que foram atendidos no Hospital Veterinário Rebouças (São Paulo, Brasil), com histórico de urolíase e infecção crônica de trato urinário. A queixa era de hematúria e disúria. Em todos os cães realizou-se ultrassonografia abdominal, identificando presença de gás intramural (compatível com cistite enfisematosa) e urólitos. Assim sendo, colheu-se urina por cistocentese e enviaram-se as amostras para urinálise, cultivo e antibiograma. Os resultados foram: presença de hemácias, leucócitos, bactérias (sinais de infecção) e ausência de glicose. O cultivo revelou crescimento da bactéria *Escherichia coli*, sensível a maioria dos antibióticos testados, especialmente à amoxicilina com clavulanato. Hemograma e testes bioquímicos estavam normais. Os cães foram tratados com base nos resultados do cultivo e antibiograma.

DISCUSSÃO

Cistite enfisematosa é doença que usualmente acomete cães com glicosúria. Geralmente este problema ocorre em animais diabéticos devido à glicosúria e alteração na função leucocitária vesical. Entretanto, os pacientes aqui relatados não possuíam glicosúria, afastando esta hipótese como causa do problema. Assim sendo, a provável causa da cistite enfisematosa foram os urólitos que predispueram a colonização da bexiga por *E. coli*, levando a cistite crônica e formação de gás, estando portanto, de acordo com o descrito na literatura (Aizenberg et al., 2003; Petite et al. 2005; Quint et al. 1992). Os exames de imagem são imprescindíveis para se demonstrar a presença de gás na bexiga, estando indicados em todos os casos em que há doença de trato urinário. Pelo fato da cistite enfisematosa usualmente acometer cães diabéticos, esta não fora suspeitada de início, porém, a indicação da ultrassonografia abdominal foi

determinante para avanço na abordagem clínica e diagnóstico da cistite enfisematosa nestes pacientes, (Aizenberg et al., 2003; Petite et al. 2005).

CONCLUSÃO

Conclui-se que pacientes com histórico de doença do trato urinário, independente de apresentarem glicosúria, podem desenvolver cistite enfisematosa como complicação e, portanto, exames de imagem da cavidade abdominal estão sempre indicados.

REFERÊNCIAS

- KELESIDIS, T.; OSMAN, S.; TSIODRAS, S. et al. Emphysematous Cystitis in the absence of know risk factors: an unusual clinical entity. **Southern Medical Journal**, vol. 102, p. 942-946, 2009.
- PETITE, A.; BUSONI, V.; HEINEN M.P.; BILLEN F.; SNAPS F. et al. Radiographic an ultrassonografic findings of emphysematous cystitis in four nondiabetic female dogs. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, vol. 47, p. 90-93, 2005.
- AIZENBERG, I. & AROCH, I.; TSIODRAS, S. et al. Emphysematous Cystitis due to *Escherichia coli* associated with prolonged chemotherapy in a non-diabetic dog. **Journal of Veterinary Medicine**, vol. 50, p 396-398, 2003.
- QUINT H.J.; DRACH, W.D.; HOFFMANN, C.J. et al. Emphysematous Cystitis: a review of the spectrum of disease. **Journal Urology**, vol. 147, p. 134-137, 1992.

036. CURVA GLICÊMICA EM CÃES SAUDÁVEIS

Patricia Almeida Ferreira¹, Stephanie de Souza Theodoro², Sabrina de Oliveira Capella², Márcia de Oliveira Nobre³

¹ Mestranda, PPG Veterinária, Universidade Federal de Pelotas/RS,

² Graduação em Veterinária, Universidade Federal de Pelotas/RS

³ profª Dr. Adj. Clínica de Pequenos Animais

RESUMO

A glicose é essencial para o funcionamento do organismo, e é importante saber em que momento após a alimentação pode-se analisá-la sem alterações dos resultados. Objetivou-se elaborar uma curva glicêmica afim de determinar quanto tempo após a alimentação pode ser feito o exame da glicose. A glicose foi avaliada em nove cães saudáveis, através de análise bioquímica laboratorial, em jejum e após o fornecimento de ração industrial. Constatou-se que o maior valor médio ocorreu 1:30 após alimentação, decaindo posteriormente. Conclui-se que a glicemia pode ser avaliada após 1:30 da ingesta de alimento, sem que haja alterações no resultado.

PALAVRAS-CHAVES glicose, jejum, alimentação.

GLUCOSE CURVE IN HEALTHY DOGS

ABSTRACT

Glucose is essential to the proper work of the body. It is important to know the correct time, after feeding, that one can analyze its value without results alterations. In this work we have elaborated a glycemic curve in order to determine the value for this time. The glucose values were measured in nine healthy dogs, through laboratorial biochemical analysis, after a period of fasting and when fed with industrial food. It was observed that the highest glucose mean value has occurred after one hour and thirty minutes after feeding, reaching lower values posteriorly. In this way we conclude that glucose can be evaluated one hour and thirty minutes after feeding without results alterations.

KEYWORDS: glucose, fasting, feeding

INTRODUÇÃO

Os carboidratos, na forma de glicose, é a principal fonte de energia para as células, as quais requerem constante suplemento deste nutriente, e apenas pequenas mudanças são toleradas sem efeitos adversos (Dinneen et al., 1992), como a resistência à insulina e a diabetes (Gayet et al., 2004). Os valores glicêmicos variam de acordo com a ingesta de alimentos, por isso, objetivou-se analisar tais níveis de cães em jejum e após alimentação, a fim de determinar mudanças ocorridas nos valores, e qual é o tempo necessário de jejum para realizar exames.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados nove cães saudáveis, SRD, adultos, ambos os sexos, os quais foram mantidos em gaiolas individuais, onde permaneceu em jejum alimentar durante 12 h. Após este período foi fornecida ração industrializada *premium* para cada animal durante 30 min, sendo posteriormente retirada e a água fornecida *ad libitum*.

As avaliações dos níveis séricos de glicose foram realizadas após 12:00 de jejum, 0:30, 1:00, 1:30, e 3:00 após o fornecimento da ração industrial. As amostras sanguíneas foram obtidas da veia jugular (5mL), o sangue depositado em tubo com gel ativador da coagulação¹, centrifugados (15000 rpm/ 5 min), e o soro separado para análise em microtubos de 2 mL, os quais permaneceram congelados (-80°C) até o momento das análises bioquímicas laboratoriais. Para isso, os microtubos foram descongelados no vapor, depositados em tubos descartáveis e colocados no aparelho BS-200 (Mindray®) - calibrado com o reagente para a leitura da glicose², a determinação enzimática das amostras foi através do teste colorimétrico. Para análise estatística foi utilizado o teste de Kruskal – Wallis, com comparações entre médias do parâmetro analisado e os horários das coletas.

RESULTADOS

Os valores da glicemia encontravam-se dentro dos padrões fisiológicos (65-120 mg/dL). A menor média foi no período em jejum, e após o fornecimento da alimentação houve aumento gradual e constante até que ocorresse o pico glicêmico à 1:30, tornando a diminuir. Houve diferença estatística significativa entre os níveis da glicose em jejum e 1:00 e 1:30 (Tabela 1).

Tabela 1: Valores médios da glicemia após 12h de jejum, e 0:30, 1:00, 1:30 e 3:00 após o fornecimento de ração industrial *premium*.

Análise mg/dL	Jejum	Pós-alimentação			
		00:30	01:00	01:30	03:00
Glicose	61,3 ^c ± 5,5	65,4 ^{bc} ± 8,5	77,1 ^{ab} ± 6,8	84,8 ^a ± 9,1	74,7 ^{abc} ± 8,2
Análise mg/dL	Jejum	Pós-alimentação			
		00:30	01:00	01:30	03:00
Glicose	61,3 ^c ± 5,5	65,4 ^{bc} ± 8,5	77,1 ^{ab} ± 6,8	84,8 ^a ± 9,1	74,7 ^{abc} ± 8,2

1 Labor ®

2 Labteste - kit Glicose Monoreagente K082

DISCUSSÃO

Os resultados encontrados na análise da glicemia são semelhantes aos verificados em estudos da curva glicêmica de cães após uma hora da ingestão de diferentes carboidratos e fibras (Palumbo, 2009), enquanto o pico glicêmico ocorreu após quatro horas da ingestão de ração padrão e dietética (Nascimento e Conti, 2008). Em humanos, os valores glicêmicos acima do fisiológico em jejum ou após 2h pós-prandiais, são bons preditores do risco de desenvolvimento de diabetes ou doenças cardiovasculares (Qiao et al., 2002).

CONCLUSÃO

O “pico” glicêmico ocorre 1:30 após o fornecimento de ração industrial, sendo possível realizar exames para dosagem da glicose posteriormente a esse período sem que haja alterações nos resultados.

Agradecimentos: CNPq; e Laboratório Dr. Rouget Perez.

Comitê de Ética: Código de cadastro nº CEEA 5271.

REFERÊNCIAS

- Dinneen, S., Gerich, J., Rizza, R. Carbohydrate Metabolism in Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. **N Engl J Med**, n.327, p.707-713, 1992.
- Gayet, C., Bailhache, E., Dumon, H., et al. Insulin resistance and changes in plasma concentration of TNF α , IGF1, and NEFA in dogs during weight gain and obesity. **J. Anim. Physiol. a. Anim. Nutr**, n.88,p.157–165, 2004.
- Palumbo, G.R. Efeito da ingestão de amido, fibra e energia na resposta glicêmica pós-prandial e saciedade em cães. Universidade Estadual Paulista, 2009.
- Nascimento, M.A., Conti, R.M.C. Verificação da curva glicêmica em cães não diabéticos com diferentes tipos de alimentação. **Anuário da produção de iniciação científica discente**, v.11,n.12, p.239-252, 2008.
- Qiao, Q., Pyörälä, K., Nissinen, A., et al. Two-hour glucose is a better risk predictor for incident coronary heart disease and cardiovascular mortality than fasting glucose. **European Heart Journal**, n.23, p.1267–1275, 2002.

037. DADOS CLÍNICOS DA INFECÇÃO NATURAL POR *Trypanosoma caninum*

Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida^{1,2}, Valéria Régia Franco Sousa²,
Fabiano Borges Figueiredo¹, Juliana Helena da Silva Barros¹,
Maria de Fátima Madeira¹

¹Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas – IPEC/FIOCRUZ –
arleferreira@gmail.com

²Universidade Federal de Mato Grosso

RESUMO

Trypanosoma caninum é um agente recentemente descrito e o presente estudo objetiva descrever as características clínicas de cães naturalmente infectados. O estudo foi realizado em Cuiabá - MT e dos 18 cães estudados, 61% encontravam-se sadios, sem qualquer alteração clínica ou dermatológica. Dos 38.9% (n=7) cães que apresentaram algum sinal a linfadenopatia e o emagrecimento foram os mais observados. Os resultados sugerem que a infecção por *T. caninum* possa cursar sem sinais clínicos relevantes, no entanto, o encontro desse agente em cães, em áreas endêmicas para leishmaniose destaca o alerta aos médicos veterinários para a importância clínica e o papel dessa espécie nessas áreas.

PALAVRAS-CHAVES: *Trypanosoma caninum*, cão, sinais clínicos, Cuiabá

CLINICAL DATA OF NATURAL INFECTION BY *Trypanosoma caninum*

ABSTRACT

Trypanosoma caninum is a recently described agent and the present study aims to describe the clinical characteristics of naturally infected dogs. The study was conducted in Cuiabá - MT and 18 dogs studied, 61% were healthy without any clinical signs or dermatological. Of 38.9% (n=7) dogs that showed any sign lymphadenopathy and weight loss were most frequently observed. The results suggest that infection with *T. caninum* can evolve without relevant clinical signs, however, the meeting of this agent in dogs in endemic areas for leishmaniasis highlights the warning to veterinarians for clinical importance and role of this species in these areas.

KEYWORDS: *Trypanosoma caninum*, dog, sinais clínicos, Cuiaba

INTRODUÇÃO

Os cães são considerados hospedeiros de algumas espécies de parasitos da família Trypanosomatidae, especialmente do gênero *Leishmania* e *Trypanosoma* (Stuart et al., 2008). Apesar de serem considerados importantes reservatórios de

agentes como *Leishmania (Leishmania) chagasi* e *Trypanosoma cruzi*, esses animais também são severamente acometidos por esses agentes, ocasionando muitas vezes o óbito dos mesmos. *Trypanosoma caninum* é um agente recentemente descrito parasitando cães na cidade do Rio de Janeiro (Madeira et al., 2009; Pinto et al., 2010), no entanto, a patogenicidade dessa espécie para os cães ainda não está elucidada. Diante do exposto e do crescente isolamento desse parasito, o presente trabalho tem por objetivo descrever as alterações clínicas observadas em cães naturalmente infectados por *T. caninum* em Cuiabá – MT.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante estudo transversal para leishmaniose visceral canina realizado em Cuiabá e municípios vizinhos, encontrou-se 18 cães naturalmente infectados por *T. caninum*. O diagnóstico foi feito através do isolamento parasitário a partir de fragmentos de pele íntegra e identificados por *nested* PCR (18S rDNA) e posterior sequenciamento (Almeida et al., 2011). No momento das visitas domiciliares os animais foram avaliados clinicamente sendo coletadas informações das alterações clínicas gerais e dermatológicas. Dez animais foram reavaliados após três e seis meses visando investigar a evolução clínica dos mesmos.

RESULTADOS

Dos 18 cães com isolamento de *T. caninum*, 11 (61%) apresentavam-se em bom estado geral no momento da primeira visita. Sete animais (38.9%) apresentaram um ou mais sinais como: linfadenomegalia (4), emagrecimento (2), conjuntivite (2), alterações dermatológicas, como úlcera cutânea (2) e alopecia generalizada (1), esplenomegalia (1). Dos 10 animais reavaliados, nove não apresentaram, após 6 meses, alteração da condição clínica inicial sendo seis assintomáticos e três sintomáticos. Um cão apresentou piora do quadro clínico, condizentes com leishmaniose visceral canina.

DISCUSSÃO

Na infecção por *L. (L.) chagasi*, é comum o relato de cães assintomáticos. Embora *T. caninum* seja um agente descrito recentemente e aspectos relacionados à infecção natural serem ainda desconhecidos, observamos que 61% dos animais não apresentaram qualquer sinal clínico. Tal característica pode estar relacionada a possível restrição deste parasito na pele, tendo em vista ser este o único sítio em que

se obteve isolamento do mesmo (Madeira et al. 2009, Pinto et al., 2010; Almeida et al., 2011). Esse fenômeno poderia sugerir a presença de alterações cutâneas, entretanto tal aspecto foi observado em apenas três dos 18 animais infectados. Apesar de cerca de 40% dos cães estudados terem apresentado algum tipo de sinal clínico, inferir a etiologia ao *T. caninum* é ainda precoce, pois sinais como emagrecimento, linfadenopatia, esplenomegalia e conjuntivite, são normalmente encontrados em cães parasitados por outros agentes. A não progressão clínica dos cães assintomáticos após 6 meses sugere baixa patogenicidade de *T. caninum*, como previamente descrito (Pinto et al., 2010, Almeida et al., 2011).

CONCLUSÃO

Os resultados sugerem que a infecção por *T. caninum* possa cursar sem sinais clínicos relevantes, no entanto, o crescente isolamento desse parasito principalmente em áreas endêmicas de leishmaniose visceral alerta os médicos veterinários para a importância do diagnóstico clínico e laboratorial dos cães nessas áreas, visando, entre outros aspectos, a compreensão de como este parasito está sendo mantido e transmitido sob condições naturais.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A.B.P.F.; SOUSA, V.R.F.; BOA-SORTE, E.C. et al. Use of parasitological culture to detect *Leishmania (Leishmania) chagasi* in naturally infected dogs. **Vector-Borne and Zoonotic Diseases**, v.11, n.12, p.1555-1560, 2011.
- MADEIRA, M.F.; SOUSA, M.A.; BARROS, J.H.S. et al. *Trypanosoma caninum* n. sp. (Protozoa: Kinetoplastida) isolated from intact skin of a domestic dog (*Canis familiaris*) captured in Rio de Janeiro, Brazil. **Parasitology**, v.136, p.411-423, 2009.
- PINTO, A.G.S.; SCHUBACH, T.M.P.; FIGUEIREDO, F.B. et al. Isolation of *Trypanosoma caninum* in domestic dogs in Rio de Janeiro, Brazil. **Parasitology**, v.137, p.1653-1660, 2010.
- STUART, K.; BRUN, R.; CROFT, S. et al. Kinetoplastids: related protozoan pathogens, different diseases. **The Journal of Clinical Investigation**, v.118, p.1301-1310, 2008.

038. DIAGNÓSTICO CLÍNICO, LABORATORIAL E EPIDEMIOLÓGICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE RELATO DE CASO

Zilyane Cardoso De Souza¹, Maria Cláudia Ribeiro Agra²,
Daniel Friguglietti Brandespim¹.

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco UFRPE/UAG - zilyane@hotmail.com

²Clínica Veterinária do Departamento de Controle de Vetores e Vigilância Animal/Secretaria de Saúde de Caruaru-PE.

RESUMO

As leishmanioses são infecções zoonóticas de grande importância na saúde pública e representam 75% das doenças emergentes no mundo. A leishmaniose visceral é uma doença negligenciada que vem se demonstrando endêmica no município de Caruaru-PE. O trabalho objetivou relatar um caso clínico de leishmaniose visceral canina com confirmação laboratorial e epidemiológica para a doença.

PALAVRAS-CHAVES: Cão, diagnóstico, leishmaniose visceral

CLINICAL DIAGNOSIS, LABORATORY AND EPIDEMIOLOGICAL OF CANINE VISCERAL LEISHMANIASIS IN THE CITY CARUARU-PE: CASE REPORT

ABSTRACT

The leishmaniasis are zoonotic infections of great importance in public health and represent 75% of emerging diseases in the world. Visceral leishmaniasis is a neglected disease that have demonstrating endemic in the city Caruaru-PE. The study aimed to report a clinical case of canine visceral leishmaniasis with laboratory confirmation and epidemiological for the disease.

KEYWORDS: Diagnosis, dog, visceral leishmaniasis

INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral, causada pela *Leishmania chagasi*, também conhecida como Calazar, é uma doença infecciosa sistêmica de caráter crônico (Brasil, 2011). Os cães (*Canis familiaris*) são os hospedeiros domésticos, e possuem um papel fundamental para a manutenção da doença em áreas endêmicas (Santos, et al 2008). O ciclo de transmissão é realizado através da picada de fêmeas de flebotomíneos do gênero *Lutzomyia*. No Brasil, o vetor mais importante é o *Lutzomyia longipalpis* (Brasil, 2006). No cão, a doença apresenta evolução lenta e sua manifestação clínica depende da resposta imunológica do animal. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso

clínico de leishmaniose visceral canina autóctone da cidade de Caruaru em Pernambuco, onde a doença apresenta caráter endêmico.

RELATO DE CASO

Foi atendido no município de Caruaru-PE, um cão da raça Rottweiler, 10 anos de idade do bairro Nova Caruaru. Com alimentação, fezes e urina normal, o animal apresentava: caquexia, pêlo opaco, mucosas pálidas, aumento dos linfonodos submandibulares, onicogrifose, alopecia periocular, lesão cutânea de orelha e de focinho (Figura 1).

Figura 1- Animal com caquexia, onicogrifose (A), lesões cutâneas e alopecia periocular (B).

O soro do animal foi enviado para o LACEN da IV GERES em Caruaru, onde foram realizados os exames de ELISA e RIFI. Após confirmação sorológica, o animal foi submetido à eutanásia, sendo observado que onde o animal vivia evidenciava um local propício ao desenvolvimento e manutenção de flebotômíneos (Figura 2A). Após a retirada do animal, foi realizado bloqueio focal com inseticida no ambiente em que o animal vivia e na residência do proprietário do mesmo (Figura 2B e C).

Figura 2- Ambiente do animal (A) e realização de bloqueio focal com inseticida (A, B).

RESULTADOS

O proprietário do animal relatou que a lesão na orelha apareceu há um ano e meio e não respondia aos tratamentos, emagrecimento progressivo há um ano, e lesão no focinho há seis meses. Nos testes sorológicos, o cão foi diagnosticado sororreagente no ELISA, e no RIFI nas diluições 1:40 e 1:80. O proprietário do animal relatou que há um ano o cão de um vizinho tinha morrido com sintomatologia clínica de leishmaniose visceral, e que o outro vizinho tinha um animal que apresentava sintomatologia clínica da doença também há um ano, e se negava a fazer teste sorológico no animal.

DISCUSSÃO

Os sinais clínicos observados no animal são característicos de Leishmaniose Visceral Canina como descrito por Brasil (2006), e também relatados por Gonçalves et al (2011). O bairro de localização periurbana (Lira, 2005), onde o animal residia é conhecidamente uma área endêmica para a doença, com casos anteriores de cães sororreagentes. O local onde o animal vivia, com galinheiros, pés de bananeira e matéria orgânica, demonstrou-se propício à presença do flebótomo transmissor da *Leishmania chagasi*, de acordo com Brasil (2006) e Miranda (2008). E a falta de intensidade e continuidade nas ações do programa tem levado ao crescimento da leishmaniose visceral em muitas regiões (Santos, 2008).

CONCLUSÃO

A Leishmaniose Visceral é uma zoonose de grande importância na saúde pública e em crescente expansão. Sabendo que nem sempre os animais portadores dessa patologia são sintomáticos, é imprescindível a associação de mais de um recurso para o correto diagnóstico e aplicação de medidas efetivas para o controle da doença.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral**. Brasília, 2006.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de vigilância em Saúde. **Glossário de Doenças: Leishmaniose Visceral**. Disponível em: <<http://portal.saude.gov.br/portal/saude>>. Acesso em: 05 nov. 2011.

GONÇALVES, M. B. et al. Associação entre alterações em fâneros e linfonodos e ocorrência de leishmaniose visceral canina. In: Reunião de Pesquisa Aplicada em Leishmanioses, 15. **RESUMO...** Uberaba: UFTM, 2011.

LIRA, R. A. **Diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina: Avaliação do Desempenho dos Kits EIE-Leishmaniose-Visceral-Canina-Bio-Manguinhos e IFI-Leishmaniose-Visceral-Canina-Bio-Manguinhos**. 87f. Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2005.

MIRANDA, G. M. D. **Leishmaniose visceral em Pernambuco: a influência da urbanização e da desigualdade social**. 137f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2008.

SANTOS, T. A. B. et al. Leishmaniose visceral. **PubVet**, v. 2, n. 25, Jun. de 2008.

039. ESPINHA BÍFIDA OCULTA, HEMIVÉRTEBRAS E ESTENOSE DO CANAL VERTEBRAL EM YORKSHIRE TERRIER: RELATO DE CASO

Bruno Benetti Junta Torres^{1,2}, Bernardo de Caro Martins², Mário Sérgio Lavor²,
Guilherme de Caro Martins², Renato Sacchetto Tôres², Eliane Gonçalves de Melo²

¹Universidade Federal de Lavras – brunotorres@dmv.ufla.br

²Universidade Federal de Minas Gerais.

RESUMO

Um cão Yorkshire Terrier de cinco anos de idade foi atendido com paraplegia e ausência de sensibilidade profunda. A lesão foi localizada clinicamente na coluna vertebral toracolombar, e os exames radiográficos mostraram espinha bífida oculta, hemivértebras, desvio cifótico grave com estenose do canal vertebral e material discal calcificado comprimindo ventralmente a medula espinhal.

PALAVRAS-CHAVES neurologia, malformações congênicas, cão

SPINA BIFIDA OCCULTA, HEMIVERTEBRAE AND STENOSIS OF THE SPINAL CANAL IN A YORKSHIRE TERRIER: A CASE REPORT

ABSTRACT

A 5-year-old Yorkshire terrier was presented with paraplegia and lack of deep pain. The lesion was localized in the thoracolumbar spine, and radiographs showed spina bifida occulta, hemivertebrae, severe kiphotic deviation with stenosis of the spinal canal and calcified disc material compressing the spinal cord ventrally.

KEYWORDS: neurology, congenital malformations, dog

INTRODUÇÃO

Anomalias congênicas da coluna vertebral e medula espinhal aparecem isoladamente ou como múltiplas malformações e, sua etiologia é desconhecida. No entanto, parece haver predisposição genética e certas raças estão predispostas, como o Bulldog (Arias et al., 2008; Westworth e Sturges, 2010).

Espinha bífida (EB) refere-se à fusão incompleta dos arcos vertebrais, resultando em defeito ósseo na porção dorsal das vértebras. A EB pode ocorrer isoladamente (EB oculta), com projeção das meninges (EB cística) ou da medula

espinhal (EB manifesta) através do defeito ósseo. Quando há comunicação com o meio externo, pode ser referido como a EB *aperta* (Vite, 2004).

As hemivértebras se originam do desenvolvimento incompleto dos corpos vertebrais, e frequentemente resultam em significativa curvatura da coluna e consequente estenose do canal vertebral (Westworth e Sturges, 2010).

Os sinais clínicos consequentes dessas malformações variam de dor a déficits mielopáticos devido à compressão ou deslocamento medular, embora frequentemente, essas anomalias sejam achados radiográficos incidentais sem apresentação clínica. Nesses casos, alterações secundárias à incongruência vertebral, como a discopatia, podem agravar o quadro clínico (Vite, 2004).

O presente relato objetiva descrever o caso de um Yorkshire terrier de cinco anos de idade, com malformações vertebrais múltiplas cujos sinais clínicos foram agravados devido à doença do disco intervertebral.

RELATO DE CASO

Um cão da raça Yorkshire Terrier, de cinco anos de idade, foi atendido com histórico de claudicação dos membros pélvicos (MP), de caráter insidioso, desde filhote, que tinha se agravado rápida e progressivamente, sem resposta à terapia clínica, havia poucos dias. Observaram-se paraplegia espástica, reflexos miotáticos exacerbados, ausência de sensibilidade profunda nos MP, hiperpatia em região torácica, reflexo cutâneo do tronco ausente abaixo de T8 e retenção fecal e urinária. Apresentava-se ofegante, com respiração abdomino-costal. Exames hematológicos e do líquido cérebroespinal mostraram-se normais, e a radiografia revelou desvio grave da coluna vertebral entre T4 e T8, gerando uma deformidade cifótica com estenose do forame vertebral. Havia imagens sugestivas de malformações de T4 a T7, com vértebra em bloco, estreitamento do espaço intervertebral e espondilose deformante ventral entre T6-T7, além de vértebra em cunha em T7. À mielografia, observaram-se estenose do forame vertebral de T5 até T8 e material discal calcificado comprimindo ainda mais a medula ventralmente, entre T6 e T7. Realizou-se hemilaminectomia e verificou-se que os processos espinhosos de T6 e T7 apresentavam-se malformados e de aspecto cartilaginoso, e que os arcos dorsais das lâminas vertebrais de T4 a T7 estavam incompletos, permitindo exposição das meninges. A medula apresentava-se hemorrágica, desvitalizada e não responsiva sugerindo mielomalacia. O animal foi mantido em unidade de terapia intensiva com oxigenioterapia, analgesia e antiinflamatórios. Entretanto, o quadro continuou progredindo, até que o animal desenvolveu uma falência respiratória e foi a óbito, oito dias depois.

DISCUSSÃO

Defeitos congênitos vertebrais são achados incidentais comuns, no entanto, há poucos relatos desta condição na espécie canina. Alterações patológicas variam de espinha bífida oculta a condições mais graves, como crânio bífido e várias formas de meningoceles e meningomielodisplasias, dependendo do compartimento embrionário do tubo neural acometido (Vite, 2004; Westworth e Sturges, 2010).

Geralmente, anormalidades múltiplas ocorrem dentro do mesmo compartimento embrionário. Entretanto, no presente caso, alterações do corpo vertebral (hemivértebras e vértebras em bloco), e do arco vertebral (espinha bífida), sugerem que houve falha no desenvolvimento embrionário dos compartimentos ventral e dorsal do tubo neural, respectivamente.

A localização dos defeitos vertebrais, principalmente da espinha bífida, foi incomum, já que é mais frequente na região lombossacral (Arias et al., 2008). Embora graves, as anomalias vertebrais torácicas não foram consideradas, pelo menos parcialmente, responsáveis pelos sinais clínicos observados. Estes, certamente foram agravados pela compressão discal, que pode ter ocorrido pela instabilidade vertebral e/ou pela própria alteração congênita.

Malformações vertebrais já foram descritas em diversas raças caninas e são condições congênitas mais prevalentes na raça Bulldog. Portanto, esse relato contribui com a incidência de tais alterações também na raça Yorkshire Terrier.

CONCLUSÃO

Malformações congênitas vertebrais podem causar dor, mielopatia, ou nenhuma disfunção evidente. É da responsabilidade do médico veterinário investigar e determinar se a anomalia é um achado incidental ou causa dos sinais clínicos.

REFERÊNCIAS

- ARIAS, M.V.B.; MARCASSO, R.A., MARGALHO, F.N. et al. Spina bifida in three dogs. **Brazilian Journal of Veterinary Pathology**, v.1, n.2, p.64-69, 2008.
- VITE, C.H. Developmental Disorders. In: Braund's Clinical Neurology in Small Animals: Localization, Diagnosis and Treatment, (Ed.). International Veterinary Information Service (www.ivis.org): Ithaca, New York, USA, .2004.
- WESTWORTH, D.R.; STURGES, B.K. Congenital Spinal Malformations in Small Animals. **The Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, n.40, p.951–981, 2010.

040. ESTUDO PROSPECTIVO DE ERLIQUIOSE MONOCÍTICA CANINA:

AVALIAÇÃO CLÍNICA E LABORATORIAL

Mariana Yukari Hayasaki Porsani¹, Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi¹, Ingrid de Oliveira Campos¹, Gisele Fabrícia Martins dos Reis¹, Juliana Pierangeli Fonseca¹,
Guilherme Oberlender¹

1- Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras
email:mariporsani@hotmail.com

RESUMO

A erliquiose monocítica canina (EMC) é mundialmente conhecida. Transmitida pelo *Rhipicephalus sanguineus*, seus sinais clínicos são consequência da resposta imunológica face à infecção. O seu diagnóstico é baseado em anamnese, exame físico, achados laboratoriais e testes sorológicos. O presente estudo verificou a avaliação clínica e laboratorial de 38 cães acometidos com EMC numa microrregião em Minas Gerais.

PALAVRAS CHAVES: erliquiose, *Rhipicephalus sanguineus*, cães

PROSPECTIVE STUDY OF CANINE MONOCYTES EHRLICHIOSIS: CLINICAL AND LABORATORY EVALUATION

ABSTRACT

The canine monocytic ehrlichiosis (CME) is known worldwide. Transmitted by *Rhipicephalus sanguineus*, its clinical signs are the result of the immune response against the infection. The diagnosis is given in a set of anamnesis, physical examination, laboratory findings, and serologic tests. This study assessed the clinical and laboratory evaluation of 38 dogs affected with EMC in Minas Gerais.

KEYWORDS: ehrlichiosis, *Rhipicephalus sanguineus*, dogs

INTRODUÇÃO

EMC é causada por uma bactéria gram negativa, intracelular obrigatória (Sousa, 2006), tendo como vetor o carrapato vermelho do cão, o *Rhipicephalus sanguineus* (Harrus e Waner, 2011). A forma clínica da doença inicia-se em 8 a 20 dias após a inoculação do agente, com sinais clínicos inespecíficos, acometendo principalmente os tratos gastrintestinais, respiratórios e neurológicos (Sousa, 2006; Harrus e Waner, 2011), associados à trombocitopenia, anemia e leucopenia. A fase subclínica geralmente é assintomática, mas animais com baixa resposta imunológica

manifestarão a doença (Harrus e Waner, 2011). Na fase crônica observam-se hemorragias, epistaxe, edema de membros, alterações neurológicas e oftálmicas, relacionados a trombocitopenia, anemia e pancitopenia (Sousa, 2006; Silva, 2009).

O diagnóstico pode ser dado por meio da visualização de mórulas em esfregaços sanguíneos periféricos (Sousa, 2006), mas as provas sorológicas garantem maior segurança diagnóstica, sendo a reação de imunofluorescência indireta (RIFI) a mais confiável (Waner e Harrus, 2000; Silva, 2009).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram adquiridas informações por meio de anamnese, sinais clínicos e exame físico, hemograma e teste sorológico RIFI. O grupo A representava os cães negativos ao teste de RIFI, mas com sintomatologia e alterações hematológicas compatíveis a EMC. O grupo B era composto por cães positivos ao teste sorológico de RIFI apresentando ou não alterações compatíveis a EMC.

RESULTADOS

Tabela 1. Hemograma dos cães: Grupo A e Grupo B (n = 38 cães).

	Hemograma¹					
Animais	Hematócrito (%)	Leucócitos (mil/mm³)	Linfócitos (mil/mm³)	Plaquetas (mil/mm³)	Segmentados (mil/mm³)	Bastonetes (mil/mm³)
Grupo A (n=19)	36,32 ± 17,85 ^a	14,05 ± 12,74 ^a	3,27 ± 2,58 ^a	107,05 ± 69,88 ^b	7,28 ± 5,06 ^a	2,58 ± 7,05 ^b
Grupo B (n=19)	37,17 ± 12,63 ^a	14,89 ± 11,92 ^a	4,24 ± 3,38 ^a	204,16 ± 132,03 ^a	9,38 ± 8,81 ^a	0,56 ± 1,03 ^a
Valor de P	0,737	0,970	0,417	0,001	0,248	0,014

¹Médias seguidas por diferentes letras na coluna diferem pelo teste t (p<0,01).

A variação média de idade em meses do grupo A foi de 63,95 ± 50,04 e do grupo B: 50,16 ± 46,86 com variação de P 0,730

DISCUSSÃO

Não houve diferença significativa entre as faixas etárias de ambos os grupos da mesma forma como relatado por Sousa (2006) e Silva (2009), divergindo dos achados de Costa et al (2007) onde houve significância entre a idade e a EMC, relacionada ao um aumento da probabilidade a exposição do agente. Em ambos os grupos não houve correlação entre as raças, corroborando com Costa et al (2007) e Silva (2009) que afirmam não existir correlação entre as raças acometidas e a prevalência EMC. Neste

trabalho, não foi correlacionado o sexo com a EMC por não haver diferença no número de machos e fêmeas de ambos os grupos: contendo 10 Fêmeas (52,6%) e 9 Machos (47,4%). No momento da avaliação do grupo B, 47,4% eram assintomáticos, assim como em Silva (2009). Apenas 10,5% do grupo B apresentavam sintomatologia no trato gastrointestinal, enquanto no grupo A, 42,1% dos sinais clínicos foram no trato gastrointestinal (perda de peso, diarreia, hiporexia, êmese) 10,5% trato respiratório (tosse e crepitações pulmonares) e sistema nervoso central (ataxia). Estes achados foram semelhantes aos observados por Sousa (2006) e Harrus e Waner (2011) que afirmam que embora seja inespecífico, o diagnóstico de EMC é o somatório da anamnese e exames laboratoriais.

CONCLUSÃO

Pode se concluir que as alterações clínicas e hematológicas observadas nos cães com EMC são bastante inespecíficas. Embora a trombocitopenia seja a principal alteração hematológica não é patognomônica da EMC, pois muitos animais positivos não a apresentam. Destacando assim a importância do conjunto entre sinais clínicos, exames laboratoriais e testes sorológicos para o diagnóstico definitivo da EMC.

REFERÊNCIAS

- COSTA, L.M.Jr.; REMBECK,K.; RIBEIRO,M,F,B.et al . Sero-prevalence and risk indicators for canine ehrlichiosis in three rural areas of Brazil. The Veterinary Journal, v.174.p.673-676, 2007.
- HARRUS,S.;WANER,T.Diagnosis of canine monocytotropic ehrlichiosis (Ehrlichia canis): A overview. The Veterinary Journal v.87.p.292-296, 2011.
- SILVA, J.N. Soroprevalência de anticorpos anti-ehrlichia canis em cães de Cuiabá, Mato Grosso. Tese de Mestrado em Medicina Veterinária-Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso Cuiabá, MT, 2009.
- SOUSA, V.R.F. Avaliação clínica, morfológica, hematológica, bioquímica e biomolecular de cães naturalmente infectados por Ehrlichia canis e Anaplasma platys.Tese Doutorado em Medicina Veterinária. Instituto de Veterinária- Universidade Feral Rural do Rio de Janeiro - Seropédica, RJ, 2006.

041. HEPATOPATIA CRÔNICA ASSOCIADA AO ACÚMULO DE COBRE EM UM CÃO DA RAÇA AMERICAN PITBULL TERRIER - RELATO DE CASO.

Luciana Andreatta Torelly Pinto¹, Tatiane da Silva Mottin¹, Marcele Bettim Bandinelli², David Driemeier², Alan Gomes Pöpl³, Francisco Conrado³

¹Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) da UFRGS – lupyatp@gmail.com

²Setor de Patologia Veterinária da UFRGS

³Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias (LacVet) da UFRGS

RESUMO

Descreve-se o caso de um cão, macho, da raça American pitbull terrier, de oito meses apresentando clinicamente ascite, prostração, polidipsia e fezes enegrecidas. Os exames bioquímicos evidenciaram insuficiência hepática. Após o óbito, o canino foi encaminhado para necropsia e estabeleceu-se diagnóstico de cirrose hepática. A dosagem de cobre em fragmento hepático resultou em 1320µg/g de peso seco. Devido aos achados estabeleceu-se o diagnóstico de hepatopatia crônica em decorrência do acúmulo hepático de cobre.

PALAVRAS-CHAVE: canino, fígado, acúmulo, cobre, cirrose

CHRONIC LIVER DISEASE ASSOCIATED TO COPPER ACCUMULATION IN AN AMERICAN PITBULL TERRIER – CASE REPORT

ABSTRACT

A case of an eight year old American pitbull terrier male dog is described. The dog presented with ascites, prostration, polydipsia and dark colored feces. A biochemical profile showed hepatic insufficiency. The dog died, was submitted to necropsy and a diagnosis of hepatic cirrhosis was made. A copper determination in a fragment of hepatic tissue yielded 1320µg/g of dry weight. Due to the findings the diagnosis of chronic liver disease as a result of hepatic copper accumulation was established.

KEYWORDS: Canine, liver, accumulation, copper, cirrhosis

INTRODUÇÃO

O cobre é um elemento essencial às células (Hoffman, 2009) e seu acúmulo excessivo induz ao estresse oxidativo, gerando inflamação (Spee et al., 2006). Diversas raças de cães foram descritas como predispostas a desenvolver hepatopatia crônica associada ao acúmulo de cobre, como Bedlington terrier, West highland white terrier, entre outros. No caso da raça Bedlington terrier há comprometimento primário na excreção biliar do cobre devido à herança autossômica recessiva (Spee et al., 2006), todavia, nas demais raças o mecanismo do acúmulo desse elemento não está totalmente elucidado (Johnson, 1997).

Este trabalho tem como objetivo relatar os achados clínicos, bioquímicos e patológicos de um cão, de oito meses, da raça American pitbull terrier com hepatopatia crônica devido ao acúmulo de cobre.

RELATO DO CASO

Um canino, macho, de oito meses, da raça American pitbull terrier recebeu atendimento clínico por apresentar ascite, hiporexia, vômito, diarreia, prostração e perda de peso. Os exames bioquímicos mostraram aumento na atividade das enzimas alanina aminotransferase (ALT) 282,6U/L e fosfatase alcalina (FA) 406,3U/L. Os valores de albumina (20,4g/L) e proteína plasmática total (PPT) 50g/L estavam abaixo dos valores de referência. A ultrassonografia abdominal mostrou hepatomegalia com bordos regulares e parênquima discretamente hiperecogênico. Após dois meses, o cão retornou com ascite, polidipsia, prostração e fezes enegrecidas. Por meio de exames laboratoriais identificou-se leve anemia hipocrômica, e os valores de PPT (40g/L) e albumina (15,3g/L) persistiram abaixo dos valores de referência, enquanto as atividades das enzimas ALT (129,9U/L) e FA (323,4U/L) permaneciam aumentadas. Havia aumento nos tempos de protrombina (15,8s) e de tromboplastina parcial ativada (36,9s). Na urinálise os achados relevantes foram bilirrubinúria e cristais de bilirrubina. O líquido abdominal foi classificado como transudato puro, após abdominocentese e análise laboratorial.

O cão foi internado e recebeu tratamento de suporte, porém veio a óbito e foi encaminhado para exame de necropsia, as quais seus achados relevantes incluíram múltiplas derivações portossistêmicas no mesentério, fígado diminuído de tamanho, com consistência firme e formações micro e macronodulares de coloração acastanhada. Histologicamente havia proliferação acentuada de tecido conjuntivo fibroso, hiperplasia de ductos biliares e múltiplos nódulos de regeneração. A coloração de ácido rubeânico evidenciou grânulos acastanhados no citoplasma de hepatócitos e macrófagos. Realizou-se dosagem de cobre em fragmento hepático resultando em 1320µg/g de peso seco.

DISCUSSÃO

Os sinais clínicos associados ao acúmulo hepático de cobre são relacionados à insuficiência hepática (Hoffman, 2009), são inespecíficos e incluem ascite, emagrecimento, vômito e polidipsia, como os apresentados no presente relato (Johnson, 1997). O processo de fibrose causa aumento da pressão portal hepática, causando ascite e desvios portossistêmicos (Rothuizen, 2009). O acúmulo hepático de cobre pode ocorrer por aumento no aporte dietético, defeitos no metabolismo hepático

ou por doenças hepáticas que causem colestase (Hoffman, 2009). Ocasionalmente cães são diagnosticados com hepatite crônica e cirrose, acompanhados de aumento dos valores de cobre hepático, porém o papel desse acúmulo não está claro (Johnson, 1997). No presente caso, o valor obtido de cobre hepático foi superior ao descrito como aceitável para a espécie canina (400µg/g de peso seco) (Johnson, 1997).

CONCLUSÃO

Com base nestes achados, concluímos que este relato demonstra um caso de hepatopatia crônica em um canino jovem, da raça American pitbull terrier devido ao acúmulo hepático de cobre.

REFERÊNCIAS

HOFFMAN, G. Cooper-associated liver diseases. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**. Philadelphia, v. 39, n.3, p. 489-511, 2009.

JOHNSON, S. E. Afecções do fígado. In: ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. **Tratado de medicina interna veterinária: moléstias do cão e do gato**. 4. ed. São Paulo: Manole, 1997. Cap. 106, v.2, p.1817-1879.

ROUTHUIZEN, J. Important clinical syndromes associated with liver disease. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, Philadelphia, v. 39, n.3, p. 419-437, 2009.

SPEE, B. et al. Cooper metabolism and oxidative stress in chronic inflammatory and cholestatic liver diseases in dogs. **Journal of veterinary intern medicine**, Lakewood, v. 20, p. 1085-1092, 2006.

042. IMPORTÂNCIA DA MENSURAÇÃO DA IMUNORREATIVIDADE SEMELHANTE À TRIPSINA SÉRICA CANINA (cTLI) PARA DIAGNÓSTICO DE INSUFICIÊNCIA PANCREÁTICA EXÓCRINA – RELATO DE CASO

Daniel Diola Bento¹, Dênis Carvalho¹, Vanesa Kutz de Arruda¹, Tácia Tavares de Aquinas²; Luiz Henrique Araújo Machado³, Priscylla Tatiana Chalfun Guimarães³

¹ Residente do Depto Clínica Veterinária -UNESP, Botucatu

² Aluna de Iniciação Científica/FAPESP – FMVZ-UNESP, Botucatu

³ Prof.Ass.Dr.–Depto Clínica Veterinária-UNESP, Botucatu- henrique@fmvz.unesp.br

RESUMO

A insuficiência pancreática exócrina (IPE) é causada pela atrofia ou inflamação das células acinares pancreáticas, resultando em má-absorção e sinais clínicos relacionados à má-nutrição. Este relato descreve o caso de um cão, poodle, com histórico de perda de peso progressiva, polifagia e diarreia crônica há seis meses. A mensuração da imunorreatividade semelhante à tripsina sérica canina (cTLI) constitui o método definitivo para diagnóstico de IPE. A instituição da terapia com suplementação enzimática possibilitou a melhora do quadro clínico apresentado pelo paciente.

PALAVRAS-CHAVE: IPE, cão, TLI

REGARD OF CANINE TRYPSIN-LIKE IMMUNOREACTIVITY (cTLI) SERIC MENSURATION FOR EXOCRINE PANCREATIC INSUFFICIENCY DIAGNOSIS: A CASE REPORT

ABSTRACT

The exocrine pancreatic insufficiency (EPI) is caused by atrophy or inflammation of pancreatic acinar cells, resulting in nutrient malabsorption and clinical signs related to malnutrition. This report describes a case of a dog, poodle breed, showing weight loss, polyphagia and chronic diarrhea for six months. The canine trypsin-like immunoreactivity (cTLI) seric mensuration was the definitive method for EPI diagnosis. The institution of therapy based on enzyme supplementation enabled the improvement of the clinical picture presented by the animal.

KEYWORDS EPI, dog, TLI

INTRODUÇÃO

Em cães, a insuficiência pancreática exócrina (IPE), causada comumente por atrofia acinar pancreática e por pancreatite crônica, resulta em secreção insuficiente de

enzimas digestivas (RUTZ et al., 2001). Os sinais clínicos, decorrentes da má digestão, incluem diarreia com fezes volumosas, polifagia, parorexia, perda de peso, borborigmos intestinais, flatulência e problemas dermatológicos, além de atrofia de musculatura esquelética e de tecido adiposo (PAPINI et al., 2008). O diagnóstico presuntivo de IPE é realizado pela análise conjunta das manifestações clínicas com testes de triagens como o desafio com triglicerídeos e análise qualitativa fecal para presença de tripsina. Não susceptível às imprecisões dos testes de triagem, a mensuração da atividade semelhante à tripsina sérica (TLI), que reflete a liberação de tripsinogênio pelas ácinos pancreáticos, constitui o método diagnóstico definitivo desta enfermidade (NELSON e COUTO, 2010). Assim, o objetivo do presente relato é ressaltar a importância do uso de tal ferramenta no diagnóstico definitivo da IPE e descrever um caso no qual tal método auxiliou na diferenciação entre as demais causas de síndrome de má digestão.

RELATO DE CASO

Um cão, fêmea, poodle, com quatro anos de idade foi admitido no Hospital Veterinário com histórico de perda de peso progressiva, polifagia, diarreia crônica com aumento de volume fecal e coprofagia. Segundo o proprietário, os tratamentos anteriormente prescritos com restauradores de microbiota intestinal, complexos vitamínicos, antibióticos, vermífugos e homeopatia durante os últimos seis meses não foram eficazes. Ao exame físico, detectaram-se mucosas pálidas, escore de condição corporal (2/5), distensão de alças intestinais e pelagem opaca e sem brilho. O exame coproparasitológico revelou a presença de *Giardia*. Após o resultado positivo do teste de triagem de tripsina fecal, uma alíquota de soro foi submetida à mensuração de TLI (imunoreatividade semelhante à tripsina sérica), que apresentou valor abaixo dos de referência (0,29 de 5 a 25 ng/ml) (NELSON e COUTO, 2006). Instituiu-se a reposição enzimática com pancreatina associada à dieta, antibioticoterapia com metronidazol (25 mg/kg) cada 12 horas por 14 dias e suplementação semanal com cobalamina (500 µg por via subcutânea) durante dois meses. A melhora dos sinais clínicos foi observada imediatamente após a instituição da terapia.

DISCUSSÃO

Perda de peso progressiva, polifagia e diarreia de intestino delgado são sinais clínicos presentes tanto na síndrome de má digestão quanto de má absorção. Apesar de bastante utilizados no diagnóstico de IPE, o desafio com triglicerídeos e análise da atividade de tripsina fecal constituem testes diagnósticos de triagem, uma vez que a

obstrução pancreática ductular, a infestação pancreática por *Eurytrema procynis* (NELSON e COUTO, 2010), a destruição enzimática por hipersecreção ácida e a síndrome do hipercrecimento bacteriano (SIBO) (ETTINGER e FELDMAN, 2010) também desencadeiam a síndrome de má digestão e podem apresentar positividade em ambos os testes. O diagnóstico definitivo é realizado pela constatação da baixa atividade da tripsina sérica (TLI). No presente relato, o exame coproparasitológico demonstrou infecção por *Giardia*. Independente da presença de uma possível causa de síndrome de má absorção, o teste da análise da atividade da tripsina fecal diagnosticou síndrome da má digestão. A mensuração da TLI constituiu o método diagnóstico definitivo da IPE.

CONCLUSÃO

Apesar de pouco utilizado na prática clínica, a mensuração da TLI constitui a ferramenta definitiva para diagnóstico da IPE. Assim, a difusão de tal método auxiliaria na redução dos erros diagnósticos ao diferenciar a IPE das demais causas de síndrome de má digestão.

REFERÊNCIAS

- ETTINGER, S.J., FELDMAN, E.C. **Textbook of veterinary internal medicine**, 7ªed. Philadelphia:Saunders, 2010. 2208 p.
- NELSON, R.W.; COUTO, C.G. **Medicina interna de pequenos animais**, 4ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 1504 p.
- PAPINI, S. D. J. P.; ECCO, R.; ARAUJO, M.; CAIRES, C. E. T.; ALMEIDA, W. B. Atrofia do pâncreas exócrino em pastor alemão. **Clinica Veterinária**, n.73, p.50-54, 2008.
- RUTZ GM, STEINER JM, WILLIAMS DA. Pancreatic Acinar Atrophy in German Shepherds. **Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian**, v.23, n.4, p.347-356, 2001.

043. INCIDÊNCIA DE TRAUMAS EM GATOS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFCG NO PERÍODO DE 2006 A 2010 NO MUNICÍPIO DE PATOS – PB

Jailson Carlos Fernandes Fidelis¹, Almir Pereira de Souza¹, Olivia Maria Moreira
Borges¹, Rodrigo de Souza Mendes¹, Rosangela Maria Nunes da Silva¹

¹Universidade Federal de Campina Grande, Patos-PB - jail.carlos@hotmail.com

RESUMO

Objetivou-se descrever e analisar a incidência de traumas em gatos atendidos no Hospital Veterinário (HV), bem como determinar as causas mais frequentes, correlacionando-as à faixa etária, raça e sexo. Para tanto, foi realizado um levantamento das fichas clínicas dos animais atendidos no setor de Clínica Médica de Pequenos Animais (CMPA) de onde observou-se uma incidência de 22,9%, dos quais 28,54% ocorreram em animais com faixa etária de 0-0,5 anos, 67,91% em machos e 90,7% em animais sem raça definida (SRD). Ademais, constatou-se que as causas mais frequentes se deveram à causa desconhecida (46,65%) e acidentes automobilísticos (19,88%).

PALAVRAS-CHAVE: acidentes, animais, causas de traumas

INCIDENCE OF TRAUMA IN CATS ATTENDED IN VETERINARY HOSPITAL OF THE UFCG ON PERIOD OF 2006 TO 2010 IN THE CITY OF PATOS - PB

ABSTRACT

The objective was to describe and analyze the effects of trauma seen in cats attended in the Veterinary Hospital (HV), and to determine the most frequent causes, correlating them to age, race and sex. Furthermore, we conducted a study of medical records of animals treated at the Medical Clinic of Small Animals (CMPA) where observed an incidence of 22.9%, 28.54% of which occurred in animals aged of 0-0.5 years, 67.91% in males and 90.7% in animals without defined breed (SRD). Moreover it was found that the most frequent causes were due to unknown cause (46.65%) and accidents (19.88%).

KEYWORDS accidents, animals, causes of trauma

INTRODUÇÃO

Entende-se por trauma, qualquer dano ao organismo e sua definição consiste simplesmente na adição ou subtração de energias (mecânica, elétrica, química,

radiação, calor) com relação a um sistema vivo, podendo causar apenas um pequeno desconforto ou gerar lesões que possam comprometer a função de órgãos vitais (Tello, 2008). Além disso, Brasmer (1984) apud Tello (2008) citam que os traumas categorizam-se em acidentes automobilísticos, causa desconhecida, interação entre animais, ferida cortante, queda de altura, esmagamento, arma de fogo e queimadura, sendo importantes à facilitação do atendimento emergencial. Desta forma, objetivou-se descrever e analisar a incidência de traumas em gatos atendidos no HV, determinando as causas mais freqüentes, correlacionando-as à idade, raça e sexo.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um levantamento das fichas clínicas referentes ao período de 01/01/06 à 31/12/10, no Hospital Veterinário para análise dos casos de traumas em gatos. Os dados obtidos foram submetidos à análise descritiva sendo tabulados e comparados de acordo com a idade (anos), sexo (macho/fêmea) e padrão racial (SRD, Siamês, Persa, Angorá).

RESULTADOS

Das 2217 fichas avaliadas, em 508 (22,9%) foram constatadas casos de traumas. Com relação à faixa etária, 28,54% situavam-se entre 0-0,5 ano, 17,91% com 1-2 anos e 16,14% com 0,5-1 ano. Quanto ao sexo, 67,91% eram machos e 31,1% fêmeas. Em relação ao padrão racial verificou-se maior ocorrência (90,7%) em SRD, seguidos do Siamês (7,67%), Angorá (0,59%) e Persa (0,98%). Quanto às causas, 46,65% classificaram-se em desconhecida, 19,88% em acidentes automobilísticos e 10,43% em interação entre animais.

DISCUSSÃO

Os casos de traumas em gatos (22,9%) foram superiores aos observados por Santos et al (2010) (11,34%) e Kolata (1980) (13%), avaliando traumas em cães, ocorrendo, possivelmente, porque os gatos, por serem animais mais independentes que os cães, possuem maior acesso às ruas e casas vizinhas, tornando-os mais susceptíveis. A maior ocorrência de traumas na faixa etária de 0-0,5 ano pode estar ligada às características anatomofisiológicas de desenvolvimento ósseo, alta atividade metabólica (animais mais ativos) e imaturidade. Concordando com Berzins (2000) apud Bentubo et al (2007), a maior incidência em machos se deveu por estes abandonarem suas residências em busca de acasalamentos, estando mais expostos à riscos. Concordando com Santos (2010), houve maior incidência em gatos SRD (90,7%) e isso

ocorreu devido à quantidade de gatos sem raça na cidade de estudo ser maior e em consequência disso são mais acometidos. Dentre as causas, aquelas de caráter desconhecido (46,65%) foram as mais frequentes, condição que pode estar relacionada aos seus hábitos e à seu caráter independente, que, aliado a não adaptação ambiental peridomiciliar urbano, ficam sujeitos a injúrias de natureza diversa, resultando em traumas não presenciados pelos seus responsáveis.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados, conclui-se que é necessário um maior empenho por parte dos proprietários no tocante a medidas de controle e prevenção de acidentes em animais jovens do sexo masculino, diminuindo assim, os casos de traumas em gatos.

REFERÊNCIAS

BENTUBO, H.D.L.; TOMAZ, M.A.; BONDAN, E.F. et al. Expectativa de vida e causas de morte em cães na área metropolitana de São Paulo (Brasil). **Ciência Rural**, v.37, n.4, p.1021-1026, 2007.

KOLATA, R.J. Trauma in dogs and cats: an overview. **Veterinary Clinical of North American: Small Animal Practice**, v.10, n.3, p.515-522, 1980.

SANTOS, W.P.P. dos.; ALVES, D. de B.; SILVA, J.H.C. da. et al. Frequência de atendimentos de cães com histórico de traumatismo no hospital veterinário do departamento de medicina veterinária da UFPE no ano de 2009; disponível em: <<http://www.sigeventos.com.br/jepe/inscricao/RESUMOs/0001/R1203-1.PDF>>.

Acesso em: 13/01/2012.

TELLO, L. H. Trauma em pequenos animais. In: _____. **Traumas em cães e gatos**. São Paulo: Medvet, 2008. Cap. 2, p. 3-11.

044. LEVANTAMENTO CLÍNICO E PATOLÓGICO RETROSPECTIVO DE PERITONITE INFECCIOSA FELINA EM FELINOS DOMÉSTICOS ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFMT DURANTE O PERÍODO DE 2006 A 2011

Natália de Oliveira Saurini¹, Angela Ferronatti Girardi², Naiani Domingos Gasparetto², Edson Moleta Colodel³, Valéria Régia Franco Sousa³

¹ Graduando Medicina Veterinária - UFMT – nsaurhini@gmail.com

² Pós-Graduando Ciências Veterinárias UFMT

³ Prof. Adjunto Med. Veterinária UFMT

RESUMO

Peritonite infecciosa felina (PIF) é uma doença viral imunomediada frequentemente fatal que afeta felinos domésticos. Esta doença foi causa de morte de 9,7% dos gatos domésticos encaminhados para necropsia em um interstício de 6 anos. Desses casos 60% era da forma úmida e 40% da não efusiva. Os principais sinais clínicos foram emagrecimento progressivo, anorexia, diarreia e distúrbios neurológicos. Macroscopicamente na forma úmida havia fibrina e líquido viscoso com coloração citrina ou avermelhada nas cavidades. Em todos os casos se notou nódulos puntiformes nas superfícies serosas principalmente omento, peritônio, rim, fígado e pleura visceral. Histologicamente nestas áreas havia piogranulomas caracterizados por infiltrado predominantemente neutrofílico e mononucleares principalmente circundando vasos sanguíneos associados à necrose caseosa. Meningite piogranulomatosa foi vista em 4 gatos que tinham a forma seca.

PALAVRAS-CHAVES peritonite infecciosa felina, piogranulomas

SURVEY REPORT AND RETROSPECTIVE PATHOLOGICAL OF FELINE INFECTIOUS PERITONITIS IN DOMESTIC CATS VETERINARY HOSPITAL UFMT DURING THE PERIOD 2006 TO 2011

ABSTRACT

Feline infectious peritonitis (FIP) affects domestic felines, it's an often fatal immune-mediated viral disease. This disease was the cause of death of 9, 7% domestic cats submitted to necropsy in the interstitium of a 6 years. These cases were 60% of the wet form and 40% of non-effusive. The main clinical signs were progressive weight loss, anorexia, diarrhea and neurological disorders. Macroscopically in the wet form had fibrin and citrus-colored viscous liquid or reddish in cavities. In all cases was observed punctate nodules on the serosal surfaces especially in the omentum, peritoneum, kidney, liver and visceral pleura. Histologically in these areas had pyogranulomas characterized by predominantly neutrophilic infiltration and mononuclear cells surrounding blood vessels mainly associated with caseous necrosis. Pyogranulomatous meningitis was seen in 4 cats that had the dry form.

KEYWORDS: Feline Infectious Peritonitis, Pyogranulomas

INTRODUÇÃO

Peritonite Infecciosa Felina (PIF) causada pelo vírus da peritonite infecciosa felina (VPIF) é uma enfermidade imunomediada, sistêmica, progressiva e fatal. Fatores como estresse, suscetibilidade genética, doenças intercorrentes e densidade populacional alta favorecem a ocorrência da doença (Oliveira et al., 2003). A manifestação clínica raramente ultrapassa 5% dos felinos infectados, porém a mortalidade tende a 100% (Kipar et al, 2010). A ocorrência de PIF é maior em gatos menores de 2 anos e rara em idosos (Brown et al., 2009). A doença causa sinais multissistêmicos e é classicamente dividida em forma efusiva (úmida) e não efusiva (seca) (Sharif et al., 2010). As lesões típicas de PIF são placas piogranulomatosas e deposição de fibrina na superfície de órgãos como pulmões, fígado, peritônio, linfonodos e meninge (Brown et al., 2009). Neste estudo descrevemos alterações clínico-patológicas em felinos com PIF, atendidos no Hospital Veterinário (HOVET) e registrados no Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso (LPV-UFMT), entre janeiro de 2006 a dezembro de 2011.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se revisão dos casos de necropsia de felinos, filtrando-se os com diagnóstico de PIF, registrados nos arquivos do LPV-UFMT, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2011. O diagnóstico baseou-se em histórico, exame clínico e avaliação macro e microscópica. Encéfalo, pulmão, coração, fígado, rim e linfonodos, foram coletados, enfatizando locais com alterações macroscópicas. As amostras fixadas em formol a 10% eram rotineiramente processadas para exames histopatológicos.

RESULTADOS

Entre janeiro de 2006 a dezembro de 2011, 103 gatos foram registrados no prontuário de necropsia do LPV-UFMT. Desses, 10 (9,7%) tiveram o diagnóstico de PIF. A idade variou de 4 meses a 6 anos. Oito (80%) eram sem raça definida, um (10%) era persa e outro (10%) era siamês. Seis (60%) eram machos, quatro (40%) eram fêmeas. Oito (80%) conviviam com outros gatos no ambiente, sendo sete oriundos do mesmo gatil. A maioria apresentou emagrecimento progressivo, alguns com distensão abdominal e anorexia; cinco tinham sinais nervosos (ataxia, paresia dos membros e convulsões) e dois tinham diarreia. À necropsia os principais achados foram nódulos puntiformes, ocasionalmente de tamanhos maiores que, por vezes, coalesciam formando placas salientes e irregulares que revestiam as superfícies serosas,

principalmente no omento, peritônio, rim, fígado e pleura visceral. Um dos animais tinha líquido abdominal viscoso de coloração citrina (400 mL), outro tinha líquido peritoneal e torácico (100 mL) de coloração vermelho claro e dois tinham líquido somente na cavidade torácica, sendo um serosanguinolento e outro amarelado.

Microscopicamente, piogranulomas caracterizados por infiltrado predominantemente neutrofílico com macrófagos, linfócitos e, ocasionalmente, células gigantes associados às áreas multifocais de necrose caseosa foram notados em diversos órgãos abdominais. Edema alveolar moderado difuso, deposição de fibrina nos alvéolos e espessamento dos septos alveolares foram vistos. Meningite granulomatosa multifocal moderada foram vistas em quatro gatos que desenvolveram a forma não efusiva e três com efusiva.

DISCUSSÃO

O diagnóstico de PIF em gatos domésticos foi baseado em histórico, sinais e alterações morfológicas. A maior incidência de PIF ocorre com idade entre 3 meses a 3 anos, neste estudo 60% dos gatos tinha menos que 2 anos (Brown et al., 2009; Oliveira et al., 2003). Sete dos gatos eram do mesmo gatil, nesses ambientes, a ocorrência de PIF é maior devido ao aumento da contaminação viral pela transmissão fecal-oral (Oliveira et al., 2003). Emagrecimento progressivo e distensão abdominal foram os sinais mais comuns na forma úmida. Na forma seca, as manifestações clínicas dependem dos órgãos afetados não sendo observados sinais clínicos característicos (Oliveira et al., 2003). Sinais nervosos frequentes como paraparesia, ataxia, hiperestesia toracolombar, nistagmo, mudanças no comportamento e outros são mais frequentes na forma seca, e mesmo na ausência destes pode haver lesões microscópicas inflamatórias no SNC (Oliveira et al., 2003). Três dos gatos com sinais nervosos tiveram meningite piogranulomatosa.

CONCLUSÃO

Os sinais clínicos não são específicos e os testes laboratoriais indicam que o gato pode ser portador do Coronavírus associado à PIF, portanto a caracterização morfológica da lesão é fundamental para o diagnóstico. O diagnóstico presuntivo pode ser feito através da avaliação do histórico, achados clínicos, resultados laboratoriais e exclusão de doenças semelhantes (Barker, 1993).

REFERÊNCIAS

BARKER, I.K. The peritoneum and retroperitoneum. In: JUBB, K.V.F.; KENNEDY, P.C.; PALMER, N. Pathology of domestic animals. San Diego : Academic, 1993. V.2. Cap.4, p.425-445.

BROWN, M.A.; TROYER, J.L.; PECON-SLATERRY, J. et al. Genetics and Pathogenesis of Feline Infectious Peritonitis. **Emerging Infectious Diseases** Vol. 15, No. 9, 1445 – 1452pag, 2009.

KIPAR, A.; MELI, M.L.; BAPTISTE, K.E. et al. Sites of feline coronavirus persistence in healthy cats. **Journal of General Virology** , 91, 1698–1707, 2010.

OLIVEIRA, F.N.; RAFFI, M.B.; SOUZA, T.M. et al. Peritonite infecciosa felina: 13 casos. *Ciência Rural*, Santa Maria, v.33, n.5, p.905-911, set-out , 2003.

SHARIF, S.; ARSHAD, S.S.; HAIR-BEJO. M. et al. Diagnostic Methods for Feline Coronavirus: A Review. **Veterinary Medicine International**, p.1-7, 2010.

045. LOXOSCELISMO SISTÊMICO EM CÃO – RELATO DE CASO

Stephanie Elise Muniz Tavares Branco¹, Marília Martins Melo¹, Silvia de Araújo França¹, Rubens Antônio Caneiro¹, Silvia Trindade Pereira¹,
Fernanda Figueiredo Garcia¹

1- Universidade Federal de Minas Gerais. Email: stephbranco@yahoo.com

RESUMO

O quadro clínico desenvolvido em indivíduos picados por aranhas *Loxosceles* é conhecido como loxoscelismo, podendo se manifestar sob a forma cutânea ou sistêmica. Este trabalho relata um caso de loxoscelismo sistêmico em cão em Belo Horizonte, o qual foi diagnosticado com base na associação da apresentação clínica e dos exames complementares característicos.

PALAVRAS-CHAVE: *Loxosceles*, cão, dermonecrose

SYSTEMIC LOXOSCELISM IN DOG – CASE REPORT

ABSTRACT

Loxoscelism is the name given to the clinical manifestation presented by individuals bitten by *Loxosceles* spiders. It may occur as the cutaneous or the systemic form. This paper reports a case of systemic loxoscelism in a dog in Belo Horizonte, diagnosed based on classic clinical presentation and laboratory tests.

KEYWORDS: *Loxosceles*, dog, dermonecrosis

REVISÃO DE LITERATURA

Loxoscelismo é o quadro de manifestações clínicas típicas desenvolvido em indivíduos picados por aranha do gênero *Loxosceles* (Funasa, 2001). Seu veneno apresenta efeito necrotóxico, vasoconstritor e trombótico, levando ao rompimento de membranas endoteliais, hemácias e plaquetas. Pode se manifestar de duas formas clínicas, a cutânea (mais freqüente) e a cutâneo-visceral, conhecida como sistêmica.

Na cutânea ocorre, no local da picada, presença de eritema, equimose, edema e, posteriormente, necrose. A lesão clássica, conhecida como placa marmórea, caracteriza-se pelo centro necrótico circundado por anel isquêmico esbranquiçado em um fundo eritematoso. Na sistêmica, pode ocorrer, também, anemia hemolítica aguda, trombocitopenia e neutropenia intensas, aumento nos níveis de uréia e creatinina, alteração em coagulograma e febre (Funasa, 2001; Malaque et al., 2002; Silva et al.,

2004; Sakate, 2008; Machado et al., 2009). A trombocitopenia e neutropenia intensas ocorrem pela migração extensa de plaquetas e neutrófilos para a lesão necrótica tecidual (Silva et al., 2004). Na necropsia, observa-se necrose no local da picada e nas áreas adjacentes, congestão e hemorragia generalizadas, principalmente nos rins (Sakate, 2008). Histologicamente, se observa extensa necrose, deposição de fibrina e trombose nos vasos sanguíneos dérmicos, degeneração da parede dos vasos sanguíneos, infiltração e agregação de células inflamatórias e hemorragia massiva. O diagnóstico, na maioria dos casos, é baseado no histórico e achados clínicos, uma vez que não há testes laboratoriais ou sorológicos diagnósticos facilmente disponíveis. Em caso de dúvida, recomenda-se biópsia da pele lesionada (Silva et al., 2004).

DESCRIÇÃO DO CASO

Cão da raça Poodle foi recebido com histórico de apatia, hiporexia e ferida em membro torácico direito (MTD) há uma semana. Apresentava mucosas pálidas, petéquias nas mucosas e pele, e temperatura retal de 40° C. A ferida apresentava área central de necrose, envolta por halo eritematoso, de aspecto marmóreo. O hemograma demonstrou anemia (VG= 12%), leucopenia (400 céls/ μ L) e trombocitopenia (2000 plaquetas/ μ L) intensas. Foi observado aumento nos níveis de amilase e uréia, e tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA) discretamente aumentado. Após quatro dias de tratamento (fluidoterapia, limpeza da ferida, antibioticoterapia e transfusão sanguínea), o animal foi a óbito. Durante a necropsia, observou-se mucosas pálidas, múltiplas áreas de equimose, extensa necrose muscular hemorrágica no MTD, presença de fibrina em toda a cavidade abdominal, congestão, hemorragia e edema generalizados. À avaliação histológica, foram observados nefrite intersticial linfocitária e degeneração tubular, espaço glomerular com moderada quantidade de fibrina, dermatite e paniculite necro-fibrinosa intensa neutrofílica aguda com inúmeros grumos bacterianos (bacilos), miosite necrotizante e fibrino-hemorrágica neutrofílica com formação de trombos, intensa congestão hepática e acúmulo de fibrina peri-vascular e peri-bronquiolar.

DISCUSSÃO

O diagnóstico de loxoscelismo frequentemente é baseado na epidemiologia, anamnese, sinais clínicos e exames complementares (Machado et al, 2004). No presente caso, a associação dos achados clínicos, hematológicos, histopatológicos e necroscópicos levou ao diagnóstico presuntivo. A lesão no MTD, com centro necrótico circundado por halo hemorrágico, condiz com o descrito na literatura (Funasa, 2001),

assim como a sua localização, uma vez que picadas nas extremidades são mais comuns (Silva et al., 2004). As alterações hematológicas, caracterizadas por anemia hemolítica, trombocitopenia e neutropenia intensas, aumento no nível de uréia e TTPA prolongado, também condizem com o esperado no loxoscelismo, assim como os achados necroscópicos (Funasa, 2001; Silva et al., 2004; Sakate, 2008; Machado et al, 2009). Segundo Silva et al. (2004), pode-se observar na histopatologia, necrose, deposição de fibrina intravascular e infiltrado celular, principalmente de polimorfonucleares, dermatite e paniculite necrotizante difusa, como foi observado neste relato. O efeito nefrotóxico direto sugerido pode justificar as alterações renais encontradas. Os grumos bacterianos encontrados podem ser associados à inoculação de bactérias no momento da picada.

CONCLUSÃO

Casos de loxoscelismo estão cada vez mais presentes em veterinária, porém muitas vezes não são diagnosticados. É importante conhecer todos os aspectos que envolvem a afecção para que diagnóstico presuntivo possa ocorrer.

REFERÊNCIAS

- FUNASA. **Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos**. Brasília: Assessoria de Comunicação e Educação em Saúde – Fundação Nacional de Saúde, 2001. P.45-56.
- MACHADO, L.H.A., ANTUNES, M.I.P.P., MAZINI, A.M. et al. Necrotic Skin Lesion in a Dog Attributed to *Loxosceles* (Brown Spider) Bite: A Case Report. **Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases**. V.15, n.3, p.572-581, 2009.
- MALAUQUE, C.M.S., CASTRO-VALENCIA, J.E., CARDOSO, et al. Clinical and Epidemiological Features of Definitive and Presumed Loxoscelism in São Paulo, Brazil. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v.44, n.3, p.139-143, 2002.
- SAKATE, MICHIKO. Zootoxinas. In: SPINOSA, H.S., GÓRNIK, S.L., PALERMONETO, J. **Toxicologia Aplicada à Medicina Veterinária**. Barueri: Editora Manole, 2008, capítulo 8, p.240-242.
- SILVA, P.H., SILVEIRA, R.B., APPEL, M.H., MANGILI, O.C., GREMSKI, W. Brown spiders and loxoscelism. **Toxicon**, v.44, p.693-709, 2004.

46. MIELOMA MÚLTIPLO COM ENVOLVIMENTO DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL EM UM CÃO: RELATO DE CASO

Alexandre Mazzanti³; Amanda o. Andrades¹; Graciane Aiello¹; Rosmarini P. dos Santos¹; AngelRipplinger²; Verônica Weber²

¹Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Centro de Ciências Rurais (CCR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

²Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária, CCR, UFSM.

³Professor Dr., Departamento de Clínica de Pequenos Animais, CCR, UFSM.

RESUMO

O mieloma múltiplo é uma neoplasia rara em cães, cujo quadro clínico é bastante variável dependendo do sistema mais prejudicado pelo crescimento das células neoplásicas. O diagnóstico é estabelecido com a combinação de achados de radiografias, exames laboratoriais e achados da patologia. O presente trabalho relata a ocorrência de mieloma múltiplo provocando sinais de envolvimento do sistema nervoso central em um labrador de 13 anos de idade.

PALAVRAS-CHAVES neoplasia, compressão medular, paraplegia

MULTIPLE MYELOMA WITH CENTRAL NERVOUS SYSTEM INVOLVEMENT IN A DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

Multiple myeloma is an uncommon canine malignant neoplasm and the clinical signs depend to the most affected system. The diagnosis is based on a combination of radiological, laboratory and pathological findings. This paper describes a case report of multiple myeloma involving the central nervous system in a labrador *retriever* of 13 years old.

KEYWORDS: neoplasm, spinal cord compression, paraplegia

INTRODUÇÃO

O mieloma múltiplo (MM) é uma proliferação sistêmica de plasmócitos malignos que geralmente envolve vários sítios da medula óssea. Em cães, o MM é um tumor maligno que compreende menos de 1% de todas as neoplasias. Não há predileção por sexo ou raça, ocorrendo mais comumente em animais idosos. As complicações associadas com o MM são numerosas, entre elas pode-se citar a síndrome da hiperviscosidade sanguínea, hipercalcemia, diátese hemorrágica, doença renal, lesões

ósseas associadas à dor ou compressão da medula espinhal. Os relatos desse neoplasma provocando compressão medular são pouco frequentes. Diante disso, o objetivo deste trabalho é relatar a compressão medular e os sinais clínicos provocados por MM em um cão.

RELATO DE CASO

Foi atendido, no Hospital Veterinário da Instituição, um Labrador, macho, 13 anos de idade, com histórico de perda progressiva dos movimentos nos membros pélvicos. No exame neurológico foi verificado paraplegia, reações posturais ausentes nos membros pélvicos (MP), reflexos segmentares espinhais normais e **ausência de dor profunda** nos MP, e hiperestesia espinhal da segunda até a quinta vértebra lombar. O hemograma revelou anemia normocítica normocrômica e proteínas plasmáticas aumentadas. A eletroforese de proteínas revelou um pico de γ globulina (2,58g/dL). Na incidência radiográfica lateral de coluna toraco-lombar foi observado lise e proliferação óssea nas vértebras lombares L3 e L6, sugestivo de neoplasia. Em função dos graves sinais neurológicos e do prognóstico desfavorável, o proprietário optou pela eutanásia. A necropsia revelou proliferação óssea nas vértebras L3-L6 e uma massa tumoral adjacente a sétima vértebra torácica comprimido severamente a medula espinhal (ME). Microscopicamente a ME desta região apresentava degeneração Walleriana acentuada e focalmente extensa. As células neoplásicas confirmaram o diagnóstico de MM.

DISCUSSÃO

Os sinais clínicos do MM geralmente são inespecíficos e variáveis (Santana et al., 2008). Os sinais neurológicos, como no presente relato, são relacionados à compressão extradural da ME, resultado da extensão do neoplasma no corpo vertebral. Este sinal pode ser evidenciado pelo exame mielográfico (Matus e Leifer, 1985). Os critérios de diagnóstico em cães incluem a presença de pelo menos duas das características a seguir: gamopatia monoclonal na eletroforese das proteínas séricas, proteinúria de Bence Jones, lesões ósseas osteolíticas ou osteoporose e, plasmocitose na medula óssea (Matus e Leifer, 1985). Algumas análises laboratoriais são importantes em animais com suspeitas de MM, dentre elas hemograma, perfil bioquímico sérico, bioquímica da urina, eletroforese de proteínas do soro e da urina, e citoscópica da medula óssea (Santana et al., 2008). A eletroforese de proteínas séricas revela picos monoclonais na região equivalente a β -globulina quando a paraproteína é do tipo IgA e, na região equivalente a γ -globulina quando a paraproteína é do tipo IgG

(Giraudel et al., 2002), assim, podemos dizer que o tumor aqui relatado provavelmente é produtor de IgG. O tratamento do MM tem como alvos as células neoplásicas. A terapia quimioterápica inicial é eficaz na diminuição da quantidade de células neoplásicas, nos níveis de imunoglobulinas séricas e no alívio da dor (Santana et al., 2008).

CONCLUSÃO

O aumento das proteínas séricas associado a sinais radiográficos de lise e proliferação óssea devem sempre ser cuidadosamente investigados, inclusive com uso de outros métodos complementares de diagnóstico como eletroforese das proteínas séricas e também da urina, dosagem de cálcio, além de investigação da função renal, já que costuma ser uma das principais complicações dessa neoplasia.

O diagnóstico precoce é imprescindível para aumentar o tempo e a qualidade de vida dos pacientes com mieloma múltiplo.

REFERÊNCIAS

- GIRAUDEL J.M., PAGÈS J.P., GUELFY J.F. Monoclonal gammopathies in the dog: a retrospective study of 18 cases (1986-1999) and literature review. ***Journal of the American Animal Hospital Association***, v. 38, p. 135-147, 2002.
- MATUS, R.E.; LEIFER, C.E. Immunoglobulin-producing tumors. ***Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice***, v. 15, p. 741-753, 1985.
- SANTANA, A.E.; SEKI, M.C.; GAMA, F.G.V. et al. **Neoplasias do sangue e dos órgãos formadores do sangue**. In: DALECK, C.R.; DE NARDI, A.B.; RODASKI, S., editores. *Oncologia em Cães e Gatos*. São Paulo: Roca, 2008, Cap. 32, p. 507-524.

047. OCORRÊNCIA DE MICROFILAREMIA NA ROTINA MEDICA DO LABORATÓRIO DE ANALISE CLINICA-ESTUDO DE CASO

Orrana Targino Galamba Fernandes¹, Telga Lucena Alves Craveiro de Almeida¹,
Marília de Albuquerque Bonelli¹, Liliane Batista de Lira¹, Mirian Nogueira Texeira¹,
Simone Gutman Vaz¹

1- Universidade Federal Rural de Pernambuco-ranagalamba@hotmail.com

RESUMO

O Laboratório de patologia clínica realiza uma média de 800 hemogramas mensais, não sendo relatada nos últimos anos a presença de microfilárias, porém nos meses de Setembro e Outubro de 2011, foram identificados ocasionalmente cinco casos de microfilaremia através do esfregaço sanguíneo. Os resultados dos hemogramas destes animais, revelaram anemia, eosinofilia, e trombocitopenia. Sendo o Recife uma cidade cujas condições são muito favoráveis à transmissão da infecção, torna-se preciso que o conhecimento dessa zoonose aumente, devido aos casos esporádicos e assintomáticos diagnosticados nos últimos meses. Conclui-se que é necessário novos estudos sobre a incidência da Dirofilariose no Estado de Pernambuco, bem como a identificação das espécies de filarídeos envolvidos.

PALAVRAS-CHAVES Microfilária, zoonose, Dirofilaria

PRESENCE OF MICRO-FILAREMIA IN THE DAILY ROUTINE OF THE CLINICAL ANALYSIS LABORATORY – CASE REPORT

ABSTRACT

The Clinical Pathology Laboratory handles an average of 800 monthly hemograms. During the last years, there were no reports of microfilariae, though in the months of September and October of 2011, five cases were identified through blood smear. The results of the blood exams showed anemia, eosinophilia, and thrombocitopenia. Recife is a city which offers favorable conditions for transmission, thus it is paramount that knowledge of this zoonosis is furthered, due to its sporadic and asymptomatic cases diagnosed in the last months. We conclude that new studies are necessary on the occurrence of dirofilariasis in the state of Pernambuco, as well as for identifying the filarial species involved.

PALAVRAS-CHAVES Microfilaria, zoonosis, Dirofilaria

INTRODUÇÃO

A dirofilariose é uma zoonose transmitida por mosquitos hematófagos. Seus hospedeiros naturais são canídeos e felídeos domésticos e selvagens. Nesses hospedeiros naturais, o período pré-patente é de, no mínimo, seis meses (ACHA et al., 1989).

O diagnóstico pode ser direto, pesquisando-se a presença do parasito, ou indireto, empregando-se testes sorológicos para detecção de anticorpos. Segundo URQUHART (1996) o diagnóstico “baseia-se nos sinais clínicos de disfunção cardiovascular e na demonstração das microfílarias no sangue”. A doença pode se apresentar de forma assintomática em casos onde não há infecções maciças (LABARTHE, 2009). Para a pesquisa de microfílarias de *D. immitis* na circulação, utiliza-se o método de filtração, o método direto (gota espessa) ou o de concentração: técnicas de Knott (ALMOSNY, 2002). Objetivou-se relatar a ocorrência casual de microfilaremia em cinco cães atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco.

MATERIAL E MÉTODOS

A partir dos hemogramas realizados no serviço de rotina do hospital foram diagnosticados acidentalmente, cinco casos de microfilaremia no período de noês de setembro a outubro. Para efeito de visualização foi realizado exame direto (gota espessa). O hemograma foi realizado com o auxílio de contador automático Sysmex Poch 100 iV e a contagem de plaquetas através do método indireto no esfregaço sanguíneo (COLES, 1984). A contagem diferencial leucocitária bem como as observações das alterações morfológicas foi realizada em esfregaço sanguíneo corado pelo corante panótico (Newprov, Paraná, Brasil).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Laboratório de patologia clínica realiza uma média de 800 hemogramas mensais, não sendo relatada nos últimos anos a presença de microfílarias, o que chama atenção para a ocorrência de casos nos últimos dois meses, onde foram encontrados ocasionalmente microfílarias no hemograma de cinco animais.

Os resultados dos hemogramas destes animais revelaram-se compatíveis com as alterações mais comumente achadas nos hemogramas: anemia, eosinofilia, e trombocitopenia, como cita Almosny, 2002. Em um estudo realizado por Labarthe et al. (2003) sobre a prevalência sorológica de *Dirofilaria immitis*, *Ehrlichia canis* e *Borrelia burgdorferi* no Brasil, dos 105 cães residentes em Recife testados para *Dirofilaria*

immitis nenhuma animal revelou positividade. Isso nos mostra que está havendo um provável aumento no número de casos no Recife, uma vez que foram encontrados ocasionalmente esses cinco casos.

Sendo o Recife uma cidade cujas condições são muito favoráveis à transmissão da infecção e tendo em vista a ampla distribuição geográfica dos mosquitos transmissores dessa parasitose, é preciso que o conhecimento dessa zoonose aumente, devido aos casos esporádicos e assintomáticos diagnosticados nos últimos meses. Por se tratar de uma zoonose (SILVA E LANGONI, 2009) a dirofilariose merece atenção.

Conclui-se que são necessários novos estudos sobre a incidência da Dirofilariose no Estado de Pernambuco, bem como a identificação das espécies de filarídeos envolvidos.

REFERÊNCIAS

- ACHA, P.N.; SZYFRES, B. **Zoonoses and communicable diseases common to man and animals**. 2.ed. Washington : Pan American Health Organization, **Zoonotic Filariases**. p.852-60, 1989.
- ALMOSNY, Nádia R. P. Hemoparasitoses em pequenos animais domésticos e como zoonoses. 1. ed. Rio de Janeiro: L.F. Livros de Veterinária Ltda. p.112-126, 2002.
- COLES, E. H. Patologia Clínica Veterinária. 3 ed. São Paulo: Manole. 1984. p. 5-10
- LABARTHE, N. V. As filárias estão de volta. Prepare-se! **Revista Nosso Clínico**, São Paulo, ano 12, n. 68, p. 52, mar./abr. 2009.
- SILVA, RC; LANGONI, H. Dirofilariose. Zoonose emergente negligenciada. **Ciência Rural, Santa Maria, Online**. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cr/2009nahead/a168cr554.pdf>. Acessado em: 15 de out de 2011.
- URQUHART, G. M.; ARMOUR, J.; DUNCAN, J. L.; DUNN, A. M.; JENNINGS, F. W. Parasitologia Veterinária, 2ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. p. 77-79.

048. PESQUISA DE AGROTÓXICOS EM PRIMATAS NÃO-HUMANOS PARA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA FEBRE AMARELA DURANTE O PERÍODO DE 2009 A 2011

Marília Martins Melo*, Lilian de Paula Gonçalves Reis, Mailson da Silva Teixeira,
Manuela Bamberg Andrade; Júlio César Cambraia Veadó.

Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Veterinária, Depto de Clínica,
Laboratório de Toxicologia; * autor para correspondência: mariliamm@ufmg.br

RESUMO

Nos anos de 2009 a 2011, vários casos de Febre Amarela ocorreram no país, levando à realização de uma parceria entre a Secretaria de Vigilância da Saúde e a Universidade para realização de exames toxicológicos para o diagnóstico diferencial em primatas não-humanos encontrados doentes ou mortos. Foram pesquisados em 36 estômagos de primatas da espécie *Callithrix penicillata*, diferentes classes de agrotóxicos tais como, organoclorados, organofosforados, clorofosforados, piretróides, carbamatos e rodenticidas anticoagulantes pela técnica de Cromatografia em Camada Delgada. Em 41,67% dos animais foram detectados piretróides. Estes resultados podem ser decorrentes da larga utilização desses produtos em lavouras e nos animais domésticos. Ressalta-se a importância do diagnóstico diferencial entre intoxicações e casos de Febre Amarela, por questões de saúde pública para a adoção de medidas preventivas tanto na transmissão de doenças ou no uso indiscriminado de agrotóxicos como os piretróides.

PALAVRAS-CHAVE: Primatas não-humanos, Intoxicações, Piretróides

RESEARCH OF PESTICIDES IN NON-HUMAN PRIMATES FOR DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF YELLOW FEVER DURING THE PERIOD OF 2009 TO 2011

Abstract

During the years of 2009 to 2011, several cases of Yellow Fever were reported in Brazil. Its occurrence led to the realization of a partnership between the Health Surveillance Secretary and the University, in order to conduct a toxicological examination aiming a differential diagnosis in non-human primates that were found sick or dead. It was researched different classes of pesticides (organochlorines, organophosphates, chlorophosphates, pyrethroids, carbamates, and coumarins) by Thin Layer Chromatography in 36 stomachs of primates, *Callithrix penicillata*. In 41.67% of the

animals analyzed it was detected pyrethroids. These results may be due to the wide usage of pyrethroids in the livestock. Therefore, concerning the public health issues, the importance of a differential diagnosis between poisoning and cases of Yellow Fever must be highlighted, in order to adopt the correct preventive measures, not only in the transmission of diseases, but also in the indiscriminate use of pesticides.

KEYWORDS: non-human primates, poisoning, pyrethroids

INTRODUÇÃO

A febre amarela ainda gera grande preocupação para as autoridades públicas e, alguns estados do Brasil são considerados áreas epizoóticas, devido à ocorrência de casos humanos da doença. A infecção do ser humano não imunizado ocorre pelo contato acidental com hospedeiros ou vetores, sendo todos os gêneros de primatas não-humanos neotropicais susceptíveis ao vírus. O objetivo deste trabalho foi a realização do diagnóstico diferencial da Febre Amarela com intoxicações causadas por agrotóxicos, em um programa de vigilância de epizootias, em ambiente silvestre, em primatas não-humanos.

MATERIAL E MÉTODOS

No total, o laboratório de Toxicologia Veterinária recebeu 36 amostras (estômagos e conteúdos estomacais) de espécies diferentes de primatas, com predominância da espécie *Callithrix penicillata*, para realização de exames toxicológicos, o que envolveu a pesquisa de organoclorados, organofosforados, clorofosforados, piretroides, carbamatos e rodenticidas anticoagulantes, utilizando-se a técnica de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) com limite de detecção acima de 1mg.kg^{-1} (Queiroz et al., 2001).

RESULTADOS

Dos 36 animais, 41,67% tiveram resultados positivos, sendo que em todos (100%) foram detectados piretróides (cipermetrina, deltametrina e permetrina). Os animais mais acometidos foram da espécie *Callithrix penicillata*, popularmente conhecidos como “mico-estrela”.

DISCUSSÃO

Os piretróides apesar de possuírem baixo poder residual, serem rapidamente absorvidos e excretados podem causar intoxicações. Sua ação tóxica é consequência do fechamento lento dos canais de sódio da membrana neuronal e inibição do fluxo de

íon cloro dependente do receptor do GABA, provocando alterações no sistema nervoso central e periférico, além da musculatura resultando em um quadro clínico característico de alterações nervosas (Valentine, 1990; Hansen et al., 1994). Existe no mercado uma grande variedade desses produtos, com indicação de aplicação agrícola, como praguicidas ou herbicidas, de aplicação veterinária ou até mesmo domiciliar, o que facilita seu uso. A mortalidade dos animais pode ser explicada pela utilização desses produtos em lavouras, nos animais domésticos ou até mesmo de forma criminosa. A espécie mais acometida dentre as analisadas foi a *Callithrix penicillata*, popularmente conhecida como “mico-estrela”. Originários de regiões de cerrado, caatinga e mata atlântica, os micos tornaram-se invasores nas áreas urbanas de muitas cidades, acostumando-se facilmente à presença humana e transformando-se em alvos fáceis de intoxicações criminosas, principalmente, quando se sabe que esses animais podem ser transmissores de zoonoses importantes, tais como a febre amarela, a raiva, a hepatite e o herpesvirus.

CONCLUSÕES

Devido à importância do controle epidemiológico de doenças como a Febre Amarela, a realização de diagnóstico diferencial com pesticidas se faz importante. Foram detectados piretróides nos primatas pesquisados, o que reforça a importância de seu uso consciente. A presença desses animais nos centros urbanos facilita a ocorrência de intoxicações criminosas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HANSEN, S.R.; STEMME, K.A.; VILLAR D. et al. Pyrethrins and pyrethroids in dogs and cats. **The Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian**, v.16, n.6, p.707–711, 1994.
- QUEIROZ, S.C.N.; COLLINS, C.H.; JARDIM, I.C.S.F. Métodos de extração e/ou concentração de compostos encontrados em fluidos biológicos para posterior determinação cromatográfica. **Química Nova**, v.24, n.1, p.68-76, 2001.
- VALENTINE, W.M. Pyrethrin and pyrethroid insecticides. **The Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice**, v.20, n.2, p.375–382, 1990.

049. RECUPERAÇÃO FUNCIONAL EM CÃES COM DOENÇA DO DISCO INTERVERTEBRAL SEM PERCEPÇÃO À DOR PROFUNDA: 37 CASOS

Rosmarini Passos dos Santos¹, Alexandre Mazzanti², Amanda Oliveira Andrades¹,
Diego Vilibaldo Beckmann¹, Graciane Aiello¹,
Josiane de Oliveira Marques³

¹Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Santa Maria, RS.

²Departamento de Clínica de Pequenos Animais, CCR, UFSM, Santa Maria, RS.

³Curso de Medicina Veterinária, CCR, UFSM, Santa Maria, RS.

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar a recuperação funcional de cães com diagnóstico de doença do disco intervertebral (DDIV) toracolombar, sem percepção da dor profunda superior a 48 horas e não submetidos ao tratamento cirúrgico. Foi observada recuperação funcional em 11 cães (55%), sendo seis deles entre 30 e 60 dias após o início dos sinais clínicos. Pode-se concluir que a recuperação funcional pode ser satisfatória e são necessários no mínimo 30 dias do início dos sinais clínicos para estabelecer um prognóstico quanto ao retorno dos movimentos voluntários.

PALAVRAS-CHAVES Paraplegia, recuperação funcional, neurologia, cão

FUNCTIONAL RECOVERY IN DOGS WITH INTERVERTEBRAL DISK DISEASE WITHOUT DEEP PAIN PERCEPTION: 37 CASES

ABSTRACT

The purpose of this study was evaluate functional recovery in 37 cases with diagnostic of thoracolumbar intervertebral disk disease in dogs without deep pain perception (more than 48 hours) and not underwent to surgical treatment from 2002 to 2010. A satisfactory functional recovery was observed in 11 dogs (55%), greater part between 30-60 days after began of clinics signal (6 dogs). Two of 11 dogs with satisfactory functional recovery not recovered deep pain perception. The results showed that dogs are capable of recover satisfactory functional and should be waited 30 days of clinics signal's began to establish a prognostic about recover of voluntaries movements.

KEYWORDS Paraplegia, functional recovery, neurology, dog.

INTRODUÇÃO

O tratamento clínico para DDIV é recomendado aos pacientes somente com hiperestesia ou com deficiências neurológicas discretas. Vários artigos têm demonstrado a recuperação funcional (RF) de cães com DDIV sem percepção da DP com duração igual ou superior a 48 horas, submetidos ao tratamento cirúrgico. Porém, a literatura é escassa quanto aos resultados encontrados em cães sem percepção à DP superior a 48 horas e não submetidos ao tratamento cirúrgico. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a recuperação funcional (RF) de cães atendidos no Hospital Veterinário Universitário (HVU), da instituição, entre os anos de 2002 e 2010, apresentando diagnóstico de DDIV toracolombar sem percepção à DP superior a 48 horas e não submetidos ao tratamento cirúrgico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram incluídos cães paraplégicos sem percepção à DP superior à 48 horas e não submetidos ao tratamento cirúrgico. A duração dos sinais clínicos foi definida quando os cães se tornaram paraplégicos sem DP até a RF sendo classificada em <30 dias, entre 30 e 60 dias e >60 dias. A RF foi classificada como satisfatória (RFS) para cães que recuperaram a habilidade de caminhar sem quedas.

RESULTADOS

As raças predominantes foram: Teckel (65%) e cães sem raça definida (18,9%). A idade média foi de 5,9 anos. Quanto ao sexo, 51% eram fêmeas e 49% eram machos. A duração dos sinais clínicos dos cães com RFS foi em média de 104 dias, sendo que 55% recuperaram entre 30 e 60 dias. Foi observado que 55% dos cães recuperaram satisfatoriamente. O retorno da percepção à DP ocorreu em 82% dos cães com RFS. Dois cães (18%) retornaram a deambular sem percepção da DP com sinais clínicos sugestivos de andar espinhal. Em 61,5% dos cães submetidos à eutanásia, os procedimentos ocorreram em um tempo inferior a 30 dias do início dos sinais clínicos e por determinação dos proprietários. Por outro lado, 55% das RFS ocorreram entre 30 e 60 dias. Portanto, estes resultados demonstram que outros cães poderiam ter recuperado a sua função neurológica, caso fosse esperado no mínimo um mês do início dos sinais clínicos.

DISCUSSÃO

O tempo de RF foi semelhante ao tempo encontrado para cães tratados cirurgicamente após 48h sem percepção à DP (Scott e McKee, 1999, Olby et al., 2003,

Arias et al., 2007), sugerindo um prognóstico semelhante entre eles em relação a RFS. A maioria dos pacientes recuperou em até 30 dias, o que sugere aguardar no mínimo 30 dias para se emitir prognóstico. Os procedimentos de eutanásia ocorreram em menos de 30 dias, tempo inferior ao da maioria das RFS. Estes resultados demonstram que outros cães poderiam ter recuperado a sua função neurológica, se esperado no mínimo um mês do início dos sinais clínicos.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que cães com diagnóstico DDIV paraplégicos e sem percepção à DP superior a 48 horas, não submetidos ao TCIR podem apresentar RFS sendo necessário esperar no mínimo 30 dias do início dos sinais clínicos para estabelecer um prognóstico quanto ao retorno dos movimentos voluntários.

REFERÊNCIAS

ARIAS, M.V.B.; NISHIOKA, C.M.; GARCIA, C.O. et al. Avaliação dos resultados clínicos após cirurgia descompressiva em cães com doença do disco intervertebral. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 59, p.1445-1450, 2007.

OLBY, N.; LEVINE, J.; HARRIS, T. et al. Long-term functional outcome of dogs with severe injuries of the thoracolumbar spinal cord: 87 cases (1996-2001). **Journal of the American Veterinary Medical Association**, v. 222, p.762-769, 2003.

SCOTT, H.W.; MCKEE, W.M. Laminectomy for 34 dogs with thoracolumbar intervertebral disc disease and loss of deep pain perception. **Journal of Small Animal Practice**, v. 40, p.417-422, 1999.

050. SÍNDROME DE HORNER SECUNDÁRIA À FIBROSSARCOMA SUBCUTÂNEO CERVICAL – RELATO DE CASO

Bernardo de Caro Martins¹, Bruno Benetti Junta Torres^{1,2}, Guilherme de Caro Martins¹, Milene Alvarenga Rachid¹, Eliane de Melo Gonçalves¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais. Email: bernardodcmartins@hotmail.com

² Universidade Federal de Lavras

RESUMO

A síndrome de Horner representa um conjunto de sinais clínicos devido à lesão da via simpática do olho e anexos. Pode ocorrer secundariamente a vários distúrbios, incluindo compressão de fibras neuronais pré-ganglionares por neoplasias em região cervical ventral. Objetiva-se relatar o caso de um cão com síndrome de Horner adquirida, devido à compressão da inervação simpática pré-ganglionar por fibrossarcoma em região cervical.

PALAVRAS-CHAVE: síndrome de Horner, fibrossarcoma, cão

HORNER'S SYNDROME SECONDARY TO SUBCUTANEOUS CERVICAL FIBROSARCOMA – A CASE REPORT

ABSTRACT

Horner's syndrome is a set of clinical signs resulting from damage of the sympathetic pathway of the eye and adnexal. It may occur secondary to several disorders including compression of the preganglionic fibers by ventral cervical neoplasia. The aim of this report is to describe a case of a dog with acquired Horner's syndrome due to compression of the preganglionic sympathetic innervation by fibrosarcoma in the cervical area.

KEYWORDS: Horner's syndrome, fibrosarcoma, dog

INTRODUÇÃO

A síndrome de Horner representa um conjunto de sinais clínicos que resulta da disfunção da inervação simpática ocular e de seus anexos. Caracteriza-se por miose, ptose palpebral superior, enoftalmia e protrusão da terceira pálpebra (Viott et al., 2010). Pode ser de origem congênita ou adquirida, e na maioria dos casos a etiologia é desconhecida. As causas adquiridas podem estar relacionadas a traumas crânio-encefálico, cervical ou torácico, otite média e interna, avulsão do plexo braquial, discopatia cervical e neoplasias (Boydell, 1998).

O trajeto das fibras simpáticas oculares se origina no hipotálamo e percorre três regiões neuroanatômicas (central, pré-ganglionar e pós-ganglionar) até chegar ao olho.

Uma lesão localizada em qualquer uma dessas regiões pode comprometer a função dos corpos neuronais e de seus prolongamentos, resultando em síndrome de Horner (Viott et al., 2010).

Objetiva-se relatar o caso de um cão com síndrome de Horner adquirida, devido à compressão da inervação simpática pré-ganglionar por fibrossarcoma em região cervical.

RELATO DE CASO

Uma cadela, SRD, de 10 anos de idade, foi atendida com histórico de tosse, hipersalivação, disfagia, regurgitação, dificuldade respiratória, havia 30 dias. Ao exame clínico-neurológico, observaram-se dispnéia inspiratória ruidosa, sialorréia intensa e aumento de volume de consistência firme, bem delimitado, com aproximadamente 6cm de diâmetro, em região cervical ventral esquerda. Notaram-se ptose palpebral superior, enoftalmia, miose puntiforme e protrusão da terceira pálpebra do olho esquerdo. Além disso, foram observadas flacidez de língua, diminuição do reflexo de ameaça e da sensibilidade facial esquerda. O exame hematológico mostrou-se inalterado. O animal apresentou parada cardiorrespiratória e foi a óbito. À necropsopia foram visualizados massa firme, bem delimitada e não infiltrativa, de 6cm em região cervical esquerda, comprimindo a traquéia, esôfago e plexo carotídeo. O exame histopatológico da massa tumoral foi sugestivo de fibrossarcoma.

DISCUSSÃO

A síndrome de Horner é a nomenclatura dada ao grupo de sinais clínicos que resulta da interrupção da inervação simpática para o olho. Esta via é responsável pela manutenção normal de tônus da musculatura lisa periorbital, pálpebras e músculo dilatador da íris. Mantém ainda o posicionamento normal do bulbo ocular, a terceira pálpebra retraída, a pupila parcialmente dilatada e, também, modula a abertura da rima palpebral (Antunes e Borges, 2011). A perda de sua função resulta, portanto, em miose, ptose palpebral superior, enoftalmia e protrusão da terceira pálpebra, como observados no caso ora relatado.

A interrupção da via simpática pré-ganglionar pode resultar de lesões em região cervical, enquanto a da via pós-ganglionar de traumas faciais e otites. Ambas poderão induzir síndrome de Horner ipsilateral. Já a interrupção da região central, além alterar a inervação simpática dos olhos, pode produzir déficits proprioceptivos e motores para os membros (Herrera et al., 1998).

Os axônios dos neurônios pré-ganglionares relacionam-se anatomicamente ao nervo vago e laríngeo recorrente na bainha carotídea, formando o tronco vagossimpático (Antunes e Borges, 2011). Compressão nessa região, além de ocasionar síndrome de Horner, pode resultar em sinais clínicos decorrentes da lesão dos nervos vago e laríngeo recorrente. Tosse, dispnéia inspiratória ruidosa e parada cardiorrespiratória foram observados no caso relatado, e associados à compressão do tronco vagossimpático devido ao fibrossarcoma cervical.

Embora seja uma síndrome clínica frequente, existem poucos relatos dessa afecção secundária à compressão por neoplasias (Boydell, 1998). No caso ora relatado, a ausência dos sinais centrais, as alterações periféricas ipsilaterais secundárias à neoplasia cervical compressiva, sugeriram síndrome de Horner devido à lesão das vias pré-ganglionares.

CONCLUSÃO

A síndrome de Horner é uma condição clínica frequente na prática veterinária associada a várias afecções, seja pelo comprometimento simpático central, pré-ganglionar ou pós-ganglionar da inervação do olho. O prognóstico está relacionado à etiologia. Com isso, um exame clínico minucioso deve ser realizado para que, quando presente, a causa primária seja identificada e, se possível, tratada.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, M.I.P.P.; BORGES, A.S. Síndrome de Horner em cães e gatos. **Veterinária e Zootecnia**, v.18, n.3, p.339-346, 2011.
- BOYDELL, I.P. Horner's syndrome in a puppy. **Journal of Small Animal Practice**, v.39, p.448-449, 1998.
- HERRERA, H.D.; SURANITI, A.P.; KOJUSNER, N.F. Idiopathic Horner's syndrome in collie dogs. **Veterinary Ophthalmology**, v.1, n.1, p.17-20, 1998.
- VIOTT, A.M.; ECOO, R.; SILVA, C.M.O. et al. Horner's syndrome associated with glioblastoma multiforme in a dog. **Brazilian Journal of Veterinary Pathology**, v.3, n.2, p.118-122, 2010.

051. VIABILIDADE DO PLASMA FRESCO CONGELADO CANINO DE ACORDO COM DIFERENTES PERÍODOS DE ESTOCAGEM- RESULTADOS PREVIOS

Ludmila Rodrigues Moroz¹, Heliana Baroni Silveira², Simone Gonçalves³, Lilian Sayuri Tatibana Fujimura⁴, Karin Denise Botteon⁴, Denise Tabacchi Fantoni⁴

¹ Universidade de São Paulo - ludymoroz@usp.br

² Médica Veterinária autônoma de Curitiba, Paraná.

³ Universidade Santo Amaro, São Paulo-SP.

⁴ Universidade de São Paulo.

RESUMO

A utilização do plasma fresco congelado (PFC) tem o intuito de tratar coagulopatias e deficiências protéicas. Estudos para a avaliação da qualidade de armazenamento do PFC na veterinária são escassos apesar da evolução da hemoterapia. Para avaliar a viabilidade das bolsas de PFC foram determinados: tempo de tromboplastina parcial ativada, tempo de protrombina, proteínas totais e albumina em bolsas estocadas em cinco diferentes períodos: até 3 meses, 3-6 meses, 6-9 meses, 9-12 meses entre 12-15 meses, congeladas abaixo de -20°C . Não houve diferença nos parâmetros de acordo com o tempo de armazenamento, sugerindo que o prazo de validade de doze meses após coleta determinado internacionalmente para seu estoque está de acordo com a manutenção de sua viabilidade, podendo ser utilizada com segurança. Entretanto estudos futuros devem ser realizados avaliando fatores de coagulação lábeis como o fator VIII.

PALAVRAS-CHAVE: hemoterapia; medicina transfusional; cães; armazenamento

VIABILITY OF CANINE FRESH FROZEN PLASMA IN ACCORD WITH DIFFERENT PERIOD OF STORE- PREVIEW RESULTS

ABSTRACT

The use of fresh frozen plasma (FFP) has the intent to treat coagulopathies and proteins deficiencies. Studies evaluating the storage quality of FFP on veterinary are in a small number, besides the evolution in hemotherapy. To evaluate the viability of FFP bags activated partial thromboplastine time, prothrombine time, whole protein and albumin were determined on storage bags in five different periods: until 3 months; 3-6 months; 6-9 months; 9-12 months; 12-15 months, freeze below -20°C . There were no differences in relation to the storage time, suggesting that the validity of 12 months is in

accordance with its viability, and can be used with security. Never the less, more studies evaluating labels coagulation factor, as factor VIII, should be done evaluating label blood factors as factor VIII.

KEYWORDS hemotherapy, transfusional medicine; dogs, storage

INTRODUÇÃO

O plasma fresco congelado (PFC) é utilizado na clínica para tratar coagulopatias e para reposição de albumina e outras proteínas. O controle de qualidade do PFC, segundo a RDC 57 (BRASIL, 2010) é realizado por meio da mensuração do tromboplastina parcial ativada (TTPA) e fator VIII, sendo considerado adequado TTPA até 20% acima do valor padrão estabelecido pelo laboratório, e o fator VIII com no mínimo 0,7UI/mL, não existindo valores para albumina e fibrinogênio.

Em bancos de sangue, o PFC pode ficar armazenado por um ano, desde que mantido abaixo de -20°C (BRASIL, 2010). Entretanto, o armazenamento do PFC por um período longo pode reduzir as concentrações de fatores de coagulação e prejudicar parâmetros de coagulação (WARDROP; BROOKS, 2001). Portanto este projeto visou avaliar a qualidade do PFC canino de acordo com tempo de estocagem por meio da dosagem de TTPA, TP, proteínas totais (PT) e albumina.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram mensurados TTPA, TP, PT e albumina de 65 bolsas de PFC de cães estocadas entre -22°C e -30°C, distribuídas em cinco grupos: até 3 meses da coleta (22 bolsas); 3 a 6 meses (9 bolsas); 6 a 9 meses (16 bolsas); 9 a 12 meses (8 bolsas); entre 12 a 15 meses (10 bolsas). Empregou-se ANOVA seguido de teste de Tukey para comparar os grupos ($p < 0,05$). Para análise dos valores de PT selecionou-se um teste não paramétrico (Krusall-Wallis).

RESULTADOS

Não houve diferenças significativas nas variáveis analisadas (Tabela 1).

Tabela 1. Valores de médias de acordo com tempo de estocagem

	MESES				
	3	3-6	6-9	9-12	12-15
TTPA	18 ($\pm 3,5$)	15 ($\pm 2,5$)	17 ($\pm 2,5$)	17 (± 2)	18,5 (± 4)
TP	12,5 (± 4)	10,5 ($\pm 3,5$)	10,5 (± 2)	11 ($\pm 2,5$)	12,5 ($\pm 3,5$)
PT	6,1 ($\pm 0,8$)	5,9 ($\pm 0,4$)	5,9 ($\pm 0,2$)	6,4 ($\pm 0,8$)	5,2 ($\pm 1,1$)
Albumina	2,5 ($\pm 0,3$)	2,6 ($\pm 0,2$)	2,66 ($\pm 0,2$)	2,56 ($\pm 0,4$)	2,29 (0,5)

DISCUSSÃO

Estudos avaliando as alterações nos valores de TTPA e TP realizados em plasma citratado sigficativamente de cães revelam que os valores de TTPA quando congelados em torno de -20°C podem aumentar significtaivamente (IAZBIK *et al.*, 2001; WARDROP; BROOKS, 2001), o que poderia resultar em redução da eficácia terapêutica durante sua estocagem. Neste estudo, não foram observadas tais alterações, entretanto WARDROP e BROOKS, (2001), demonstraram que há redução do fator VIII em PFC canino estocado em temperaturas de -20 e -30C, tornando esta avaliação importante em situações futuras, como no caso de pacientes com hemofilia A.

Os valores de TTPA, em nenhum grupo, excederam 20% o valor padrão do laboratório que é de 16 segundos para PFC pré-estocagem, estando de acordo com as normas de qualidade descritas pela RDC 57 (BRASIL, 2010)

CONCLUSÃO

Não houve diferença nos parâmetros avaliados indicando que o PFC canino estocado por até um ano congelado abaixo de -20°C pode ser utilizado com segurança terapêutica, exceto em pacientes com hemofilia A.

Estudos futuros avaliando fatores lábeis, como o fator VIII devem ser realizados.

REFERÊNCIAS

- BRASIL, M. DA S. RESOLUÇÃO - RDC No 57 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010
Página 1 de 25 RESOLUÇÃO - RDC No 57 , DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010
Legislações - RDC. . [S.l: s.n.]. , 2010
- IAZBIK, C.; COUTO, C. G.; GRAY, T. L.; KOCIBA, G. Effect of storage conditions on hemostatic parameters of canine plasma obtained for transfusion. *American Journal of Veterinary Research*, v. 62, n. 5, p. 734-5, maio 2001.
- WARDROP, K. J.; BROOKS, M. B. Stability of Hemostatic Proteins in Canine Fresh Frozen Plasma Units. *Veterinary Clinical Pathology*, v. 30, n. 2, p. 91-95, 2001.

052. ACURÁCIA DO EXAME CITOPATOLÓGICO NO DIAGNÓSTICO DA ESPOROTRICOSE FELINA

Jéssica Nunes Silva¹, Sônia Lambert Passos¹, Amanda Akemi Braga Kitada¹, Isabella Dib Gremião¹, Tânia Maria Pacheco Schubach¹ & Sandro Antonio Pereira¹.

¹Laboratório de Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses em Animais Domésticos, Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas / Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – sandro.pereira@ipecc.fiocruz.br

RESUMO

A esporotricose é causada pelo fungo *Sporothrix schenckii*. O diagnóstico definitivo é obtido a partir do isolamento em cultura, entretanto, o exame citopatológico é utilizado frequentemente no diagnóstico de casos felinos sem que os parâmetros de acurácia estejam estabelecidos. O objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia do exame citopatológico no diagnóstico da esporotricose felina. Foi realizado um estudo diagnóstico seccional mascarado no qual foram incluídos 244 gatos. A sensibilidade do exame citopatológico foi 84,9% e a especificidade foi 57,9%. Os valores preditivos (positivo e negativo), as razões de verossimilhança (positiva e negativa) e a acurácia foram respectivamente: 86,0%; 24,4%; 2,02; 0,26 e 82,8%. O exame citopatológico mostrou-se um método sensível, rápido e prático que deve ser utilizado no diagnóstico da esporotricose felina.

PALAVRAS-CHAVE: *Sporothrix schenckii*, diagnóstico, gato.

CYTOPATHOLOGICAL EXAMINATION ACCURACY IN FELINE SPOROTRICHOSIS DIAGNOSIS

ABSTRACT

Sporotrichosis is caused by *Sporothrix schenckii*. The definitive diagnosis is obtained from the isolation in culture. However, the cytopathologic examination is often used in the diagnostic of feline cases without the parameters of accuracy established. The aim of this study was to evaluate the accuracy of the cytopathological examination in the diagnosis of feline sporotrichosis. We conducted a masked sectional diagnostic study which included 244 cats. The sensitivity of the test was 84.9% and the specificity 57.9%. Predictive values (+/-), likelihood ratios (+/-) and accuracy were respectively: 86.0%, 24.4%, 2.02, 0.26 and 82.8%. We conclude that the cytopathological examination is a sensitive, rapid and practical method to be used in feline sporotrichosis diagnosis epidemic outbreaks.

KEYWORDS: *Sporothrix schenckii*, cat, diagnosis.

INTRODUÇÃO

A esporotricose é causada pelo fungo *Sporothrix schenckii*. Acomete humanos e animais (Rippon, 1988). Desde 1998 ocorre uma epidemia desta micose no Rio de Janeiro, na qual os gatos são os animais mais afetados (Pereira et al., 2011). Geralmente, os gatos adquirem a infecção após brigas com outros gatos doentes e a lesão mais frequente é a úlcera cutânea (Schubach et al., 2004). O diagnóstico definitivo é obtido pelo isolamento em cultura, mas o resultado pode demorar até 4 semanas (Rippon, 1988). O exame citopatológico é utilizado frequentemente no diagnóstico de casos felinos devido a riqueza parasitária observada nas lesões (Pereira et al., 2011), entretanto, os parâmetros de acurácia deste teste ainda não foram estabelecidos. O objetivo deste estudo foi avaliar a acurácia do exame citopatológico em relação a cultura no diagnóstico da esporotricose felina.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo diagnóstico seccional mascarado no período de março de 2010 até julho de 2011. Foram incluídos gatos com lesão ulcerada não tratados com antifúngicos. Foi coletado material da mesma lesão ulcerada para o exame citopatológico e cultura. As lâminas foram coradas pelo método panótico rápido e a leitura realizada em microscópio óptico (1000X) (Pereira et al., 2011). O resultado do exame citopatológico foi obtido sem o conhecimento do resultado da cultura. Foram calculados a sensibilidade (S), especificidade (E), valores preditivos (VP), razões de verossimilhança (RV) e acurácia.

RESULTADOS

Foram incluídos 244 gatos, dos quais 225 foram positivos na cultura e 199 no exame citopatológico. Os parâmetros de acurácia encontram-se na tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de acurácia do exame citopatológico em relação a cultura no diagnóstico da esporotricose felina.

	RESULTADO	IC 95%
Sensibilidade	84,9%	79,53% a 89,30%
Especificidade	57,9%	33,50% a 79,75%
VPP	86,0%	92,23% a 98,25%
VPN	24,4%	12,88% a 39,54%
RV +	2,02	1,19 a 3,43
RV -	0,26	0,16 a 0,43
Acurácia	82,8%	

DISCUSSÃO

A sensibilidade do exame citopatológico neste estudo foi alta, semelhante a relatada previamente por outros autores na mesma região (Pereira et al., 2011). Os demais parâmetros de acurácia deste teste até o momento não haviam sido estabelecidos não permitindo a comparação com outros estudos. A especificidade mediana pode estar relacionada ao pequeno número de gatos com ausência de doença incluídos. A alta prevalência da doença na população incluída influenciou nos VPs e se deu em virtude do estudo ter sido realizado numa instituição de referência no atendimento de esporotricose humana e animal. Os resultados das RVs foram aceitáveis e acurácia foi alta.

CONCLUSÃO

O exame citopatológico é sensível, rápido, prático e apresenta boa acurácia; permitindo o diagnóstico precoce e a instauração de medidas terapêuticas e profiláticas, principalmente em situações epidêmicas.

REFERÊNCIAS

- PEREIRA, S. A., MENEZES, R. C., GREMIAO, I. D. et al. Sensitivity of cytopathological examination in the diagnosis of feline sporotrichosis. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, n.13, p.220-223, 2011
- RIPPON, J. Sporotrichosis. In: RIPPON, J. (Ed.). **Medical Mycology - The Pathogenic Fungi and the Pathogenic Actinomycetes**. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 1988. cap.11, p.325-352
- SCHUBACH, T. M., SCHUBACH, A., OKAMOTO, T. et al. Evaluation of an epidemic of sporotrichosis in cats: 347 cases (1998-2001). **Journal of the American Veterinary Medical Association**, n.224 p.1623-1629, 2004

053. DERMATOFITOSE EM PEQUENOS ANIMAIS NA REGIÃO SUL DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

Stefanie Bressan Waller¹, Angelita dos Reis Gomes¹, Laís Foresti¹, Rosema Santin²,
Isabel Martins Madrid¹, Mário Carlos Araújo Meireles¹

¹Universidade Federal de Pelotas – waller.stefanie@yahoo.com.br

²Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Estudo retrospectivo de 121 casos de dermatofitose em cães e gatos nos últimos 31 anos no sul do Brasil registrou maior ocorrência em animais jovens e em épocas de maior umidade, bem como em fêmeas e animais de raças para caninos, e machos e sem raça definida para felinos. *Microsporum canis* foi o agente fúngico mais prevalente.

PALAVRAS-CHAVES Dermatofitose, Epidemiologia, Caninos, Felinos

RINGWORM IN SMALL ANIMALS IN SOUTHERN BRAZIL

ABSTRACT

A retrospective study of 121 ringworm cases in dogs and cats in the last 31 years in southern Brazil showed biggest occurrence in young animals and in highest humidity, as well as in female and breed animals for canines, and male and no specific breed for felines. *Microsporum canis* was most prevalent fungal agent.

KEYWORDS: Dermatophytosis, Epidemiology, Canines, Felines

INTRODUÇÃO

Dermatofitose é uma infecção fúngica superficial de tecidos queratinizados (unhas, pelos e pele), que afetam animais e humanos¹. O objetivo foi descrever a frequência da doença em caninos e felinos na região sul do Rio Grande do Sul.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado estudo retrospectivo através da análise descritiva de 650 registros de amostras positivos para dermatofitose em cães e gatos entre 1980 a 2011, analisando as variáveis: sexo, idade, raça, espécie fúngica e estação do ano.

RESULTADOS

De 650 amostras positivas para micoses, 18,6% (121/650) eram dermatofitose, sendo 74,4% (90/121) em cães e 25,6% (31/121) em gatos, conforme a Tabela 1:

Tabela 1: Frequência de ocorrência da dermatofitose em cães e gatos no sul do estado Rio Grande do Sul no período de 1980 a 2011:

Variáveis analisadas		Caninos (n=90)		Felinos (n=31)		Total (n=121)	
		N	%	N	%	N	%
Estação do ano	Inverno	22	24,4	6	19,4	28	23,2
	Outono	25	27,8	13	41,8	38	31,4
	Primavera	18	20	6	19,4	24	19,8
	Verão	25	27,8	6	19,4	31	25,6
Sexo	Macho	28	31,1	15	48,5	43	35,5
	Fêmea	48	53,4	14	45	62	51,3
	N/I	14	15,5	2	6,5	16	13,2
Idade	Jovem (até um ano)	44	48,8	17	54,8	61	50,4
	Adulto (1-10 anos)	27	30	7	22,6	34	28,1
	Idoso (acima de 10 anos)	3	3,4	0	0	3	2,5
	N/I	16	17,8	7	22,6	23	19
Raça	Raça Definida	45	50	12	38,7	57	47,1
	Sem Raça Definida	35	38,9	19	61,3	54	44,6
	N/I	10	11,1	0	0	10	8,3
Espécie fúngica	<i>M. canis</i>	51	56,6	22	71	73	60,3
	<i>M. gypseum</i>	27	30	3	9,7	30	24,8
	<i>T. mentagrophytes</i>	3	3,4	1	3,3	4	3,3
	N/I	9	10	5	16	14	11,6

N: Número absoluto; N/I: Não Informado

DISCUSSÃO

A frequência da dermatofitose em cães e gatos está de acordo com os achados na literatura, sendo as fêmeas caninas e machos felinos mais suscetíveis^{2,3}. Felinos sem raça definida foram mais acometidos, em concordância com Neves et al. (2011)³. Já em cães, as raças definidas foram maioria, sendo Yorkshire Terrier a principal, conforme estudos⁴, seguida de Labrador Retriever. Segundo Cafarchia et al.⁴, a predisposição a micose independe do comprimento dos pelos, estando relacionada às defesas cutâneas não específicas. Independente da espécie, os maiores registros ocorreram em jovens de até um ano de idade, conforme estudos prévios^{2,3}, atribuindo esse fato à imaturidade do sistema imunológico⁴. O dermatófito *M. canis* foi isolado na maioria dos casos, sendo este dado bem documentado na literatura^{2,3,4}. A maior casuística foi na estação do outono, que tem a umidade relativa do ar (UR) acima de 82,8%⁵. Este achado está de acordo com um estudo regional que avalia ser a UR um fator de risco para a dermatofitose, a qual obteve maior casuística na estação de outono e inverno², que foram as únicas a apresentar UR superior a 78%. Em nosso estudo, a segunda estação de maior ocorrência foi o verão, contudo, a região de Pelotas tem médias de UR superiores a 78% em todas as estações do ano, exceto na primavera⁵, tendo sido esta a estação de menor ocorrência. Assim a diferença

climatológica entre estas regiões pode ter influenciado na diferença de sazonalidade encontrada.

CONCLUSÃO

No sul do Rio Grande do Sul, o maior número de casos de dermatofitose nos últimos 31 anos ocorreu em animais jovens de ambas as espécies, a qual *Microsporum canis* prevaleceu. Houve predomínio em cães de raça definida, ao contrário de felinos, sendo a umidade um fator de risco para o desenvolvimento desta micose.

REFERÊNCIAS

1. CHERMETTE, R.; FERREIRO, L; GUILLOT, J. Dermatophytoses in Animals. **Mycopathologia**, v. 166, p. 385-405, 2008.
2. APPELT, C. E. Estudo retrospectivo das dermatofitoses diagnosticadas em cães e gatos em Porto Alegre, RS, Brasil, no período de 1979 a 2009. **Dissertação de Mestrado – UFRGS**. 2010. 46p.
3. NEVES, R.C.S.M.; CRUZ, F.A.C.S.; LIMA, S.R.; TORRES, M.M.; DUTRA, V.; SOUSA, V.R.F. Retrospectiva das dermatofitoses em cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, nos anos de 2006 a 2008. **Ciência Rural**, v.41, n.8, p. 1405-1410, 2011.
4. CAFARCHIA, C.; ROMITO, D.; SASANELLI, M.; LIA, R.; CAPELLI, G.; OTRANTO, D. The epidemiology of canine and feline dermatophytoses in southern Italy. **Mycoses**, v.47, n.11/12, p. 508-513, 2004.
5. EMBRAPA. Boletim Agroclimatológico de Pelotas. 2011. Disponível em: <http://www.cpact.embrapa.br/agromet/estacao/boletim.html>

054. DERMATOFITOSE EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO NO ANO DE 2011

Naiani Domingos Gasparetto¹; Yolanda Paim Arruda Trevisan²; Nayara Benites Moreira²; Maria Cristina da Silva³; Valéria Dutra⁴; Valéria Régia Franco Sousa⁴

1. Mestranda em Ciências Veterinárias HOVET- UFMT – naianigasparetto@hotmail.com

2. Graduanda em Medicina Veterinária-UFMT

3. Mestre em Ciências Veterinárias HOVET-UFMT

4. Professor Adjunto - Departamento de Clínica Médica Veterinária HOVET- UFMT

RESUMO

A dermatofitose é uma infecção fúngica que atinge os animais domésticos e envolve as camadas superficiais da pele, pelo e unhas. Foram atendidos 117 cães com afecções dermatológicas e desses, 66 diagnosticou dermatofitose. O agente etiológico isolado preponderante foi o *Microsporum* spp. A ocorrência da doença foi avaliada de acordo com sexo, raça e idade.

PALAVRAS-CHAVE: Dermatofitose, *Microsporum* spp., cães

RINGWORM IN DOGS TREATED AT THE VETERINARY HOSPITAL OF FEDERAL UNIVERSITY OF MATO GROSSO IN 2011

ABSTRACT

Dermatophytosis is a fungal infection that affects domestic animals and involves the superficial layers of the skin, hair and nails. A total of 117 dogs were treated with skin disorders. These, 66 (56,4%) were diagnosed with dermatophytosis. The predominant etiologic agent was *Microsporum* spp. The occurrence of the disease was assessed according to sex, breed and age.

KEYWORDS: Dermatophytosis, *Microsporum* spp., dogs

INTRODUÇÃO

Dermatofitose é uma infecção comum dos tecidos queratinizados e semi-queratinizados, causada por fungos altamente especializados em invadir e colonizar o estrato córneo da pele, unha e pelo de animais e seres humanos (Scott et al., 1996).

Os dermatófitos que frequentemente infectam animais são *Microsporum* spp. e *Trichophyton* sp. e a infecção é caracterizada por alopecia multifocal, descamação e lesões de distintas configurações (Scott et al., 1996). A enfermidade varia desde infecções agudas autolimitantes, geralmente sem prurido, podendo haver remissão espontânea, até quadros crônicos que persistem por meses ou anos e o diagnóstico é baseado no isolamento e identificação dos agentes causais (Scott et al., 1996). O

presente resumo tem como objetivo contribuir para o conhecimento da ocorrência de dermatofitoses em cães com afecções dermatológicas, no ano de 2011, em uma parcela da população canina no município de Cuiabá-MT.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras de pelos e escamas da pele de 117 cães com quadro clínico dermatológico foram coletadas com auxílio de pinça anatômica. Essas amostras foram submetidas a exame direto em microscópio de luz, utilizando-se de KOH a 20% para observar a existência de eventuais alterações e presença de artroconídeos.

Posteriormente, foram semeadas em ágar Sabouraud com Cloranfenicol, sendo a morfologia das colônias e a aparência microscópica dos macroconídeos caracterizadas de acordo com Quinn et al. (1994) .

RESULTADOS

Dos 117 cães avaliados, 66 (56,4%) apresentaram dermatofitose associada ou não a outra enfermidade cutânea. Desses, 61 (92,4%) foram identificados com *Microsporum* spp., 4 (6,1%) com *Trichophyton* sp. e 1 (1,5%) dos cães apresentou associação entre *Microsporum* spp. e *Trichophyton* sp. Em relação à raça, constatou-se que 22 (33,3%) não apresentavam precisa definição racial e 44 (66,7%) eram cães de raça definida; dentre eles, os cães da raça Poodle obtiveram maior ocorrência (22,6%), seguido pelos cães da raça Pit Bull (18,2%). Com relação ao sexo, do total de animais com dermatofitose, 38 (57,6%) eram machos e 28 (42,4%) eram fêmeas e quanto a idade: 14 tinham menos de um ano (21,2%), 37 (56,1%) entre um e seis anos e 15 (22,7%) acima de sete anos.

DISCUSSÃO

Segundo Scott et al. (1996), a prevalência da dermatofitose tende a ser maior em regiões de climas tropical e subtropical, fato que torna a doença de grande importância no local do estudo. Esta pesquisa revelou que o *Microsporum* spp. foi o principal dermatófito isolado, assim como na maioria dos estudos sobre dermatofitose em cães (Scott et al., 1996; Neves et al., 2011). Como descrito por Balda et al. (2004), não observou predisposição relativa ao sexo quanto à ocorrência de dermatofitose nos cães, no entanto, o fato de machos apresentarem a infecção em maior proporção neste estudo pode estar relacionado à maior capacidade de produção sebácea por esse sexo (Cafarchia et al., 2004). No que se refere à raça, constatou-se maior prevalência entre cães com definição racial, sendo a maioria Poodles. No trabalho de Balda et al. (2004),

75% dos cães eram de raça definida, porém a maioria era da raça Yorkshire. As razões para a predisposição de tais raças ainda não estão bem claras, mas possivelmente, os pêlos alongados contribuem para que as estruturas fiquem protegidas da dissecação, favorecendo a sua propagação, devido às ótimas condições de temperatura e umidade (Sparkes et al., 1993). Quanto à faixa etária, notou-se maior ocorrência em cães adultos, isso difere de outros estudos que demonstram que animais situados no primeiro ano de vida possuem maior predisposição para a infecção (Balda et al., 2004; Cafarchia et al., 2004).

CONCLUSÃO

Pela análise dos resultados concluiu-se que o principal agente responsável pela dermatofitose na população canina desse estudo é o *Microsporum* spp. Não foi observada diferença estatística significativa quanto ao sexo dos animais. Os cães de raça definida foram mais infectados e a maior ocorrência da doença foi verificada nos caninos com idade entre um e seis anos.

REFERÊNCIAS

- BALDA, A. C.; LARSSON, C. E.; OTSUKA, M. et al. Estudo retrospectivo de casuística das dermatofitoses em cães e gatos atendidos no serviço de Dermatologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 32, n. 2, p. 133-140, 2004.
- CAFARCHIA, C.; ROMITO, D.; SASANELLI, M. et al. The epidemiology of canine and feline dermatophytoses in southern Italy. **Mycoses**, v. 47, n. 11-12, p. 508-513, 2004.
- NEVES, R. C. S. M.; CRUZ, F. A. C. S.; LIMA, S. R. et al. Retrospectiva das dermatofitoses em cães e gatos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, nos anos de 2006 a 2008. **Ciência Rural**, v.41, n. 8, p.1405-1410, 2011.
- QUINN, P. J.; CARTER, M. E.; MARKER, B. et al. **Clinical Veterinary microbiology**. London: Wolfe Publishing, 1994. 648p.
- SCOTT, D.W.; MILLER, W.H.Jr.; GRIFFIN, C.G. **Dermatologia de pequenos animais**. 5.ed. Rio de Janeiro: Interlivros, 1996. 1130p.
- SPARKES, A.; [GRUFFYDD-JONES, T. J.](#); [SHAW, S. E.](#) et al. Epidemiological and diagnostic features of canine and feline dermatophytosis in the United Kingdom from 1956 to 1991. **Veterinary Record**, v.133, n.3, p.57-61, 1993.

055. DISPLASIA ECTODÉRMICA LIGADA AO CROMOSSOMO X – APLASIA DO FOLÍCULO PILOSO ASSOCIADA À DISPLASIA DENTÁRIA EM CÃO: RELATO DE CASO

SÉRGIO R. T. DALTRO¹, ROSANE K. N. FRANÇA²

1 Médico Veterinário - srdaltro@hotmail.com

2 Médica Veterinária

RESUMO

Displasias Ectodérmicas são distúrbios do desenvolvimento dos tecidos derivados da ectoderme, caracterizada principalmente por uma redução ou ausência de folículos pilosebáceos sobre algumas áreas do corpo. Alopecia, hipotricose e alterações dentárias são alguns dos sinais clínicos. Este trabalho tem o objetivo de relatar o caso de um cão, macho, diagnosticado com displasia ectodérmica ligada ao cromossomo X associada a displasia dentária.

PALAVRAS-CHAVE: displasia, ectoderme, alopecia, alterações dentárias, cães

X-LINKED ECTODERMAL DYPLASIA - APLASIA OF THE HAIR FOLLICLE WITH DENTAL DYSPLASIA IN DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

Ectodermal dysplasias are developmental disorders of the tissues derived from ectoderm. It is characterized by a reduction or absence of pilosebaceous follicles on some areas of the body. Alopecia, hypotrichosis and dental abnormalities are some of the clinical signs. This work aims to report the case of a dog, male, diagnosed with X-linked ectodermal dysplasia, associated with dental dysplasia.

KEYWORDS: dysplasia, ectoderm, alopecia, dental abnormalities, dogs

REVISÃO DE LITERATURA

A displasia ectodérmica ligada ao cromossomo X é uma doença de má-formação congênita, ligada ao sexo recessiva, caracterizada principalmente por uma redução ou ausência de folículos pilosos, músculo eretor do pelo, glândulas sebáceas e glândulas apócrinas em algumas áreas do corpo (Freire-Maia e Pinheiro, 1984).

Alopecia e hipotricose são apresentações clínicas características. Em alguns cães, ainda podem ser observadas combinações de alterações dentárias, como: oligodontia, hipoplasia dentária, persistência dos dentes decíduos e dentes cônicos (Moura e Cirio, 2004). O diagnóstico definitivo é obtido através da histopatologia, onde é constatada a ausência ou redução do folículo piloso e glândulas anexas. O tratamento é meramente paliativo (Cardoso et al., 2003).

RELATO DE CASO

Um cão errante, macho, Poodle, de aproximadamente 6 meses, foi atendido em uma clínica veterinária, com queixa de alopecia em várias regiões do corpo, sem prurido. No exame clínico, constataram-se várias áreas alopécicas distribuídas nas regiões frontotemporal, ventrocervical, latero-ventral torácica e abdominal e na região lombar a alopecia se apresentava em “forma de diamante”. Desta forma, raspados cutâneos, cultura fúngica e citologia foram realizados, mas todos resultaram negativos. A pelagem era ressecada, fina e rarefeita. Além destes, outros sinais clínicos, como: oligodontia, displasia dentária com persistência dos dentes decíduos e ceratoconjuntivite seca, também estavam presentes.

Coletou-se, então, um fragmento da região alopécica abdominal, medindo 20 x 7 x 2 mm, para uma avaliação histopatológica, que revelou, na epiderme, hiperpigmentação e ortoqueratose; toda a derme exibiu quase que completamente ausência de folículos pilosos, de músculos eretores dos pelos, de glândulas sebáceas e glândulas apócrinas. Não foram evidenciados sinais de reação inflamatória.

O tratamento foi apenas sintomático, através da utilização de protetor solar nas áreas alopécicas e hidratação constante de todo o pelo.

DISCUSSÃO

O caso descrito mostrou um exemplo clássico de Displasia Ectodérmica ligada ao cromossomo X em cão. Os sinais clínicodermatológicos são semelhantes aos descritos na literatura, na qual a alopecia teve distribuição simétrica com envolvimento da região temporal, dorsocaudal e ventral (Moura e Cirio, 2004). A lesão em “forma de diamante” na região dorsocaudal é uma apresentação característica da doença citada em Miller e Kirk (2001).

As alterações dentárias e oftálmicas correspondem às alterações ectodermas e a ausência das glândulas sudoríparas não tem a mesma importância clínica que em humanos, pois os cães contam com a respiração ofegante para dissipar o calor ao invés do suor cutâneo (Freire-Maia e Pinheiro, 1984). A avaliação histopatológica,

associada aos sinais clínicos, permitiu um diagnóstico definitivo, evidenciando a ausência dos folículos pilosos, das glândulas sebáceas e apócrinas e do músculo eretor do pelo (Moura e Cirio, 2004).

A displasia ectodérmica não possui tratamento específico e o maior problema desta doença é estético. O prognóstico é favorável e o tratamento é paliativo, visando uma melhor qualidade de vida do paciente (Moura e Cirio, 2004).

CONCLUSÃO

A displasia ectodérmica ligada ao cromossomo X associada a displasia dentária é uma síndrome bastante rara que acomete cães, sendo necessária uma investigação criteriosa para chegar a um diagnóstico definitivo, desde a anamnese e achados clínicos até a histopatologia.

REFERÊNCIAS

- FREIRE-MAIA, N., PINHEIRO, M. **Ectodermal Dysplasias**: A Clinical and Genetic Study. New York: Liss, 1984: 33–6.
- MOURA, E.; CIRIO, S. M. Clinical and genetic aspects of X-linked ectodermal dysplasia in the dog – a review including three new spontaneous cases. **Veterinary Dermatology** 2004, **15**, 269–277.
- CARDOSO, M. J. L., FRANCO, S. R. V. S., FABRIS, V. Displasia folicular em cão. **Ciência Rural**, Santa Maria, v.33, n.5, p.949-951, set-out, 2003.
- SCOTT, D., MILLER, W., GRIFFIN, C. *Muller and Kirk's Small Animal Dermatology*. England: **Elsevier**, 2001.

056. ESCLERODERMIA EM UM CANINO: RELATO DE CASO

Elisângela Nascimento Silva¹, Aline Quintela², Débora Passos Hinojosa Schaffer¹,
Leonardo Azevedo³, Bianca Oliveira Nicchio¹, Rafaela da Silva Loureiro¹

1. Médico Veterinário do Programa de Residência da União Metropolitana para o Desenvolvimento de Educação e Cultura (UNIME). Lauro de Freitas, Bahia, Brasil. Email: elisangelavet_pe@hotmail.com
2. Professor da disciplina Clínica Médica de Pequenos Animais da UNIME
3. Médico Veterinário Autônomo

RESUMO

Esclerodermia é uma doença de etiologia desconhecida, de evolução longa, definida como uma desordem generalizada do tecido conjuntivo com alterações bioquímicas do colágeno representadas clinicamente por espessamento e fibrose cutânea que resultam no endurecimento da pele, sendo essa a característica clínica fundamental da doença. Esse trabalho teve o objetivo de relatar um caso de esclerodermia sistêmica em um canino, macho, da raça Cocker Spaniel de 10 anos de idade. A histopatologia evidenciou pele exibindo proliferação do tecido colagenoso da derme que avançava para o panículo adiposo. Com o tratamento instituído houve melhora gradual do quadro de enrijecimento da pele ao longo de dois meses. O paciente veio a óbito no terceiro mês. A necropsia foi realizada e outras alterações foram evidenciadas.

PALAVRAS-CHAVE: esclerodermia, canino, fibrose, histopatológico

SCLERODERMA IN A DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

Scleroderma is a disease of unknown etiology, the long evolution, defined as a generalized disorder of connective tissue with collagen biochemical represented clinically by skin thickening and fibrosis resulting in hardening of the skin, which is the key clinical feature of the disease. This work aimed to report a case of systemic scleroderma in a canine male Cocker Spaniel of 10 years of age. Histopathology showed skin shows proliferation of collagenous tissue of the dermis that advanced to the panniculus. After treatment there was gradual improvement of hardening of the skin over two months. The patient died in the third month. In autopsy other changes were observed.

KEYWORDS: scleroderma, canine, fibrosis, histopathological

INTRODUÇÃO

A esclerodermia é uma desordem do tecido conjuntivo com alterações bioquímicas do colágeno representadas clinicamente por espessamento e fibrose cutânea que resultam no endurecimento da pele (Azulay, Azulay, 2004; Vilas et al., 2002). Os achados patológicos incluem o processo de fibrose e oclusão microvascular nos órgãos acometidos dos pacientes com a forma de esclerose sistêmica e lesões cutâneas circunscritas (localizada). Todos os órgãos podem ser acometidos, no entanto o mais frequentemente envolvido é o trato intestinal, seguido dos pulmões, coração e dos rins (Arnold et al., 1994). A esclerose cutânea está presente na maioria dos casos de esclerodermia sistêmica (Vilas et al., 2002). O comprometimento renal sintomático é raro, porém o envolvimento assintomático é freqüente. O diagnóstico da esclerose sistêmica é feito através dos achados clínicos e exames complementares (Azulay, Azulay, 2004; Vilas et al., 2002) e o histopatológico deve ser solicitado quando há dúvida diagnóstica (Vilas et al., 2002). Não existe um tratamento específico que resulte na cura da doença (Vilas et al., 2002). Em geral, são administrados medicamentos que inibem o processo inflamatório e que bloqueiam a produção excessiva de colágeno (Sampaio; Rivitti, 2001), como imunossuppressores, imunomodulador, corticóides (Vilas et al., 2002) e bloqueadores de colágeno (Sampaio; Rivitti, 2001). Esse trabalho teve o objetivo de relatar um caso de suspeita de esclerodermia sistêmica em um canino.

RELATO DE CASO

Um canino, macho, da raça Cocker Spaniel de 10 anos de idade foi atendido com histórico de lesões cutâneas há cerca de um mês. O animal havia sido levado ao veterinário, que observou quadro semelhante ao “riso sardônico”. Após uma semana, o proprietário observou o enrijecimento da pele do animal e dificuldade para se alimentar e beber água. Ao exame físico observou-se enrijecimento generalizado da pele, áreas com alopecia na região do pescoço e limitação na abertura da boca. Foram realizados exames complementares (hemograma, uréia, creatinina, ALT, FA, CPK, eletrocardiograma e radiografia torácica). O hemograma revelou anemia e discreta trombocitopenia. Demais exames estavam dentro dos parâmetros de normalidade. Foi realizada biópsia incisional com *punch* na região do masseter para realização do exame histopatológico. A epiderme exibiu atrofia discreta, atingindo toda a derme e avançando para o panículo adiposo onde existia proliferação do tecido colagenoso com fibras de colágeno discretamente espessadas, porém com arranjo e organização semelhante ao da derme normal. Existe infiltrado inflamatório mononuclear muito discreto e em padrão perivascular. Foi prescrito prednisolona (2mg/Kg/BID). Foi

observada melhora gradual do quadro de enrijecimento da pele no acompanhamento ao longo de dois meses. No terceiro mês, o paciente apresentou êmese e claudicação do membro posterior com edema na articulação tíbio-társica e dor à palpação. O paciente veio a óbito na mesma semana. Foi realizada necropsia e macroscopicamente foi evidenciada nefrite crônica, calcificação do pulmão, hipertrofia concêntrica no coração com endocardiose de grau leve, gastrite e abscesso em articulação tíbio-társica.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O quadro de enrijecimento generalizado na pele do paciente referido não é relatado na literatura em cães. Contudo em humanos foi relatado casos de pacientes com fibrose na pele e órgãos internos conhecidos como esclerodermia (Vilas et al., 2002). A dificuldade na abertura da cavidade oral do paciente também é relatada em humano, denominando-se microstomia que é atribuída à deposição de colágeno nos tecidos periorais (Pereira et al., 2009). O envolvimento sistêmico pôde ser confirmado pelos achados de necropsia que revelaram alterações nos rins. A alteração nos rins em humanos é caracterizada pela insuficiência renal progressiva (Corbella et al., 2006). Os achados do exame histopatológico encontrados são compatíveis com os encontrados por Gross (2005), que afirma encontrar uma epiderme normal, o tecido fibroso exclui a arquitetura de tecido normal, assemelhando-se a tecido cicatricial, as fibras colágenas são densas com arranjo normal, inflamação é muito leve, que consiste de uma infiltração perivascular. O diagnóstico de esclerodermia sistêmica foi baseado na história clínica e exame histopatológico (Vilas et al., 2002). O corticóide foi efetivo na diminuição da rigidez da pele, apesar da literatura humana restringir seu uso apenas nos casos de vasculite (Azulay, Azulay, 2004). A morte súbita do paciente pode ser atribuída à fibrose cardíaca e crise renal esclerodérmica (Azulay, Azulay, 2004; Vilas et al., 2002).

Na literatura não existe caso relatado de esclerodermia sistêmica em cães. A esclerodermia localizada, porém já foi descrita. No presente caso ocorreu semelhança da maioria dos sinais com a esclerodermia sistêmica em humanos, porém ainda carece de dados laboratoriais para confirmação do quadro.

REFERÊNCIAS

- SAMPAIO, S.A.P., RIVITTI, E.A. Dermatologia. 2.ed. Artes Médicas: São Paulo, 2001.
- ARNOLD, H.L., ODOM, R.B., JAMES, W.D. Doenças da Pele de Andrews: Dermatologia clínica. 8.ed. Manole: São Paulo, 1994.
- AZULAY, R.D., AZULAY, D.R. Dermatologia. 3.ed. Koogan: Rio de Janeiro, 2004.

VILAS, A.P., VEIGA, M.V., ABECASIS, P. Esclerose sistêmica - Perspectivas atuais. Medicina Interna, v. .9, n.2, 2002.

GROSS, T.L., IHRKE, WALDER E.J., AFFOLTER, V.K. Skin disease of the dog and cat. 2° edition. Blackwell Science: Oxford, 2005.

CORBELLA, M.C. et al. Consenso sobre esclerodermia-Sociedade Argentina de Dermatologia, 2006.

PEREIRA, M.C., NUNES, R.A.M., MARCHIONNI, A.M., MARTINS, G.B. Esclerodermia sistêmica: RELATO DE CASO clínico. Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo. 2009.21(1):69-73.

057. LINFOMA EPITELIOTRÓPICO DESCAMATIVO E NÃO PRURIGINOSO EM CÃO – RELATO DE CASO

Guilherme de Caro Martins¹, Bernardo de Caro Martins¹, Bruno Benetti Junta Torres^{1,2},
Larissa Silveira Botoni¹ Gleidice Eunice Lavalle¹, Adriane da Costa Val Bicalho¹

¹ Universidade Federal de Minas Gerais. Email: guilhermedcmartins@hotmail.com

² Universidade Federal de Lavras

RESUMO

O linfoma epiteliotrópico canino é uma neoplasia rara caracterizada por eritema difuso associado a crostas e descamação, lesões papulares e nodulares e manchas distribuídas pelo corpo, com prurido intenso. Objetiva-se relatar um caso de linfoma epiteliotrópico canino, subtipo reticulose pagetóide, com característica clínica incomum devido ao aspecto descamativo e não pruriginoso.

PALAVRAS-CHAVE: dermatologia, reticulose pagetóide, cão

A NON-PRURIGINOUS SCALY EPITHELIOTROPIC LYMPHOMA IN A DOG – CASE REPORT

ABSTRACT

Canine epitheliotropic lymphoma is a rare neoplasm characterized by diffuse erythema associated with crusting and scaling, papular and nodular lesions and patches distributed throughout the body, with intense itching. This paper aims at reporting a case of canine epitheliotropic lymphoma, subtype pagetoid reticulosis, with unusual clinical feature due to widespread scaly appearance with no pruritus.

KEYWORDS: dermatology, pagetoid reticulosis, dog

INTRODUÇÃO

O linfoma epiteliotrópico canino (LEC) é uma neoplasia rara de origem desconhecida, caracterizada por infiltração de linfócitos T atípicos em tecidos epidérmicos e anexos (Scott et al, 2001; Fontaine et al, 2010). Representa menos que 1% dos tumores cutâneos e é mais observado em cães idosos das raças Cocker, Boxer e Golden Retriever (Scott et al, 2001).

Pode ser classificado em três subtipos de acordo com o padrão histopatológico em: micose fungóide, síndrome de Sézari e reticulose pagetóide, sendo a primeira a forma mais comum (Fontaine et al., 2010). Outra classificação, baseada nos sinais

clínicos, define quatro formas da doença (Scott et al, 2001), as quais caracterizam-se por a) eritroderma esfoliativo; b) eritema mucocutâneo com infiltração, despigmentação e ulceração; c) placas e nódulos subcutâneos múltiplos ou solitários; d) infiltração e ulceração de mucosa oral.

O prognóstico é desfavorável, com sobrevida média, de seis meses. Os protocolos terapêuticos com lomustina, associada ou não a corticosteróides, e mecloretamina tópica associada ao propilenoglicol são considerados mais eficazes e visam proporcionar qualidade de vida ao paciente (Scott et al, 2001; Williams et al, 2006; Fontaine et al, 2009).

Esse trabalho tem como objetivo relatar um caso de LEC, subtipo reticulose pagetóide, com característica clínica incomum devido ao aspecto descamativo generalizado e não pruriginoso.

RELATO DO CASO

Um cão da raça Yorkshire, de sete anos, apresentou queda difusa de pelo com descamação e sem prurido, havia um ano. Durante esse período havia sido medicado com antifúngicos, antibióticos e vitaminas, e, no entanto, houve piora clínica considerável. Foram observados alopecia, descamação e comedos generalizados. Os demais parâmetros clínicos e os exames hematológicos e dos hormônios tireoidianos bem como raspado cutâneo profundo e tricograma não evidenciaram alterações significativas. O resultado da biópsia demonstrou intenso epiteliotropismo anexial e epidérmico por células redondas mononucleares, além de discreta espongiose. Assim diagnosticou-se LEC do subtipo reticulose pagetóide.

O animal vem sendo tratado há oito meses com lomustina 60-90mg/m² em quatro seções iniciais intervaladas de 21 dias e prednisona 25-40 mg/m² por noventa dias. Observou-se redução evidente das lesões nos primeiros meses e melhora da qualidade de vida do paciente.

DISCUSSÃO

O LEC é uma afecção rara que pode mimetizar diversas dermatopatias, motivo pelo qual seu diagnóstico requer tempo, é dispendioso e somente confirmado pelo exame histopatológico (Scott et al, 2001; Fontaine et al, 2010).

Após a exclusão das dermatopatias mais comuns que poderiam concorrer com os sinais clínicos supracitados, realizou-se exame histopatológico das lesões.

A apresentação clínica mais comum do LEC caracteriza-se por eritema, descamação, prurido intenso e lesões em placas (Fontaine et al., 2010). Assim como

observado em alguns dos 30 cães no estudo retrospectivo de Fontaine et al. (2010), o caso ora relatado, apresentou padrão clínico atípico e não pôde ser classificada dentro dos padrões dermatológicos já estabelecidos (Scott et al., 2001).

Histologicamente o LEC é caracterizado por infiltração de linfócitos atípicos na epiderme (microabscesso de Pautrier) e em estruturas anexas, e a intensidade do epiteliotropismo, geralmente, define seu subtipo (Scott et al, 2001; Fontaine et al, 2010). Devido ao pouco infiltrado dérmico e intenso infiltrado epidermal, suspeitou-se de LEC do subtipo reticulose pagetóide disseminada, pouco relatado na literatura. Estudos retrospectivos relataram a ocorrência desse subtipo de LEC entre 20% e 32% em cães (Moore et al., 2009; Fontaine et al., 2010).

Diversos protocolos terapêuticos tem sido relatados, com resposta clínica variável, sem no entanto ocorrer prolongamento significativo do tempo de sobrevida (Scott et al, 2001; Williams et al, 2006). A associação de lomustina e prednisona é considerada umas das terapias mais eficazes para proporcionar boa qualidade de vida (Williams et al, 2006). Por isso, optou-se pelo tratamento com esses fármacos.

Apesar do prognóstico desfavorável e da expectativa média de vida de seis meses (Scott et al, 2001), o animal em questão vem sendo acompanhado há oito meses, e, até o presente momento, com qualidade de vida satisfatória.

CONCLUSÃO

O LEC é uma afecção rara com características clínicas que mimetizam diversas outras dermatopatias e torna-se um diagnóstico desafiador. Sua apresentação clínica pode variar dificultando sua caracterização de acordo com as classificações correntes. O diagnóstico definitivo deve ser realizado por exame histopatológico, e, embora o prognóstico seja desfavorável, busca-se com o tratamento proporcionar qualidade de vida ao animal.

REFERÊNCIAS

- SCOTT D.W, MILLER W.H, GRIFFIN C.E. **Muller and Kirk' s Small Animal Dermatology** , 6thed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2001. 1526p.
- FONTAINE, J; HEIMANN, M; DAY, M.J. Canine cutaneous epitheliotropic T-cell lymphoma: a review of 30 cases. **Veterinary Dermatology**, v.21, p.267-275, 2010.
- MOORE, P.F et al. Canine epitheliotropic cutaneous T-cell lymphoma: an investigation of T-cell receptor immunophenotype, lesion topography and molecular clonality. **Veterinary Dermatology**, v.20, p.569-576, 2009.
- WILLIAMS, L.E et al. CCNU in Treatment of Canine Epitheliotropic Lymphoma. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v.20, p.136-143, 2006.

058. LÚPUS ERITEMATOSO DISCÓIDE EM CAVIDADE ORAL DE CÃO – RELATO DE CASO

Claudia Stringhini Faraco¹, Rafaela Rosa Barcellos², Fabiane de Oliveira Brandão³,
Amanda Siviero⁴, Priscila Zlotowki⁵, Carlos Afonso de Castro Beck⁶

^{1,2,3,4,5,6:} Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Faculdade de Veterinária (FAVET). Contato: claudiafaraco@hotmail.com

RESUMO

O lúpus eritematoso discóide (LED) é uma doença autoimune limitada à pele, ocorrendo normalmente no plano nasal. Seu diagnóstico é feito com base nos sinais clínicos associado à histopatologia; como tratamento são indicados imunossupressores. Apesar de não apresentar risco à vida do paciente, a terapia faz-se necessária por toda a vida. Este trabalho relata o caso de um canino com LED em cavidade oral.

PALAVRAS CHAVE: autoimune, oral, pele, úlceras

LUPUS ERYTHEMATOSUS, DISCOID ORAL CAVITY IN THE DOG CASE REPORT

ABSTRACT

Discoid erythematosus lupus is an immunomediated disease that is limited to the skin, normally on the nose plane. Its diagnosis is based on clinical signs associated with histopathology; as treatment, immunosuppressives are indicated. Although not present a risk to the patient's life, the therapy is necessary for all life. This paper reports a canine case of discoid erythematosus lupus in the oral cavity.

KEYWORDS: autoimmune, oral, skin, ulcers

INTRODUÇÃO

O lúpus eritematoso (LE) pode ser dividido em lúpus eritematoso sistêmico (LES), que é uma desordem autoimune multissistêmica, e lúpus eritematoso discóide (LED), que é uma forma benigna de LES limitada à pele (Willemse, 1998). As duas apresentações podem ser diferenciadas pois no LED as lesões ficam confinadas à pele e os pacientes afetados não apresentam sinais de doença sistêmica (Jones et al, 2000). Entre as áreas afetadas estão plano nasal, pálpebras, lábios, coxins plantares, pavilhão auricular e cavidade oral (Rhodes, 2008). Lesões iniciais são caracterizadas por despigmentação, eritema, descamação, crostas e, ocasionalmente, vesículas e

bolhas; lesões crônicas apresentam tecido cicatricial, alopecia e hipopigmentação. Em alguns casos podem ocorrer erosões ou úlceras orais. A radiação solar agrava o distúrbio (Jones et al, 2000). O diagnóstico é essencialmente clínico e histopatológico (Guaguère e Bensignor, 2005). O prognóstico é favorável, contudo, usualmente há necessidade de tratamento vitalício (Willemse, 1998).

RELATO DE CASO

Foi atendido um canino, Boxer, fêmea, 28,5 kg, 6 anos de idade, apresentando sangramento oral e halitose. No exame clínico encontrava-se em ótimo estado geral, porém, com úlceras na mucosa oral (Fig.1), dor local e cálculos dentários grau III. Após exames pré operatórios - hemograma, ALT, AST, creatinina e uréia realizou-se profilaxia dentária e coletou-se fragmentos da mucosa oral que foram encaminhados para biópsia; o resultado indicou apenas processo inflamatório. Para o pós operatório prescreveu-se espiramicina e metronidazol (Stomorgyl®), meloxicam e dieta pastosa.

O cão apresentou melhora por 30 dias, reiniciando gradativamente as lesões. Aproximadamente 60 dias após a cirurgia o animal retornou com novas úlceras na mucosa oral, sendo sugerida nova biópsia, que obteve como resultado lupus eritematoso discóide (Fig. 2). Após o diagnóstico histológico, administrou-se prednisona, 1 mg.kg⁻¹ duas vezes ao dia (BID) por 15 dias, passando a 1 mg.kg⁻¹ uma vez ao dia (SID) por mais 15 dias, quando houve regressão das úlceras por completo.

No entanto, quando tentou-se o esquema em dias alternados houve piora do quadro. Retornou-se à administração diária e o animal apresentou um quadro de hiperglicemia. Foram feitos novos exames - hemograma, ALT, AST, uréia, creatinina e glicose, sendo reiniciada a utilização de prednisona 1 mg.kg⁻¹ SID por 15 dias; após esse período foi administrada a mesma dose, em dias alternados, utilizando juntamente azatioprina 1 mg.kg⁻¹, havendo estabilização do quadro (Fig. 3).

DISCUSSÃO

No exame histopatológico que diagnosticou LED foi encontrado acantose do epitélio com incontinência pigmentar e abundante infiltrado linfoplasmocitário com área de ulceração, sendo compatível com LE, o que associado aos sinais clínicos leva ao diagnóstico de LED (Jones et al, 2000). Dentre os tratamentos disponíveis optou-se pela prednisona, devido à presença de úlceras. Iniciou-se com 2 mg/kg ao dia, o que está de acordo com o indicado por Rosenkrantz (2005). Contudo, quando tentou-se o tratamento de manutenção, com o uso em dias alternados, mesmo que sendo feito de forma gradual, como indicado por MacDonald (2004) houve piora das lesões. Fez-se,

então, a associação da prednisona com azatioprina (Willemse, 1998) para poder diminuir a prednisona administrada no animal, visto que o tratamento é vitalício.

Rosenkrantz (2005) indica a realização de hemograma e bioquímicos a cada 3-6 meses quando há o uso de corticosteróide, o que foi realizado; não sendo feitos na frequência que a autora indica quando há o uso de azatioprina, que seria a cada 2 semanas nos primeiros 3 meses e, após, semestralmente.

CONCLUSÃO

O uso da prednisona associando à azatioprina foi eficaz para o tratamento de LED, contudo deve-se avaliar cada terapêutica individualmente.

Figura 1: Cavidade oral de cão apresentando úlceras.

Figura 2: Mucosa oral. Dermatite de interface com degeneração do epitélio basal associada a infiltrado misto moderado. Incontinência pigmentar. H&E. Obj.10X.

Figura 3: Cavidade oral de cão com regressão das lesões.

REFERÊNCIAS

- GUAGUÉRE, E.; BENSIGNOR, E. Lúpus Eritematoso Cutâneo. In ____ **Terapêutica dermatológica do cão**. 1. ed. São Paulo: Roca Ltda, 2005. cap. 15, p. 219-221.
- JONES, T.C.; HUNT, R.D.; KING, N.W. A pele e seus apêndices. In ____ **Patologia Veterinária**. 6. ed. São Paulo: Manole Ltda, 2000. cap. 17, p. 831-886.
- MACDONALD, J.M. Corticoterapia. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. **Tratado de Medicina Interna Veterinária - Doenças do cão e do gato**. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. v.1. cap. 75, p. 323-333.
- RHODES, K.H. Dermatoses imunomediadas. In Birchard, S.J. **Manual Saunders Clínica de pequenos animais**. 3. ed. São Paulo: Roca Ltda, 2008. cap. 48, p. 501-508
- ROSENKRANTZ, W.S. Lúpus Eritematoso Discóide. In RHODES, K.H. **Dermatologia de Pequenos Animais – Consulta em 5 minutos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Revinter Ltda, 2005. cap. 66, p. 420-423.
- WILLEMSE, T. Doenças Neoplásicas. In: WILLEMSE, T. **Dermatologia clínica de cães e gatos**. 2. ed. São Paulo: Manole, 1998. cap. 6, p. 44-74.

059. PERFIL DE RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE *STAPHYLOCOCCUS* SPP. ISOLADAS DE PIODERMATITE CANINA

Jusciêne Bagagi Moura¹, Alexsandra Bezerra de Carvalho¹, Nádia Aparecida de Souza¹, Dielson da Silva Vieira¹, Juraci Coelho Ramos Júnior²,
Mateus Matiuizzi da Costa¹

¹Universidade Federal do Vale do São Francisco– juscikoelho@hotmail.com

²Clínica Veterinária do Vale do São Francisco.

RESUMO

Este trabalho objetivou avaliar o perfil de resistência antimicrobiana de *Staphylococcus* spp. isoladas de piodermatites de cães atendidos na cidade de Petrolina, frente a antibióticos utilizados em medicina veterinária. Os isolados foram identificados por provas bioquímicas e tintoriais e testados quanto a sua susceptibilidade frente a 12 antimicrobianos. Foram isoladas 38 *Staphylococcus* spp. Apenas dois (5%) isolados não apresentaram resistência a nenhuma das drogas testadas, três (7%) apresentaram resistência a uma droga e 33 (86%) foram multiresistentes. O estudo demonstra níveis alarmantes de resistência antimicrobiana nas *Staphylococcus* spp. de piodermatites canina.

PALAVRAS-CHAVES antimicrobiano, cães, dermatologia

ANTIMICROBIAL RESISTANCE PROFILE OF *STAPHYLOCOCCUS* SPP. PYODERMA OF ISOLATED CANINE

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the profile of antimicrobial resistance of *Staphylococcus* spp. isolated from pyoderma in dogs treated at the city of Petrolina, compared to antibiotics used in veterinary medicine. The isolates were identified by biochemical tests and staining and tested for their susceptibility against 12 antimicrobial agents. 38 were isolated *Staphylococcus* spp. Only two (5%) isolates showed no resistance to any of the drugs tested, three (7%) showed resistance to one drug and 33 (86%) were multiresistant. The study shows alarming levels of antimicrobial resistance in *Staphylococcus* spp. of canine pyoderma.

KEYWORDS: antimicrobial, dogs, dermatology

INTRODUÇÃO

O gênero *Staphylococcus* spp. está associado à infecções que acometem tanto humanos quanto animais. É um dos mais significativos patógenos causadores de piodermites em animais de companhia (Coelho et al., 2007), onde o uso indiscriminado de antimicrobianos dissemina bactérias resistentes entre as populações microbianas, impedindo a ação de diversos fármacos e tornando a resistência extremamente variável entre os países e regiões, podendo estar relacionada à origem hospitalar ou comunitária destas, tendo como exemplo a *Staphylococcus aureus* que apresenta resistência mundialmente (Tavares, 2000).

MATERIAL E MÉTODOS

A coleta das amostras foram feitas com *swabs* de algodão estéril em meio *stuart*. Foram coletadas 38 amostras de piodermites de cães de diferentes raças, sexo e idade, atendidos na cidade de Petrolina (PE) no ano de 2011. Para o isolamento bacteriano, as amostras foram semeadas em Ágar sangue a 5%. Os agentes foram identificados por meio de características morfológicas, bioquímicas e tintoriais. O perfil de sensibilidade foi determinado por meio do método de difusão em disco Kirby-Bauer modificado, com as drogas: penicilina (PEN 10µg), ampicilina (AMP 10 µg), cefalexina (CFE 30µg), estreptomicina (EST 10 µg), gentamicina (GEN 10 µg), ciprofloxacino (CIP 05 µg), eritromicina (ERI 15 µg), sulfazotrim (SUT 25 µg), doxiciclina (DOX 30 µg), tetraciclina (TET 30 µg), cefalotina (CFL 30 µg), ceftriaxona (CRO 30 µg). Após a leitura dos halos foi determinado o perfil de sensibilidade dos isolados e o índice de resistência bacteriana múltipla aos antimicrobianos (IRMA).

RESULTADOS

Tabela 1. RESUMO do número de amostras que apresentaram resistência aos antimicrobianos.

Grupo	β-Lactâmicos					Aminoglicosídeos		Quinolonas	Macrolídeos	Sulfas	Tetraciclinas	
Antimicrobianos	PEN	AMP	CFE	CFL	CRO	EST	GEN	CIP	ERI	SUT	DOX	TET
Amostras (n)	27	25	04	01	02	16	07	08	16	24	08	18
Resistentes (%)	70%	65%	10%	2%	5%	42%	18%	20%	42%	64%	20%	47%

DISCUSSÃO

Das 38 *Staphylococcus* spp. isoladas, apenas dois (5%) isolados bacterianos não apresentaram resistência a nenhuma das drogas testadas, três (7%) apresentaram resistência a pelo menos uma droga e 34 (86%) foram multiresistentes, cerca de 95% das amostras foram resistentes a todos os grupos de antimicrobianos, com destaque para o grupo dos β-lactâmicos (penicilina, ampicilina) e as sulfas (sulfazotrim),

envolvidos em mais de 50% das amostras testadas. Sendo a cefalotina e a ceftriaxona as drogas mais eficientes. A resistência à β -lactâmicos, também foi observada em outros trabalhos: Ganiere et al (2005) e Penna et al (2009), sugerindo a produção de betalactamases pelas bactérias. Com relação às sulfas são drogas com grande capacidade de indução de resistência bacteriana, indicando o contato prévio destas com antibióticos dessa classe (Ganiere et al., 2005). De modo geral, verificou-se elevado percentual de resistência antimicrobiana e um elevado percentual de resistência múltipla, o que corrobora com o trabalho de Penna et al (2009), mostrando a importância global destes dados.

CONCLUSÃO

A resistência antimicrobiana de *Staphylococcus* spp. em animais de companhia é um problema mundial, grave e crescente, e uma questão também de saúde pública. Este estudo enfatiza a necessidade do antibiograma, a fim de evitar tratamentos empíricos que levam a indução cada vez mais rápida de cepas resistentes.

Nota: Aprovado pelo Comitê de ética no dia 26/09/2011 (Protocolo: 28/260911).

REFERÊNCIAS

- COELHO, S. de M. de O.; MORAES, R.A. M.; SOARES, L. de C et al. Mapeamento do perfil de resistência e detecção do gene *mecA* em *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus intermedius* oxacilina-resistentes isolados de espécies humanas e animais. **Ciência Rural**, v.37, n.1, 2007.
- GANIERE, J.P.; MEDAILLE, C.; MANGION, C. Antimicrobial drug susceptibility of *Staphylococcus intermedius* clinical isolates from canine pyoderma. **J. Vet. Med**, v.52, p.25–31, 2005.
- PENNA, B.; VARGES, R.; MEDEIROS, L. et al. *In vitro* antimicrobial susceptibility of *staphylococci* isolated from canine pyoderma in Rio de Janeiro, Brazil. **Brazilian Journal of Microbiology**, v.40, p.490-494, 2009.
- TAVARES W. Problem gram-positive bacteria: resistance in staphylococci, enterococci, and pneumococci to antimicrobial drugs. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v.33, p.281-301, 2000.

060. A ULTRASSONOGRAFIA SIMPLES COMO DIAGNÓSTICO DA DISPLASIA RENAL CONGENITA EM CÃES DA RAÇA SHIH TZU NO MUNICÍPIO DE SALVADOR – BAHIA

Guttenberg Braun Neto¹, Ricardo Diniz Guerra e Silva², Fátima Barreto de Jesus³, Luis Carlos Sousa da Conceição⁴, Anderson Trindade Fonseca⁵

^{1, 3, 4 e 5} Médico Veterinário Autônomo – SSA/BA – guttenbergbraun36@hotmail.com

² Professor Assistente do Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos da Escola Medicina Veterinária da UFBA – ricardo.guerra@ufba.br

RESUMO

Este estudo realizou um levantamento da incidência da displasia renal congênita em cães da raça shih tzu no município de Salvador, Bahia. Foram utilizados 100 animais com idade entre 06 e 12 meses. Os animais foram avaliados quanto à arquitetura dos seus rins, sendo classificados como displásicos aqueles que apresentaram tamanho reduzido ou arquitetura córtico-medular alterada. Foi encontrada uma frequência de 9% de displasia na população estudada. Três machos com pelagem tricolor apresentaram a displasia ($p=0,074$). Seis fêmeas com pelagem tricolor apresentaram a displasia renal ($p=0,009$). A incidência em animais de pelagem tricolor foi de 18% ($p=0,002$).

PALAVRAS-CHAVES Displasia renal, Shih tzu, ultrassonografia

THE SIMPLE ULTRASOUND AS DIAGNOSIS OF CONGENITAL RENAL DYSPLASIA IN SHIH TZU DOG RACE IN THE CITY OF SALVADOR - BAHIA

ABSTRACT

This study conducted a survey of the incidence of congenital renal dysplasia in shih tzu dogs from the city of Salvador, Bahia. A total of 100 animals aged between 06 and 12 months. The animals were evaluated for the ultrasound architecture of your kidneys and were classified as dysplastic those with small size or changed cortico-medullary architecture. A frequency of 9% of dysplasia has been found in this population. Three males with tricolor pelage showed dysplasia ($p=0.074$). Six females with tricolor coat showed renal dysplasia ($p=0.009$). The incidence in tricolor coat animals was 18% ($p=0.002$).

KEYWORDS: Renal dysplasia, Shih Tzu, ultrasound

INTRODUÇÃO

A Displasia Renal em cães jovens caracteriza-se como uma desordem no desenvolvimento do parênquima renal devido a uma diferenciação celular anormal durante o período embrionário, podendo ser de origem hereditária ou congênita, acometendo principalmente animais de quatro meses a dois anos de idade (Pereira et al., 2007). O diagnóstico é feito a partir da identificação de falha renal em animais imaturos e adultos jovens. Avaliações radiográficas e ultrassonográficas revelam um rim de tamanho reduzido e às vezes fibrosado (Bovee, 2003).

O objetivo deste trabalho foi determinar a incidência da displasia renal congênita em cães da raça Shih Tzu, até o primeiro ano de vida, no município de Salvador, Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 100 caninos da raça Shih Tzu, entre seis meses e um ano de vida, estes, subdivididos em grupo G1 (25 machos de pelagem preta e branca(PB)), grupo G2 (25 machos de pelagem tricolor), grupo G3 (25 fêmeas de pelagem preta e branca) e o grupo G4 (25 fêmeas de pelagem tricolor).

Os animais foram avaliados quanto à arquitetura ultrassonográfica dos seus rins. Sendo classificados como displásicos aqueles que apresentaram tamanho reduzido ou arquitetura córtico-medular alterada. Não foram avaliadas alterações clínicas dos animais, inclusive daqueles que apresentaram características ultrassonográficas sugestivas de displasia renal.

RESULTADOS

Foi encontrada uma frequência de 9% de displasia renal na população estudada. Este estudo avaliou a correlação entre a pelagem e o sexo dos grupos experimentais e a ocorrência de displasia renal. Os resultados podem ser observados na tabela 01.

Tabela 01. Resultados Obtidos.

Grupo	Quantidade	Sexo	Pelagem	Displasia	%	Significância
G1	25	Macho	PB	0	0,0%	G1 x G2 P=0,074
G2	25	Macho	Tricolor	3	12,0%	
G3	25	Fêmea	PB	0	0,0%	G3 x G4 P=0,009
G4	25	Fêmea	Tricolor	6	24,0%	

A incidência da displasia em animais de pelagem tricolor (G2 + G4) foi de 18%, enquanto nenhum animal de pelagem preta e branca (G1 + G3) apresentou a patologia (p=0,002).

DISCUSSÃO

Os resultados demonstram que, os cães da raça Shih Tzu têm uma predisposição a apresentar esta patologia. Esse achado corrobora com os encontrados por Wakamatsu et. al.(2007), Pereira et. al. (2007), e Bovee (2003), que descrevem a Displasia Renal Juvenil em animais jovens de diversas raças, inclusive a Shih Tzu, apesar da ausência de sintomatologia nos primeiro meses ou anos de vida.

CONCLUSÃO

A ultrassonografia simples demonstrou que displasia renal em cães da raça shih tzu é uma realidade, principalmente em indivíduos com pelagem tricolor, e com incidência ainda maior em fêmeas.

REFERÊNCIAS

BOVEE, K.C. Renal Dysplasia in Shih Tzu Dogs. World Animal Veterinary Association. Bangkok-Thailand, October 24-27, 2003

PEREIRA, G.Q.; PAULA, D.S.; NAGASHIMA, J.K.; BELONI, S.N.E.; GONZALES, J.R.M.e REIS, A.C.F. Displasia Renal em Cão. **Acta Scientiae Veterinariae**. 35(Supl 2): s583-585,. 2007.

WAKAMATSU, N.; SURDYK, K.; CARMICHAEL, K.P.; E BROWN, C.A. Histologic and Ultrastrutural studies of juvenile onset renal disease in four Rottweiler Dogs. **Vet. Pathol**.44:1, 2007.

061. ACOMPANHAMENTO ULTRASSONOGRÁFICO SERIADO DA EVOLUÇÃO DE HIDROPSIA FETAL EM CADELA BULLDOG FRANCÊS

Andreia Regis de Assis¹, Flávia Dada Paiva¹, Mário Sérgio Pillon Tabosa¹, Raphael dos
Reis Roberti Monteiro², Thais Alessandra de Freitas²

¹MV VetDx Imagem Veterinária, Campo Grande-MS - vetdximagem@gmail.com

²MV autônomos – Campo Grande -MS

RESUMO

A hidropsia fetal é caracterizada pelo acúmulo de líquido subcutâneo generalizado (anasarca) e/ou em cavidades serosas e pode ser detectada durante a ultrassonografia gestacional. Este trabalho descreve sonograficamente a evolução de hidropsia em um feto Bulldog Francês à partir dos 42 dias de gestação.

PALAVRAS-CHAVES: Anasarca, feto, cão, ultrassonografia

HYDROPS FETALYS IN THE FRENCH BULLDOG - CASE REPORT

ABSTRACT

Hydrops fetalys is characterized by widespread accumulation of fluid in subcutaneous (anasarca) and/or serous cavities and can be detected by pregnancy ultrasound. This paper describes the evolution of sonographic fetal hydrops in a French Bulldog from 42 days of gestation.

KEYWORDS: Anasarca, fetuses, dog, ultrasound

INTRODUÇÃO

A hidropsia fetal é caracterizada pelo acúmulo anormal de líquido no espaço extravascular, causando edema subcutâneo generalizado (anasarca) e coleções em quantidade variável nas cavidades serosas (peritoneal, pleural e pericárdica) (Toniolo e Vicente, 2003; Sorribas, 2006, Assis et al., 2011).

Ao exame ultrassonográfico, o edema subcutâneo apresenta-se com uma camada anecóica de espessura variável, separando a pele dos tecidos subjacentes do feto (Allen et al., 1989; Hopper et al., 2004, Assis et al., 2011). Localiza-se preferencialmente no dorso e pescoço, estendendo-se ao redor do tronco e crânio em fetos caninos mais gravemente afetados (Hopper et al., 2004). Cistos repletos de líquido podem ser detectados no tecido subcutâneo do pescoço (Sorribas, 2006, Assis et al., 2011).

O prognóstico é de reservado a grave (Sorribas, 2006), a mortalidade neonatal é alta e poucos filhotes sobrevivem (Hopper et al., 2004).

Relata-se o acompanhamento ultrassonográfico seriado da evolução de hidropsia fetal em uma cadela Bulldog Francês.

RELATO DE CASO

Foram realizados exames ultrassonográficos seriados a partir dos 44 dias de inseminação em uma cadela Bulldog Francês de três anos de idade, com seis fetos, sendo um malformado.

Na primeira avaliação foi detectado um feto com edema subcutâneo de 0,8 cm ao longo do tronco (Figura 1A) e cistos cervicais de 0,5 cm. As câmaras cardíacas apresentavam-se dilatadas. A estimativa ultrassonográfica do tempo gestacional foi de 42 dias baseando-se em morfogênese e diâmetro biparietal.

Aos 48 dias de gestação, a espessura do edema subcutâneo mediu 2,0 cm e os cistos cervicais atingiram 1,0 cm, com evolução de efusão pleural (Figura 1B).

Aos 52 dias de gestação constatou-se efusão abdominal no feto malformado (Figura 1C). Foi detectado óbito de um dos outros cinco fetos. A partir desta data procedeu-se acompanhamento sonográfico diário e aos 54 dias o feto malformado veio a óbito. Com o óbito dos fetos foi instituída antibioticoterapia profilática.

Nos exames sequenciais o primeiro feto morto apresentava regressão de tamanho e redução acentuada de líquido amniótico, enquanto o aspecto morfológico do feto malformado morto manteve-se constante.

Figura 1- Sonogramas de feto Bulldog Francês com hidropsia em planos longitudinais. A- 42 dias de gestação. Feto com anasarca. B- 48 dias de gestação. Notar efusão pleural e evolução de edema subcutâneo. C- 52 dias de gestação. Notar efusão pleural e abdominal.

A cesariana foi procedida no dia seguinte após a última avaliação (59 dias de gestação). Durante todo o período gestacional a cadela não apresentou manifestações clínicas intercorrentes e os outros quatro filhotes nasceram saudáveis.

A dissecação do filhote revelou espessamento subcutâneo generalizado de até 1,5 cm de espessura de aspecto gelatinoso e cistos com conteúdo líquido em região

cervical (Figura 2). Os pulmões encontravam-se colabados e a cavidade torácica repleta de líquido.

Figura 2- Dissecção do filhote de Bulldog Francês com hidropsia.

DISCUSSÃO

Os achados de necropsia do filhote anômalo foram compatíveis com os aspectos ultrassonográficos e estão de acordo com o descrito na literatura sobre hidropsia fetal (Sorribas, 2006; Allen et al., 1989; Hopper et al., 2004).

O presente relato reporta a importância do exame ultrassonográfico gestacional seriado uma vez que hidropsia fetal pode apresentar regressão (Hopper et al., 2004) ou progressão (Assis et al., 2011) e ocasionar complicação no parto pela dificuldade de expulsão do filhote edematoso.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a ultrassonografia permite a detecção e monitoramento da evolução da hidropsia fetal.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, W.E.; ENGLAND, G.C.W.; WHITE K.B. Hydrops fetalis diagnosed by real-time ultrasonography in a Bichon Frisé bitch. **Journal of Small Animal Practice**, v.30, n.8, p.465–467, 1989.
- ASSIS, AR; CASTRO, F.C.; FACCO, G.G.; CERRILHO, M.C.M.; CARRIJO, P.R. Diagnóstico ultrassonográfico pré-natal de anasarca em cão da raça Yorkshire: valor prognóstico na determinação de parto distócico – RELATO DE CASO. In: **Anais do Congresso brasileiro da Anclivepa**, Goiânia, 2011. p. 44.
- HOPPER, B.J.; RICHARDSON, J.L.; LESTER, N.V. Spontaneous antenatal resolution of canine hydrops fetalis diagnosed by ultrasound. **Journal of Small Animal Practice**, v. 45, n.1, p. 2-8, 2004.
- SORRIBAS, C.E. **Atlas de Reprodução Canina**. São Paulo: Interbook, 2006. 348p.
- TONIOLLO, G.H.; VICENTE, W.R.R. Parto patológico ou distócico. In: **Manual de obstetrícia veterinária**. São Paulo: Varela, 2003. p.77-84.

062. ASPECTOS ULTRASSONOGRÁFICOS DE PIONEFROSE UNILATERAL EM CADELAS: RELATO DE DOIS CASOS

Andreia Regis de Assis¹, Daniela Torres Cantadori¹, Flávia Dada Paiva¹,

Luciano Pereira de Barros², Mércia amaro Marquetti²

¹ VetDx Imagem Veterinária, Campo Grande-MS - vetdximagem@gmail.com

²Prontovet, Campo Grande-MS

RESUMO

Pionefrose caracteriza-se por infecção renal hidronefrótica que surge a partir de acúmulo de exsudato na pelve renal dilatada. Relata-se dois casos de pionefrose em cadelas comparando achados clínico-laboratoriais e ultrassonográficos. As cadelas foram nefrectomizadas e os aspectos macroscópicos das peças cirúrgicas corresponderam às observações sonográficas.

PALAVRAS-CHAVES Rim, cão, ultrassonografia

SONOGRAPHIC ASPECTS OF UNILATERAL PYONEPHROSIS IN BITCHES: TWO CASE REPORTS

ABSTRACT

Pyonephrosis characterized by hidronefrotica kidney infection that arises from the accumulation of exudate in the dilated renal pelvis. We report two cases of pyonephrosis in dogs comparing clinical and laboratory data and ultrasound. The dogs were nephrectomized and macroscopic aspects of the surgical specimens corresponded to sonographic observations.

KEYWORDS: kidneys, dog, ultrasound

INTRODUÇÃO

Pionefrose refere-se a infecção renal hidronefrótica, decorrente da obstrução aguda ou crônica do trato urinário com infecção superimposta. O envolvimento do parênquima renal pode ocasionar desde uma simples pielonefrite até extensa destruição do órgão (Apparício et al., 2007; Choi et al., 2010). Achados clínicos e ultrassonográficos são associados para concluir o diagnóstico de pionefrose em humanos, mas esses resultados não têm sido investigados em cães (Choi et al., 2010).

A aparência ultrassonográfica do parênquima renal e o grau de dilatação da pelve variam com o tempo da obstrução e ao fato de ser completa ou parcial. A obstrução completa crônica ocasiona atrofia do parênquima renal e em estágios avançados o rim evolui para uma bolsa, delimitada por parede de espessura variável preenchida por conteúdo hiperecogênico (D'Anjou, 2008, Choi et al., 2010). Este trabalho relata dois

casos de pionefrose em cadelas comparando sinais clínicos, laboratoriais e sonográficos.

RELATO DE CASOS

Duas cadelas foram encaminhadas para ultrassonografia abdominal com histórico de prostração, anorexia, poliúria, polidipsia, sensibilidade abdominal, hipertermia, leucocitose e acentuada presença de leucócitos e bactérias na citologia do sedimento urinário. A seguir descrevem-se particularidades de cada caso.

Cadela Lhasa Apso, seis anos de idade. A ultrassonografia evidenciou litíase vesical e pielectasia esquerda com debris ecogênicos (Figura 1A). Institui-se antibioticoterapia durante oito dias procedida de reavaliação sonográfica. A paciente evoluiu com aumento do tamanho renal e dilatação progressiva do sistema coletor preenchido por material hiperecogênico, adelgaçamento de parênquima (Figura 1B).

Figura 1- Cadela Lhasa Apso com pionefrose direita. A e B primeira e segunda avaliação sonográfica, respectivamente. Notar a evolução da dilatação pélvica repleta de debris celulares. C- Peça cirurgica após secção longitudinal, observar a dilatação pélvica e adelgaçamento do parênquima.

Cadela Poodle, oito anos de idade, ovariectomizada há cinco meses em decorrência de piometra. A ultrassonografia revelou renomegalia direita (9,0 cm em eixo longitudinal), acentuado adelgaçamento do parênquima renal e dilatação do sistema coletor repleto por conteúdo hiperecogênico (Figura 2A). Os tecidos adjacentes encontravam-se hiperecogênicos e o ureter não foi visibilizado. A bexiga apresentava intensa presença de ecos puntiformes em suspensão e sedimentados.

Nas duas pacientes o diagnóstico sonográfico sugerido foi de pionefrose e procedida nefrectomia. No transoperatório observou-se acentuada dilatação do ureter nas duas pacientes. Não foi detectada litíase ureteral na cadela Lhasa Apso. Na cadela Poodle foi constatada aderência fibrosa no trajeto do ureter. Os aspectos macroscópicos das peças cirúrgicas corresponderam aos exames de imagem, com dilatação e presença de material purulento no sistema coletor observados após secção do rins (Figuras 1C, 2b e 2C).

Figura 2- Cadela Poodle com piodrose esquerda. A Sonograma renal longitudinal revelando acentuada dilatação pélvica preenchida por conteúdo ecogênico. B – Peça cirúrgica após nefrectomia. Observar espessamento ureteral. C- Secção longitudinal do rim demonstrando dilatação pélvica e presença de material purulento.

DISCUSSÃO

De acordo Choi et al (2010) e D'Anjou (2008) cães com piodrose apresentam pelve renal total ou parcialmente repleta por conteúdo hiperecogênico. Os achados sonográficos do presente relato concordam com estes autores, porém, a associação com a história clínica (sensibilidade abdominal) e exames laboratoriais (leucocitose sanguínea e leucócitos e bactérias no sedimento urinário) de cada paciente foi relevante na CONCLUSÃO diagnóstica. De acordo com Finco (1995) e Apparício et al. (2007) a obstrução do fluxo urinário aumenta o risco de infecção renal através das bactérias hematógenas ou ascendente e tem sido associada com um risco aumentado de pielonefrite.

CONCLUSÃO

A ocorrência de material hiperecogênico no sistema coletor dilatado é indicativo de piodrose e a associação da imagem com os resultados dos exames laboratoriais corrobora com este diagnóstico.

REFERÊNCIAS

- APPARÍCIO, M; VICENTE, W.R.R., FARIAS, A., COVIZZI, G.J., RIBEIRO, A.P.C.; GADELHA, C.R.F. Pyonephrosis following ovariohysterectomy in a bitch: case report. **Ars Veterinária**, v. 23, n. 1, p. 19-22, 2007.
- CHOI, J.; JANG, J.; KIM, H.; YOON, J. Ultrasonographic features of pyonephrosis in dogs. **Veterinary Radiology & Ultrasound**; v.51,n.5, p. 548-553, 2010.
- D'ANJOU, M.A, Kidneys and ureters. In: PENNINCK, D; D'ANJOU, M.A. **Atlas of Small Animal Ultrasonographic**, Iowa: Blackwell Publishing, 2008. p.339-364.
- FINCO, D. R. Obstructive Uropathy and Hydronephrosis. In: OSBORNE, C.A.; FINCO, D.R. **Canine and Feline Nephrology and Urology**. Philadelphia: Pensilvania, 1995. 889 p.

063. AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CEREBRAL DE FELINOS HÍGIDOS

Viviam Rocco Babicsak¹, Luciana Carandina da Silva¹, Guilherme Schiess Cardoso¹,
Vânia Maria de Vasconcelos Machado¹, Luiz Carlos Vulcano¹

¹Universidade Estadual Paulista de Botucatu – viviam.babicsak@gmail.com

RESUMO

A determinação de lesões através da tomografia computadorizada depende do conhecimento do padrão de normalidade das estruturas nesta modalidade. Dessa forma, neste estudo descrevemos os achados tomográficos cerebrais normais de felinos, relacionados à opacidade tecidual, posicionamento da foixe cerebral e simetria ventricular, características qualitativas importantes na detecção de alterações.

PALAVRAS-CHAVES tomografia cerebral, cérebro, felino

QUALITATIVE EVALUATION OF BRAIN COMPUTED TOMOGRAPHY OF HEALTHY FELINES

ABSTRACT

The lesions determination by computed tomography depends on the knowledge of the normal structures by this method. Thus, in this study we describe the normal tomographic findings of the brain of felines, concerning about tissue opacity, falx cerebri position and ventricular symmetry, important qualitative characteristics in detecting alterations.

KEYWORDS: computed tomography, brain, feline

INTRODUÇÃO

Os aspectos tomográficos de doenças cerebrais comumente incluem mudança focal na opacidade tecidual, desvio da foixe cerebral e alteração nas dimensões, formato e posicionamento ventriculares (Tucker e Gavin, 1996), e, portanto, são essas características que devem ser analisadas durante a avaliação tomográfica. Entretanto, para a detecção dessas alterações, o padrão de normalidade deve ser conhecido, dessa forma, neste RESUMO descrevemos os achados qualitativos das imagens tomográficas cerebrais de gatos domésticos saudáveis com relação à opacidade tecidual, posição da foixe cerebral e simetria ventricular.

MATERIAL E MÉTODOS

Neste estudo, foram avaliadas as imagens tomográficas cerebrais de quinze felinos adultos (1 a 10 anos). Estes, que não apresentavam histórico de sintomatologia nervosa, foram considerados hígidos através dos exames físicos gerais e neurológicos e também por meio do exame de cadeia de polimerase (PCR) para os vírus de leucemia (FeLV) e imunodeficiência (FIV) felinas, que demonstrou um resultado negativo para todos. Após o escaneamento tomográfico dos animais sob anestesia, foi realizada a avaliação cerebral qualitativa das imagens.

RESULTADOS

Em 14 animais deste estudo (93,33%), foram observadas discretas variações de opacidade no parênquima cerebral devido à presença de algumas áreas hipoatenuantes de forma multifocal, revelando uma discreta heterogeneidade. Em um felino (6,67%) foram identificadas áreas circunscritas hipoatenuantes distribuídas de forma difusa pelo parênquima cerebral em maior número em comparação ao restante dos animais.

Em 14 felinos (93,33%), não foi observado desvio da foice cerebral, no entanto, em um animal (6,67%), um discreto desvio desta estrutura para o hemisfério cerebral direito foi identificado.

Com relação à simetria dos ventrículos laterais, esta foi identificada em dez animais (66,67%), enquanto que uma assimetria foi verificada em cinco felinos (33,33%).

DISCUSSÃO

Apesar da verificação de discreta heterogeneidade devido à presença de áreas hipoatenuantes no parênquima cerebral, em um animal essas áreas foram observadas em maior número e de modo mais difuso. Esse achado pode estar relacionado a um processo de degeneração axonal uma vez que o animal que apresentou tais imagens tomográficas apresentava-se no limite superior do intervalo da faixa etária estipulada para os animais adultos neste estudo (10 anos). Nesse processo, após a morte celular neuronal, há uma substituição tecidual por líquido cerebrospinal, o que confere à imagem tomográfica a presença de áreas hipoatenuantes no parênquima cerebral (Meyer et al., 1994).

Com relação à foice cerebral, a avaliação se dá quanto à presença de desvios. Estudos prévios indicam que na presença de desvio dessa estrutura deve ser pesquisada a existência de lesões ocupadoras de espaço ou assimetria ventriculares

(Tucker e Gavin, 1996; Paul et al., 2010), no entanto, o animal em que se verificou o discreto desvio da foice cerebral não apresentou nenhum outro achado tomográfico.

Quanto à simetria ventricular, a ausência desta característica não necessariamente sugere a presença de alguma alteração uma vez que a mesma ocorre de forma relativamente comum em animais normais. Em cães saudáveis e jovens da raça labrador retriever foi identificada uma discreta a severa assimetria ventricular em 31% dos animais no estudo de de Haan et al. (1994).

CONCLUSÃO

Uma discreta heterogeneidade cerebral decorrente de alterações na opacidade cerebral, pode ser observada na imagem tomográfica de felinos saudáveis, além de assimetria ventricular. A possibilidade de verificação dessas imagens em animais saudáveis constitui um achado de grande importância de modo que possíveis interpretações errôneas sugerindo anormalidades cerebrais não sejam atribuídas de modo precipitado à essas imagens.

Apoio: FAPESP

REFERÊNCIAS

- DEHAAN, C.E.; KRAFT, S.L.; GAVIN, P.R. et al. Normal variation in size of the lateral ventricles of the labrador retriever dog as assessed by magnetic resonance imaging. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, v. 35, n. 2, p. 83-86, 1994.
- MEYER, J.S.; TAKASHIMA, S.; TERAYAMA, Y. et al. CT changes associated with normal aging of the human brain. **Journal of the Neurological Sciences**, v. 123, n. 1-2, p. 200-208, 1994.
- PAUL, A.E.H.; LENARD, Z.; MANSFIELD, C.S. Computed tomography diagnosis of eight dogs with brain infarction. **Australian Veterinary Journal**, v. 88, n. 10, p. 374-380, 2010.
- TUCKER, R.L., GAVIN, P.R. Brain Imaging. **Veterinary Clinics of North American Small Animal Practice**, v. 26, n. 4, p. 735-758, 1996.

064. DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DE HIDROCEFALIA FETAL EM FELINOS DOMÉSTICOS– RELATO DE DOIS CASOS

Andréia Regis de Assis¹, Antônio Marcelo Quintas Martins², Daniela Torres Cantadori¹,
Flávia Dada Paiva¹, Francielli Cristini de Castro³

¹MV, VetDx Imagem Veterinária, Campo Grande-MS - vetdximagem@gmail.com

²MV UNIDERP – Campo Grande – MS

³Acadêmica de Medicina Veterinária – Campo Grande - MS

RESUMO

A hidrocefalia é o acúmulo patológico de líquido dentro dos ventrículos cerebrais ocasionando ventriculomegalia. O exame ultrassonográfico gestacional de duas gatas revelou fetos com aumento dos ventrículos cerebrais preenchidos por conteúdo anecogênico. Os aspectos macroscópicos da dissecação dos fetos malformados natimortos foram compatíveis com os achados ultrassonográficos. Conclui-se que o exame tem valor diagnóstico e prognóstico na determinação de hidrocefalia fetal em felinos.

PALAVRAS-CHAVES ultrassonografia, feto, hidrocefalia, felino

SONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF FETAL HYDROCEPHALY IN CATS - TWO CASES REPORTS.

ABSTRACT

Hydrocephalus is a pathological accumulation of fluid within the ventricles causing ventriculomegaly. The two cats pregnancy ultrasound examination revealed fetuses with increased cerebral ventricles filled with anechoic content. The patient was underwent to cesarean section and the fetuses necropsied. The macroscopic dissection of malformed fetuses were stillborn consistent with the sonographic findings. In conclusion the ultrasound has diagnostic and prognostic value in determining fetal hydrocephalus in cats.

KEYWORDS: ultrasound, fetus, hydrocephaly, feline

INTRODUÇÃO

A hidrocefalia é o acúmulo patológico de líquido dentro dos ventrículos cerebrais, implicando em aumento do sistema ventricular, geralmente associado à hipoplasia ou à atrofia do tecido circundante (Thomas, 2010). O diagnóstico pós-natal de malformações do sistema nervoso foi relatado em felinos (Greene et al., 1982; Sharp et al., 1999). Distúrbios do desenvolvimento são as causas mais comuns de hidrocefalia. A ação de

teratógenos físicos, químicos e biológicos podem ocasionar falhas no desenvolvimento do tubo neural gerando malformações do encéfalo. O diagnóstico pós-natal é baseado em aspectos clínicos e de imagem (Thomas, 2010). O aumento ventricular repleto de líquido anecogênico e homogêneo é facilmente identificado durante o exame ultrassonográfico (Carvalho et al., 2007). A necropsia revela ventriculomegalia e atrofia do parênquima cerebral (Thomas, 2010). Este trabalho relata dois casos de hidrocefalia fetal detectadas em exames ultrassonográficos de diferentes gatas em período final de gestação.

RELATO DE CASOS

Uma gata SRD (dois anos de idade) e uma Persa (um ano de idade) foram encaminhadas para avaliação ultrassonográfica gestacional com respectivamente 59 e 50 dias de gestação (estimativa ultrassonográfica).

Ao exame foi detectado em cada gata um feto hidrocéfalo caracterizado por áreas anecoicas em encéfalo. Na gata SRD foram constatados dois fetos vivos com diâmetro biparietal (DBP) de 2,3 e 2,6 cm, sendo este último do feto malformado cuja imagem cefálica revelou conteúdo anecoico intracraniano com acentuado adelgaçamento do manto cerebral (Figura 1A). Na gata Persa observou-se três fetos vivos e dentre estes um com dilatação ventricular de 0.6 cm aos 50 dias de gestação (Figura 1B). A paciente foi reavaliada aos 58 dias de gestação evidenciando progressão do tamanho ventricular do cérebro fetal.

Figura 1- Hidrocefalia em felinos. A- Sonograma de feto felino SRD aos 58 dias de gestação revelando acentuada dilatação ventricular. B – Sonograma de feto felino Persa aos 50 dias de gestação. Imagem craniana em plano transversal demonstrando dilatação ventricular e lateral revelando descontinuidade do crânio. C - Dissecção de fetos felinos SRD. Visão dorsal da calota craniana após remoção do tegumento. Feto hidrocéfalo a direita da imagem.

As pacientes foram submetidas a cesariana a critério dos clínicos responsáveis. Os filhotes malformados natimortos foram necropsiados. Os demais filhotes vieram a óbito poucas horas a um dia após o parto. Macroscopicamente os fetos malformados apresentavam abaulamento da calota craniana em comparação com os irmãos (Figura

1C). A exposição do encéfalo revelou adelgaçamento do parênquima cerebral e ventrículos dilatados preenchidos por líquido.

DISCUSSÃO

No presente relato, as características sonográficas do encéfalo fetal foram compatíveis com aquelas descritas na literatura para hidrocefalia em neonatos, com aumento do sistema ventricular preenchido por conteúdo anecoico (Carvalho et al., 2007) e confirmados no exame pós morte evidenciando a aplicação da ultrassonografia gestacional no diagnóstico de malformações.

Não foi possível identificar causas da hidrocefalia neste trabalho. Foi descrita associação de hidranencefalia com panleucopenia felina (Greene et al., 1982) e hidrocefalia e hidroanencefalia com parvovirose em filhotes de gata imunizada durante a prenhez com vacina de parvovirus vivo modificado (Sharp et al., 1999). Esta associação carece de maior investigação, porém frente a tal possibilidade, gatas com diagnóstico de hidrocefalia fetal, merecem maior atenção na conduta clínica.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a ultrassonografia possibilita o diagnóstico de hidrocefalia fetal em felinos e sua importância reside na determinação de malformações incompatíveis com a viabilidade dos filhotes ou que possam causar distocia.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, C.F.; ANDRADE NETO, J.P.; JIMENEZ, C.D.; DINIZ, S.A.; CERRI, G.G.; CHAMMAS Ultra-sonografia transcraniana em cães com distúrbios neurológicos de origem central. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**. v. 59, n. 6, p. 1412-1416. 2007.
- GREENE, C.E.; GORGASZ, E.J.; MARTIN, C.L. Hydranencephaly associated with feline panleukopenia. **Journal American Veterinary Medicine Association**. v. 180, n. 7, p. 767-768. 1982.
- SHARP, N.J.; DAVIS, B.J.; GUY, J.S.; CULLEN, J.M.; STEINGOLD, Hydranencephaly and cerebellar hypoplasia in two kittens attributed to intrauterine parvovirus infection. **Journal Compendium Pathology**. v.121, n.1, p. 39-53. 1999.
- THOMAS, W.B. Hydrocephalus in dogs and cats. **Veterinary Clinic of North American Small Animal in Practice**. v. 40, n. 1, p.143-59. 2010.

065. DIAGNÓSTICO ULTRASSONOGRÁFICO DE VENTRICULOMEGALIA CEREBRAL EM CÃES – RELATO DE QUATRO CASOS

Andreia Regis de Assis¹, Daniela Torres Cantadori¹, Flávia Dada Paiva¹, Francielli
Cristini de Castro², Mário Sérgio Pillon Tabosa¹, Verônica Jorge Babo-Terra³

¹ MV VetDx Imagem Veterinária, Campo Grande-MS-vetdximagem@gmail.com

² Acadêmica de Medicina UNIDERP- Campo Grande-MS.

³ MV Dra, Curso de Medicina Veterinária-UFMS.

RESUMO

Foram constatados diferentes graus de dilatação dos ventrículos cerebrais por meio da ultrassonografia transcraniana em quatro cães de diferentes raças e idades. O exame permite mensuração do tamanho dos ventrículos cerebrais em cães de pequeno porte ou com fontanela aberta e pode constituir-se em uma ferramenta viável na monitorização de ventriculomegalia na rotina clínica veterinária.

PALAVRAS-CHAVES Cérebro, hidrocefalia, ultrassonografia, cão

ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF BRAIN VENTRICULOMEGALY IN DOGS – FOUR CASE REPORTS

ABSTRACT

Several degrees of cerebral ventricles dilatation have been detected by transcranial ultrasound in four dogs of different breeds and ages. The test allows measurement of the size of the cerebral ventricles in small breed dogs or with open fontanel and can therefore may represent a viable tool in monitoring ventriculomegaly in routine veterinary practice.

KEYWORDS: Brain, hydrocephaly, ultrasound. dog

INTRODUÇÃO

Hidrocefalia é um acúmulo anormal de líquido resultante de desequilíbrio na sua produção, fluxo ou absorção, ocasionando ventriculomegalia e aumento da pressão intracraniana. Pode ser congênita (primária) ou adquirida (secundária), sendo os transtornos de desenvolvimento as causas mais comuns. Os sinais clínicos incluem convulsões, deficiências visuais e cognitivas, podendo ter evolução rapidamente progressiva. A maior incidência ocorre em raças *toys* (Chihuahua, Yorkshire e Poodle). Cães acometidos frequentemente apresentam fontanela aberta. O diagnóstico baseia-se em sinais clínicos e de imagem (Harrington et al., 1996; Thomas, 2010). Na medicina, a ultrassonografia transcraniana é a modalidade adotada inicialmente em

neonatos e crianças com suspeita de hidrocefalia (Carvalho et al, 2007). Este trabalho relata o diagnóstico ultrassonográfico de ventriculomegalia em quatro cães.

RELATO DE CASOS

Foi realizada ultrassonografia transcraniana em quatro cães (02 machos e 02 fêmeas), de diferentes raças, com idade entre cinco meses e três anos, enumerados de 1 a 4 e apresentados na Tabela 1. O exame foi executado com transdutor microconvexo de 5,0 – 6,5 – 8,0 MHz.

O exame revelou aumento dos ventrículos cerebrais preenchidos por conteúdo anecogênico em todos os pacientes (Figura 1). As medidas ventriculares são apresentadas na Tabela 1. Nos cães 1 e 4 observou-se acentuada dilatação ventricular com atrofia do parênquima cerebral (Figuras 1A e 1D).

Caso	Raça	Idade	sexo	Histórico	Medida ventricular	
					Direito	Esquerdo
01	SRD	03 anos	M	Convulsões	34,2mm	33,4mm
02	Yorkshire	05 meses	M	Fontanela aberta	09,1mm	12,8mm,
03	Chihuahua	07 meses	F	Fontanela aberta, estrabismo	7,48 mm	7,12 mm
04	Pinscher	02 anos	F	Estrabismo	15 mm	16 mm

Tabela 1 – Dados de resenha, histórico e medidas ventriculares dorsoventrais dos cães deste estudo.

Apenas um cão (1) apresentava sinais neurológicos representados por crises convulsivas de evolução progressiva e não responsiva a terapia medicamentosa há dois dias. Dois animais (2 e 3) foram encaminhados para avaliação sonográfica em decorrência de fontanela bregmática persistente detectada ao exame físico e em um animal (4) a neurosonográfica foi realizada em decorrência de aparente bftalmia com exame oftalmológico e tonometria ocular dentro de parâmetros normais. Nos animais 1 e 4, a palpação não demonstrou abertura de fontanelas.

Figura 1- Sonogramas de cães com ventriculomegalia. A- SRD. B- Yorkshire. C- Chihuahua. D- Pinscher.

DISCUSSÃO

Embora a tomografia computadorizada e ressonância magnética sejam métodos eficazes no diagnóstico de ventriculomegalia, tal condição pode ser constatada pela ultrassonografia em cães com fontanela aberta e alguns de pequeno porte, (Thomas, 2010). No presente trabalho, o exame mostrou-se eficaz no diagnóstico e graduação da ventriculomegalia e os achados de imagem foram compatíveis com os descritos na literatura com dilatação ventricular preenchida por conteúdo anecoico e adelgaçamento do manto cerebral (Hudson et al., 1990; Carvalho et al., 2007). Todos os pacientes apresentaram mensurações ventriculares maiores que 0,35 mm, considerada medida *borderline* para a classificação de ventriculomegalia em cães (Carvalho et al, 2007).

CONCLUSÃO

A ultrassonografia é uma alternativa viável para mensurar diâmetros ventriculares e pode representar um instrumento de monitorização em cães com ventriculomegalia na rotina clínica veterinária.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, C. F.; ANDRADE NETO, J. P.; JIMENEZ, C. D.; DINIZ, S. A.; CERRI, G. G.; CHAMMAS, M. C. Ultra-sonografia transcraniana em cães com distúrbios neurológicos de origem central. **Arquivo brasileiro de medicina veterinária e zootecnia**, v. 59, n.6, p. 1412-1416, 2007.
- HARRINGTON, M.L.; BAGLEY, R.S.; MOORE, M.P. Hydrocephalus. **Veterinary Clinic North American Small Animal in Practice**, v.26, n.4, p. 843-56, 1996.
- HUDSON, J. A.; SIMPSON, S. T.; BUXTON, D. F.; CARTEE, R. E.; STEISS, J. E. Ultrasonographic diagnosis of canine hydrocephalus. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, v.31, n.2, p.50-58.1990.
- THOMAS, W.B. Hydrocephalus in dogs and cats. **Veterinary Clinic North American Small Animal Practice**, v. 40, n.1, p.143-59, 2010.

066. HISTEROCELE GESTACIONAL ASSOCIADA A HIDROCEFALIA FETAL EM CADELA – RELATO DE CASO

Andreia Regis de Assis¹, Daniela Torres Cantadori¹, Flávia Dada Paiva¹, Mário Sérgio Pillon Tabosa¹, Rosana Antunes Estrada²

¹VetDx, Campo Grande-MS - vetdximagem@gmail.com

²Zhenvet –Campo Grande-MS

RESUMO

Relata-se o diagnóstico ultrassonográfico de histerocele gestacional associada a hidrocefalia fetal em uma cadela sem raça definida. Os achados de necropsia dos fetos estavam em concordância com as alterações ultrassonográficas. A histerocele gestacional e a hidrocefalia fetal são condições já descritas, porém relatos de ocorrência concomitante não foram encontrados na literatura revisada.

PALAVRAS-CHAVES hérnia inguinal; útero; hidrocefalia fetal, cão

GESTATIONAL HYSTEROCELE ASSOATED WITH FETAL HYDROCEPHALUS IN BITCH - CASE REPORT

ABSTRACT

This paper reports the sonographic diagnosis of gestational hysterocele fetal hydrocephalus associated with a mongrel dog. The necropsy of the fetuses were in agreement with the sonographic changes. The hysterocele pregnancy and fetal hydrocephalus are conditions already described, but reports of simultaneous occurrence were not found in the literature reviewed.

KEYWORDS: inguinal hernia, uterus, fetal hydrocephalus, dog

INTRODUÇÃO

A Histerocele é caracterizada pela protusão do útero para o subcutâneo de origem traumática ou não, ocasionando sinais clínicos em decorrência de gestação ou piometra. O diagnóstico diferencial inclui neoplasias, abscesso ou hematomas e pode ser auxiliado pela ultrassonografia ou radiografia. O tratamento recomendado é ovariosalpingohisterectomia (Oliveira et al., 2000; Fossum et al., 2005).

A hidrocefalia é o acúmulo patológico de líquido no sistema nervoso central ocasionando ventriculomegalia. As formas congênitas ocorrem devido a defeitos estruturais que obstruem o fluxo liquórico. A ventriculomegalia é identificada na ultrassonografia como estruturas repletas de líquido anecogênico, com o tecido mais ecogênico do córtex circundante (Carvalho et al., 2007).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de histerocele gravídica associada à hidrocefalia fetal em cadela, detectados ao exame ultrassonográfico.

RELATO DE CASO

Uma cadela sem raça definida, de oito anos de idade, com aumento de volume inguinal esquerdo rápido e progressivo (figura 1A), de consistência mole e indolor á palpação, foi encaminhada para avaliação ultrassonográfica.

Ao exame, constatou-se gestação de 42 dias com corno uterino em região subcutânea inguinal esquerda contendo duas bolsas gestacionais. Um terceiro feto encontrava-se em segmento uterino intracavitário. Foi detectada hidrocefalia em um feto do corno ectópico (figura 1B) e diferença entre as medidas de diâmetro biparietal (DBP) dos fetos. A paciente foi submetida à ovariossalpingohisterectomia.

Figura 1 – Cadela com histerocele gestacional. A- Aumento de volume inguinal esquerdo. B- Sonograma Gestacional demonstrando feto com Hidrocefalia. C- Dissecação dos fetos revelando a diferença de tamanho de fontanela bregmática após a remoção do revestimento da calota craniana.

Características	Feto 01	Feto 02	Feto 03
Localização do feto	Corno uterino direito tópico	Corno uterino esquerdo herniado	
Comprimento craniossacral	8,2 cm	7,0 cm	7,0 cm
Diâmetro Biparietal	1,5 cm	1,5 cm	1,2 cm
Tamanho da fontanela	0,8 x 0,8 cm	1,2 x 1,0 cm	1,0 x 0,5 cm

Quadro 1- Dimensões craniossacral, biparietal e de abertura de fontanela realizadas durante a avaliação macroscópica de cada feto.

Macroscopicamente observou-se diferença de tamanho entre os fetos, sendo os menores (fetos 2 e 3) localizados na herniação. O quadro 1 apresenta as dimensões craniossacral, biparietal e de abertura de fontanela realizadas durante a avaliação macroscópica. O feto hidrocéfalo (feto 2) apresentou dimensão craniossacral intermediária entre os demais. O DBP do menor feto foi 1,2 cm enquanto do maior feto

foi 1,5 cm. O feto hidrocéfalo (feto 2) apresentou 1,5 cm de DBP e maior abertura de fontanela (figura 1C).

DISCUSSÃO

A histerocele deve ser considerada no diagnóstico diferencial de aumentos de volumes inguinais, sendo a ultrassonografia útil na sua distinção (Fossum et al., 2005), como foi observado no presente relato.

Os achados ultrassonográficos de hidrocefalia fetal observados neste caso são compatíveis com os descritos na literatura com aumento dos ventrículos cerebrais com conteúdo anecogênico (Carvalho et al., 2007).

Tanto a histerocele quanto a hidrocefalia fetal já foram descritas isoladamente, porém relatos de ocorrência concomitante não foram encontrados na literatura revisada. Apesar do feto malformado encontrar-se no corno herniado, não foi possível estabelecer relação de causa entre as duas condições apresentadas neste relato, podendo-se questionar o papel da histerocele como fator de risco para a ocorrência da hidrocefalia, supondo que o corno ectópico tenha aporte sanguíneo reduzido devido a compressão e que esta condição possa acarretar comprometimento do desenvolvimento fetal, porém, necessita-se de mais pesquisas que comprovem tal teoria.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a ultrassonografia é uma ferramenta útil no diagnóstico de histerocele gestacional e na constatação de hidrocefalia fetal em cães.

REFERÊNCIAS

- CARVALHO, C.F.; ANDRADE NETO, J.P.; JIMENEZ, C.D.; DINIZ, S.A.; CERRI, G.G.; CHAMMAS, M.C. Ultra-sonografia transcraniana em cães com distúrbios neurológicos de origem central. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.59, n.6, p.1412-1416, 2007.
- FOSSUM, T. W.; HEDLUND, C.S.; HULSE, D. A.; JOHNSON, A. L.; SEIM III, H. B.; WILLARD, M. D.; CARROL, G. L. Cirurgia da cavidade abdominal. In: FOSSUM, T. W.; **Cirurgia de pequenos animais**. 2 ed., São Paulo: Roca, 2005. p. 264-269.
- OLIVEIRA, S. T.; MENDONÇA, C. S.; FARIA, M. A. R. Histerocele inguinal com gestação em cadela - relato de dois casos. **Clínica Veterinária**, n. 25, p. 27-31, 2000.

067. RADIOGRAFIA TORACICA EM CUTIAS (*Dasyprocta prymnolopha*, WAGLER 1831)

Anaemilia das Neves Diniz¹, Videline Rodrigues de Sousa², Natália Leite³, João Macêdo de Sousa⁴, Paulo Victor Garrêto Rodrigues dos Santos⁵, Flávio Ribeiro Alves⁶.

¹Universidade Federal do Piauí – anaemilia.diniz@yahoo.com.br

²Universidade Federal do Piauí – videlinavet@live.com

³Universidade Federal do Piauí – nataliansl@hotmail.com

⁴Universidade Federal do Piauí – smacedo@ufpi.br

⁵Universidade Federal do Piauí – victorgarreto@hotmail.com

⁶Universidade Federal do Piauí – flavioribeiro@ufpi.edu.br

RESUMO

A Cutia (*Dasyprocta* sp.) é um mamífero roedor que ocorre em todo território nacional e atualmente é uma importante espécie criada em cativeiro. Foram realizadas radiografias torácicas em projeções laterais de 30 Cutias sendo 15 machos e 15 fêmeas. O VHS mensurado demonstrou média de $7,75 \pm 0,48v$ para os machos e $7,61 \pm 0,34v$ para as fêmeas. O presente estudo permitiu o estabelecimento dos primeiros valores de referência para mensurações cardíaca nesta espécie.

PALAVRAS-CHAVES VHS, Roedores Selvagens, Radiologia

CHEST RADIOGRAPH IN AGOUTI (*Dasyprocta prymnolopha*, WAGLER 1831)

ABSTRACT

The Agouti (*Dasyprocta Primnolopha*, WAGLER 1831) is mammalian rodent that occurs throughout the country and currently in a important species bred in captivity. Chest radiographs in the lateral projections 30 and 15 Agouti males and 15 females were made. The VHS measured showed an average of $7.75 \pm 0.48 v$ for males and $7.61 \pm 0.34 v$ for females. The present study allowed the establishment of the first reference values for cardiac measurements in this species.

KEYWORDS: VHS, Wild Rodents, Radiology

INTRODUÇÃO

A Cutia (*Dasyprocta* sp.) é um mamífero roedor que ocorre em todo território nacional, para a qual tem se desprendido grande preocupação quanto a sua conservação (HOSKEN E SILVEIRA, 2001).

Estudos por imagem da função cardíaca em espécies silvestres ainda são escassos (HEATLEY, 2009). Dentre eles, o VHS (vertebral heart score) é um método utilizado para prever alterações do tamanho cardíaco em radiografias laterais, por meio do sistema de unidade vertebral, comparando-se dimensões cardíacas aos

comprimentos das vértebras torácicas a partir de T4 (BUCHANAN e BUCHELER, 1995). Contudo, ainda são escassos valores de VHS para a maioria das espécies de animais selvagens.

O presente estudo visou apresentar padrões de normalidade de VHS para Cutias (*Dasyprocta prymnolopha*, Wagler 1831), clinicamente saudáveis mantidas em cativeiro, buscando subsidiar valores de referência para estudos futuros nesta espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas 30 cutias (*Dasyprocta prymnolopha*), com idade entre um e três anos, divididas em dois grupos com 15 machos e 15 fêmeas. Os animais foram contidos fisicamente com os membros torácicos tracionados cranialmente, membros pélvicos tracionados caudalmente, em decúbito lateral sobre uma mesa de exames semiológicos (M-351).

O VHS foi calculado a partir das mensurações da distância apicobasilar e do maior diâmetro cardíaco e sobrepondo-as às vértebras torácicas, a partir de T4 em radiografias latero-laterais (LL), conforme previamente estabelecido por Buchanan e Bücheler (1995). Os dados obtidos foram analisados por meio de teste *t de Student* pareado para interpretação dos parâmetros, considerando um intervalo de confiança de 5% ($p < 0,05$).

RESULTADOS

O VHS mensurado demonstrou média de $7,75 \pm 0,48v$ para os machos e $7,61 \pm 0,34v$ para as fêmeas, não ocorrendo diferença entre machos e fêmeas ($p = 0,73$, $p > 0,05$). Considerando todo o grupo amostrado, a média do IT e do VHS foram $9,82 \pm 2,73^\circ$ e $7,68 \pm 0,41v$, respectivamente.

DISCUSSÃO

As medidas de VHS ($7,68 \pm 0,41v$) obtidas mostraram-se menores do que os valores de referência para cães ($9,7 \pm 0,7v$) (SLEEPER e BUCHANAN, 2001), mas semelhantes àsquelas referenciadas para gatos adultos ($7,5 \pm 0,30v$) (LITSTER e BUCHANAN, 2000). Este valor também foi menor do que o mensurado para o sagui ($9,42 \pm 0,44v$) (WAGNER e KIRBERGER, 2005), o porco-espinho (BLACK et al., 2001) e o morcego ($9,7 \pm 0,5v$) (GARDNER et al., 2007) e maior do que o observado em furões ($5,39 \pm 0,45$ - projeção LL) (ONUMA et al., 2009).

CONCLUSÃO

A aplicação da técnica de VHS sem contenção química foi bem tolerada e forneceu informações valiosas à identificação de alterações cardíacas, permitindo o estabelecimento dos primeiros valores de referência do VHS para nesta espécie.

REFERÊNCIAS

- HEATLEY, J. J. 2009. Cardiovascular anatomy, physiology and disease of rodent and small exotic mammals. **Vet Clin Exot Anim.** 12: 99–113.
- BUCHANAN, J. W, BÜCHELER, J. 1995. Vertebral scale system to measure canine heart size in radiographs. **Journal of the American Veterinary Medical Association.**2: 194-199.
- SLEEPER, M. M, BUCHANAN, J. W. 2001. Vertebral scale system to measure heart size in growing puppies. **J. Am. Vet. Med. Assoc.** 219: 57–59.
- LITSTER, A. L, BUCHANAN J. W. 2000. Vertebral scale system to measure feline heart size in radiographs. **J. Am. Vet. Med. Assoc.** 216:.210-214.
- WAGNER, W. M, KIRBERGER, R. M. 2005. Radiographic anatomy of the thorax and abdomen of the common marmoset (*Callithrix jacchus*). **Veterinary Radiology & Ultrasound.** 46: 217–224.
- GARDNER, A, THOMPSON, M. S, FONTENOT, D, GIBSON, N, HEARD, D. J. 2007. Radiographic evaluation of cardiac size in flying fox species (*Pteropus rodricensis*, *P. hypomelanus*, and *P. vampyrus*). **Journal of Zoo and Wildlife Medicine.** 38: 192-200
- BLACK, P. A, MARSHALL, C, SEYFRIED, A. W, BARTIN, A. M. 2011. Cardiac Assessment of African Hedgehogs, *Atelerix albiventris*. **Journal of Zoo and Wildlife Medicine.** 42: 49-53.
- ONUMA, M, KONDO, H, ONO, S, UEKI, M, SHIBUYA, H, SATO, T. 2009. Radiographic Measurement of Cardiac Size in 64 Ferrets. **J. Vet. Med. Sci.** 71: 355–358.

068. RADIOLOGIA CONVENCIONAL E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO DIAGNÓSTICO DE BULAS PULMONARES ASSOCIADAS A PNEUMOTÓRAX E PNEUMOMEDIASTINO EM UM CÃO

Viviam Rocco Babicsak¹, Débora Rodrigues dos Santos¹, Cristiane de Abreu Estanislau¹, Sheila Canevese Rahal¹, Vânia Maria de Vasconcelos Machado¹, Luiz Carlos Vulcano¹

¹Universidade Estadual Paulista de Botucatu – viviam.babicsak@gmail.com

RESUMO

As bulas pulmonares são afecções congênitas ou adquiridas, que podem sofrer rupturas e/ou ainda estar associadas a outras doenças pulmonares, resultando em um desconforto respiratório ao paciente. Nesse relato descrevemos as técnicas radiográficas e tomográficas como métodos de diagnóstico de bulas pulmonares em um cão com pneumotórax e pneumomediastino decorrente da ruptura dessas estruturas.

PALAVRAS-CHAVES: radiologia, tomografia computadorizada, bulas pulmonares, cão

CONVENTIONAL RADIOLOGY AND COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF PULMONARY BULLAE ASSOCIATED TO PNEUMOTHORAX AND PNEUMOMEDIASTINUM IN A DOG

ABSTRACT

The pulmonary bullae are congenital or acquired disorders, which can be disrupted and/or even be associated with other lung diseases, resulting in respiratory distress to the patient. In this report we describe the radiographic and tomographic techniques as diagnostic methods of pulmonary bullae in a dog with pneumothorax and pneumomediastinum caused by rupture of these structures.

KEYWORDS: radiology, computed tomography, pulmonary bullae, dog

INTRODUÇÃO

As bulas pulmonares, causa comum de pneumotórax e pneumomediastino (Valentine et al, 1996), podem ser congênitas, originando-se a partir de brônquios, ou adquiridas, formadas em decorrência de uma ruptura alveolar. A radiografia torácica pode ser um método diagnóstico dessa doença (Valentine et al, 1996) entretanto, a modalidade de escolha para a identificação de bulas pulmonares é a tomografia computadorizada (Au et al, 2006).

RELATO DE CASO

Um canino macho, sem raça definida, de 11 anos de idade, que apresentava apatia, anorexia, dispnéia, taquipnéia, cianose e anemia, como sinais clínicos, foi atendido no hospital veterinário e submetido a radiografias torácicas e a tomografia computadorizada. Nestes exames, foi identificada uma coleção gasosa livre em espaço pleural (pneumotórax) e mediastino (pneumomediastino), associada a diversas áreas de limites bem definidos e regulares, paredes finas, apresentando conteúdo gasoso em seu interior, de dimensões variadas, distribuídas por todo o parênquima pulmonar, compatíveis com bulas pulmonares. Através dessas técnicas de imagem, foi observada uma opacificação dos lobos pulmonares, que apresentavam padrão pulmonar intersticial, bronquial e alveolar.

DISCUSSÃO

As bulas pulmonares são áreas cavitárias preenchidas por conteúdo gasoso dentro do parênquima pulmonar resultantes da destruição, dilatação e confluência do alvéolo adjacente (Murphy e Fishman, 1988). O diagnóstico definitivo dessa afecção pode ser difícil uma vez que estas estruturas podem não ser aparentes em radiografias torácicas por apresentarem pequenas dimensões e se localizarem nas margens dos lobos pulmonares (Valentine et al, 1996), sendo assim, a tomografia computadorizada é a modalidade de escolha para o diagnóstico dessa doença (Au et al, 2006). Além disso, a tomografia pode fornecer importantes informações relacionadas ao planejamento cirúrgico dos animais (Au et al, 2006), uma vez que estudos demonstraram que cães com pneumotórax espontâneo tratados cirurgicamente apresentam baixas taxa de recorrência e mortalidade em comparação com cães tratados conservativamente (Puerto et al, 2002).

As bulas pulmonares são visibilizadas como áreas cavitárias de limites definidos, regulares e finos, que apresentam coleção gasosa em seu interior, e geralmente são distribuídas de forma difusa pelos lobos pulmonares (Silverman et al, 1974), como encontrado no presente RELATO DE CASO. Em uma menor frequência, os cistos podem apresentar-se solitários, ocorrendo mais comumente no lobo médio direito (Silverman et al, 1974). Associada á elas, também pode ser observada a presença de pneumotórax e pneumomediastino, decorrentes da ruptura da bula, que geralmente são diagnosticadas apenas por meio de radiografias, não requerendo a realização do exame tomográfico (Au et al, 2006). As bulas pulmonares, o pneumotórax e o pneumomediastino puderam ser identificados através da radiografia no indivíduo

relatado, no entanto, a tomografia forneceu informações detalhadas sobre cada bula pulmonar existente no animal.

Além disso, em associação às bulas pulmonares, algumas alterações como abscessos, bronquiectasias, pneumonia ou tumores podem ser observadas no pulmão (Silverman et al, 1974). No animal relatado foi observada uma opacificação pulmonar, melhor avaliada nas imagens tomográficas, podendo ser originada por uma doença pulmonar associada como pneumonia e/ou uma atelectasia decorrente do pneumotórax.

CONCLUSÃO

As bulas pulmonares, que frequentemente podem romper, causando pneumotórax e pneumomediastino, podem ser diagnosticadas através de métodos radiográfico e tomográfico. Esta última modalidade apresenta certas vantagens sobre a radiografia uma vez que permite a identificação de pequenas bulas não detectáveis pela radiografia e uma melhor avaliação do parênquima pulmonar, além de possibilitar o planejamento nos casos cirúrgicos.

REFERÊNCIAS

- AU, J.J.; WEISMAN, D.L.; STEFANACCI, J.D. et al. Use of computed tomography for evaluation of lung lesions associated with spontaneous pneumothorax in dogs: 12 cases (1999-2002). **Journal of the American Veterinary Medicine Association**, v.228, n.5, p.733-737, 2006.
- MURPHY, D.M.; FISHMAN, A.P. Bullous disease of the lung. In: FISHMAN, A.P. **Pulmonary diseases and disorders**. 2 ed. Nova York: McGraw-Hill, 1998, 1219-1222 p.
- PUERTO, D.A.; BROCKMAN, D.J.; LINDQUIST, C. et al. Surgical and nonsurgical management of and selected risk factors for spontaneous pneumothorax in dogs: 64 cases (1986-1999). **Journal of the American Veterinary Medicine Association**, v.220, n.11, p.1670-1674, 2002.
- SILVERMAN, S.; POULOS, P.W.; SUTER, P.F. Cavitary pulmonary lesions in animals. **Veterinary Radiology**, v.17, n.4, p.134-146, 1974.
- VALENTINE, A.; SMEAK, D.; ALLEN, D. et al. Spontaneous pneumothorax in dogs. **Compendium of Continuing Education for the Pract Veterinarian**, v.18, n.1, p.53-62, 1996.

069. URETROCISTOGRAFIA NO DIAGNÓSTICO DE REFLUXO VESICoureTERAL: RELATO DE CASO

Gladsthon Divino de **Sousa Filho**³, André Ribeiro **Fayad**³, Rogério Marques **Fortes**¹,
Tales Dias **Prado**¹, Maria Clorinda Soares **Fioravanti**², Naida Cristina **Borges**²

¹ Mestrando(a) em Ciência Animal pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG.

² Professora Doutora do Departamento de Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG.

³ Graduando em Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG.

RESUMO

As alterações no sistema urinário de pequenos animais têm motivado investigações de diagnóstico por imagem, permitindo detectar massas abdominais, rupturas, presença de litíases, agenesias e hipoplasias renais; o uso de soluções contrastantes possibilitou a maior definição da imagem radiográfica contribuindo com um diagnóstico mais preciso. A uretrocistografia retrógrada tem sido estudada para avaliação do trato urinário (TU) inferior e cada vez mais disseminada.

PALAVRAS-CHAVES: radiografia contrastada, trato urinário, cão, refluxo vesicoureteral

CYSTOURETHROGRAPHY IN DIAGNOSTIC OF VESICoureTERAL REFLUX

ABSTRACT

The changes in the urinary system of small animals have motivated investigations of diagnostic imaging, allowing detection of abdominal masses, ruptures, presence of gallstones, kidney agenesis and hypoplasia, the use of contrasting solutions allowed for greater definition of the radiographic image contributing to a more accurate diagnosis. The retrograde cystourethrography has been used for evaluation of lower urinary tract and its application has been increasingly widespread

KEYWORDS: contrast radiography, urinary tract, dog, vesicoureteral reflux

INTRODUÇÃO

Indica-se uretrocistografia (UC) sempre que os sinais clínicos forem sugestivos de alterações no TU inferior, tais como hematória, disúria, estrangúria, polaciúria e bacteriúria; podendo realizá-la para avaliação de estruturas adjacentes à bexiga. Os exames de imagem radiográfica usados para exploração do sistema urinário são a

radiografia abdominal simples e a urografia excretora (UE). A UE visa principalmente o estudo das estruturas superiores; o estudo da UC tem permitido a avaliação de estruturas inferiores deste sistema, com aplicação retrógrada (RIELLA, 2003). Em medicina a uretrocistografia é considerada uma técnica segura e de fácil execução, sendo largamente empregada como auxiliar na detecção de morfologia anormal que não possa ser observada pela radiografia simples (ESSMAN, 2005).

RELATO DO CASO

Foi atendido um cão, macho, Dachshund, dois anos, sete quilos, com histórico de prostração e inapetência, apresentando hematúria e êmese. Ao exame físico foram observadas mucosas normocoradas, leve desidratação, abdome distendido, TPC inferior à 2 segundos, normotermia, hematúria, frequência cardíaca e respiratória normais. No hemograma foi observado leucocitose, as bioquímicas séricas (uréia, creatinina, ALT e albumina) apresentaram-se aumentadas. À ultrassonografia abdominal bexiga distendida, parede normoespessada, conteúdo hipoeecóico heterogêneo, com pontos hipereecóicos em suspensão. Foi realizada radiografia simples do abdome, em seguida a UC foi procedida com INTRODUÇÃO de solução de contraste a 20%, através de sondagem vesico-uretral, na dose de 10 ml/Kg, totalizando 70 ml possibilitando a visualização de refluxo vesicoureteral (Figura 1).

Figura 1: Imagem radiográfica de cão macho, raça Dachshund, em decúbito latero-lateral direito, com utilização de contraste iodado. Evidencia-se presença do refluxo vesicoureteral. Fonte: Arquivo Pessoal, 2010.

DISCUSSÃO

Refluxo vesicoureteral caracteriza-se pelo fluxo retrógrado da urina da bexiga para os ureteres e pelve renal. Se a urina retrógrada apresentar patógenos, infecções do trato urinário superior ocorrerão. O animal do relato teve seu diagnóstico baseado pelos sinais clínicos apresentados associados ao histórico e aos exames radiográficos complementares. Com base na patogenia o refluxo pode ser dividido em duas categorias: primária (má-formação intrínseca da junção vesicoureteral) e secundária (disfunção da junção adquirida). Nos casos primários em animais de 7 a 12 semanas o refluxo pode ser auto limitante sendo mais comum em machos e bilaterais. Nos casos

secundários o refluxo pode estar associado a obstruções mecânicas ou funcionais, inflamação da junção vesicoureteral, ureteres ectópicos e principalmente por infecções dos tratos urinários. Para realização da uretrocistografia com contraste positivo, recomenda-se o preenchimento da bexiga com solução iodada a 20%, e dose de 10 ml/kg, o preenchimento deve ser lento e interrompido quando a bexiga apresentar-se túrgida; as imagens radiográficas devem ser realizadas no mínimo em quatro posições: dois decúbitos laterais direito e esquerdo e decúbitos ventral e dorsal, permitindo assim uma avaliação adequada de toda a estrutura do trato urinário inferior (Essman, 2005). O tratamento consiste na utilização de terapia medicamentosa para erradicar a infecção do trato urinário e, se preciso cirurgia para corrigir a junção vesicoureteral anormal (King LR. 1992).

CONCLUSÃO

A uretrocistografia miccional pode ser mais uma ferramenta na avaliação do trato urinário inferior, sua fácil aplicação e a segurança permite que seja amplamente utilizada pelo clínico veterinário.

REFERÊNCIAS

- ESSMAN, S. C. Contrast Cystography. **Clinical Techniques in Small Animal Practice, Philadelphia**, v. 20, p. 46-51, 2005.
- KEALY, JK., MCALLISTER, H. The abdomen. In: Kealy, J.K., McAllister, H. **Diagnostic Radiology & Ultrasonography of the Dog and Cat**. 4.ed. Missouri: Elsevier Saunders, p. 147-155, 2005.
- KING LR. Vesicoureteral reflux, megaureter, and ureteral reimplantation. In: Walsh PC, Retik AB, Stamey TA, Vaughn ED, eds. **Campbell's Urology**. 6th ed. Philadelphia, Pennsylvania: WB
- RIELLA, M. C. **Princípios de Nefrologia e Distúrbios Hidroeletrolítico**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. 1033 p.

070. REABILITAÇÃO DE CÃO COM SEQUELA DA CINOMOSE ATRAVÉS DE FISIOTERAPIA: RELATO DE CASO

Luana Clemente de Oliveira¹, Gabriela Mendes Campos², Débora Monteiro Navarro³ e Laila Carina Soares dos Santos⁴

¹ Graduanda do Curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – luana_clemente@hotmail.com

^{2, 3} Mestranda na Pós Graduação em Ciência Animal Tropical na UFRPE.

⁴ Médica Veterinária autônoma capacitada em Fisioterapia Animal.

RESUMO

Foi realizado fisioterapia em um cão com seqüelas da cinomose. O cão apresentou inicialmente dificuldades locomotoras. O tratamento instituído foi realizado através da estimulação dos reflexos, estímulos proprioceptivos da coordenação motora e contrações musculares. Após o tratamento o paciente retornou a se locomover sem dificuldades.

PALAVRAS-CHAVES: Cinomose, fisioterapia, reabilitação

REHABILITATION OF DOG WITH SEQUEL DISTEMPER BY PHYSIOTHERAPY: CASE REPORT

ABSTRACT

Physiotherapy was performed in a dog with distemper sequel. The dog initially presented with locomotor difficulty. The treatment was performed by reflexes stimulation, proprioceptive of motor and muscle contractions. After treatment the patient returned to move around without difficulty.

KEYWORDS: distemper, physiotherapy, rehabilitation

INTRODUÇÃO

Cinomose é uma doença infecciosa, altamente contagiosa provocada por paramixovírus (SHAW & IHLE, 1999). Esta virose acomete cães de qualquer idade, raça e sexo, com maior predileção por filhotes e cães não-vacinados. É uma das doenças neurológicas mais comuns em cães, os sinais mais observados são: cegueira, convulsões, ataxias cerebelar, vestibular ou sensorial, mioclonias, anorexia, corrimento nasal e ocular, febre, tosse, vômito (VANDEVELDE & CACHIM, 1992). A fisioterapia tem função fundamental na recuperação dos animais acometidos com debilidade neurológica. O objetivo deste trabalho foi descrever como atua a fisioterapia na recuperação do animal com cinomose.

RELATO DE CASO

Foi atendido em uma clínica veterinária na cidade de Recife/PE, um cão, SRD, 6 anos, 12,8kg, apresentando seqüela de cinomose. Após a anamnese clínica e fisioterápica, o dono relatou que o animal estava a 15 dias sem andar. Clinicamente, o animal se apresentava estável, demonstrando tetraparesia ao exame físico. No exame fisioterápico específico o animal apresentou todos os reflexos testados presentes, sendo eles: bicipital, flexor, isquiático, femoral, patelar e perineal. A propriocepção estava ausente nos membros posteriores direito (MPD) e esquerdo (MPE), no membro anterior esquerdo (MAE) e diminuída no membro anterior direito (MAD). Apresentou dor superficial e profunda em todos os membros. Na coluna o animal apresentava leve cifose, não demonstrando dor à palpação. O exame da musculatura revelou: flacidez muscular nos membros posteriores (MP'S) e hipotrofia discreta e rigidez articular nos membros anteriores (MA'S). O protocolo fisioterápico inicial instituído foi: compressas mornas nos membros anteriores, massagem, alongamento, movimentação passiva das articulações, pinçamento do dígito, escova, permanência em estação, estímulo proprioceptivo em pista de propriocepção e FES (Functional Electrical Stimulation).

Posteriormente com a melhora do animal acrescentou-se caminhada com obstáculos para facilitar a deambulação. As sessões de fisioterapia foram realizadas 2 vezes por semana, visto a dificuldade do proprietário, entretanto foi preconizado um protocolo fisioterápico, com uma bateria de exercícios a serem realizados rotineiramente no animal pelo proprietário. Para correção da cifose realizou-se exercícios com bola terapêutica e alongamento da região cervical com auxílio de petiscos. Na quinta sessão o animal apresentou melhoras significativas e normalidade na sétima sessão quando recebeu alta médica.

DISCUSSÃO

As compressas mornas foram utilizadas de acordo com o recomendado por Mikail & Pedro, 2006, com indicações para analgesia, relaxamento muscular e aumento da amplitude articular. Segundo Anderson, 1998, a massagem auxilia o retorno sanguíneo, linfático, além de produzir mobilização muscular, podendo remover acúmulos de líquidos e desfazer aderências. Já o alongamento mantém os músculos flexíveis e promove a diminuição das tensões musculares, que com o auxílio da bola terapêutica melhora a coordenação motora geral. A literatura demonstra que a frequência ideal do trabalho de alongamento é uma vez por semana para manutenção de amplitude de movimento e de três a cinco vezes por semana quando o objetivo é aumento de amplitude de movimento (KNUDSON, 1998). Portanto foi imprescindível

além da fisioterapia realizada, a colaboração do proprietário em realizar os exercícios propostos pelo médico veterinário. A terapêutica do animal em estudo está baseada em literatura de acordo com Mikail & Pedro, 2006, portanto o estímulo proprioceptivo com auxílio do tapete teve a função de excitar as terminações nervosas a fim de obter as contrações musculares de reabilitar e ainda reprogramar a função do movimento.

Enquanto o pinçamento do dígito estimulou o reflexo profundo e promoveu retorno da força muscular. Além do tratamento com o FES que utiliza a corrente elétrica para provocar a contração de músculos paralisados ou enfraquecidos.

CONCLUSÃO

A fisioterapia é uma área recente em ascensão na medicina veterinária, que atua na reabilitação de injúrias neuro-ortopédicas. A sua utilização em pacientes com problemas neurológicos decorrente da cinomose foi comprovada ser eficaz.

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, B. Alongue-se. Edição 9, Summus, 1998.
- KNUDSON, D. **Stretching: from science to practice**. p. 38-42. 1998
- MIKAIL, S.; PEDRO, C.R. **Fisioterapia Veterinária** Ed. Manole p. 50-51, 63, 73, 2006.
- SHAW, D.; IHLE, S. **Medicina Interna de Pequenos Animais**. Ed. Artmed. p.620 1999.
- VANDEVELDE, M., CACHIN, M. The neurological form of canine distemper. In: KIRK, R.W., BONAGURA, J.D. **Current veterinary therapy XI. Small animal practice**. Philadelphia: Saunders, 1992. p. 1003-1007.

071. TRATAMENTO POR ACUPUNTURA EM UM PASTOR BELGA COM MIELOPATIA DEGENERATIVA

Sílvia Oliveira Battastini¹, Wanessa Krüger Beheregaray Gianotti¹, Erika Pinto de Azevedo¹, Giordano Cabral Gianotti¹, Emerson Antonio Contesini¹

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul

RESUMO

Cadela da raça Pastor Belga de sete anos de idade apresentou claudicação de membro pélvico sem alterações radiográficas. Após a primeira sessão de acupuntura, apresentou melhora temporária no quadro clínico. Com a evolução dos sintomas à paraplegia durante o período de tratamento, foi realizada mielografia, que não apresentou alterações, sugerindo o diagnóstico de mielopatia degenerativa. Devido ao prognóstico reservado e ao agravamento do quadro clínico mesmo com a realização da acupuntura, foi realizada a eutanásia. A confirmação do diagnóstico foi feita por meio do exame de necropsia.

PALAVRAS-CHAVE: acupuntura, paraparesia progressiva crônica, mielopatia

ACUPUNCTURE TREATMENT IN A BELGIAN SHEPHERD DOG WITH DEGENERATIVE MYELOPATHY

ABSTRACT

Seven year-old Belgian Shepherd female dog presented faltering in the right pelvic limb, with no radiographic alterations. After acupuncture session, the patient showed clinically temporary improvement. With the evolution of the symptoms to paraplegia, even though she was being treated, a myelography exam was performed and no alterations were found, suggesting the degenerative myelopathy diagnosis. Euthanasia was performed due to the aggravation of the case and the bad prognosis. The diagnosis was confirmed after a necropsy exam.

KEYWORDS: acupuncture, chronic progressive paraparesis, myelopathy

INTRODUÇÃO

A Mielopatia Degenerativa (MD) é uma síndrome caracterizada por ataxia e paresia espástica de neurônio motor superior em membros pélvicos (MP), que progride à paraplegia. Apresenta caráter ascendente, e os sinais tardios incluem tetraplegia e

lesão em nervos cranianos, levando o animal a óbito por paralisia respiratória (Chrisman et al., 2005; Coates e Winninger, 2010).

O tratamento da MD é direcionado ao controle dos processos inflamatórios provocados pela deposição de imunocomplexos nos vasos da medula espinhal (Chrisman et al., 2005). Estudos recentes propõem a ação da acupuntura inibindo processos neuroinflamatórios (Liu et al., 2004), característicos da MD. Além disso, a acupuntura também apresenta excelentes resultados ao atenuar a gravidade dos sinais clínicos secundários, como dor e contratura muscular (Downing, 2011). O objetivo deste trabalho é relatar o tratamento com acupuntura de uma paciente apresentando quadro progressivo de MD.

RELATO DO CASO

Uma cadela da raça Pastor Belga, de sete anos de idade, apresentou claudicação em MP direito (MPD) e contratura muscular na região lombar, quadro que havia iniciado cinco meses antes sem resposta a tratamento com corticosteroide e repouso, e sem alterações radiográficas. Ao exame clínico, apresentou déficit proprioceptivo e atrofia muscular em MPD. Após a primeira sessão de acupuntura, a paciente apresentou leve melhora no quadro, porém, após três sessões de tratamento, não retornou ao atendimento por dois meses. Ao retorno, apresentava paraparesia de MP. Na sessão seguinte, já era capaz de manter-se em estação, e em quatro semanas de tratamento a paciente já deambulava, porém sem o apoio do MPD. Entretanto, apesar do tratamento, voltou a apresentar paraparesia de MP. Assim, foi recomendada avaliação concomitante por médico veterinário neurologista e exame de mielografia, que não apresentou alterações, levando ao diagnóstico sugestivo de MD. Por tratar-se de uma doença degenerativa progressiva e sem cura, e pelo agravamento do quadro clínico, foi realizada eutanásia por decisão dos proprietários. O exame histopatológico *post mortem* apresentava sinais característicos da doença, como perda de axônios e de mielina na substância branca da medula espinhal, e confirmou o diagnóstico de MD.

DISCUSSÃO

A acupuntura restabelece funções neurológicas, normalizando a transmissão dos impulsos nervosos (Angeli et al., 2005), o que contribui no tratamento de condições neurológicas degenerativas. Além disso, ela também inibe a neuroinflamação por diferentes vias no sistema nervoso central (Liu et al., 2004). Assim é provável que, no presente caso, a acupuntura tenha reduzido o processo inflamatório degenerativo na medula espinhal e diminuído os sinais clínicos secundários da doença, como a

contratura muscular, através da ação em receptores opióides e do ácido γ -aminobutírico (Downing, 2011).

CONCLUSÃO

O tratamento com acupuntura provocou efeitos benéficos no quadro clínico da paciente, provavelmente modulando os impulsos nervosos, retardando o processo inflamatório auto-imune e promovendo relaxamento muscular, assim reduzindo temporariamente os sinais clínicos primários e secundários da doença, o que promoveu melhoria na qualidade de vida da paciente até o momento da eutanásia.

REFERÊNCIAS

- ANGELI, A.L.; JOAQUIM, J.G.F.; GAMA, E.D. et al. Outcome of 119 dogs and cats treated at the acupuncture unit of the Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science of the University of São Paulo State, Botucatu city, Brazil. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, v.42, n.1, p.68-74, 2005.
- CHRISMAN, C.; MARIANI, C.; PLATT, S. et al. **Neurologia para o clínico de pequenos animais**. São Paulo: Rocca, 2005. 336 p.
- COATES, J.R.; WININGER, F.A. Canine Degenerative Myelopathy. **Veterinary Clinic of Small Animals**, v.40, p.929-950, 2010.
- DOWNING, R. The role of physical medicine and rehabilitation for patients in palliative and hospice care. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v.41, n.3, p.591-608, 2011.
- LIU, X.Y.; ZHOU, H.F.; PAN, Y.L., et al. Electro-acupuncture stimulation protects dopaminergic neurons from inflammation-mediated damage in medial forebrain bundle-transected rats. **Experimental Neurology**, v.189, p.189-196, 2004.

072. COLANGITE NEUTROFÍLICA CRÔNICA NUM CÃO – RELATO DE CASO

Simone scherer¹, Letícia Mendes Fratini², Gabriela Lobo D'ávila³, Luciana Branquinho Queiroga⁴, Adriana Cunha Muschner⁴. Émerson Antônio Contesini⁵

¹Doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Veterinária (FAVET) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – simone.scherer9@hotmail.com

² Residente do Hospital de Clínicas Veterinárias da FAVET-UFRGS

³ Aluno de graduação da FAVET-UFRGS

⁴ Médica veterinária autônoma

⁵ Professor Associado do Departamento de Medicina Animal da FAVET-UFRGS.

RESUMO

A colangite é um distúrbio inflamatório que acomete o trato biliar podendo atingir o fígado. Esta doença é mais comum em gatos, é classificada em neutrofílica (crônica e aguda), e linfocítica. O presente trabalho relata um caso clínico de colangite neutrofílica crônica em um cão da raça Poodle com 12 anos de idade.

PALAVRAS-CHAVES: vesicular biliar, fígado, canino

CHRONIC NEUTROFILIC COLANGITIS IN ONE DOG – CASE REPORT

ABSTRACT

Cholangitis is defined as inflammation of the biliary tract that extends into the liver. This is more common in cats, it's histologically classified into neutrofilic (chronic and acute) and lymphocytic. The present work report a clinical case of chronic neutrofilic cholangitis in twelve-year-old Poodle dog.

KEYWORDS: Gallbladder, liver, canine

INTRODUÇÃO

A colangite é um distúrbio inflamatório que acomete o trato biliar podendo atingir os hepatócitos adjacentes, podendo ser somente inflamatória ou ter origem infecciosa. É uma afecção raramente descrita na espécie canina (Bunch, 2010; Johnson e Sherding, 2008). Acredita-se que infecções bacterianas crônicas em outras partes do corpo ou infecção ascendente do trato digestivo podem predispor a doença (Johnson e Sherding, 2008; Richter, 2005). A colangite neutrofílica crônica (CNC) tem progressão lenta e está frequentemente associada à fibrose portal e proliferação acentuada do ducto biliar, podendo evoluir para uma cirrose hepática (Fossum, 2007; Johnson e Sherding, 2008).

RELATO DE CASO

Um canino da raça Poodle, macho, 12 anos, com a queixa de vômitos intermitentes há um mês. Ao exame clínico o animal apresentou moderado desconforto abdominal e 6% de desidratação. Foi realizada ultrassonografia abdominal(USA) que evidenciou bordas hepáticas arredondadas, parênquima alterado, vesícula biliar (VB) repleta, não sendo possível avaliar o colédoco. As alterações na bioquímica sanguínea encontradas foram um aumento da fosfatase alcalina de 1230,82 u/L e nos valores de alanina transaminase de 119,75 u/L. Três dias após a internação o animal não apresentou melhora do quadro, uma nova USA foi realizada demonstrando um aumento significativo da VB em relação à anterior. Optou-se por fazer uma laparotomia exploratória. A VB foi localizada e encontrava-se exageradamente ingurgitada (Figura 1 A). As vias biliares extra-hepáticas (VBEH) estavam aumentadas (Figura1 B), mas não obstruídas e o fígado encontrava-se alterado. O conteúdo da VB foi enviado para cultura e antibiograma. Foi coletado um pequeno fragmento do lobo lateral direito do fígado para biópsia.

Figura 1- (A) Vesícula biliar exageradamente aumentada; (B) Colédoco ingurgitado (seta).

A biópsia hepática diagnosticou uma moderada hepatite crônica ativa com fibrose e agressão periportal e presença de neutrófilos. A cultura e antibiograma do líquido vesical foi compatível com contaminação por *Klebsiella spp.* e sensível a enrofloxacina. Disposto destes laudos concluiu-se que se tratava de um caso colangite neutrofílica crônica. O animal foi tratado com enrofloxacina, ácido ursodesoxicólico, colchicina, S-adenosilmetionina e vitamina E. Dez dias após a alta, o animal voltou a clínica em ótimo estado geral, foram repetidos a USA, que visibilizou a VB com repleção adequada e os resultados dos exames bioquímicos e hematológicos estavam dentro dos valores normais para a espécie. O tratamento medicamentoso seguiu por mais 20 dias.

DISCUSSÃO

A CNC é definida como a inflamação do trato biliar que se estende para o parênquima hepático. Acredita-se que a infecção bacteriana ascendente do intestino delgado seja uma das principais causas. No caso relatado esta foi a provável causa da doença, pois o animal não apresentava infecção em outros órgãos, e a análise do conteúdo da VB resultou em contaminação por *Klebsiella ssp* bactéria presente frequentemente no intestino delgado (Fossum, 2007; Johnson e Sherding, 2008). É fundamental a realização de exames complementares e muitas vezes somente a análise histopatológica conclui o diagnóstico (Fossum, 2007) como no presente relato.

CONCLUSÃO

Apesar de o tratamento clínico ser o de eleição em casos de CNC, a laparotomia exploratória foi peça chave no diagnóstico deste caso, uma vez que possibilitou descartar obstrução de VBEH e colher amostras para histopatológico, cultura e antibiograma para o correto diagnóstico desta afecção.

REFERÊNCIAS

- BUNCH, S.E. Doenças hepatobiliares no cão. In: NELSON, R. W.; COUTO, C. G. **Medicina interna de pequenos animais**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. cap. 38, pp. 512-514.
- FOSSUM, T.W. **Cirurgia de pequenos animais**. 3. São Paulo: Elsevier, 2007. Cap. 19 p.339-530.
- JOHNSON, S.E.; SHERDING, R.G.. Hepatopatias e doenças do trato biliar. In: BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R.G. **Manual Saunders: clínica de pequenos animais**. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008. Cap. 71. p.827-828.
- RICHTER, K.P.; Doenças do Fígado e do sistema Hepatobiliar. In: Tams T.R. **Gastroenterologia de Pequenos Animais**. 2. ed. São Paulo: Roca, 2005. p.337-338.

073. AVALIAÇÃO CLÍNICA DE CÃES COM CINOMOSE CANINA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Cristine Dossin Bastos Fischer¹, Laura Melo Pereira¹, Carolina Butori Xavier¹, Vagner Ricardo Lunge².

¹Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (HV-ULBRA)–
tinevet@terra.com.br

²Universidade Luterana do Brasil

RESUMO

O vírus da cinomose canina (CDV, do inglês *canine distemper virus*) é agente causador de importante doença infecciosa em cães. O objetivo deste trabalho foi realizar uma análise dos principais sinais clínicos presentes em animais com cinomose e comparar com a progressão da doença. 175 animais com suspeita de cinomose foram avaliados no período de março/ 2010 a junho/ 2011. A presença do CDV foi confirmada em 89 cães (50,9%). O sinal clínico mais freqüente foi conjuntivite (77,5%) e na evolução clínica de 84 destes cães, 42 (50%) tiveram alta médica, 30 (35,7%) foram eutanasiados e 12 (14,3%) vieram a óbito.

PALAVRAS-CHAVE: cães, vírus da cinomose canina, RT-PCR

CLINICAL FEATURES IN DOGS WITH CANINE DISTEMPER IN RIO GRANDE DO SUL STATE

ABSTRACT

Canine distemper virus (CDV) is an agent of an important infectious disease in dogs. The objective of this study was to analyze the main clinical signs present in animals with distemper and compare them to the progression of disease. 175 animals suspected of distemper were evaluated from March/2010 to June/2011. The presence of CDV was confirmed in 89 dogs (50.9%). The most frequent clinical symptom was conjunctivitis (77.5%) and in the clinical course of 84 of them, 42 (50%) were discharged, 30 (35.7%) were euthanized and 12 (14.3%) died during treatment.

KEYWORDS: dogs, canine distemper virus, RT-PCR

INTRODUÇÃO

O vírus da cinomose canina (CDV, *canine distemper virus*) é o causador de importante doença em cães caracterizada por sintomatologia multisistêmica e mortalidade variável. Os sinais clínicos podem incluir os sistemas gastrintestinal, respiratório e neurológico, com mortalidade de 50%. O diagnóstico inicial da doença é estabelecido pela suspeita clínica após a anamnese e o exame físico. Diferentes

estudos destacam o teste imuno-cromatográfico rápido (detecção de antígenos) e a RT-PCR (detecção do RNA viral) para o diagnóstico etiológico *ante mortem* da infecção pelo CDV (An et al., 2008; Gebara et al., 2004). O objetivo deste trabalho foi analisar os sinais clínicos e a progressão da cinomose canina em cães em um Hospital Veterinário da região metropolitana de Porto Alegre.

MATERIAL E MÉTODOS

Os pacientes do estudo foram cães com sintomatologia compatível com cinomose atendidos na rotina clínica de um Hospital Veterinário em Canoas, no período de março/2010 a junho/2011. Os cães foram submetidos à avaliação clínica e coleta de exames complementares como suabe conjuntival para detecção do antígeno do CDV por imunoensaio cromatográfico (Anigen Rapid CDV) e sangue total e/ou urina para detecção do RNA viral pela técnica de transcrição reversa seguida de duas etapas da reação em cadeia da polimerase - *nested*-RT-PCR. Os cães receberam tratamento com ou sem internação hospitalar. A evolução clínica foi classificada em alta, óbito e eutanásia. Cães com um ou mais testes específicos positivos nas amostras biológicas foram considerados como infectados pelo CDV.

RESULTADOS

Durante o período do estudo, foram atendidos 175 cães que estavam em primeira consulta clínica e apresentaram suspeita de cinomose. Com base nas análises laboratoriais, a presença do CDV foi confirmada em 89 dos cães suspeitos (50,9%). O sinal clínico mais freqüente nos animais positivos foi conjuntivite (77,5%). Foi possível acompanhar a evolução clínica de 168 cães. Nos 84 animais com doença confirmada, 42 (50%) tiveram alta médica e não apresentaram outros sinais de doença, 30 (35,7%) foram eutanasiados e 12 (14,3%) vieram a óbito durante o tratamento.

DISCUSSÃO

Quando se compara a evolução dos animais com e sem diagnóstico confirmado de cinomose, observa-se que 85,7% dos animais com cinomose foram eutanasiados enquanto 14,3% dos cães sem a doença o foram. A cinomose canina é a principal causa de eutanásia em cães (Figuera et al., 2008) e ferramentas que auxiliem o clínico veterinário no diagnóstico precoce da infecção pelo CDV, podem auxiliá-lo na definição de novos protocolos terapêuticos (Dal Pozzo et al., 2009) e no prognóstico dos animais, já que neste estudo, a mortalidade alcançou 50%. O diagnóstico da cinomose canina normalmente é realizado pelo médico veterinário por critérios clínicos em uma primeira

consulta (Greene e Appel, 2006) e no presente estudo, 175 cães estavam em primeira consulta no Hospital e apresentaram suspeita de cinomose, com a presença do CDV sendo confirmada em 89 dos cães suspeitos (50,9%). Os sinais clínicos mais observados nos cães com cinomose foram conjuntivite (77,5%) e sinais neurológicos, como mioclonias e convulsões (50,6%). Mas, também ocorreram sinais gastrintestinais, como vômito (21,3%); diarreia (15,4%) e pústulas abdominais (17,7%), no entanto estes foram significativamente menores. Estes sinais são descritos por Greene e Appel (2006) para a doença.

CONCLUSÃO

A cinomose foi causa de doença em 50,9% de cães avaliados neste estudo sendo a conjuntivite o principal sinal clínico nos animais. A cinomose canina ainda é importante causa de eutanásia em cães.

Nota: Comissão de Ética no Uso de Animais da ULBRA- CEP-ULBRA 2009-023A.

REFERÊNCIAS

- AN, D.J.; KIM, T.Y.; SONG, D.S. et al. An Immunochromatography Assay for Rapid Antemortem Diagnosis of Dogs Suspected to Have Canine Distemper. **Journal of Virological Methods**. v. 147, p. 244–249, 2008.
- DAL POZZO, F.; VIOLA, G.; FRANCESCA, V. et al. Antiviral Efficacy of EICAR against Canine Distemper Virus (CDV) in vitro. **Research in Veterinary Science**, v.88, p.339-344, 2009.
- FIGHERA, R.A.; SOUZA, T.M.; SILVA, M.C. et al.. Causas de Morte e Razões para Eutanásia de Cães na Mesoregião do Centro Ocidental Rio-Grandense (1965-2004). **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.28, n.44, p.223-230, 2008.
- GEBARA, C.M.S.; WOSIACKI, S.R.; NEGRÃO, F.J. et al. Detecção do Gene da Nucleoproteína do Vírus da Cinomose Canina por RT-PCR em Urina de Cães com Sinais Clínicos de Cinomose. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 56, n. 4, p. 480-487, 2004.
- GREENE, C.E.; APPEL, M.J. Canine Distemper. In.: GREENE, C. E. **Infectious Diseases of the Dog and Cat**. Philadelphia: Saunders Company, 2006. p. 25-41.

074. CO-INFECÇÃO POR *Leishmania (Leishmania) chagasi* E *Trypanosoma caninum* EM CÃO DE CUIABÁ, MATO GROSSO – RELATO DE CASO

Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida^{1,2}, Valéria Régia Franco Sousa², Fabiano Borges Figueiredo¹, Juliana Helena da Silva Barros¹, Maria de Fátima Madeira¹

¹Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas – IPEC/FIOCRUZ – arleferreira@gmail.com

²Universidade Federal de Mato Grosso

RESUMO

O presente relato descreve a co-infecção por *Leishmania (Leishmania) chagasi* e *Trypanosoma caninum* em cão de Cuiabá - MT. Cão, macho, Sem Raça Definida, três anos de idade foi avaliado em estudo para leishmaniose canina. Através de cultura parasitológica obteve-se isolamento de *L. (L.) chagasi* em amostra de medula óssea e de *T. caninum* de fragmento de pele íntegra. Esse relato ressalta a importância da adoção de ferramentas diagnósticas que discriminem os agentes etiológicos envolvidos na infecção canina, principalmente em áreas endêmicas de sobreposição.

PALAVRAS-CHAVE: *Leishmania (Leishmania) chagasi*, *Trypanosoma caninum*, cão, Cuiabá

CO-INFECTION FOR *Leishmania (Leishmania) chagasi* AND *Trypanosoma caninum* IN DOGS OF CUIABÁ, MATO GROSSO – CASE REPORT

ABSTRACT

This report describes the co-infection with *Leishmania (Leishmania) chagasi* and *Trypanosoma caninum* in dog Cuiabá - MT. Dog, male, mixed breed, three years of age was evaluated in a study for canine leishmaniasis. Through parasitological culture isolation was obtained from *L. (L.) chagasi* in a sample of bone marrow and *T. caninum* fragment of intact skin. This report highlights the importance of the adoption of diagnostic tools that discriminate between the etiologic agents involved in canine infection, especially in endemic areas of overlap.

KEYWORDS: *Leishmania (Leishmania) chagasi*, *Trypanosoma caninum*, dog, Cuiabá

INTRODUÇÃO

Leishmania e *Trypanosoma* são agentes de importância em saúde pública e econômica, causando doenças em animais e no homem. Em algumas enfermidades ocasionadas por esses agentes, os cães são considerados importantes reservatórios e fonte de transmissão em áreas endêmicas (Umezawa et al., 2009). Em áreas de

sobreposição desses parasitos é comum o relato de infecções mistas (Savani et al., 2005). *Trypanosoma caninum* foi descrito na cidade de Cuiabá recentemente, onde casos de leishmaniose visceral canina (LVC) também ocorrem (Almeida et al., 2011). O presente relato descreve a co-infecção por *L. (L.) chagasi* e *T. caninum* em cão de Cuiabá/MT.

RELATO DE CASO

Canino, Sem Raça Definida, Macho, três anos foi avaliado em estudo para LVC. No momento da visita, o cão apresentava linfadenomegalia generalizada. Procedeu-se então coleta de sangue, amostra de medula óssea do esterno, linfonodo e fragmentos de pele íntegra para exames laboratoriais visando isolamento parasitário, detecção de DNA de *Leishmania* sp e sorologia para leishmaniose através de imunofluorescência indireta (IFI). A IFI foi positiva com título de anticorpos específicos para *Leishmania* sp. de 1:40 e obteve-se amplificação de DNA de *Leishmania* sp em amostra de medula óssea. A cultura foi negativa para fragmentos de pele, medula óssea e sangue.

Um mês após, realizou-se nova coleta. Na IFI observou-se um aumento no título de anticorpos para 1:160 e isolou-se *Trypanosoma caninum* em fragmentos de pele íntegra (Almeida et al., 2011). Cinco meses após, o animal foi reavaliado, tendo o mesmo apresentado piora no quadro clínico, sendo observado apatia, mucosas pálidas, linfadenomegalia generalizada, esplenomegalia e conjuntivite. A IFI, nesse momento apresentou o resultado de 1:640 e obteve-se isolamento de *L. (L.) chagasi* em amostra de medula óssea, caracterizada por isoenzimas.

DISCUSSÃO

Para controlar a expansão da leishmaniose visceral (LV), a eutanásia de cães sororreagentes é uma das ações realizadas no Brasil. Cuiabá é considerada área de transmissão moderada de LV, no entanto o estudo da LVC é focado em inquéritos sorológicos (Mestre et al., 2011). A utilização do isolamento parasitário, além de ter confirmado a presença de *L. (L.) chagasi* nesta região, detectou a presença de *T. caninum*, espécie descrita primariamente na cidade do Rio de Janeiro (Madeira et al., 2009). O isolamento dessas duas espécies em um mesmo animal reforça a presença de áreas de sobreposição e amplia o relato da infecção mista por diferentes espécies de tripanosomatídeos em cães domésticos. Apesar das descrições não revelarem patogenicidade do *T. caninum* ao cão, o seu encontro em áreas de circulação de *L. (L.) chagasi* pode, como descrito por Silva et al. (2011) dificultar as medidas de prevenção

e controle, tendo em vista a ocorrência de reações cruzadas nos testes sorológicos entre os mesmos.

CONCLUSÃO

Esse relato ressalta a importância da adoção de ferramentas diagnósticas que discriminem os agentes etiológicos envolvidos na infecção canina, principalmente em áreas endêmicas de sobreposição.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, A.B.P.F.; SOUSA, V.R.F.; BOA-SORTE, E.C. et al. Use of parasitological culture to detect *Leishmania (Leishmania) chagasi* in naturally infected dogs. **Vector-Borne and Zoonotic Diseases**, v.11, n.12, p.1555-1560, 2011.
- MADEIRA, M.F.; SOUSA, M.A.; BARROS, J.H.S. et al. *Trypanosoma caninum* n. sp. (Protozoa: Kinetoplastida) isolated from intact skin of a domestic dog (*Canis familiaris*) captured in Rio de Janeiro, Brazil. **Parasitology**, v.136, p.411-423, 2009.
- MESTRE, G.L.C.; RIBEIRO, A.L.M., MIYAZAKI, R.D. et al. Study of phlebotomine sand flies and canine infection in areas of human visceral leishmaniasis, Cuiabá, Mato Grosso. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, v. 20, n. 3, p. 228-234, 2011.
- SAVANI, E.S.; NUNES, V.L.; GALATI, E.A. et al. Occurrence of co-infection by *Leishmania (Leishmania) chagasi* and *Trypanosoma (Trypanozoon) evansi* in a dog in the State of Mato Grosso do Sul, Brazil. **Memórias do Instituto Oswaldo Cruz**, v.100, n.7, p.739-41, 2005.
- SILVA, D.A.; MADEIRA, M.F.; TEIXEIRA, A.C. et al. Laboratory tests performed on *Leishmania* seroreactive dogs euthanized by the leishmaniasis control program. **Veterinary Parasitology**, v.179, p.257-261, 2011.
- UMEZAWA, E.S.; SOUZA A.I.; PINEDO-CANCINO, V. et al. TESA-blot for the diagnosis of Chagas disease in dogs from co-endemic regions for *Trypanosoma cruzi*, *Trypanosoma evansi* and *Leishmania chagasi*. **Acta Tropica**, v.111, p.15-20, 2009.

075. CRIPTOCOCOSE INTESTINAL EM CÃO – RELATO DE CASO

Amanda Resende Duarte¹, Vanessa Del Bianco², Luiz Henrique de Araújo Machado³

¹ Pós graduanda do Departamento de Clínica Veterinária, FMVZ/UNESP-Botucatu

² Médica Veterinária – Hospital Veterinário Cães e Gatos 24 horas

³ Prof. Ass. Dr. do Departamento de Clínica Veterinária, FMVZ/UNESP-Botucatu

RESUMO

A criptococose é uma micose sistêmica oportunista, que acomete animais e seres humanos. As apresentações clínicas mais comuns estão relacionadas com o trato respiratório e sistema nervoso central. O acometimento primário do trato gastrointestinal é considerado raro em cães. Os sintomas mais comuns estão associados à apatia, anorexia, perda de peso e granulomas nos órgãos afetados. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de criptococose intestinal, causando enterite crônica e intussuscepção em cão.

PALAVRAS CHAVE: Criptococose, trato gastrointestinal, enterite crônica, cão

INTESTINAL CRYPTOCOCCOSIS IN A DOG – REPORT CASE

ABSTRACT

Cryptococcosis is a systemic mycosis that affects humans and animals. The most common clinical presentations are associated with respiratory and central nervous system. The involvement of the gastrointestinal tract is considered rare in dogs. The most common symptoms are associated with apathy, anorexia, weight loss and granulomas in affected organs. The objective of this study is to report a case of intestinal cryptococcosis, causing chronic enteritis and intussusception in a dog.

KEYWORDS: Cryptococcosis, gastrointestinal tract, chronic enteritis, dog

INTRODUÇÃO

A Criptococose é uma importante micose sistêmica, oportunista, de distribuição mundial que acomete mamíferos domésticos, animais silvestres e o homem. (MALIK, 1995). *Cryptococcus neoformans* e *Cryptococcus gattii* são os agentes etiológicos responsáveis pela doença (GRENNE, 1998). A principal via de infecção é através da inalação de esporos presentes em excrementos de aves, principalmente pombos e solos ricos em matéria vegetal em decomposição (MALIK, 1995; LESTER, 2011). As apresentações clínicas mais comuns estão relacionadas com o trato respiratório e sistema nervoso (GRAVES 2005). A criptococose acometendo primariamente o trato gastrointestinal é considerada rara em cães, tanto como achado isolado, quanto na forma disseminada da doença e sugere-se a ingestão como via de infecção nesses casos (MALIK, 1999; GRAVES, 2005; LESTER, 2011) Os animais acometidos podem apresentar anorexia, perda de peso e vômito. O presente estudo tem como objetivo

relatar um caso de criptococose intestinal causando enterite crônica e intussuscepção em cão.

RELATO DE CASO

No dia 29/10/2011 foi atendido no hospital veterinário um cão, macho, três anos de idade, raça yorkshire, não castrado, vacinação atualizada, domiciliado com histórico de êmese e diarreia há três dias. Ao exame físico: sensibilidade abdominal dolorosa e estrutura firme em região mesogástrica à palpação abdominal, demais parâmetros dentro da normalidade. O animal foi submetido ao exame ultrassonográfico com presença de intussuscepção em segmento de alça, que se encontrava ocupando grande parte do antímero esquerdo da cavidade abdominal. No mesmo dia o animal realizou uma laparotomia e foi observado a intussuscepção envolvendo intestino grosso jejuno e ceco, e notado presença de proliferação de tecido de aproximadamente 2 cm na parede do jejuno, realizado enterectomia e enteroanastomose; enviado fragmento intestinal para análise histopatológica. Foram realizados hemograma (leucócitos 37.800 e proteínas totais 4,8 g%) e perfis bioquímicos: renal e hepático sem alterações. O animal ficou internado durante 2 dias e tratado com: ampicilina 22mg/kg/TID, metronidazol 15 mg/kg/BID e dipirona + escopolamina 25mg/kg/TID, realizado um novo hemograma antes da liberação com normalização dos valores hematológicos. No exame histopatológico verificou-se grave processo inflamatório supurativo difuso associado a extensa ulceração, acompanhada por grande quantidade de estruturas leveduriformes PAS – positivas birrefringentes, arredondadas, medindo entre 3,5 a 7µm de diâmetro (*Cryptococcus neoformans*). No mesmo dia foi prescrito itraconazol 10mg/kg/SID, após dez dias de tratamento o animal retornou com melhora da hematoquezia, mas ainda com fezes pastosas; no exame ultrassonográfico foi observado linfonodo mesentérico medindo 8,21 cm de comprimento com aspecto grosseiro. Não foi possível dar continuidade ao caso, uma vez que o proprietário não retornou mais ao atendimento.

DISCUSSÃO

O envolvimento do trato gastrintestinal na criptococose é considerado raro quando em comparação com a apresentação pulmonar ou neurológica da doença (MALIK, 1999). Neste relato, o cão apresentou quadro de enterite crônica e intussuscepção sem alterações respiratórias ou neurológicas. MALIK (1999) descreveu dois casos semelhantes aonde os animais apresentavam apatia, perda de peso, vômito e granulomas em intestino delgado e grosso. Sugere-se que nessas situações atípicas, o trato gastrointestinal seja a provável porta de entrada para a infecção, através da ingestão de esporos contidos no ambiente em associação com a quebra da integridade do epitélio intestinal (LESTER, 2011). O diagnóstico definitivo só pode ser feito através

da análise histopatológica da lesão intestinal, pois o animal não apresentava outros sintomas, mas o exame citológico e histológico de fluidos ou tecidos de locais afetados e cultura microbiana são métodos sensíveis para o diagnóstico da criptococose (TRIVEDI, 2011). O tratamento é necessário por meses ou anos, podendo haver recidivas e disseminação via hematogênica ou linfática (LESTER, 2011). O debridamento cirúrgico dos granulomas é altamente recomendado em associação com antifúngicos orais para se alcançar um bom resultado (BOWLES e FRY, 2009). Neste caso, após a retirada do granuloma intestinal, optou-se pelo uso do itraconazol devido a sua boa eficácia, baixa toxicidade e custo acessível. Observou-se melhora do quadro de enterite nos primeiros 10 dias de tratamento, com resolução da hematoquezia. Infelizmente não foi possível acompanhar a evolução do quadro. Em animais que apresentem envolvimento do sistema nervoso central, recomenda-se a utilização da anfotericina B em associação com outros fungicidas (LESTER, 2011). O prognóstico é reservado para animais que apresentam a forma disseminada ou alterações neurológicas (O'BRIEN, 2006).

CONCLUSÃO

A criptococose é uma micose sistêmica que pode afetar diferentes espécies animais, embora incomum, a criptococose intestinal deve ser considerada como diagnóstico diferencial nas enterites crônicas em cães. É uma doença grave, porém com um diagnóstico precoce e um tratamento fúngico adequado pode ter um bom prognóstico.

REFERÊNCIAS

- BOWLES D.B.; FRY D.R. Nasal cryptococcosis in two dogs in New Zealand. **New Zealand Veterinary Journal**. v. 57. 2009. p.53–57.
- GRAVES T.K.; BARGER A.M.; ADAMS.B. et al. Diagnosis of systemic cryptococcosis by fecal cytology in a dog. **Veterinary Clinical Pathology**.v. 34.2005. p.409-412.
- MALIK.R. Cryptococcosis. In: GREENE, C. E.; WATSON, A. D. J. **Infectious Diseases of the Dog and Cat**. 2. ed. Philadelphia: WBSaunders, 1998.cap 61.p 584-598.
- LESTER S.L.; MALIK .R.; BARTLETT K.H. et al. Cryptococcosis: update and emergence of *Cryptococcus gattii*.**Veterinary Clinical Pathology** v.40.2011.p.4-17.
- MALIK R.; DILL-MACKY .E.; MARTIN P. et al. Cryptococcosis in dogs: a retrospective study of 20 consecutive cases. **Journal of Medical and Veterinary Mycology**. v.33. 1995. p.291–297.
- O'BRIEN C.R.; KROCKENBERGER M.B.; MARTIN P.et al. Long-term outcome of therapy for 59 cats and 11 dogs with cryptococcosis. **Australian Veterinary Journal**. v.84. 2006. p.384–392.
- TRIVEDI S.R.; SYKES J.E.; CANNON M.S.et al. Clinical features and epidemiology of cryptococcosis in cats and dogs in California: 93 cases (1988–2010). **Journal of the American Veterinary Medical Association**. v 293. 2011. p.357-369.

076. ENTEROBACTÉRIAS ISOLADAS DE AMOSTRAS FECAIS DE CÃES JOVENS E ADULTOS SADIOS DA CIDADE DE BELÉM, PARÁ

Rafael Monteiro de Melo¹, Hugo Filipe Rodrigues Melo, Marcio Alan Oliveira Moura, Roberto de Faria Espinheiro¹, Délia Cristina Figueira Aguiar¹; Hilma Lúcia Tavares Dias¹

¹Laboratório de Investigação e Diagnóstico de Enfermidades Animais, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Pará. rafaelzinho_melo@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste estudo foi identificar enterobactérias patogênicas presentes nas fezes de cães na cidade de Belém. Procedeu-se a coleta de fezes de 18 cães jovens e 23 adultos. As bactérias isoladas com maior ocorrência em filhotes foram *Escherichia coli* (11/61%), *Enterobacter* sp. (04/22%), *Edwardsiella* sp. (04/22%), *Shigella flexneri* (01/5,5%) e *Citrobacter* (01/5,5%). Nos adultos encontrou-se *Proteus mirabilis* (08/34,7%), *E. coli* (07/30,4%), *Enterobacter* sp. (02/8,6%), *Klebsiella* sp. (01/4,3%) e *Shigella flexneri* (01/4,3%). Em nenhuma das amostras isolou-se *Salmonella* spp. Os gêneros bacterianos isolados foram similares em ambos os grupos e são componentes da microbiota normal do trato gastrointestinal de cães jovens e adultos com potencial patogênico para causar infecções diarreicas.

PALAVRAS-CHAVE: Cães, filhotes, adultos, enterobactérias, Belém

ENTEROBACTER ISOLATED FROM SAMPLES OF FECES FROM ADULTS AND YOUNG DOGS HEALTHY OF THE CITY OF BELÉM, PARÁ

ABSTRACTS

The objective of this study was to identify pathogenic enterobacteria present in the feces of dogs in the city of Belem. The feces were collected from 18 young dogs and 23 adults. The most frequent bacteria isolated in puppies were *Escherichia coli* (11/61%), *Enterobacter* sp. (22.4%), *Edwardsiella* sp. (22.4%), *Shigella flexneri* (01/5.5%) and *Citrobacter* (01/5.5%). It was found was found *Proteus mirabilis* (08/34,7%), *E.coli* (30.7,4%), *Enterobacter* sp. (02/8.6%), *Klebsiella* sp.(01/4.3%) and *Shigella flexneri* (01/4.3%) in adults. *Salmonella* spp. Isolated in none of the samples. The bacterial genera isolated were similar in both groups and are components of the normal microbiota of the gastrointestinal tract of young dogs and adults with pathogenic potential to cause diarrheal infections.

KEYWORDS: Dogs, puppies, adults, enterobacteria, Belém

INTRODUÇÃO

Os enteropatógenos causam infecções gastrintestinais e provocam infecções em outras áreas do corpo. Alguns desses bacilos estão associados à alguns tipos de doenças, enquanto outros são membros da microbiota normal, podendo causar infecções oportunistas (Murray *et al.*, 2004). Em virtude dos cães estarem em contato estreito com homens e serem potenciais reservatórios de micro-organismos a outras espécies, o presente trabalho teve como objetivo, identificar enterobactérias de maior ocorrência em cães jovens e adultos da cidade de Belém, Pará.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 41 cães nos quais foram divididos em dois grupos, constituídos de 18 filhotes e 23 adultos, de ambos os sexos e pertencentes a residências da região metropolitana de Belém. As amostras fecais foram coletadas com auxílio de *swabs* estéreis e mantidas em caldo BHI para pré-enriquecimento. As amostras foram semeadas em placas de Petri contendo Ágar sangue, Ágar MacConkey e Ágar XLD e colocadas para incubar a 37°C, durante 48 horas. As estirpes isoladas foram identificadas pelos testes bioquímicos segundo Lennette *et al.* (1985).

RESULTADOS

Do total de amostras avaliadas, foram obtidas 46 cepas bacterianas (Tabela 1). Em cães jovens ocorreu no mesmo animal crescimento associado de *E. coli* e *Enterobacter* sp. o mesmo ocorrendo entre *Shigella flexneri* e *Enterobacter* sp. Em ambos os grupos, não foi isolado *Salmonella* spp.

Tabela 1 - Enterobactérias isoladas de amostras fecais obtidas de cães jovens e adultos de residências na cidade de Belém, Pará.

Enterobactérias isoladas	Filhotes		adultos	
	N	%	N	%
<i>Escherichia coli</i>	11	61	07	30,4
<i>Enterobacter</i> sp	04	22	02	8,6
<i>Edwardsiella</i> sp.	04	22	0	0
<i>Citrobacter</i> sp.	01	5,5	0	0
<i>Klebsiella</i> spp.	0	0	01	4,3
<i>Proteus mirabilis</i>	0	0	08	34,7
<i>Shigella flexneri</i>	01	5,5	01	4,3

DISCUSSÃO

Neste estudo a microbiota entérica em cães jovens e adultos apresentou-se de forma homogênea, com diferença em *Edwardsiella* sp., *Citrobacter* sp. *Klebsiella* sp. e *Proteus mirabilis*. Dentre as isoladas, *E. coli* foi mais prevalente, sendo um dos mais frequentes agentes causais de infecções do trato urinário de humanos, tanto quanto de cães e gatos. Desta forma é importante o seu conhecimento, particularmente quando se considera o convívio próximo entre estas espécies (Von Sydow et al., 2006). Outros bacilos *Shigella flexneri* estão sempre associados à doença, enquanto que *Klebsiella* sp. e *Proteus mirabilis* são membros da microbiota normal, podendo causar infecções oportunistas.

CONCLUSÃO

As enterobactérias isoladas neste estudo compõem a microbiota do trato gastrointestinal de cães e apresentam potencial patogênico para outras espécies.

REFERÊNCIAS

- LENNETE, E.H.; HANSLER JUNIOR, W.J.; SHADOMY, H.J. Manual of clinical microbiology. 4.ed. **American Society for Microbiology Press**, 1149p. 1985.
- MURRAY, P.R. Manual of Microbiology 7 ed. Washington: **American Society for Microbiology**, p. 1773p. 1999.
- VON SYDOW, A.C.M.D.G.; COOGAN, J.A.; MORENO, A.M. et al. Ocorrência de fatores de virulência em estirpes de *Escherichia coli* isoladas de fezes de cães errantes. **Arquivos do Instituto Biológico**. v.73, n.4, p.401-407. 2006.

077. ESTUDO DA MICROBIOTA BACTERIANA VAGINAL DE CADELAS E GATAS DOMÉSTICAS

Tamires Danielle Cardoso Viana¹; Nayara Maria Oliveira dos Santos¹; Aline Lorena Souza de Lima¹; Thamillys Rayssa Marques Monteiro¹; Roberto de Faria Espinheiro¹; Hilma Lúcia Tavares Dias¹

¹Laboratório de Investigação e Diagnóstico de Enfermidades Animais, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Pará.

RESUMO

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de identificar bactérias em amostras vaginais de cadelas e gatas e avaliar a sensibilidade frente a 14 antimicrobianos. Foram utilizados 34 animais, sendo que 26 eram cadelas e oito gatas. Os agentes isolados em cadelas foram: *Staphylococcus* coagulase negativa, *Streptococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp., *Staphylococcus saprophyticus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella* sp., *Pseudomonas* sp. e *Escherichia coli*. Nas amostras de gatas as bactérias isoladas foram: *Streptococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* e *Bacillus* sp. Os agentes isolados em cadelas foram sensíveis a maioria das drogas testadas com grau maior de resistência a sulfonamida, amicacina, vancomicina, clindamicina e eritromicina. Os resultados obtidos indicaram que a amoxicilina, eritromicina, norfloxacin, oxacilina, clindamicina, kanamicina, cefazolina e penicilina foram os antimicrobianos os agentes identificados em gatas demonstraram maior sensibilidade e a resistência observada foi contra as drogas sulfonamidas, ácido nalidíxico, amicacina e vancomicina.

Palavras-chave: cães, gatos, conjuntiva, microbiologia, antimicrobianos.

VAGINAL BACTERIAL MICROBIOTA STUDY OF DOMESTIC DOGS AND CATS

ABSTRACT

This study was conducted to identify bacteria in vaginal samples of dogs and cats and to evaluate the sensitivity against 14 antibiotics. We used 34 animals, 26 of which were dogs and eight cats. The agents isolated from dogs were coagulase-negative *Staphylococcus*, *Streptococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp., *Staphylococcus saprophyticus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella* sp., *Pseudomonas* sp. and *Escherichia coli*. In the samples of the bacteria isolated cats were *Streptococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*,

Proteus mirabilis and *Bacillus* sp. The isolates were sensitive in dogs most of the drugs tested with higher degree of resistance to sulfonamide, amikacin, vancomycin, clindamycin and erythromycin. The results indicated that amoxicillin, erythromycin, norfloxacin, oxacillin, clindamycin, kanamycin, penicillin and cefazolin were the antimicrobial agents identified in cats demonstrated higher sensitivity and resistance was observed against drugs sulfonamide, nalidixic acid, amikacin and vancomycin.

KEYWORDS: dogs, cats, vaginal, microbiota, antimicrobial

INTRODUÇÃO

As infecções bacterianas do trato genital são conhecidas como as principais causas de distúrbios reprodutivos. Dentre os agentes isolados em cadelas e gatas as bactérias gram-positivas e gram-negativas são predominantes (Oliveira et al., 1998; Andrade et al., 2005). Neste contexto, o presente estudo se propõe realizar a identificação da microbiota vaginal de cadelas e gatas adultas e testar os isolados frente a antimicrobianos.

MATERIAL E MÉTODOS

Avaliou-se 34 animais, sendo que 26 eram cadelas e oito gatas, todas adultas, sem sintomas aparentes no aparelho reprodutor. Após a coleta feita com swabs estéreis, as amostras eram semeadas em Agar sangue e Ágar MacConkey e colocadas a 37°C, durante 48 horas. Para o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, foi utilizado o método de difusão de discos em Ágar Mueller-Hinton, empregando-se 14 drogas antimicrobianas: penicilina (10 mg), azitromicina (15 mg), ampicilina (10mcg), amicacina (30mcg), clindamicina (2mg), cefotaxima (30mcg), ceftazidima (30mcg), ceftriaxona (30mcg), cloranfenicol (30mcg), eritromicina (15mcg), kanamicina (30mcg), gentamicina (30 mg), rinfampicina (5 mg) e vancomicina (30mcg)

RESULTADOS

Isolou-se 32 cultivos bacteriológicos, verificando-se duas amostras negativas no crescimento de material obtido de cadelas. Os agentes isolados em cadelas foram: *Staphylococcus coagulase negativa*, *Streptococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* spp., *Staphylococcus saprophyticus*, *Proteus mirabilis*, *Klebsiella* sp., *Pseudomonas* sp. e *Escherichia coli*. Nas amostras de gatas as bactérias isoladas foram: *Streptococcus* sp., *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis* e *Bacillus* sp. Os agentes isolados em cadelas foram sensíveis a maioria das drogas

testadas com grau maior de resistência a sulfonamida, amicacina, vancomicina, clindamicina e eritromicina. Os resultados obtidos indicaram que a amoxicilina, eritromicina, norfloxacin, oxacilina, clindamicina, kanamicina, cefazolina e penicilina foram os antimicrobianos testados nas amostras oriundas das gatas com maior sensibilidade e a resistência foi contra as drogas sulfonamidas, ácido nalidíxico, amicacina e vancomicina.

DISCUSSÃO

Os resultados apresentados neste estudo confirmam os achados de outros estudos anteriores em amostras vaginais de cadelas e gatas (Oliveira et al., 1998; Andrade et al., 2005). Quanto ao antibiograma feitos em ambas espécies constatou-se que a maioria das drogas foi sensível aos agentes testados.

CONCLUSÃO

As bactérias isoladas compõem a microbiota vaginal de animais, sendo importante o isolamento e os testes de sensibilidade antimicrobiana para a escolha da droga que irá auxiliar no tratamento de infecções nesses animais.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, J.B.; SANTOS, A.G.; CHAVES, A.R.; GOMES, L.P. et al. Isolamento e identificação da microbiota vaginal de gatas domésticas. Comparação entre castradas e não castradas. **Revista Universidade Rural**, Ser. Ci. Vida. Seropédica, RJ, EDUR, v. 25, suplemento, 2005.
- OLIVEIRA, C.M.; COSTA, C.E.O.; SILVA, J.A.P. Microbiota aeróbica em fêmeas caninas hígdas durante o ciclo estral. Avaliação da sensibilidade aos antimicrobianos. **Revista Brasileira de Medicina Veterinária**, v. 20, n.2, 1998.

078. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ATÍPICAS DA LEISHMANIOSE VISCERAL EM UM CANINO DOMÉSTICO

Maria Gláucia Carlos de Oliveira¹, Talyta Lins Nunes¹, Valéria Veras de Paula¹, Kilder Dantas Filgueira¹

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (Mossoró-RN) – kilderfilgueira@bol.com.br

RESUMO

Algumas alterações clínicas ocorrem de forma insólita na leishmaniose visceral canina (LVC). O trabalho objetivou descrever sinais clínicos incomuns oftálmicos e ortopédicos da referida enfermidade. Um canino possuía claudicação. Realizou-se o exame físico. Foram solicitadas radiografias articulares e citologia do líquido sinovial. Também se empregaram técnicas citológicas oculares e sorologia para LVC. Havia alterações clínicas em articulações cárpicas e társicas. Na conjuntiva inferior esquerda existia um nódulo. As radiografias revelaram artrite. A citologia sinovial e do nódulo ocular demonstrou presença de *Leishmania sp.* A sorologia para LVC evidenciou-se reagente. O conhecimento do quadro clínico incomum de tal doença é importante na solicitação correta dos exames complementares.

PALAVRAS-CHAVES leishmaniose, sintomatologia, cães

ATYPICAL CLINICAL MANIFESTATIONS OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN A DOMESTIC CANINE

ABSTRACT

Some clinical manifestations occur in an unusual way in canine visceral leishmaniasis (CVL). The study describes unusual ophthalmic and orthopedic clinical signs of such disease. One dog had claudication. Physical examination was carried out. X-rays of the joints and synovial fluid cytology were requested. Ocular cytological techniques were also used as well as serology for LVC. There were clinical changes in carpal and tarsal joints. There was also a lump in the lower left conjunctiva. X-rays revealed arthritis. The synovial and ocular nodule cytology showed presence of *Leishmania sp.* The serology revealed a reactive LVC. Knowledge of the unusual clinical picture of this disease is important in the correct request of complementary exams.

KEYWORDS: leishmaniasis, symptomatology, dogs

INTRODUÇÃO

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença infecto-contagiosa, sistêmica e crônica que pode comprometer qualquer órgão ou fluido biológico. A

distribuição das lesões oculares na LVC varia de 16% a 80%, observando-se comumente conjuntivite, blefarite, uveíte anterior e ceratoconjuntivite seca (Solano-Gallego et al., 2009). Contudo, há uma reduzida frequência de proliferações nodulares oftálmicas relacionadas com a enfermidade (Fulgêncio, 2006). Cães com leishmaniose visceral podem demonstrar alterações osteoarticulares, embora também de forma escassa (Silva, 2009). Nesse sentido, o presente trabalho objetivou descrever sinais clínicos incomuns oftálmicos e ortopédicos envolvidos com a LVC.

MATERIAL E MÉTODOS

Um canino, macho, sem raça definida, com um ano de idade possuía claudicação e dificuldade de deambulação há dois meses. Iniciou-se o exame físico do paciente. Em seguida foram solicitadas radiografias de algumas articulações. Nestas, se procedeu ainda a artocentese, objetivando-se realizar o exame citológico do líquido sinovial. Técnicas citológicas também foram empregadas em estrutura ocular do animal. Posteriormente, executou-se sorologia para LVC, pelos métodos de reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e ensaio imunoenzimático (ELISA).

RESULTADOS

O animal apresentava dor, edema e rigidez em articulações cárpicas e társicas. Na conjuntiva da pálpebra inferior esquerda existia um nódulo, firme, séssil e de superfície íntegra. Os achados radiográficos das articulações citadas corresponderam a trabeculado ósseo grosseiro, esclerose subcondral e osteólise associada à proliferação óssea. Estas alterações foram compatíveis com artrite. A citologia do líquido sinovial e do nódulo ocular demonstrou infiltrado inflamatório misto e formas amastigotas de *Leishmania sp.* A sorologia para LVC evidenciou resultado reagente nas técnicas utilizadas, com diluição de 1:80 pela RIFI. Estabeleceu-se o diagnóstico de LVC, ocasionando poliartrite e nódulo conjuntival. Após os resultados laboratoriais, o proprietário não retornou com o animal.

DISCUSSÃO

Os nódulos conjuntivais são alterações menos comuns na LVC, com uma frequência de apenas 4,4% dos casos de manifestações oculares relacionadas à doença. Correspondem a granulomas constituídos por infiltrado linfo-histioplasmocitário, com grande quantidade de formas amastigotas de *Leishmania sp.* (Fulgêncio, 2006). No paciente descrito, a citologia foi essencial na correlação da oftalmopatia insólita com a doença. Dentre as outras formas clínicas incomuns da LVC

cita-se a poliartrite erosiva ou não-erosiva (Solano-Gallego et al., 2009). A presença de tal patologia ortopédica justificou a sintomatologia inicial revelada pelo canino do presente relato. Geralmente as articulações mais afetadas correspondem as társicas e cárpicas, havendo uma tendência para o envolvimento bilateral. O cão pode evidenciar distúrbios clínicos osteoarticulares, mas com exames de imagens normais caso o tempo de evolução da enfermidade ainda não seja suficiente para revelar anormalidades radiográficas (Silva, 2009). A distribuição topográfica das artropatias em questão encontrou-se compatível com a literatura. Devido à cronicidade clínica, o exame radiográfico demonstrou-se útil no diagnóstico da poliartrite. Para associar esta com a LVC foi necessária a adoção das técnicas citológicas e sorológicas.

CONCLUSÃO

O conhecimento de formas incomuns da LVC é importante no sentido de solicitar corretamente os exames complementares que possam auxiliar no diagnóstico definitivo da enfermidade.

REFERÊNCIAS

- FULGÊNCIO, G.O. **Prevalência de oftalmopatias em cães naturalmente infectados com *Leishmania (Leishmania) chagasi* no município de Belo Horizonte – estudo clínico e histopatológico**. 2006. Belo Horizonte, 48f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais.
- SILVA, A.R.S. **Avaliação radiográfica das articulações dos membros locomotores de cães naturalmente acometidos por Leishmaniose Visceral no município de Araçatuba-SP**. 2009. Araçatuba, 83f. Dissertação (Mestrado em Ciência Animal) – Curso de Medicina Veterinária, Universidade Estadual Paulista.
- SOLANO-GALLEGO, L.; KOUTINAS, A.; MIRÓ, G. et al. Directions for the diagnosis, clinical staging, treatment and prevention of canine leishmaniosis. **Veterinary Parasitology**, v.165, n.1-2, p.1-18, 2009.

079. MICROBIOTA BACTERIANA AERÓBICA CONJUNTIVAL DE CÃES E GATOS SADIOS DA CIDADE DE BELÉM, PARÁ

Mikelly Gomes Cardoso¹; Lorena Aviz Pinho¹; Roseli do Socorro Dias Monteiro¹;
Jéssica Almeida Novaes¹; Roberto de Faria Espinheiro¹; Hilma Lúcia Tavares Dias¹

¹Laboratório de Investigação e Diagnóstico de Enfermidades Animais, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Pará. mymi_cardoso@hotmail.com

RESUMO

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de identificar micro-organismos na conjuntiva de cães e gatos e avaliar a sensibilidade frente a 14 antimicrobianos. Foram utilizados 48 animais, sendo que 44 eram caninos e 04 felinos. As bactérias de maior ocorrência em cães foram: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* spp., *Bacillus* spp., *Enterobacter* sp. e *Escherichia coli*, em felinos encontrou-se *Streptococcus* spp., *Bacillus* sp., *E. coli* e *Enterobacter* sp. Os resultados obtidos indicaram que a azitromicina, clindamicina, kanamicina, amicacina, rifampicina, norfloxacin, oxacilina, penicilina, vancomicina, foram os antimicrobianos em que *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. apresentaram maior grau de sensibilidade.

Palavras-chave: cães, gatos, conjuntiva, microbiologia, antimicrobianos.

CONJUNCTIVAL AEROBIC BACTERIAL MICROBIOTA OF HEALTHY DOGS AND CATS OF THE CITY OF BELEM, PARA

ABSTRACT

This study was conducted to identify micro-organisms in the conjunctiva of dogs and cats and to evaluate the sensitivity of the isolates against 13 antimicrobials. We used 48 animals, 44 dogs and 04 cats, all healthy adult. The bacteria more frequent in dogs: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* spp., *Bacillus* spp. *Enterobacter* sp. and *Escherichia coli*. It was found in cats *Streptococcus* spp., *Bacillus* sp., *E. coli* and *Enterobacter* sp. The results indicated that azithromycin, clindamycin, kanamycin, amikacin, rifampicin, norfloxacin, oxacillin, penicillin, vancomycin, were the antimicrobials in which *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus* sp., *Streptococcus* sp. had a higher degree of sensitivity.

KEYWORDS: dogs, cats, conjunctival microbiology, antimicrobial

INTRODUÇÃO

A microbiota normal tem sido estudada em cães e gatos e os gêneros bacterianos isolados de olhos destes animais, sadios e doentes, incluem *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus intermedius*, *Bacillus sp.*, *Proteus mirabilis* e *Enterobacter cloacae* (Andrade, et al., 2002; Furiani, et al., 2011) e uma vez que esta microbiota conjuntival pode variar de acordo com a região geográfica e clima, este estudo teve como objetivo identificar micro-organismos na conjuntiva de cães e gatos e avaliar a sensibilidade dos isolados frente a 14 antimicrobianos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados 48 animais, sendo que 44 eram caninos e 04 felinos, todos adultos e sadios. As amostras foram coletadas de ambos olhos por meio de *swabs* estéreis friccionados à conjuntiva palpebral. As amostras eram semeadas em meios Agar sangue e Ágar MacConkey e colocadas para incubar a 37°C, durante 48 horas.

Após este período as colônias eram avaliadas quanto às características morfológicas e bioquímicas. Para o teste de sensibilidade aos antimicrobianos, foi utilizado o método de difusão de discos em Ágar Mueller-Hinton, empregando-se 14 drogas antimicrobianas: penicilina (10 mg), azitromicina (15 mg), ampicilina (10mcg), amicacina (30mcg), clindamicina (2mg), cefotaxima (30mcg), ceftazidima (30mcg), ceftriaxona (30mcg), cloranfenicol (30mcg), eritromicina (15mcg), kanamicina (30mcg), gentamicina (30 mg), rinfampicina (5 mg) e vancomicina (30mcg).

RESULTADOS

Nas amostras provenientes de ambos os olhos de cães foram encontradas somente bactérias Gram-positivas, com predominância de *Staphylococcus aureus* (33,3%), *Staphylococcus sp.* (27,4%), *Bacillus sp.* (13,8%), *Streptococcus sp.* (13,7%) *Staphylococcus saprophyticus* (7,8%), e *Enterobacter sp.* (4%) em felinos encontrou-se *Streptococcus sp.* (41%), *Bacillus sp.* (38%), *E. coli* (15%) e *Enterobacter sp.* (6%). Os resultados indicaram que a azitromicina, clindamicina, kanamicina, amicacina, rinfampicina, norfloxacina, oxacilina, penicilina, vancomicina, foram os antimicrobianos em que *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus saprophyticus*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.* apresentaram maior grau de sensibilidade.

DISCUSSÃO

A análise da microbiota ocular de cães e gatos sadios encontrou 102 cepas bacterianas, sendo a maioria composta de Gram-positivos, entre as quais mais

frequentemente isoladas foram *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus* sp., *Bacillus* sp., *Streptococcus* sp. e *Staphylococcus saprophyticus* (7,8%). Estas espécies isoladas são consideradas como parte da microbiota de animais hígidos e são encontradas causando infecções oculares em gatos e cães (Andrade, et al., 2002; SANTOS, et al., 2009). Estes dados confirmam com a maioria de outros estudos, onde cocos Gram-positivos são mais prevalentes.

CONCLUSÃO

As bactérias isoladas compõem a microbiota normal da conjuntiva de animais, sendo importante o isolamento e os testes de sensibilidade antimicrobiana para a escolha da droga que irá auxiliar no tratamento de infecções nesses animais.

REFERENCIAS

ANDRADE, A.L.; STRINGHINI, G.; BONELLO, F.L. et al. Microbiota conjuntival de cães sadios da cidade de Araçatuba (SP). **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia**. v 65, p 323-326. 2002.

FURIANI, N.; SCARAMPELLA, F.; MARTINO, P.A et al. Evaluation of the bacterial microflora of the conjunctival sac of healthy dogs and dogs with atopic dermatitis. **Veterinary Dermatology**, v. 22, n. 6, p 490-496. 2011.

SANTOS, L.G.F.; ALMEIDA, A.B.P.F.; SILVA, M.C. et al. Microbiota conjuntival de cães hígidos e com afecções oftálmicas. **Acta Scientiae Veterinariae**. v 37, n. 2, p 165-169. 2009.

080. SUSCEPTIBILIDADE ANTIMICROBIANA DE ISOLADOS DA CONJUNTIVA DE PACAS (*Agouti paca*) MANTIDAS EM CATIVEIRO

Júlio Henrique Donza Vieira¹; Aline Lorena Souza de Lima¹; Rafael Monteiro de Melo¹; Roberto de Faria Espinheiro¹; Delia Cristina Figueira Aguiar¹; Hilma Lúcia Tavares Dias¹

¹Laboratório de Investigação e Diagnóstico de Enfermidades Animais, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Pará. jhdv16@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi identificar micro-organismos na conjuntiva de pacas (*Agouti paca*), bem como avaliar a sensibilidade frente a antimicrobianos. Foram utilizados 10 animais adultos e sadios. Após o cultivo e identificação bioquímica das amostras retiradas de ambos os olhos, as bactérias de maior ocorrência foram *Staphylococcus sp.*, *Pseudomonas sp.* e *Escherichia coli*. Na avaliação da sensibilidade aos 13 antibióticos para cada uma das bactérias, os resultados revelam a sensibilidade para quase todos os tipos. As bactérias isoladas são consideradas como da microbiota normal da conjuntiva de animais, sendo importante o isolamento e os testes de sensibilidade antimicrobiana para a escolha da droga que irá auxiliar no tratamento de infecções nesses animais.

PALAVRAS-CHAVE: paca, microbiologia, antimicrobianos

ANTIMICROBIAL SENSIVITY OF THE CONJUNCTIVAL ISOLATED FROM CAPTIVE PACAS

ABSTRACT

The objective of this study was to identify micro-organisms in the conjunctiva of pacas (*Agouti paca*), and to evaluate the sensitivity against 13 antibiotics. We used 10 healthy adult animals. After cultivation and biochemical identification of samples taken from both eyes, the most frequent bacteria were *Staphylococcus sp.*, *Pseudomonas sp.* and *Escherichia coli*. In assessing the sensitivity to 13 antibiotics for each of the bacteria, the results reveal the sensitivity to almost all types. The bacteria isolated are considered normal microbiota of the conjunctiva of animals, thus the isolation and antimicrobial susceptibility testing to choose the drug that will assist in the treatment of infections in these animals.

KEYWORDS: paca, microbiology, antimicrobials

INTRODUÇÃO

A paca, pertencente à Família Agoutidae, é o segundo maior roedor brasileiro. Estes animais podem apresentar infecções na conjuntiva, embora poucos relatos são descritos na literatura. A microbiota normal tem sido estudada em cães (Furiani, et al., 2011), gatos (Gaskin et al., 1980), bovinos (Samuelson et al., 1984), entre outros animais. Assim como outras espécies, as pacas são vulneráveis a traumas externos que podem ocasionar processos inflamatórios graves com invasão bacteriana ou fungica. Em virtude disso e da escassez de dados sobre a microbiota do saco conjuntival de pacas, objetivou-se isolar bactérias aeróbias da conjuntiva desses animais e determinar a sensibilidade antimicrobiana.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas 10 pacas (04 machos e 06 fêmeas) adultos, sadios, pertencentes ao criatório científico da Universidade Federal do Pará. Foi coletado material de ambos os olhos, utilizando swabs estéreis. No laboratório, as amostras eram semeadas em placas de Petri contendo Agar sangue e Ágar MacConkey e colocadas para incubar a temperatura de 37°C, durante 24 horas. Após o período de incubação as colônias eram avaliadas quanto às características morfotintoriais e utilizaram-se os testes bioquímicos para identificação das bactérias isoladas. No teste de sensibilidade aos antimicrobianos, foi utilizado o método de difusão de discos em Ágar Mueller-Hinton, empregando-se 13 drogas antimicrobianas penicilina (10 mg), azitromicina (15 mg), ampicilina (10mcg), amicacina (30mcg), clindamicina (2mg), cefotaxima (30mcg), ceftazidima (30mcg), ceftriaxona (30mcg), cloranfenicol (30mcg), eritromicina (15mcg), gentamicina (30 mg), rinfampicina (5 mg) e vancomicina (30mcg).

RESULTADOS

O estudo da microbiota conjuntival bacteriana das pacas revelou o isolamento de bactérias em todos os cultivos realizados, com predominância de bactérias aeróbias Gram-positivas, sendo o gênero *Staphylococcus* sp. coagulase negativos (80%) o mais isolado, seguido de *Pseudomonas* sp. (10%) e *Escherichia coli* (10%). Na avaliação da sensibilidade aos 13 antibióticos para cada uma das bactérias, o estudo revelou que a maioria apresentou sensibilidade à penicilina, azitromicina, amicacina, ceftriaxona, cloranfenicol, eritromicina, gentamicina, rinfampicina e vancomicina e resistência a claritromicina, ampicilina, oxacilina e cefalotina.

DISCUSSÃO

A microbiota da conjuntiva pode variar segundo a região e o clima de uma determinada região geográfica, isso já verificado em cães, equinos (Furiani, et al., 2011; Almeida Neto, et al., 2006), no entanto, não foram encontrados na literatura científica relatos da microbiota conjuntival de pacas sadias. O gênero *Staphylococcus* sp. coagulase negativos é frequentemente isolado dos olhos de outras espécies animais. Ocorreu o crescimento associado de *Staphylococcus* sp. e *E. coli* e *Staphylococcus* sp. e *Pseudomonas* sp., tais gêneros são considerados micro-organismos saprófitas da pele, mas podem em determinadas circunstâncias tornarem-se patógenos potenciais e causarem infecções do saco conjuntival.

CONCLUSÃO

As bactérias isoladas são consideradas como microbiota normal da conjuntiva de animais, sendo importante o isolamento e os testes de sensibilidade antimicrobiana para a escolha da droga que irá auxiliar no tratamento de infecções nesses animais.

REFERÊNCIAS

FURIANI, N.; SCARAMPELLA, F.; MARTINO, P.A. et al. Evaluation of the bacterial microflora of the conjunctival sac of healthy dogs and dogs with atopic dermatitis. *Veterinary Dermatology*, v. 22, n. 6, p 490-496. 2011

GASKIN, J. M. Microbiology of the canine and feline eye. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v 10, n. 2, p 303-16. 1980.

SAMUELSON, D.A.; ANDRESEN, T.L.; GWIN, R.M. Conjunctival fungal flora in horses, cattle, dogs, and cats. **American Veterinary Medical Association**. . v. 184, n. 10. p.1240-1242. 1984.

081. ASPERGILOSE SINO-NASAL E SINO-ORBITAL EM UM GATO PERSA

Fernanda V. Amorim da costa¹; Ana Carolina da V. Rodarte-Almeida²; Otávia Dorigon³

1 MV, MSc., PhD, Universidade Federal do Rio Grande do Sul- UFRGS.

2 MV, MSc., Universidade Federal do Paraná- UFPR.

3 MV, Clínica Veterinária Green Cross, Florianópolis, SC.

RESUMO

Infecções fúngicas profundas na órbita e na cavidade nasal são pouco relatadas em gatos, parecendo ser mais comum em braquiocefálicos e raramente o *Aspergillus* spp está associado a esta desordem. Um gato, apresentando exoftalmia devido à presença de uma massa retrobulbar no olho esquerdo, foi diagnosticado com aspergilose, através da cultura fúngica e análise histopatológica. O tratamento valeu-se da exérese cirúrgica e de antifúngicos. Apesar dos esforços terapêuticos, o paciente veio a óbito devido a uma insuficiência respiratória.

PALAVRAS-CHAVES felino, fungo, rinite, exoftalmia, nasal, ocular.

A PERSIAN CAT WITH SINO-NASAL AND SINO-ORBITAL ASPERGILOSIS

ABSTRACT

Deep fungal infections in the orbit and nasal cavity are rarely described in cats, seems to be more common in brachycephalic breeds and *Aspergillus* spp are rarely associated with this disorder. A cat presenting exophthalmos due to a retrobulbar mass in the left eye, was diagnosed with aspergiloses by fungal culture and histopathologic examination. The mass was removed surgically and the patient was treated with antifungal. Despite therapeutic efforts the patient died due to respiratory failure.

Key words: feline, fungal, rhinitis, exophthalmos, nasal, ocular.

INTRODUÇÃO

Infecções fúngicas na órbita e na cavidade nasal são pouco relatadas em gatos e raramente o *Aspergillus* spp está associado a esta desordem (Barachetti, 2009). Quando a barreira epitelial nasal ou ocular é quebrada, os fungos de sua flora normal podem se tornar patogênicos. A forma invasiva nos gatos pode ocorrer de forma disseminada e por infecção do seio nasal/frontal (Benitah, 2006). O envolvimento orbital resulta de um foco distante ou de uma extensão de uma lesão envolvendo o bulbo ocular e seios nasais (Barachetti, 2009).

O diagnóstico é baseado nos achados histopatológicos e nos sinais clínicos que incluem alterações respiratórias (Whitney, 2005), e oftálmicas como a exoftalmia (Hamilton, 2000). O sucesso do tratamento da aspergilose sino-nasal (ASN) pode ser obtido com o uso de itraconazol e fluconazol (Benitah, 2006;), sendo necessário, em alguns casos, a excisão cirúrgica curativa da massa (Hamilton, 2000). Contudo, o prognóstico é reservado (Benitah, 2006). Este relato detalha a apresentação clínica, diagnóstico e conduta terapêutica em um gato com *Aspergillus* spp.

RELATO DE CASO

Um gato persa, macho, de três anos de idade foi atendido apresentando exoftalmia devido à presença de uma massa retrobulbar, úlcera de córnea, edema de terceira pálpebra e glaucoma no olho esquerdo, além de secreção nasal e ocular mucopurulenta ipsolateral. O diagnóstico de *Aspergillus* spp foi obtido por cultura fúngica da massa e análise histopatológica. Como tratamento o paciente foi submetido à exérese cirúrgica da massa e à administração de clotrimazol tópico, uma vez por semana e tratamento sistêmico com itraconazol por via oral. Após 20 dias, foi observada uma massa ao lado esquerdo do palato mole, que foi removida cirurgicamente, observando-se recidiva após 7 dias. Posteriormente foi aplicada uma dose única de anfotericina B por via subcutânea, concomitante à fluidoterapia intravenosa. Contudo, o paciente começou a apresentar dificuldade respiratória devido à obstrução da orofaringe, vindo a óbito em 2 dias.

DISCUSSÃO

A aspergilose nasal é comumente relatada, porém é infreqüente em gatos (Barachetti, 2009). A conformação braquicefálica do paciente pode ter sido um importante fator de risco no desenvolvimento da ASN (Barrs et al, 2007). A suspeita diagnóstica neste caso foi embasada nos sinais clínicos apresentados. Secreção nasal e espirros, são vistos na ASN (Whitney et al. 2005; Barachetti et al, 2009), e exoftalmia, epífora e hiperemia conjuntival, encontrados nos casos de aspergilose sino-orbital (ASO) (Barachetti et al, 2009). Os espirros ou secreção nasal comumente aparecem seis meses antes da apresentação clínica, sugerindo que a ASO é uma progressão ASN (Barrs e Beatty, 2010), no entanto neste paciente não foi elucidado quando foi iniciado o quadro de secreção ocular ipsilateral

Optou-se pelo uso do itraconazol neste paciente devido sua eficácia e relativa segurança em gatos (Medleau, 1995), referindo bons resultados em de animais com

ASN (Whitney, 2005), e ineficácia em um gato com ASO (McLellan et al., 2006). A associação de itraconazol com anfotericina B pode não ser eficaz devido à possibilidade dos compostos azólicos bloquearem a síntese de ergosterol, necessário para a ligação da anfotericina B (Barrs e Beatty, 2010). Portanto, esta pode ter sido uma das razões para a falha na resposta ao tratamento neste paciente.

No presente relato, o tratamento antifúngico com itraconazol oral, clotrimazol tópico e anfotericina B sistêmica não foi eficaz. A aspergilose orbital é uma desordem de prognóstico grave e mais estudos são necessários para melhor entender e tratar esta doença nos gatos.

REFERÊNCIAS

- BARACHETTI, L.; MORTELLARO, C.M.; Di GIANCAMILLO, M. et al. Bilateral orbital and nasal aspergillosis in a cat. *Veterinary Ophthalmology*, v.12, p.176-182, 2009.
- BARRS, V.R.; BEATTY, J.A. Upper respiratory tract aspergillosis. In: AUGUST, J.R. *Consultations in Feline Medicine*. 6. ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2010. cap. 5, p.36-52.
- BENITAH, N. Canine nasal aspergillosis. *Clinical Techniques in Small Animal Practice*, v.21, p.82-88, 2006.
- HAMILTON, H.L.; WHITLEY, R.D.; McLAUGHLIN, S.A. Exophthalmos secondary to aspergillosis in a cat. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.36, p.343-347, 2000.
- McLELLAN, G.J., AQUINO, S.M., MASON, D.R. et al. Use of posaconazole in the management of invasive orbital aspergillosis in a cat. *Journal of the American Animal Hospital Association*, v.42, p.302-307, 2006.
- MEDLEAU, L.; JACONS, G.J.; MARKS, M.A. Itraconazole for the treatment of cryptococcosis in cats. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, v.9, p.39-42, 1995.
- WHITNEY, B.L.; BROUSSARD, J.; STEFANACCIL, J.D. Four cats with fungal rhinitis. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, v.7, p.53-58, 2005.

082. COLANGIOHEPATITE EM FELINOS: RELATO DE CASOS

Angela Ferronato Girardi¹; Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida²; Sarah Nunes Vecchi¹; Yara Meireles¹; Camila Calvi Menegassi; Valéria Régia Franco Sousa¹.

¹ Departamento de Clínica Médica Veterinária - UFMT;

² Pós-graduação em Pesquisa Clínica em Doenças Infecciosas – IPEC/FIOCRUZ

RESUMO

Colangiohepatite é a inflamação de ductos biliares e parênquima hepático muito comum em felinos, devido à sua conformação anatômica. Foram relatados quatro casos de felinos com mais de quatro anos de idade que apresentavam anorexia, emagrecimento progressivo, icterícia e vômito ou sialorréia. As alterações de exames complementares compreenderam aumento de atividade de enzimas hepáticas e alterações ultrassonográficas específicas como dilatação de ductos e hepatomegalia. O tratamento instituído consistiu em antibioticoterapia, silimarina, ácido ursodesoxicólico e de suporte, além de praziquantel. Apesar do diagnóstico etiológico não ser estabelecido, o uso de fitoterápico, regenerador hepatocelular, associado ao protocolo preconizado para colangiohepatite provocou remissão dos sinais.

PALAVRAS-CHAVE: Colangiohepatite, felinos, ultrassonografia

FELINE CHOLANGIOHEPATITIS: CASES REPORT

ABSTRACT

Cholangiohepatitis is the inflammation of biliary ducts and hepatic parenchyma that is very common in feline due to its anatomy. Four cases were reported with cats from more than four year old that had anorexia, progressive weight loss, jaundice and vomit or salivation. The exams show high activity from the hepatic enzymes and ultrasound specific changes like biliary duct dilation and hepatomegaly. The treatment consists in antibiotic therapy, silymarin, ursodeoxycholic acid and supportive, also praziquantel. Although diagnostic was not established, the use of herbal hepatocellular regenerator, associated to recommended protocol for cholangiohepatitis caused remission of the signs.

KEYWORDS: cholangiohepatitis, feline, ultrasonography

INTRODUÇÃO

Colangiohepatite é a doença necroinflamatória mais comum dos gatos domésticos que envolve a tríade portal e o parênquima hepático adjacente (CENTER, 2009). Dentre as causas incluem-se as infecciosas, lipidose hepática, aumento de

bactérias do duodeno ou de enzimas pancreáticas (NELSON e COUTO, 2006). Os sinais mais comuns são vômito, diarreia, icterícia, distensão e dor abdominal, poliúria, polidipsia, letargia, depressão e sinais nervosos em quadros graves. A suspeita se baseia no exame físico e achados clinicopatológicos, mas o diagnóstico definitivo se dá pelo exame histopatológico (RONDEAU, 2009). Este RESUMO descreve quatro casos clínicos sugestivos de colangiohepatite em felinos domésticos.

RELATO DO CASO:

No Hospital Universitário da UFMT, foram atendidos, entre maio e dezembro de 2011, quatro felinos de quatro a treze anos, de raça Siamesa, Persa e SRD, apresentando emagrecimento progressivo e três estavam-se ictericos. Um deles apresentava vômito e outros dois sialorréia. Foi observado leucopenia em um dos casos, e neutrofilia em outro. A dosagem sérica de ALT variou de 149 a 399 UI/L. Um dos animais apresentava icterícia e com FA de 1065 UI/L. Em três dos animais foi realizada ultrassonografia onde notou-se hepatomegalia e dilatação de ductos biliares, além de dilatação do colédoco em um deles. Com a ultrassonografia e os achados clínico - laboratoriais a suspeita de colangiohepatite foi elencada. O tratamento instituído constituiu em enrofloxacin, ácido ursodesoxicólico, complexo vitamínico, silimarina (Hepatopharme®) e praziquantel. Em todos os animais houve remissão dos sinais clínicos com continuidade do tratamento por um período de trinta dias.

DISCUSSÃO

Os sinais clínicos apresentados pelos felinos, apesar de não específicos, são também compatíveis com afecções hepatobiliares, entretanto a presença de icterícia em três deles levou-se a suspeita de alterações hepáticas (RONDEAU, 2009). O aumento da atividade de enzimas hepáticas contribuiu para o diagnóstico, além da ultrassonografia, que tende a ser específica e sensível e revelou dilatação de ductos biliares que é um dos principais achados (BRAIN et al., 2006). Apesar de pouco específico em afecções hepatobiliares, o encontro de leucocitose e como possível causa a colonização bacteriana levou ao tratamento com antibioticoterapia, bem como a utilização de praziquantel devido a suspeita de platinossomíase, por seu difícil diagnóstico e pela semelhança de sinais clínicos (XAVIER et al., 2007). O tratamento instituído com ácido ursodesoxicólico já tem sido descrito na literatura (PRESSEL et al., 2005), assim como o uso de silimarina, regenerador hepatocelular, apesar dos dados assim serem incipientes (CENTER, 2009).

CONCLUSÃO

Nos casos onde não é possível chegar a um diagnóstico definitivo, a abrangência terapêutica deve ser ampla a fim de tratar as possíveis causas da colangiohepatite. A limitação de recursos diagnósticos faz com que seja esta a conduta a ser tomada.

REFERÊNCIAS

BRAIN, P.H.; BARRS, V.R.; MARTIN, P. et al. Feline cholecystitis and acute neutrophilic cholangitis: clinical findings, bacterial isolates and response to treatment in six cases. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.8, p.91-103, 2006.

CENTER, S.A. Diseases of the Gallbladder and Biliary Tree. Veterinary Clinics of North America Small Animal, **v.39, p.543-598, 2009.**

PRESSEL, M.A.; FOX, L.E.; APLEY, M.D. et al. Vancomycin for multi-drug resistant *Enterococcus faecium* cholangiohepatitis in a cat. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.7, p.317-321, 2005.

RONDEAU, M.P. Hepatitis and Cholangiohepatitis. In: SILVERSTEIN, D. & HOPPER, K. **Small Animal Critical Care Medicine**, 2ed. St. Louis, Mo.: Edinburgh: Saunders Elsevier, 2009, cap. 126, p. 547-551.

XAVIER, F. G.; MORATO, G. S.; RIGHI, D. A. et al. Cystic liver disease related to high *Platynosomum fastosum* infection in a domestic cat. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.9, p.51-55, 2007.

NELSON, R.W.; COUTO, C.G. **Manual de medicina interna de pequenos animais.** Rio de Janeiro, Saunders Elsevier. 2006p.489-506.

083. DESCRIÇÃO CLÍNICA E PATOLÓGICA DO TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL EM PACIENTE FELINO

Amara Gyane Alves de Lima¹, Naftali Silva Fernandes¹, Silvia Aparecida Cavalcanti de Queiroz¹, Valéria Veras de Paula¹, Kilder Dantas Filgueira¹

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (Mossoró-RN) –
kilderfilgueira@bol.com.br

RESUMO

O tromboembolismo arterial corresponde a um distúrbio circulatório grave. Em felinos geralmente é associado a cardiopatas. O trabalho objetivou relatar um caso de tromboembolismo arterial felino secundário a cardiomiopatia hipertrófica. Uma gata possuía o histórico de paralisia. Realizou-se o exame físico da paciente. Esta veio a óbito e encaminhada para necropsia. O animal apresentava membros pélvicos hipotérmicos, paralisados e sem dor. Na necropsia verificou-se tromboembolo em aorta abdominal e artérias ilíacas. Havia hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Em felino com paralisia de membros pélvicos, deve-se considerar a relação com tromboembolismo arterial.

PALAVRAS-CHAVES trombo, cardiopatia, gatos

CLINICAL AND PATHOLOGIC DESCRIPTION OF THROMBOEMBOLISM IN A FELINE PATIENT

ABSTRACT

Arterial thromboembolism is a serious circulatory disorder. In cats it is usually associated with heart diseases. This study aimed to report a case of feline arterial thromboembolism, secondary to hypertrophic cardiomyopathy. A cat had a history of paralysis. The animal presented hypothermic, paralyzed hind limbs, without pain. Physical examination of the patient was carried out, but it came to death and was sent for autopsy. During the autopsy, it was verified thrombi in the abdominal aorta and iliac arteries. There was concentric left ventricular hypertrophy. In feline with pelvic limb paralysis, one must consider the presence of arterial thromboembolism.

KEYWORDS: thrombo, cardiopathy, cats

INTRODUÇÃO

O tromboembolismo arterial é um distúrbio circulatório de grande relevância na clínica médica de pequenos animais (Medeiros, 2011). Em felinos, mais de 70% dos casos desta patologia encontra-se em associação a cardiopatas (Coelho et al., 2010).

Origina-se de um trombo alojado no interior da câmara cardíaca esquerda, o qual é ejetado na circulação sanguínea e causando bloqueio da aorta terminal e trifurcação ilíaca (Norsworthy et al., 2009). Consequentemente há uma grave isquemia nos tecidos supridos pelo segmento arterial acometido, sendo o prognóstico geralmente ruim. Cerca de 60-70% dos gatos vão a óbito ou são submetidos à eutanásia durante o episódio tromboembólico inicial (Medeiros, 2011). O presente trabalho objetivou relatar os sinais clínicos e anatomopatológicos de um felino com tromboembolismo arterial secundário a cardiomiopatia hipertrófica.

MATERIAL E MÉTODOS

Um felino, fêmea, da raça persa, com três anos de idade apresentava o histórico de ausência de deambulação há poucos dias. A proprietária atribuía o fato a trauma por ação contundente após a gata ser submetida a uma situação de estresse (explosão de fogos de artifício). Realizou-se o exame físico da paciente. Contudo esta veio a óbito logo em seguida. Encaminhou-se o felino para necropsia.

RESULTADOS

O animal demonstrava membros pélvicos hipotérmicos, paralisados e sem dor profunda. O pulso femoral era ausente. Existia cianose dos leitos ungueais. A auscultação cardiopulmonar foi dificultada pela dispnéia. Na necropsia verificou-se tromboembolo em aorta abdominal caudal e início das artérias ilíacas e sacral média. Trombos foram encontrados nos átrios. Havia hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, com redução do lúmen. Ocorria também dilatação atrial esquerda e edema pulmonar. Não se evidenciou trauma em coluna vertebral e membros pélvicos. Estabeleceu-se o diagnóstico de tromboembolismo arterial associado à cardiomiopatia hipertrófica.

DISCUSSÃO

A sintomatologia do tromboembolismo surge em consequência de neuromiopias isquêmicas distais ao trombo. A isquemia é causada por obstrução física e vasoconstrição colateral em razão da liberação de vasoativos pelo trombo. A

dor diminui conforme os nervos sensoriais perdem sua função (Norsworthy et al., 2009; Coelho et al., 2010). Estas citações justificaram a apresentação clínica do felino descrito. A tromboembolia é uma das consequências mais drásticas da cardiomiopatia hipertrófica felina. Esta é uma doença primária do miocárdio, caracterizando-se por hipertrofia ventricular esquerda significativa. A origem hereditária foi determinada em algumas raças de gatos, como Maine Coon, Americano de Pelo Curto e Persa (Norsworthy et al., 2009). Nesse sentido, o padrão racial da paciente em discussão correlacionou-se com o aparecimento da enfermidade cardíaca. Especula-se que na cardiomiopatia hipertrófica, uma estase do fluxo sanguíneo e um estado hipercoagulável contribuam para a formação de trombos atriais (Medeiros, 2011). Logo, para o animal em questão, possivelmente no momento do estresse relatado, ocorreu um incremento na taquicardia, vindo a favorecer o desprendimento do trombo pré-existente em átrio esquerdo. Em seguida, o mesmo foi carreado pela circulação sistêmica, tornando assim um tromboembolo, e provocando a obstrução vascular. Tal fato induziu o proprietário a relacionar, erroneamente, a paralisia presente com causas traumáticas. Em gatos com paresia pélvica aguda também se deve realizar a diferenciação com extrusão do disco intervertebral, linfoma espinhal, infarto fibrocartilagenoso, neuropatia diabética e miastenia grave (Medeiros, 2011).

CONCLUSÃO

Ao abordar um paciente felino com paralisia aguda de membros pélvicos, deve-se considerar a presença de tromboembolismo arterial e sua associação com doenças do miocárdio.

REFERÊNCIAS

- COELHO, B.M.P.; LEME, M.C.; KANAYAMA, L.M. et al. Paralisia súbita de membros pélvicos em felinos decorrente de tromboembolismo arterial. In: CONGRESSO PAULISTA DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, X., 2010, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Anclivepa-SP, 2010.
- MEDEIROS, K.R. Tromboembolismo aórtico felino. In: CONGRESSO MEDVEP DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS, 2011, Curitiba. **Anais...** Curitiba: Medvep, 2011.
- NORSWORTHY, G.D.; CRYSTAL, M.A.; GRACE, S.F. et al. **O paciente felino**. 3. ed. Barueri: Manole, 2009. 801 p.

084. DISAUTONOMIA FELINA – SÍNDROME DE KEY-GASKELL: RELATO DE CASO

Bruno Benetti Junta Torres^{1,2}, Guilherme de Caro Martins², Bernardo de Caro Martins², Paulo Eduardo Ferian³, Milene Alvarenga Rachid², Eliane Gonçalves de Melo²

¹Universidade Federal de Lavras – brunotorres@dmv.ufla.br

²Universidade Federal de Minas Gerais.

³Universidade do Estado de Santa Catarina.

RESUMO

A disautonomia felina é caracterizada pela degeneração neuronal dos gânglios autonômicos que resulta em sinais clínicos relacionados à disfunção do sistema nervoso autônomo. A etiologia é desconhecida, o prognóstico é desfavorável e não há tratamento disponível. O objetivo do presente relato é descrever um caso de disautonomia felina, elucidando a progressão dos sinais clínicos e discorrendo sobre os achados clínico-patológicos.

PALAVRAS-CHAVES neurologia, gangliopatia, disautonomia felina

FELINE DYSAUTONOMIA - KEY-GASKELL SYNDROME: A CASE REPORT

ABSTRACT

Feline dysautonomia is characterized by degeneration of the neurons in the nervous ganglia that results in clinical signs related to dysfunction of the autonomic nervous systems. The cause is unknown and has a poor prognosis and no definitive treatment available. The purpose of this study is to report a case of feline dysautonomia, highlight the clinical signs progression, and the clinical and pathological findings.

KEYWORDS neurology, gangliopathy, feline dysautonomia

INTRODUÇÃO

A disautonomia felina, ou síndrome de Key-Gaskell, é uma doença causada pela disfunção do sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático, devido à degeneração neuronal dos gânglios autonômicos (Sharp et al.,1984). Embora tenham sido sugeridas associações a agentes tóxicos, genéticos, nutricionais e infecciosos, sua etiologia ainda não está esclarecida (Nunn et al.,2004). Não foram descritos predisposição racial, de gênero ou de idade de acometimento, entretanto, a doença

tem sido relatada predominantemente em animais jovens (Harkin et al., 2002). Os sinais clínicos refletem a disfunção autonômica generalizada dos tratos gastrintestinais e urinário, mas megaesôfago, hipomotilidade esofágica e regurgitação estão entre os achados mais consistentes (Robert e Washabau, 2005). Objetiva-se descrever um caso de disautonomia felina, elucidando a progressão dos sinais clínicos e discorrendo sobre os achados clínico-patológicos.

RELATO DE CASO

Um felino sem raça definida, fêmea não castrada, de um ano e cinco meses de idade, foi atendido com anorexia, prostração, dificuldade respiratória e de deglutição, constipação, dificuldade urinária e regurgitação/vômito havia dois dias. Apresentava também desidratação, mucosas ressecadas, secreção mucosa nasal, dilatação pupilar pouco responsiva à luz, anisocoria, prolapso de 3ª pálpebras, distensão abdominal e bexiga repleta. Foram realizados exames físico, radiográficos de tórax e abdômen, laboratoriais e videolaringoscopia. Os exames laboratoriais mostraram-se normais. As radiografias confirmaram megaesôfago e distensão vesical e intestinal, que estava repleto de gases e fezes. À videolaringoscopia, não havia sinais de obstrução que justificassem a dispnéia inspiratória do animal. O animal foi a óbito dentro de 72 horas e ao exame necroscópico, observaram-se dilatação esofágica e broncopneumonia. Histologicamente, os gânglios autonômicos mioentéricos e da raiz dorsal dos nervos espinhais apresentavam depleção de neurônios, com citoplasmas eosinofílicos e vacuolizados, e com núcleos condensados e picnóticos.

DISCUSSÃO

Casos de disautonomia felina foram descritos durante os anos 80 e 90, após primeiro relato feito por Key e Gaskell em 1982 na Escócia. Poucos casos foram relatados desde então, sendo a maior prevalência no Reino Unido e Escandinávia (Kidder et al., 2008).

Letargia, anorexia, vômito, disúria e dispnéia inspiratória são sinais inespecíficos. Em gatos, pupilas dilatadas, prolapso da 3ª pálpebra, regurgitação e constipação são os sinais clínicos mais característicos (Robert e Washabau, 2005). Estes sinais foram observados em mais de 75% dentre 86 casos documentados (Sharp et al., 1984) e corroboram os achados do presente relato.

Embora a doença seja tipicamente observada em adultos de até três anos, há relatos de felinos acometidos desde os dois meses até 11 anos de idade (Kidder et al.,

2008). Os sinais clínicos se desenvolvem em menos de 48 horas, na maioria dos casos, e o prognóstico é desfavorável, com índice de mortalidade de aproximadamente 70% (Sharp et al., 1984). No caso ora relatado, a progressão dos sinais clínicos ocorreram de forma aguda e devido à deterioração clínica, a despeito do tratamento suportivo, o animal foi a óbito. A broncopneumonia, possivelmente aspirativa, deve ser consequência do megaesôfago. Sabe-se que a depleção do número dos neurônios ganglionares e características de degeneração destes devem ser observadas nos casos de disautonomia, independente da espécie (Kidder et al., 2008). Assim, no caso ora relatado, as alterações histológicas ganglionares confirmaram a suspeita clínica de disautonomia felina.

Portanto, acredita-se que este seja o primeiro caso descrito de disautonomia felina no Brasil, uma vez que não foram encontrados relatos desta doença na literatura corrente, em diversos bancos de arquivos pesquisados.

CONCLUSÃO

Disautonomia felina, embora rara, é uma doença devastadora com um prognóstico desfavorável, e deve ser investigada em qualquer gato que se apresente com a combinação de anorexia, regurgitação, protrusão de 3ª pálpebra e pupilas dilatadas pouco responsivas à luz.

REFERÊNCIAS

- HARKIN, K.R.; ANDREWS, G.A.; NIETFELD, J.C. Dysautonomia in dogs: 65 cases (1993–2000), **Journal of the American Veterinary and Medical Association**, v.220, p.633–639, 2002.
- KIDDER, A.C.; JOHANNES, C.; O'BRIEN, D.P.; et al. Feline dysautonomia in the Midwestern United States: a retrospective study of nine cases. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.10, n.2, p.130-136, 2008.
- NUNN, F.; CAVE, T.A.; KNOTTENBELT, C. et al. Association between Key–Gaskell syndrome and infection by *Clostridium botulinum* type C/D, **The Veterinary Records**, v.155, p.111–115, 2004.
- ROBERT J. WASHABAU. Disorders of the pharynx and oesophagus. In: HALL, E.J.; SIMPSON, J.W.; WILLIAMS, D.A. **BSAVA Manual of Canine and Feline Gastroenterology**, 2nd ed. p.142-143, 2005.

SHARP, N.J.H.; NASH, A.S.; GRIFFITHS, I.R. Feline dysautonomia (Key–Gaskell syndrome): a clinical and pathological study of forty cases. **Journal of Small Animal Practice**, v.25, p. 599–615, 1984.

085. ESTERÓIDE ANTIPROGESTÁGENO PARA TRATAMENTO DE HIPERPLASIA FIBROEPITELIAL FELINA

Débora Cristina Olsson¹, Maria Lígia Arruda Mistieri²,
Suzane Lilian Beier³, Charles Pelizzari⁴, Ana Paula Dossena¹

¹Faculdade de Itapiranga – ana_dossena@hotmail.com

²Universidade Federal do Pampa

³Universidade do Estado de Santa Catarina

⁴Veterinário Autônomo

RESUMO

O presente trabalho relata um caso de hiperplasia mamária felina tratada com antiprogéstágeno. Optou-se pelo uso do Aglepristone na posologia de 10 mg/kg a cada 24 horas, durante dez dias, via subcutânea. Todos os pares de glândulas mamárias apresentavam hiperplasia simétrica que foram submetidas a medidas em sua largura e comprimento, diariamente. Transcorridos onze dias da primeira dose, constatou-se regressão semicompleta do tecido mamário, sendo a gata submetida à ovariossalpingohisterectomia (OSH). O antiprogéstágeno Aglepristone se revelou como uma opção de tratamento eficaz, segura e de rápido efeito terapêutico.

PALAVRAS-CHAVES Felino, glândula mamária, hiperplasia, antiprogéstágeno

STEROID SYNTHETIC PROGESTERONE IN TREATMENT OF FELINE FIBROEPITHELIAL HYPERPLASIA MAMMARY

ABSTRACT

This paper reports a case of feline mammary hyperplasia treated with antiprogéstágeno. We chose to use aglepristone in dosage of 10 mg / kg every 24 hours over five days, subcutaneously. All pairs of mammary gland hyperplasia showed symmetrical, with rather firm who underwent measurements of its width and length, daily. Eleven days elapsed from the first dose, it was found semicompleta regression of breast tissue, being subjected to the cat ovariossalpingohisterectomia. The antiprogéstágeno aglepristone revealed himself as an effective treatment option, secure and fast therapeutic effect.

KEYWORDS Feline mammary gland hyperplasia, steroid synthetic progesterone

INTRODUÇÃO

A alteração fibroepitelial mamária se desenvolve em decorrência a um estímulo de progesterona. Um número considerável de hormônios tem sido implicado na patogênese como o acetato de medroxiprogesterona, utilizados para supressão do estro. O diagnóstico pode ser feito através do histórico e achados clínicos associados à análise histopatológica (Silva et al., 2002). A terapêutica consiste em suprimir o estímulo hormonal e a OSH deve ser realizada após regressão do volume mamário. Recentemente, novas alternativas de terapêutica clínica são estudadas, entre elas, destaca-se o aglepristone, um antiprogestágeno desenvolvido inicialmente como abortivo que vem sendo testado no tratamento da hiperplasia fibroepitelial felina (Fieni et al., 2006). Este trabalho teve como objetivo descrever uma hiperplasia felina, de uma fêmea de oito meses de idade, com histórico de apatia, anorexia e aumento de volume mamário desenvolvido após administração de uma única dose do contraceptivo acetato de medroxiprogesterona.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizadas medidas diárias das dimensões individuais de cada mama (Figura 1). O dia zero foi o dia comparativo. Realizou-se a terapia específica com antiprogestágeno Aglepristone (Alizin®), 10mg/kg, SID, durante dez dias. O animal foi examinado diariamente e posteriormente no final do tratamento terapêutico, submetido à OSH.

RESULTADOS

No presente caso, verificou-se hiperplasia assimétrica das cadeias mamárias, com edema, hiperemia, hipertermia, sensibilidade dolorosa além de cianose e telangiectasia. Foram observadas úlceras cutânea e necrose nas glândulas inguinais por lambertura excessiva. A partir do terceiro dia de tratamento percebeu-se diminuição do edema e cicatrização das lesões e melhora da locomoção do animal. A partir do quinto dia pode-se observar diminuição significativa do tamanho das glândulas mamárias (Figura 1). No décimo dia, a diminuição do tamanho do tecido mamário permitiu que o animal fosse submetido à OSH.

Figura 1. Metragem diária da largura e comprimento de cada glândula da cadeia mamária direita e esquerda durante o tratamento com antiprogestágeno Aglepristone.

Glândula Mamária	Largura X comprimento (cm)										
	Dia zero	Dia 01	Dia 02	Dia 03	Dia 04	Dia 05	Dia 06	Dia 07	Dia 08	Dia 09	Dia 10
Torácica direita	9,0 x 7,5	9,0 x 7,5	8,0 x 7,0	7,0 x 7,0	6,5 x 5,5	6,0 x 6,0	6,0 x 6,0	5,5 x 6,0	4,0 x 5,0	5,0 x 5,0	4,5 x 5,0
Torácica esquerda	9,0 x 10,0	8,0 x 7,0	7,0 x 7,5	6,0 x 6,0	6,0 x 6,0	4,0 x 5,5	4,0 x 5,5	4,0 x 5,0	3,5 x 4,5	4,0 x 4,5	3,5 x 5,0
Abdominal cranial direita	10,0 x 10,0	9,5 x 7,0	8,0 x 8,0	7,5 x 6,5	6,5 x 6,5	7,5 x 6,0	7,0 x 6,0	6,5 x 6,0	6,5 x 6,0	6,0 x 5,5	6,5 x 5,0
Abdominal cranial esquerda	8,0 x 9,0	7,0 x 8,0	7,0 x 8,5	6,5 x 6,0	6,0 x 6,0	6,0 x 5,5	6,0 x 6,0	6,0 x 5,5	5,5 x 5,0	5,0 x 5,0	5,0 x 5,0
Abdominal caudal direita	9,5 x 8,5	8,0 x 8,0	8,0 x 7,0	7,0 x 6,5	6,5 x 6,0	7,0 x 7,0	7,0 x 6,0	7,0 x 6,0	6,0 x 7,0	6,0 x 6,0	4,0 x 5,0
Abdominal caudal esquerda	9,0 x 8,0	8,0 x 7,0	8,0 x 7,5	6,5 x 6,5	6,0 x 6,5	6,5 x 6,5	6,5 x 6,0	6,0 x 6,0	6,5 x 6,0	5,0 x 6,0	5,0 x 5,5
Inguinal direita	9,0 x 8,5	7,0 x 9,0	7,5 x 8,0	7,0 x 7,0	7,0 x 6,5	5,0 x 6,5	6,0 x 6,0	6,0 x 6,5	5,5 x 6,0	5,5 x 6,0	4,5 x 5,0
Inguinal esquerda	8,0 x 9,5	8,0 x 7,0	5,5 x 8,0	5,5 x 7,5	7,0 x 8,0	6,0 x 7,0	5,0 x 7,0	6,0 x 7,0	6,0 x 6,5	5,5 x 6,5	4,5 x 4,5

DISCUSSÃO

O tratamento para gatas afetadas por hiperplasia fibroepitelial mamária consiste na retirada do estímulo hormonal, através da suspensão do medicamento à base de progesterona ou através de OSH (Silva et al., 2002). Todavia, pode manter seu efeito sérico por um período de até seis meses. O tratamento com Aglepristone que surge como uma alternativa terapêutica. Este antagonista de progesterona é comumente utilizado para a indução ou interrupção do parto e tratamento da piometra (Fieni et al., 2006).

CONCLUSÃO

O antiprogestágeno aglepristone se revelou como uma opção de tratamento eficaz, segura e de rápido efeito terapêutico.

REFERÊNCIAS

FIENI, F. et al. Clinical, biological and hormonal study of mid-pregnancy termination in cats with aglepristone. **Theriogenology**, v. 66, n. 6-7, p.1721-1728, 2006.

SILVA, T. F. P. et al. Fibroadenoma mamário felino após administração única de acetato de medroxiprogesterona. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, n. 5, supl., p.154-156, 2002.

086. HEMIMELIA RADIAL EM UM EXEMPLAR DA ESPÉCIE FELINA

Valéria Veras de Paula¹, Kilder Dantas Filgueira¹

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (Mossoró-RN) –
kilderfilgueira@bol.com.br

RESUMO

A hemimelia é uma patologia incomum na espécie felina e equivale a hipoplasia ou agenesia de ossos pareados. O trabalho objetivou relatar um caso de agenesia de rádio em felino. Um gato possuía alteração nos membros torácicos. O paciente foi submetido a exame físico seguido de avaliação radiográfica. Os membros torácicos apresentavam deformidade rotacional, flexionados medialmente. As radiografias demonstraram ausência bilateral do rádio. A descrição da hemimelia total (agenesia) de rádio é fundamental para alertar sua ocorrência na clínica médica de felinos.

PALAVRAS-CHAVES agenesia, rádio, *Felis catus*

RADIAL HEMIMELIA IN A CASE OF FELINE SPECIES

ABSTRACT

Hemimelia is uncommon in the feline species, and it is equivalent to hypoplasia or agenesis of paired bones. The study aimed to report a case of radius agenesis in a cat. A cat had changes in the forelimbs. The patient underwent physical examination, followed by radiographic evaluation. The forelimbs had rotational deformity, medially bent. Radiographs showed bilateral absence of the radius. The description of total radius hemimelia (agenesis) is essential to alert to its occurrence in feline clinical medicine.

KEYWORDS: agenesis, radius, *Felis catus*

INTRODUÇÃO

A hemimelia corresponde a uma patologia esquelética congênita caracterizada pela hipoplasia ou total ausência (agenesia) de ossos pareados. O rádio, tíbia e ulna são as estruturas mais comprometidas (Nunes et al., 2008). Quando há envolvimento do rádio, os pacientes apresentam sintomatologia já nas primeiras semanas de vida, com sinais de deformidade angular, claudicação e diminuição da amplitude de movimento das articulações adjacentes (Carneval et al., 2011). Embora as malformações dos membros torácicos ocorram com maior frequência em relação aos membros pélvicos, a hemimelia de rádio não é comum em cães e gatos (Alam et al.,

2006). Nesse sentido, o presente trabalho objetivou descrever um caso de agenesia de ambos os rádios, na espécie felina.

MATERIAL E MÉTODOS

Um felino, macho, adulto, sem raça definida, possuía o histórico de distúrbio nos membros torácicos. Desconhecia-se o tempo de evolução do processo, pois o animal não era domiciliado e havia sido adotado recentemente. Iniciou-se o exame físico do paciente. Em seguida foi solicitado exame radiográfico nos membros com anormalidades, nas incidências mediolateral, lateromedial, craniocaudal-dorsopalmar.

RESULTADOS

Clinicamente, o felino demonstrava alteração em sistema locomotor. Os membros torácicos apresentavam deformidade rotacional, estando flexionados medialmente, com angulação de 90° em relação ao eixo longitudinal. A deambulação era anômala, onde o animal utilizava como ponto de apoio, a face lateral das regiões do carpo, metacarpal e metacarpofalangeal. As radiografias de ambos os membros exibiram ausência do osso do rádio, com encurvamento e aumento de espessura da ulna. Logo, foi estabelecido o diagnóstico de hemimelia total (ou agenesia) radial, de ocorrência bilateral. Não se instituiu tratamento específico para patologia. O proprietário foi orientado para evitar sobrepeso do animal e não manter o mesmo em local com assoalho áspero. Também se sugeriu a realização do procedimento de orquiectomia.

DISCUSSÃO

Os defeitos genéticos que causam as deficiências dos membros estão associados com herança autossômica dominante, recessiva ou aberrações cromossômicas. Também se relacionam com vasculopatias durante a condrogênese e mielogênese (Carneval et al., 2011). Outras causas sugeridas são compressão fetal intrauterina ou fatores envolvidos com a fêmea gestante, como deficiências nutricionais, irradiação, vacinas e medicações (Nunes et al., 2008). No animal em questão não foi possível a correlação com estas últimas etiologias, pois o felino era adulto e não domiciliado na época da adoção. Geralmente a agenesia radial se apresenta de forma unilateral. O membro afetado é curto, com deformidade e limitação funcional. As principais complicações clínicas são decorrentes de lesões repetitivas, devido à má postura que os animais adotam para conseguirem se locomover (Alam et al., 2006). No presente relato houve discordância parcial com a literatura, pois o paciente manifestou a alteração bilateralmente e não revelou, até o presente momento,

ferimentos locais por ação continuada. Contudo, a sintomatologia descrita foi similar aos achados do trabalho em discussão. O exame radiográfico é fundamental para o diagnóstico definitivo da hemimelia (Carneval et al., 2011). Esta citação foi confirmada no caso descrito. Algumas correções cirúrgicas resultam em melhoria da função de membro e melhor qualidade de vida do animal (Nunes et al., 2008). O enxerto ósseo autógeno e a artrodese são procedimentos considerados como alternativa para a amputação do membro (Alam et al., 2006). Contudo, a cirurgia pode não ser recomendada quando o paciente encontra-se bem adaptado a patologia esquelética. Entretanto, é importante a castração do animal devido ao envolvimento hereditário da afecção (Nunes et al., 2008). Em virtude da condição física do felino examinado optou-se pelo tratamento conservador, realizando-se apenas medidas de controle para evitar o agravamento da anormalidade.

CONCLUSÃO

A descrição da agenesia de rádio é fundamental para alertar sua ocorrência, apesar de incomum, na rotina da clínica médica de felinos. Além disto, o conhecimento da patologia permite a adoção de medidas de manejo adequadas para o paciente.

REFERÊNCIAS

- ALAM, M.R.; HEO, S.Y.; LEE, H.B. et al. Preaxial longitudinal intercalary radial hemimelia in a dog: a case report. **Veterinarni Medicina**, v.51, n.3, p.118–123, 2006.
- CARNEVAL, T.R.; RAUSCH, S.F.; MEIRELES, M.C.A. et al. Relato de quatro casos de hemimelia em felinos. In: CONGRESSO MEDVEP DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS, 2011, Curitiba. **Anais...** Curitiba: Medvep, 2011.
- NUNES, G.D.L.N.; FILGUEIRA, F.G.F.; FILGUEIRA, K.D. et al. Hemimelia bilateral de rádio em felino doméstico – relato de um caso. In: CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA, XXIX., 2008, Maceió. **Anais...** Maceió: Anclivepa-AL, 2008.

087. INFECÇÃO NATURAL POR *LEISHMANIA SPP.* EM FELINO DOMÉSTICO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA: RELATO DE CASO

Rebeca Cavalcante Marinho¹, Kaio Moraes de Farias², Ana Carolina Landim Pacheco³, Diana Magalhães de Oliveira¹, Aline Mesquita Miranda², Daniel de Araújo Viana²

¹Universidade Estadual do Ceará – UECE – beca.marinho@hotmail.com

²PathoVet Laboratório – Anatomia Patológica e Patologia Clínica Veterinária

³Universidade Federal do Piauí – UFPI

RESUMO

A Leishmaniose é uma doença causada por agentes do gênero *Leishmania*, que pode apresentar-se na forma cutânea ou visceral. Os sinais clínicos observados em felinos são semelhantes aos observados em cães; perda de peso, desidratação, hepato/espleno e linfadenomegalia bem como lesões cutâneas. O diagnóstico foi feito através da realização de exame citológico de linfonodos, medula óssea e lesões cutâneas com posterior identificação das formas amastigotas de *Leishmania*. Desse modo, relata-se um caso de infecção natural por *Leishmania sp.* em um felino doméstico, apresentando emagrecimento progressivo e lesões nodulares na pila esquerda e na pálpebra inferior direita. O diagnóstico definitivo foi pela técnica de Punção Aspirativa por Agulha Fina, a qual mostrou que o animal foi positivo para Leishmaniose.

PALAVRAS-CHAVES Felino, Punção Aspirativa, Leishmaniose

NATURAL INFECTION WITH *LEISHMANIA SPP.* IN A DOMESTIC FELINE IN FORTALEZA CITY: CASE REPORT.

ABSTRACT

Leishmaniasis is a disease caused by agents of the genus *Leishmania*, which can present as cutaneous or visceral. The clinical signs observed in cats are similar to those observed in dogs: weight loss, dehydration, liver / splenic and enlarged lymph nodes and skin lesions. The diagnosis was done by performing cytological examination of lymph nodes, bone marrow and skin lesions with subsequent identification of *Leishmania* amastigotes. Thus, we report a case of natural infection by *Leishmania sp.* in a domestic cat, with progressive weight loss and nodular lesions in the left pinna and right lower eyelid. The definitive diagnosis was the technique of Fine Needle Aspiration, which showed that the animal was positive for leishmaniasis.

KEYWORDS Feline, Aspiration, Leishmaniasis

INTRODUÇÃO

Leishmaniose é uma enfermidade considerada de distribuição mundial e grande importância na saúde pública de diversos países, causada por diversas espécies do gênero *Leishmania spp.*, um protozoário flagelado intracelular obrigatório da família *Trypanosomatidae*. (Mehlhorn, 2001). As espécies de *Leishmania* relacionadas com a enfermidade em felinos são a *L. (L.) infantum chagasi*, na leishmaniose visceral (Savani et al, 2004) e *L. (V.) braziliensis* (Schubach et al., 2004) e *L. (L.) amazonensis* (Souza et al., 2005) na forma cutânea da doença. Casos de leishmaniose felina (LF), tanto na apresentação cutânea como visceral, têm sido relatados no Brasil (Schubach et al., 2004; Silva et al., 2010; Souza et al., 2009). Este trabalho tem como objetivo relatar o primeiro caso de infecção natural por *Leishmania spp.* em felino no município de Fortaleza - CE.

RELATO DE CASO

Foi atendido uma fêmea, da espécie felina, sem raça definida, com dois anos de idade, que vivia em ambiente domiciliar, mas tinha acesso à rua. Ao exame físico: emaciado, com evidente esplenomegalia e linfadenomegalia generalizada à palpação, mucosas hipocoradas, temperatura retal de 39,0°C. Foram observados dois nódulos cutâneos, um na pina esquerda e o outro na pálpebra inferior direita (Figura 01 e 02).

Foi solicitado o exame de punção aspirativa por agulha fina (PAAF) para diagnóstico e sorologia para anticorpos específicos anti-*Leishmania* e sorologia para vírus da Leucemia Felina (FeLV) e vírus da imunodeficiência felina (FIV). Utilizou-se o teste ELISA para detecção do antígeno para FeLV e do anticorpo para FIV. Como resultados, os esfregaços oriundos das coletas supracitadas mostravam grande celularidade constituída por numerosos macrófagos de citoplasma amplo e vacuolizado mesclados a linfócitos, plasmócitos e alguns neutrófilos. Havia grande quantidade de formas amastigotas de *Leishmania spp.* tanto no citoplasma de macrófagos quanto dispersas pelas lâminas (Figuras 03 e 04). No que concerne aos exames sorológicos o animal foi negativo para FeLV e positivo para FIV. Para a sorologia anti-*Leishmania*, em ambos dos testes, o animal foi negativo.

DISCUSSÃO

A cidade de Fortaleza, assim como outras regiões do mundo em que casos de LF foram relatados, é considerada uma região endêmica para Leishmaniose visceral e

cutânea (Silva et al., 2010; Souza et al., 2009). Sinais clínicos como: emagrecimento progressivo, intensa esplenomegalia e linfadenomegalia generalizada, bem como lesões nodulares cutâneas, os quais que necessitam de análise morfológica por citologia ou histopatologia para elucidação; são achados vistos também em outros relatos de LF (Pennisi et al., 2004; Poli et al., 2002; Poli et al., 2002; Savani et al., 2004; Schuback et al., 2004). Pela PAAF, a presença de inúmeras formas amastigotas de *Leishmania spp.* em todos os tecidos analisados foi constatada. A maioria dos relatos de LF está associada à apresentação cutânea da enfermidade segundo Poli et al., (2002), no entanto, a forma visceral também pode ocorrer, o que, curiosamente, ocorreu com o animal avaliado, no qual a presença de formas amastigotas no linfonodo e na medula óssea, caracterizou a LF visceral (Poli et al., 2002). Segundo Martín-Sanchez et al., (2007), a LF tem sido associada a enfermidades imunossupressoras a partir da infecção por FIV e FeLV. No caso relatado, o animal apresentava sorologia positiva para a FIV e negativa para FeLV, o que pode explicar a debilidade do organismo em gerar uma resposta imune celular eficiente contra as *Leishmanias* (Grevot et al., 2005). A sorologia para verificar anticorpos anti-*Leishmania* teve resultado negativo e, segundo Poli et al. (2002), a técnica de sorologia para detecção de anticorpos anti-*Leishmania* não é uma técnica específica para felinos, uma vez que estes não desenvolvem uma resposta imune humoral específica, fazendo com que esses animais apresentem uma sorologia negativa mesmo estando infectados.

CONCLUSÃO

Através deste primeiro relato em nossa região, verifica-se que os felinos são reservatórios em potencial para o desenvolvimento da Leishmaniose e, sua participação na cadeia epidemiológica da doença, na maioria das vezes, é negligenciada pelo sub-diagnóstico. O exame de PAAF representa um método inicial e rápido para o diagnóstico da LF, especialmente quando associados a outros exames complementares e uma investigação aprofundada para obtenção de um diagnóstico definitivo de Leishmaniose Felina.

REFERÊNCIAS

GREVOT, A.; JAUSSAUD HUGUES, P.; MARTY, P. et. al. Leishmaniosis Due To *Leishmania Infantum* In A FIV and FeLV positive cat with a squamous cell carcinoma diagnosed with histological, serological and isoenzymatic methods. **Parasite**, n. 12, p. 271-275, 2005.

HOOGSTRAAL, H.; DIETLEIN, D.R. 1964. Leishmaniasis in the Sudan Republic: recent results. **Bulletin of the World Health Organization**, v. 31, p.137-143. MANCIANTI, F.

Feline leishmaniasis: what's the epidemiological role of the cat? **Parasitology**, v. 46, n. 1-2, p. 203-206, 2004.

MARTIN-SANCHEZ, J.; ACEDO, C.; MUNÓZ-PEREZ, M. et al. Infection by *Leishmania infantum* in cats: Epidemiological study in Spain. **Veterinary Parasitology** n. 145, p. 267–273, 2007. MEHLHORN, H. **Encyclopedic reference of parasitology**. Segunda Edição. Berlim. Editora Springer, 2001.

PENNISI, M.G.; VENZA, M.; REALE, S. et al. Case report of leishmaniasis in four cats. **Veterinary Research Communications**. n. 28, p. 363–366, 2004.

POLI, A.; ABRAMO, F.; BARSOTTI, P. et al. Feline leishmaniosis due to *Leishmania infantum* in Italy. **Veterinary Parasitology** n. 106, p. 181–191, 2002.

SAVANI, E.S.; ALMEIDA, M.F.; CAMARGO, M.C.G.O. et al. Detection of *Leishmania* (*Leishmania*) *amazonensis* and *Leishmania* (*Leishmania*) *infantum* chagasi in Brazilian bats. **Veterinary Parasitology** n. 168, p. 5–10, 2010.

SCHUBACH, T.M.; FIGUEIREDO, F.B.; PEREIRA, S.A. et al. American cutaneous leishmaniasis in two cats from Rio de Janeiro, Brazil: first report of natural infection with *Leishmania* (*Viannia*) *braziliensis*. **Transaction of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 98, n. 3, p. 165-167, 2004.

SILVA, S.M.; RABELO, P.F.B.; GONTIJO, N.F. et al. First report of infection of *Lutzomyia longipalpis* by *Leishmania* (*Leishmania*) *infantum* from a naturally infected cat of Brazil. **Veterinary Parasitology** n. 174, p. 150–154, 2010.

SOUZA, A.I.; BARROS, E.M.S.; ISHIKAWA, E. et al. Feline leishmaniasis due to *Leishmania* (*Leishmania*) *amazonensis* in Mato Grosso do Sul State, Brazil. **Veterinary Parasitology** n. 128, p. 41–45, 2005.

SOUZA, A.I.; NUNES, V.L.B.; BORRALHO, V.M. et al. Domestic feline cutaneous leishmaniasis in the municipality of Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul state, Brazil: A Case Report. **Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases**. v. 15, n. 2, p. 359-365, 2009.

088. OCORRÊNCIA DE *Mycoplasma haemofelis* EM FELINOS DOMÉSTICOS DE CUIABÁ, MATO GROSSO, BRASIL

Daphine Ariadne Jesus de Paula¹, Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida¹, Ana Lúcia Pinto Joanoni¹, Adriane Jorge Mendonça¹, Valéria Régia Franco Sousa¹, Valéria Dutra¹

¹ Universidade Federal do Mato Grosso

RESUMO

A Micoplasmose Hemotrópica Felina (MHF) é causada por um patógeno oportunista, que em situações de estresse ou em presença de infecções concomitantes, pode resultar no desenvolvimento de intensa anemia. Através da técnica de PCR, foi avaliada a prevalência de Micoplasmose em gatos na cidade Cuiabá-MT. Observou-se 18% de positividade para o *Mycoplasma haemofelis*. Com este estudo observou-se a ocorrência do *M. haemofelis*, porém estudos mais aprofundados são necessários para melhor entendermos os fatores de risco associados à doença.

PALAVRAS-CHAVES felinos, micoplasmose, PCR

OCCURRENCE OF *Mycoplasma haemofelis* IN DOMESTIC FELINES FROM CUIABÁ, MATO GROSSO, BRAZIL

ABSTRACT

The Feline Hemotropic Mycoplasmosis is caused by an opportunistic pathogen, in situations of stress and the presence of concomitant infections may result in the development of severe anemia. By PCR, we evaluated the prevalence of Mycoplasmosis in cats. We observed an occurrence of 18% positivity for *Mycoplasma haemofelis*. Here, we observed the occurrence of *M. haemofelis*, however further studies are needed to better understand the risk factors associated to disease.

KEYWORDS cats, mycoplasmosis, PCR

INTRODUÇÃO

A Micoplasmose felina, também conhecida como anemia infecciosa felina, é uma enfermidade causada por *Mycoplasma haemofelis*, “*Candidatus Mycoplasma haemominutum*” e/ou “*Candidatus Mycoplasma turicensis*”. A infecção é considerada oportunista, porém, em condições de estresse ou em presença de infecções concomitantes, pode resultar no desenvolvimento de intensa anemia em consequência do parasitismo celular (Harvey, 2006). O diagnóstico baseia-se na identificação do

microrganismo em esfregaço sanguíneo, entretanto técnicas moleculares, como a Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR), têm sido utilizadas para a identificação de animais infectados (Tasker e Lappin, 2002). O presente estudo teve por objetivo verificar a ocorrência do *Mycoplasma haemofelis* através da técnica de PCR e a avaliação dos aspectos hematológicos (presença da anemia) em felinos domésticos atendidos no Hospital Veterinário da UFMT.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostra sanguínea de 100 felinos atendidos no hospital veterinário durante os período de 2010 a 2011 foram coletadas, processadas para exames hematológicos, extração de DNA genômico pela técnica fenol-clorofórmio e realização da PCR segundo Watanabe et al. (2003). Dados como raça, sexo, idade e hemograma foram obtidos do prontuário de cada felino visando avaliação dos fatores de risco e presença ou não de anemia.

RESULTADOS

De um total de 100 amostras testadas para *M. haemofelis*, 62% dos animais eram machos, 82% sem raça definida (SRD), 13% apresentavam anemia no momento do exame e 53% eram adultos (idade superior a 12 meses). Dezoito animais (18%) foram positivos na PCR para o microrganismo estudado, destes 16 (88,9%) machos e apenas 2 (15,4%) apresentaram anemia no hemograma.

DISCUSSÃO

No Brasil, a prevalência da MHF tem variado em decorrência da região estudada, 9,2 a 12% (Macieira et al., 2007; Hora, 2008). O encontro de maior número de machos infectados em relação as fêmeas pode ser decorrente dos hábitos de deambulação e o possível envolvimento em brigas (Roura et al., 2010). Nesta pesquisa a presença de anemia não foi determinante para o diagnóstico positivo da doença. Em geral o aspecto clínico das infecções varia de animais assintomáticos até crises hemolíticas graves (Foley et al., 1998). Tais sinais podem estar relacionados a espécie de hemoplasma envolvida, a susceptibilidade do hospedeiro, do grau e da velocidade do desenvolvimento da anemia ou mesmo pela presença de outras infecções agudas ou crônicas concomitantes (Tasker e Lappin, 2006).

CONCLUSÃO

Com este trabalho conseguiu-se observar uma maior ocorrência do *Mycoplasma haemofelis* em felinos machos, entretanto estudos mais aprofundados são necessários para melhor entendermos os fatores de risco associados a doença.

REFERÊNCIAS

- FOLEY, J.E.; HARRUS, S.; POLAND, A. et al. Molecular, clinical, and pathologic comparison of two distinct strains of *Haemobartonella felis* in domestic cats. *American Journal of Veterinary Research*, v.59, p. 1581-588, 1998.
- HARVEY, J. W. Hemotrophic mycoplasmosis (Hemobartonellosis). In: GREENE, C. E. **Infectious diseases of the dog and cat**. 3.ed. Saint Louis: Elsevier Inc, 2006, p. 252-260.
- HORA, A.S. **Micoplasmas hemotrópicos como potenciais agentes causadores de anemia em felinos domésticos**. 2008. 75 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Veterinária) – Curso de Pós-Graduação em Clínica Veterinária, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.
- MACIEIRA, D.B.; MENEZES, R.C.; DAMICO, C.B. et al. Prevalence and risk factors for hemoplasmas in domestic cats naturally infected with feline immunodeficiency virus and/or feline leukemia virus in Rio de Janeiro-Brazil. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.10, n.2, p.120-129, 2007.
- ROURA, X.; PETERS, I. R.; ALTET, L. et al. Prevalence of hemotropic mycoplasmas in healthy and unhealthy cats and dogs in Spain. **Journal of veterinary diagnostic investigation**, v.22, p.270-274, 2010.
- TASKER, S.; LAPPIN, M.R. *Haemobartonella felis*: recent developments in diagnosis and treatment. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v.4, p.3-11, 2002.
- WATANABE, M.; HISASUE, M.; HASHIZAKI, K. et al. Molecular detection and characterization of *Haemobartonella felis* in domestic cats in Japan employing sequence-specific polymerase chain reaction (SS-PCR). **Journal of veterinary diagnostic investigation**, v.65, p.1111-1114, 2003.

089. PANCREATITE AGUDA EM UM FELINO PEDIÁTRICO: ACHADOS CLÍNICOS E ANATOMOPATOLÓGICOS

Silvia Aparecida Cavalcanti de Queiroz¹, Tiago da Costa Dantas¹, Alessandro Magno Lustosa Morais¹, Valéria Veras de Paula¹, Kilder Dantas Filgueira¹

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (Mossoró-RN) –
kilderfilgueira@bol.com.br

RESUMO

A pancreatite felina pode apresentar-se de forma aguda ou crônica. A aguda é menos comum e relaciona-se com sinais clínicos mais severos. O trabalho objetivou descrever um caso de pancreatite aguda em felino. Foi examinada uma gata, com dois meses de idade. Esta veio a óbito, sendo encaminhada para necropsia. O material obtido foi enviado para histopatologia. A gata exibia abdômen dilatado, hipotermia, desidratação. O exame necroscópico constatou ascite, linfonodos mesentéricos hipertrofiados e pâncreas edematoso. A histopatologia demonstrou quadro de pancreatite aguda associada à linfadenite reativa. Quando necessária, a histopatologia pancreática deve ser incluída como exame complementar na rotina clínica de felinos.

PALAVRAS-CHAVES patologia pancreática, diagnóstico, *Felis catus*.

ACUTE PANCREATITIS IN A PEDIATRIC FELINE: CLINICAL AND PATHOLOGICAL FINDINGS

ABSTRACT

The feline pancreatitis may appear either as acute or chronic. The acute is less common and is related to more severe clinical signs. The study describes a case of acute pancreatitis in a cat. A two-month-old cat was examined, presenting distended abdomen, hypothermia, and dehydration. It came to death, being sent for necropsy. The material obtained was sent for histopathology. The autopsy showed ascites, hypertrophied mesenteric lymph nodes and edematous pancreas. Histopathology showed a picture of acute pancreatitis associated with reactive lymphadenitis. When necessary, pancreatic histopathology should be included as a complementary test in clinic.

KEYWORDS: pancreatic pathology, diagnosis, *Felis catus*.

INTRODUÇÃO

A pancreatite é um distúrbio do pâncreas exócrino, associado a uma alta taxa de mortalidade em humanos e animais (Kepecs, 2006). Em felinos, 90% dos casos de pancreatite não têm causa identificada (Xenoulis e Steiner, 2009). A doença acomete gatos de cinco semanas até 20 anos de idade (Daniel, 2011). A pancreatite felina pode apresentar-se como aguda ou crônica (Kepecs, 2006). A forma aguda é menos comum e relaciona-se com sinais clínicos mais severos (Xenoulis e Steiner, 2009). Há uma deficiência no diagnóstico definitivo de tal enfermidade (Daniel, 2011), uma vez que o mesmo é obtido apenas pela histopatologia (Xenoulis e Steiner, 2009). O presente trabalho objetivou descrever um caso de pancreatite aguda em felino pediátrico, evidenciando os aspectos *ante e post mortem*.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma fêmea da espécie felina, da raça persa, com dois meses de idade, possuía o histórico de apatia e anorexia há três dias, com vômito e diarreia esporadicamente. Realizou-se o exame físico da paciente. Esta foi estabilizada com terapia de suporte. Solicitaram-se exames complementares como, hemograma completo, bioquímica sérica (renal, hepática e dosagem de potássio). Não foi possível realizar ultrassonografia abdominal. A gata veio a óbito e encaminhada para necropsia. Enviou-se o material obtido para exame histopatológico.

RESULTADOS

A paciente encontrava-se com comportamento deprimido, abdômen dilatado, hipotermia, taquipnéia e desidratação. A gata também demonstrava midríase, ataxia e convulsões. O principal achado na hematologia equivaleu à leucocitose e as anormalidades bioquímicas mais significativas foram a hipoalbuminemia e hipocalcemia. No exame necroscópico, constatou-se ascite, linfonodos mesentéricos hipertrofiados e pâncreas com coloração irregular e edematoso. O sistema nervoso central não revelava alterações macroscópicas. A histopatologia evidenciou edema severo entre os lóbulos pancreáticos, com infiltrado inflamatório misto. Os seios subcapsulares e medulares dos linfonodos mesentéricos estavam repletos de plasmócitos e macrófagos. No córtex cerebral, tronco encefálico e cerebelo existia edema acentuado e multifocal. O quadro microscópico foi compatível com pancreatite aguda associada à linfadenite reativa e edema encefálico agudo.

DISCUSSÃO

Os gatos com pancreatite apresentam sinais inespecíficos, como letargia, anorexia e desidratação. Em menor frequência há taquipnéia, hipotermia, vômito,

diarréia e efusões (Xenoulis e Steiner, 2009; Daniel, 2011). Esses achados foram constatados no animal em discussão. Sinais neurológicos são verificados em casos graves e associam-se a um quadro de encefalopatia pancreática (Kepecs, 2006). Como a forma aguda da pancreatite é mais severa, esta poderia explicar as alterações neurológicas do presente relato. A microscopia do tecido nervoso foi importante para detectar lesões e correlacioná-las com o distúrbio pancreático. A hipoalbuminemia e hipocalemia são indicadores da gravidade da pancreatite (Daniel, 2011). Ambos foram encontrados na paciente em questão, sendo compatíveis com a severidade da enfermidade. O diagnóstico definitivo é obtido pela histopatologia do pâncreas. O caso em discussão confirmou o papel fundamental deste exame, em virtude da falta de especificidade clínica. A análise histopatológica eleva a prevalência da pancreatite felina (Xenoulis e Steiner, 2009) e auxilia o prognóstico, ao realizar *in vivo* a distinção entre a forma aguda e crônica da doença.

CONCLUSÃO

O conhecimento da pancreatite aguda em felino pediátrico é importante para a diferenciação de outras enfermidades, com sinais similares, que ocorrem em filhotes. Quando necessária, a histopatologia pancreática deve ser incluída como exame complementar na rotina clínica.

REFERÊNCIAS

- DANIEL, A.G.T. Pancreatite aguda em felinos: como diagnosticar e tratar? In: CONGRESSO PAULISTA DE CLÍNICOS VETERINÁRIOS DE PEQUENOS ANIMAIS, XI., 2011, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Anclivepa-SP, 2011.
- KEPECS, E.L. **Pancreatite felina**. 2006. São Paulo, 51f. Monografia (Especialização em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais) - Curso de Pós-graduação *Latu Sensu*, Universidade Castelo Branco.
- XENOULIS, P.; STEINER, J.O. Pancreatite felina. **Veterinary Focus**, v.19, n.2, p.11-19, 2009.

090. PREVALÊNCIA DE IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA E LEUCEMIA VIRAL FELINA NO DISTRITO FEDERAL

EDILENE DA SILVA MARTINS, GUILHERME KANCIUKAITIS TOGNOLI, PEDRO

HENRIQUE OLIVEIRA ILHA, GIOVANA ADORNI MAZZOTTI

¹Médica veterinária autônoma - DF

²Mestre, Professor, FACIPLAC - DF

³Graduando em Medicina Veterinária, FACIPLAC, DF - pedroilha2@gmail.com

⁴Mestre, Professora, FACIPLAC - DF

RESUMO

Os vírus da imunodeficiência viral felina (FIV) e da leucemia viral felina (FeLV) são importantes causadores de doenças graves, sem cura e que em sua grande maioria levam ao óbito. Ambos são cosmopolitas, com maior prevalência em animais que têm acesso à rua ou que vivem em grandes populações. Conhecer qual a prevalência dessas doenças em uma população é importante para diagnóstico e controle. Analisou-se pelo método de ELISA a ocorrência da infecção FIV e FeLV em 361 amostras de sangue de gatos do Distrito Federal. A prevalência foi de 3% para FIV, de 12% para FeLV e de 2% positivos para ambos retrovírus.

PALAVRAS-CHAVES FeLV; FIV; sorologia

FELINE IMMUNODEFICIENCY VIRUS AND FELINE LEUKEMIA VIRUS PREVALENCES IN DISTRITO FEDERAL

ABSTRACT

The feline immunodeficiency (FIV) and the feline leukemia viruses (FeLV) are significant causers of serious, cureless diseases that commonly lead to patient's death. Both of these are cosmopolitan viruses with large prevalence in animals with street access or those who live in large populations. Knowing these diseases prevalence in a population is important to diagnose and control them. Blood samples from 361 cats living at Distrito Federal were submitted to ELISA test to verify the presence of infection. The results showed that 3% of the tested animals were positively infected with FIV, 12% for FeLV and 2% for both retroviruses.

KEYWORDS FeLV; FIV; sorology

INTRODUÇÃO

O vírus da imunodeficiência viral felina (FIV) é um *Lentivirus* da família *Retroviridae* que causa uma imunodeficiência progressiva análoga à síndrome da

imunodeficiência adquirida humana. O vírus da leucemia viral felina (FeLV) pertence à subfamília *Oncoviridae* da família *Retroviridae*, que causa uma variedade de desordens neoplásicas e degenerativas. O FIV e o FeLV são cosmopolitas, infecciosos, causam doenças incuráveis normalmente levam o animal ao óbito, o que faz com que a prevenção seja o melhor meio para diminuir a prevalência dessas doenças (Levy, et al., 2008)

Na cidade de Brasília (DF) ainda não existem estudos descrevendo a prevalência para a imunodeficiência viral felina e leucemia viral felina. Conhecer qual a prevalência dessas doenças em uma população é importante para diagnóstico e controle.

O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise retrospectiva dos resultados de exames sorológicos para FIV e FeLV, solicitados por médicos veterinários a um laboratório veterinário do Distrito Federal, no período de um ano.

MATERIAL E MÉTODOS

Através de análise dos arquivos de um laboratório veterinário que atende todo o Distrito Federal, constatou-se 361 solicitações realizadas por médicos veterinários da região para exame sorológico para FIV e FeLV, no período entre agosto de 2010 e agosto de 2011. Os exames foram realizados pelo teste de ELISA (SNAP® FIV/FeLV Combo Test – IDEXX laboratories). A partir desses resultados verificou-se a prevalência de animais com FIV, FeLV ou FIV e FeLV juntas.

RESULTADOS

Dos 361 exames solicitados, foram identificados 2,77% (10/361) resultados positivos para FIV, 12 % (45/361) para FeLV e 2% (8/361) positivos para ambos os retrovírus.

DISCUSSÃO

Nas mostras analisadas houve menor prevalência de animais infectados pelo FIV (2,77%) do que pelo FeLV (12%), no Distrito Federal (DF). Segundo Silva (2007), em Porto Alegre a infecção pelo FIV (21%) foi maior do que para o FeLV (10,8%), comportando-se de forma contrária ao que encontramos. Nesse mesmo estudo, a prevalência de animais soropositivos para ambas as viroses foi maior (6,1%) que a encontrada em nosso estudo (2%). Teixeira e colaboradores (2007) encontraram 32,5% dos animais de abrigos de Belo Horizonte soropositivos para FeLV. Marçola

(2011) realizou PCR em animais do DF e encontrou 2% de animais positivos para FIV, sendo semelhante ao dado levantado por nosso estudo. Essas diferenças e semelhanças podem ser decorrentes dos diferentes hábitos de vida dos animais nessas regiões, bem como sob quais circunstâncias os exames foram solicitados pelos médicos veterinários e permitidos pelos proprietários. Infelizmente não há vacina que proteja o animal do FIV. A proteção contra o FeLV era facilmente realizada através de vacinação anual, entretanto, desde 2010 essa vacina não se encontra mais disponível no mercado brasileiro.

CONCLUSÃO

A prevalência de gatos infectados pelo FeLV é maior do que dos gatos infectados pelo FIV no Distrito Federal. Alertar os proprietários sobre os riscos de seus animais contrair a doença, bem como a solicitação de exames diagnósticos, faz-se extremamente necessária para baixar esses índices. A volta da comercialização da vacina contra FeLV no Brasil ajudaria a diminuir o número de animais infectados.

Agradecimentos: Laboratório Santé Saúde Animal.

REFERÊNCIAS

- LEVY, J.; CRAWFORD, C.; HARTMANN, K.; HOFMANN-LEHMANN, R.; LITTLE, S.; SUNDAHL, E.; THAYER, V. 2008 American Association of Feline Practitioners' feline retrovirus management guidelines. **Journal of Feline Medicine and Surgery**. v. 10, p. 300-316, 2008.
- MARÇOLA, T. G. Estudo da avaliação laboratorial e ocorrência da infecção pelo vírus da imunodeficiência felina e co-Infecções em felinos domésticos de diferentes localidades do Distrito Federal. 2011. pag.1-16. **Dissertação**— Universidade Federal de Brasília, 2011.
- SILVA, F. R. C. Prevalência das infecções pelo vírus da leucemia viral felina e da imunodeficiência viral felina. 2007. p.13-23. **Dissertação** - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
- TEIXEIRA, B. M.; RAJÃO, D.S.; HADDAD, J. P. A; LEITE R.C.; REIS, J. K. P.. Ocorrência do vírus da imunodeficiência felina e do vírus da leucemia felina em gatos domésticos mantidos em abrigos no município de Belo Horizonte. **Arquivo Brasileiro medicina veterinária Zootecnia**, Belo Horizonte, v.59, n.4, p.939-940, 2007.

091. RESIDÊNCIA EM MEDICINA VETERINÁRIA DO COLETIVO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Graziela Ribeiro da Cunha¹, Juliana Becker¹, Pedro Teider¹, Simone Guerios¹,
Alexander Biondo¹

¹ Departamento de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Paraná, Curitiba,
Paraná, Brasil. abiondo@illinois.edu

RESUMO

A Medicina Veterinária do Coletivo no Brasil pode ser entendida como uma nova e abrangente área da medicina veterinária que foca a gestão e o controle da população animal com base em programas de guarda responsável, associados à esterilização e educação em saúde, como política públicas governamentais, visando uma relação harmoniosa entre Meio ambiente, Ser Humano e Animal. A residência em Medicina Veterinária do Coletivo é a primeira dessa área no Brasil e foca o treinamento dos residentes na educação em saúde, principalmente no que diz respeito à promoção da guarda responsável de animais.

Palavra-Chave: Veterinária do Coletivo, Residência, Controle Populacional

SHELTER MEDICINE RESIDENCY IN THE FEDERAL UNIVERSITY OF PARANÁ

ABSTRACT

The Shelter Medicine in Brazil can be understood as a new and comprehensive field of veterinary medicine that focuses on the management and control of animal population based on responsible ownership programs, associated with sterilization and health education, government and public policy in order a harmonious relationship among environment, Human and Animal beings. The Shelter Medicine residency is the first of this area in Brazil and focuses on the training of the residents in health education, particularly with regard to the promotion of responsible ownership of animals.

KEYWORDS: Shelter Medicine, Residency, Population control

INTRODUÇÃO

Atualmente vivenciamos uma mudança de paradigmas nos Centros de Controle de Zoonoses (CCZ's) com o fim da eutanásia como forma de controle populacional e aumento do tempo de permanência dos animais nesses locais. A Medicina Veterinária

do Coletivo deriva do modelo norte americano da Medicina Veterinária de Abrigos ou “Shelter Medicine” (MILLER e ZAWISTOWSKI, 2004) com o objetivo de suprir a necessidade de profissionais especializados nas Prefeituras Municipais, CCZ's e Abrigos de Animais, que devem ter como objetivo principal a promoção da saúde na comunidade e o bem-estar dos animais, baseados no princípio de Saúde Única. Para isso, é imprescindível que o médico veterinário do coletivo reconheça a realidade de cada município e tenha a capacidade de se adaptar à estrutura física, recursos humanos e recursos materiais, levando em consideração as características da comunidade a que pertence e estimulando a participação social para a solução do problema (GARCIA e MALDONADO, 2009).

RELATO DO CASO

Atendendo a essa nova demanda social, surgiu em 2011 a primeira residência em Medicina Veterinária do Coletivo do Brasil através de um convênio firmado entre a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. O foco central das atividades realizadas tem sido a educação em saúde, principalmente no que diz respeito à promoção da guarda responsável de animais. Os residentes realizaram vistorias domiciliares para triagem de animais aptos à castração, onde ocorreu aplicação de questionário socioeconômico, avaliação do ambiente, exame clínico do animal e todas as orientações necessárias foram repassadas aos proprietários, que assistiram previamente a uma palestra sobre o tema. Até o mês de dezembro de 2011 foram realizados 179 atendimentos domiciliares pelos residentes, nos quais 381 animais foram triados e avaliados clinicamente. Ao final do processo o procedimento cirúrgico e a implantação de microchip foram realizados em clínicas conveniadas com a Prefeitura de São Jose dos Pinhais. Concomitantemente, os residentes participaram do planejamento e execução de um trabalho educativo com todas as crianças do quinto ano das escolas municipais. Aproximadamente 2.700 alunos foram conscientizados sobre guarda responsável e bem-estar animal, tornando-se disseminadores desses conceitos na comunidade em que vivem. Além disso, o residente recebe treinamento nas áreas de veterinária preventiva, saúde pública, epidemiologia, comportamento, bem-estar animal, diagnóstico por imagem, clínica médica e cirúrgica de pequenos animais.

DISCUSSÃO

A residência em Medicina Veterinária do Coletivo é uma proposta inovadora e promissora, pois não há disciplinas nos cursos de veterinária do Brasil que abordem a questão do controle populacional com ênfase na guarda responsável e no bem-estar animal (GARCIA e MALDONADO, 2009). Com a nova realidade vivenciada nos CCZ's faz-se necessário um novo perfil profissional, pois os veterinários que se dedicavam à saúde pública e, por consequência, ao controle populacional de animais, não possuíam prática em clínica veterinária, cirurgia e comportamento animal. Através de Programas de Guarda Responsável que preconizam o monitoramento e gerenciamento da saúde e do bem-estar animal é possível direcionar a atenção dos proprietários aos cuidados com a saúde física, mental e comportamental dos animais, proporcionando maior acesso a essas informações, o que pode evitar o abandono e suas consequências. Sendo assim, tanto nossa profissão, quanto a comunidade se beneficiarão quando todos os animais forem tratados dignamente e quando seus proprietários possuírem habilidades, conhecimentos e recursos para manter um maior vínculo com eles.

CONCLUSÃO

A residência em medicina veterinária do coletivo na UFPR proporciona um aprendizado muito amplo no âmbito do curso de medicina veterinária, pois envolve questões ambientais, sociais e saúde animal, colocando em prática o conceito de saúde única e formando profissionais aptos ao atendimento da atual demanda da sociedade no que diz respeito às soluções para o controle da população animal.

REFERÊNCIAS

MILLER, L.; ZAWISTOWSKI, S.; Shelter Medicine for Veterinarians and Staff. Blackwell Publishing. 1st Ed., 2004.

GARCIA, R. C. M.; MALDONADO, N. A. C.; Medicina Veterinária do Coletivo: Um novo desafio para os veterinários. Rev. Clín. Vet., Ano XIV, n. 82, set./out. 2009.

092. NEFROPATIA JUVENIL ASSOCIADA À DISPLASIA RENAL – RELATO DE CASO

Denis Carvalho Costa¹, Fernanda Chicharo Chacar¹, Tácia Tavares de Aquinas², Vivian Rocco Babicsak³, Maria Jaqueline Mamprim⁴, Priscylla Tatiana Chalfun Guimarães⁵

¹ Residente do Depto Clínica Veterinária -UNESP, Botucatu, ² Aluna de Iniciação

Científica/FAPESP – FMVZ-UNESP, Botucatu, ³Residente do Depto de Reprodução e Radiologia Veterinária -UNESP, Botucatu, ⁴ Profa.Adjunto.– Depto de Reprodução e Radiologia Veterinária -UNESP, Botucatu, ⁵ Profa.Ass.Dr.–Depto Clínica Veterinária-UNESP, Botucatu- tatiana@fmvz.unesp.br

RESUMO

Nefropatia juvenil é um termo abrangente geral para doenças renais degenerativas não-inflamatórias ou desenvolvimento da doença renal crônica em animais jovens, e é relativamente comum em linhagens de animais, principalmente em cães e em menor grau em gatos. A displasia renal é o desenvolvimento desorganizado do parênquima renal devido à diferenciação anômala. O presente relato descreve o caso de um cão macho da raça Dobermann de um ano e cinco meses de idade com sinais clínicos de doença renal crônica.

PALAVRAS-CHAVES nefropatia juvenil, displasia renal, cão.

NEPHROPATY ASSOCIATED WITH RENAL DYSPLASIA – CASE REPORT

ABSTRACT

Juvenile nephropathy is a broad all-encompassing term for noninflammatory, degenerative, or developmental, chronic renal disease of obscure pathogenesis in young animals, and is relatively common in inbred lines of animals, particularly dogs and, less so, cats. Renal dysplasia is disorganized development of renal parenchyma due to anomalous differentiation. This report describes the case of male dog of the breed Dobermann, one year and five months of age with clinical signs of chronic kidney disease.

KEYWORDS Juvenile nephropathy, Renal dysplasia, dog

INTRODUÇÃO

A nefropatia juvenil inclui diversas alterações morfológicas como agenesia, hipoplasia, displasia, cistos primário, glomerulopatias, fibrose peritubular, nefropatias túbulointersticial e disfunção no transporte tubular. A displasia renal associada à nefropatia juvenil é caracterizada pelo desenvolvimento desorganizado e diferenciado na estrutura do parênquima renal, sendo decorrente de alterações durante o período embriológico, ou seja, na fase da nefrogênese (LEES, 2011). Os sinais clínicos de displasia renais mais comuns são, redução do apetite ou anorexia, atraso no crescimento ou perda de peso, poliúria, polidipsia e êmese (LEES, 2007). O diagnóstico definitivo de displasia renal se faz com o exame histopatológico (ABRAHAM et al, 2003). O tratamento indicado é o conservativo, de suporte e sintomático com o objetivo de minimizar as consequências clínicas e fisiopatológicas da função renal, oferecendo melhor qualidade de vida ao animal (LEES, 2007).

RELATO DE CASO

Um cão de 17 meses de idade, macho, da raça Dobermann foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho-Campus Botucatu, apresentando episódios de emese, emagrecimento progressivo, prostração, hiporexia há quatro dias, polidipsia e poliúria há 20 dias. Ao exame clínico, verificaram-se, mucosas hipocoradas, desidratação de 8%, caquexia, estomatite, hálito urêmico e letargia. O canino foi submetido a coleta de sangue para avaliação hematológica, bioquímica renal e hepática, dosagem de eletrólitos fósforo e cálcio, coleta de urina por cateterismo para realização de urina tipo I e relação protéica creatinina (RPC) da urina e exame ultrasonográfico abdominal. A avaliação hematológica revelou hematócrito de 19%, apresentando anemia arregenerativa macrocítica normocrômica. Ao perfil hepático não se notou alterações. Já na função renal observou-se azotemia, uréia no valor de 354 mg/dl e creatinina 6,7 mg/dL. Notou-se também hipocalcemia e hiperfosfatemia. Referente a urinálise, constatou-se de alteração, densidade urinária de 1,010, proteinúria e o valor de RPC maior do que 2,0. Ao exame ultrasonográfico abdominal observou-se a ausência de arquitetura normal renal e elevação generalizada da sua ecogenicidade. O paciente foi submetido ao tratamento sintomático, com fluidoterapia por via intravenosa com solução de ringer com lactato a uma taxa de infusão de 40 ml/kg/h e realizado por via subcutânea metoclopramida na dose de 0,5 mg/kg e cloridrato de ranitidina na dose de 2,0 mg/kg. Após resultado do hemograma,

conduziu-se o paciente para transfusão sanguínea a fim de elevarmos o valor do hematócrito e reduzirmos o quadro de hipóxia do paciente. No dia seguinte o quadro clínico evoluiu para um prognóstico desfavorável com vômitos frequentes, diarreia e desidratação grave. Diante do insucesso do tratamento conservativo e sintomático e pelo fato do paciente possuir uma possível doença congênito-hereditária com prognóstico desfavorável, o proprietário optou pela eutanásia, sendo realizada, posteriormente, a necropsia do animal.

DISCUSSÃO

As alterações observadas nos exames laboratoriais (uremia), anemia arregenerativa, hiperfosfatemia, hipocalcemia e ao exame ultrasonográfico (destruição do parênquima renal), juntamente com base nos dados da anamnese e exame clínico permitiram o diagnóstico de nefropatia juvenil associada à displasia renal, sendo essas alterações condizentes com a literatura. O prognóstico para animais com doença renal associado ao quadro de displasia renal com uremia é desfavorável (LEES, 2011).

CONCLUSÃO

Visto que inúmeros cães jovens de diversas raças acometidas, podem ser acometidos a esta afecção patológica de caráter congênito-hereditário, a displasia renal deve ser investigada em animais jovens com sinais clínicos de doença renal crônica e em cães com predisposição racial, para evitar animais portadores e a reprodução dos mesmos.

REFERÊNCIAS

- ABRAHAM, L. A. BECK, C. AND SLOCOMBE, R. F. Renal dysplasia and urinary tract infection in a Bull Mastiff puppy. **Aust Vet Journal**, v.81,n 6,336-339, 2003.
- LEES, G. E. Congenital Kidney diseases . In: POLZIN, D. J & BARTGES, J.. **Canine and Feline Nephrology and Urology of Small Animals** 3. Ed., Blackwell Publishing Ltd, 2011, Cap 56, p 568-571.
- LEES, G. E. Juvenile and Familial Nephropathies In: Elliot J. & Grauer, G. F. **BSAVA Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology**, 2007, 2 ed Copyright. Cap 7, p 81-84.

093. SÍNDROME NEFRÓTICA ASSOCIADO AO VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA EM GATO: RELATO DE CASO

Tathiana Mourão dos **ANJOS**¹, Júlio César Cambraia **VEADO**², Pillar Gomide do **VALLE**³, Renato Filhusi **MARIANO**⁴, Wagner Lima **ARAÚJO**⁵, Luis Eduardo de Souza **TASSINI**⁶.

¹Universidade Federal de Minas Gerais - tathimouraoanjos@ufmg.br

^{2,3,4,5,6}Universidade Federal de Minas Gerais

RESUMO

Foi atendido um gato, da raça siamês, com histórico de edema de membros e ascite. Exames complementares revelaram infecção pelo vírus da leucemia felina (FeLV), doença renal crônica e sinais de síndrome nefrótica. O animal apresentou evolução favorável ao tratamento sintomático embora o prognóstico fosse reservado à desfavorável.

Palavras-chave: glomerulonefrite, FeLV, nefropatia, proteinúria, felino.

NEPHROTIC SYNDROME ASSOCIATED WITH THE VIRUS VIRUS OF FELINE LEUKEMIA IN A CAT: CASE REPORT

ABSTRACT

It was attended a cat, the Siamese breed, with a history of leg edema and ascites. Investigations revealed infection with feline leukemia virus (FeLV), chronic renal failure and signs of nephrotic syndrome. The animal presented a favorable outcome for symptom though was reserved for the unfavorable prognosis.

KEYWORDS: glomerulonephritis, FeLV, nephropathy, proteinuria, feline.

REVISÃO DE LITERATURA

A síndrome nefrótica é uma doença caracterizada por apresentar sinais clínicos de edema ou ascite, em virtude da existência de proteinúria de origem glomerular persistente. A glomerulonefrite causada pela deposição de imunocomplexos no interior glomerular é a causa mais comum de síndrome nefrótica. A leucemia felina, doença infecciosa causada por um retrovírus, provoca estímulo imune e, muitas vezes, consequente glomerulonefrite imunomediada (Souza, 2003). Objetiva-se com este trabalho, relatar um caso de síndrome nefrótica associada à leucemia felina (FeLV), e sua evolução após tratamento.

RELATO DO CASO:

Felino, siamês, macho castrado, 3 anos, apresentando apatia, anorexia, perda de peso, poliúria, polidipsia e aumento de volume nos membros e abdome. Ao exame físico confirmou-se edema na região escrotal, abdome, pescoço, membros torácicos e pélvicos. Apresentava febre (40.5°C), desidratação, mucosas hipocoradas, taquicardia e hipertensão arterial (190 x 110 mmHg). Foi instituído tratamento sintomático com fluidoterapia intravenosa, diurético (furosemida), antibiótico (amoxicilina) e antitérmico (dipirona). O animal foi submetido a exames complementares. Constatou-se sorologia positiva para FeLV, hemograma mostrando anemia severa (eritrócitos 1,21 milhões/mm³ e hematócrito de 5,89%) e leucocitose (26.450 /mm³). Foi realizada transfusão de sangue. Pesquisa de hemoparasitas negativa. Na urinálise, observou-se proteinúria (++++), sedimento inativo, densidade urinária baixa (1005 g/L) e relação proteína:creatinina urinária (RPC) de 1,6. Bioquímica sérica revelou hipoalbuminemia (1,3 g/dl), hipercolesterolemia (296 mg/dl), azotemia (uréia: 157,6 mg/dl e creatinina: 3,86 mg/dl), hiperfosfatemia (9,30 mg/dl) e hipocalcemia (3,0 mEq/L). Na terceira semana de tratamento já que não havia mais azotemia, nem edema foi suspenso o diurético e a fluidoterapia. Foi prescrito α -interferon-2 β recombinante 30UI/ml (1 ml/SID/VO/uso constante) para controle da leucemia felina e benazepril (0,25 mg/kg/SID/ VO/uso constante) para controle da proteinúria. Após 60 dias, a proteinúria havia diminuído (++) com RPC de 0,8 e pressão arterial de 165 x 110 mmHg. O paciente recebeu alta e foi recomendada manter dieta para paciente nefropata.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

No caso relatado, observou-se combinação de proteinúria significativa, hipoalbuminemia, edema generalizado, hipercolesterolemia e moderada hipertensão sistêmica, características da síndrome nefrótica. A hipoalbuminemia provocou diminuição da pressão coloidosmótica e consequente edema. Além disso, a redução do débito cardíaco e do volume plasmático estimula o aumento da atividade do sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA), o que leva a aumento da pressão glomerular e maior retenção de água e sal, com formação de edema, justificando, também a hipertensão arterial sistêmica (Brown, 1995).

A proteinúria consiste no principal achado laboratorial indicativo de lesão glomerular. As doenças glomerulares em gatos ocorrem, geralmente, devido às glomerulonefrites imunomediada (Brown, 1995; Grauer e Dibartola, 2000). O inibidor da ECA foi preconizado para reduzir a proteinúria pelo fato do animal ser portador do vírus da leucemia, o que tornava a terapia imunossupressora inviável (Grant e Forrester,

2001). A anemia, nesses casos, do tipo hemolítica auto-imune, também pode ocorrer por aplasia medular e/ou deficiência de eritropoietina devido a doença renal crônica. A hipercolesterolemia resulta da combinação na redução do catabolismo e aumento da síntese hepática de lipoproteínas, levando ao acúmulo representado pelo aumento do colesterol (Brown, 1995; Grauer e Dibartola, 2000).

CONCLUSÃO

Frente ao paciente com ascite, ou edema de membros, com histórico de nefropatia ou não, a mensuração sérica de colesterol e albumina, relação RPC urinária, são extremamente importantes para avaliar a possibilidade de ocorrência da síndrome nefrótica. A RPC deve ser realizada em todos os animais com suspeita de nefropatia e a causa da proteinúria com consequente hipoalbuminemia, deve ser pesquisada. Medidas terapêuticas devem ser imediatamente iniciadas, porém o prognóstico da síndrome nefrótica em geral é desfavorável, e no presente relato, o prognóstico continua a ser reservado à desfavorável uma vez que o gato em questão é infectado com o FeLV, agente viral capaz de causar glomerulonefrite imunomediada.

REFERÊNCIAS

- BROWN, S.A. *Primary diseases of glomeruli*. In: Osborne CA.; Finco DR. **Canine and Feline Nephrology and Urology**. 1th Baltimore: Williams & Wilkins, 1995. p. 368-385
- GRAUER, G.F., DIBARTOLA, S.P. *Glomerular disease*. In: Ettinger SJ., Feldman, E.C. **Textbook of Veterinary Internal Medicine**. 5th. Philadelphia: Saunders, 2000. p. 1662-1678.
- GRANT, D.C., FORRESTER, S.D. Glomerulonephritis in dogs and cats: glomerular function, pathophysiology, and clinical signs. **Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarian**. 2001; 23(8): 739-747.
- SOUZA, H.J.M. **Coletâneas em Medicina e Cirurgia Felina**. 1ed. Rio de Janeiro: L.F. Livros de Veterinária, 2003, p. 251-271.

**094. DEFEITO NA PAREDE TÓRACO-ABDOMINAL ASSOCIADO À MÁ-FORMAÇÃO EM MEMBROS TORÁDICOS DE NEONATO CANINO
RELATO DE CASO**

Luciana Zang¹, Ana Cristina Pacheco de Araújo², Marcelo Meller Alievi², Fernanda Soldatelli Valente², Sílvia Oliveira Battastini¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – lucianaz_23@yahoo.com.br

²Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS (HCV-UFRGS)

RESUMO

Descreve-se um caso de neonato canino com falha no fechamento da região tóraco-abdominal ventral associado à hemimelia paraxial terminal (agenesia de rádio e do I e II dedos) no membro torácico direito e hemimelia transversa terminal (parte do antebraço, resquício de ulna, úmero e escápula) no membro torácico esquerdo.

PALAVRAS-CHAVES onfalocele, hemimelia transversa, agenesia de rádio

**THORACIC AND ABDOMINAL WALL CLOSURE DEFECT ASSOCIATED TO
ANTERIOR LIMB MALFORMATION IN A NEONATE DOG – CASE REPORT**

ABSTRACT

Description of a case of a canine neonate with thoracic and abdominal ventral wall closure defect associated to terminal paraxial hemimielia (radius and I and II digits agenesis) in the right thoracic limb and terminal transverse hemimielia (section of the forearm, ulna vestige, humerus and scapula) in the left thoracic limb.

KEYWORDS: omphalocele, transverse hemimielia, radius agenesis

INTRODUÇÃO

Os defeitos no fechamento de parede ventral ocorrem devido a alguma falha no desenvolvimento fetal, onde a musculatura ventral não se une, expondo assim parte das vísceras. Sua classificação é feita conforme o envolvimento do cordão umbilical ou não. As mais frequentes falhas são a hérnia umbilical, a onfalocele e a gastrosquiase (Chabra e Gleason, 2005; Feldkamp et al., 2007). Esses defeitos podem estar associados a outros defeitos congênitos, como do aparelho músculo-esquelético (Forrester e Merz, 2008). As más formações esqueléticas podem envolver o corpo inteiro ou apenas partes, podendo variar no envolvimento do tamanho dos ossos, adição ou agenesia total de um osso ou até mesmo de um membro (Noden e De

Lahunta, 1985; Dennis e Leipold, 1979). O presente trabalho objetiva relatar um caso de onfalocele associado à deformação de membros torácicos em um neonato canino.

RELATO DE CASO

Foi atendida uma cadela da raça pinscher, dois anos de idade, que apresentou quadro de distocia. O animal já havia parido um filhote, aparentemente normal, e estava em trabalho de parto por mais de 12 horas. Apresentava histórico de ninhada anterior sem problemas de parto, e aplicação de hormônio como método contraceptivo. O animal foi encaminhado para procedimento cirúrgico de cesariana e ovário-salpingohisterectomia (OSH). Após histerotomia, foi verificada a presença de três fetos, um vivo e dois mortos. O neonato vivo era uma fêmea e apresentava grande defeito de fechamento da parede abdominal e caixa torácica (região do esterno), e por questões humanitárias foi submetido à eutanásia. Este filhote estava envolto pela placenta, aparentemente normal, com grande parte das vísceras expostas (fígado, intestino, baço, pâncreas, rins, coração e pulmões). Associado, foram verificadas alterações severas dos membros torácicos, apresentava uma hemimelia paraxial terminal (agenesia de rádio e dos I e II dedos) no membro torácico direito e hemimelia transversa terminal (apresentava apenas parte do antebraço, resquício de ulna, úmero e escápula) no membro torácico esquerdo.

Figura 1 – Defeito tóraco-abdominal com exposição visceral (A). Hemimelia paraxial terminal no membro torácico direito (B) e hemimelia transversa terminal no membro torácico esquerdo (C).

DISCUSSÃO

Os defeitos no fechamento de parede já foram descritos em filhotes de ratazanas, camundongos, porquinhos-da-índia, coelhos, cães, gatos, cavalos, bovinos, ovelhas e porcos. Normalmente apresentam incidência menor que 1%, porém em alguns estudos feitos em gatos e leitões, viu-se que aumentou para 5%, sendo prevalente em certas raças, mostrando um potencial genético para sua ocorrência (Szabo, 1989). Em humanos as falhas no fechamento de parede ventral ocorrem em 1 a cada 2.000 nascimentos (Chabra e Gleason, 2005; Feldkamp et al., 2007), e a

onfalocele ocorre em 2,5 a cada 10.000 nascidos vivos (Calzolari et al., 1995). Conforme estudo feito por Forrester e Merz (2008) a associação com defeitos do aparato músculo-esquelético pode chegar a 40%, sendo que 10% se tratavam de deformação de membros torácicos. No caso descrito houve tanto alterações no abdome, tórax e membros torácicos de apenas um filhote de uma ninhada de quatro.

CONCLUSÃO

O estudo dos defeitos congênitos tem o intuito de compreender a embriologia, etiologia, fatores de risco e sua recorrência.

REFERÊNCIAS

- CALZOLARI, E.; BIANCHI, F.; DOLK, H.; MILAN, M. Omphalocele and gastroschisis in Europe: a survey of 3 million births 1980-1990. *Am J Med Genet*, v. 58, 187-194, 1995
- CHABRA, S.; GLEASON, C.A. Gastroschisis: Embryology, pathogenesis, epidemiology. **NeoReviews**, v. 6, n. 11, p. e493–e499, 2005
- DENNIS, S.M.; LEIPOLD, H.W. Ovine congenital defects. **Vet Bull**, v. 49, p. 233-239., 1979.
- FELDKAMP, M.L.; CAREY, J.C.; SADLER, T.W. Development of gastroschisis: Review of hypotheses, a novel hypothesis, and implications for research. **Am J Med Genet**, Part A, v. 143A, p 639–652, 2007
- FORRETER, M.B.; MERZ, R.D. Structural birth defects associated with omphalocele and gastroschisis, Hawaii, 1986–2001. **Congenital Anomalies**, v. 48, p. 87–91, 2008
- NODEN, D.M.; DE LAHUNTA, A. **The embryology of domestic animals. Development mechanisms and malformations**. Baltimore, MD: Williams and Wilkins, 1985. 367 p.
- SZABO, K.T. **Congenital malformations in laboratory and farm animals**. San Diego: Academic Press, 1989. 313 p.

095. MANEJO DO NEONATO CANINO COM FENDA PALATINA PRIMÁRIA RELATO DE CASO

Vanessa Kutz de Arruda¹, Maria Lúcia Gomes Lourenço¹, Fernanda Chicharo Chacar¹, Amanda Resende Duarte¹, Luiz Henrique de Araújo Machado¹

¹-Serviço de Clínica Médica de Pequenos Animais FMVZ-UNESP- Botucatu

RESUMO

A fenda palatina primária, também conhecida como lábio leporino ou queilosquise é uma malformação congênita rara cuja etiologia pode ser hereditária, iatrogênica administração de fármacos durante a gestação, ou ainda gerada por desequilíbrios nutricionais. Alguns cuidados com o neonato portador da anomalia são necessários visto que, esta alteração pode prejudicar a nutrição do mesmo, pois dificulta o reflexo de sucção além de induzir à aspiração do conteúdo alimentar provocando pneumonia aspirativa. O objetivo do presente relato é descrever um caso de um cão neonato com fenda palatina primária evidenciando a importância do manejo clínico adequado para evitar complicações oriundas da malformação.

PALAVRAS-CHAVE: recém-nascido, defeitos congênitos, queilosquise, cão, lábio leporino

MANAGEMENT OF THE NEONATE CANINE WITH PRIMARY CLEFT PALATE - CASE REPORT

ABSTRACT

The primary cleft palate, also known as cleft lip or queilosquise is a rare congenital malformation whose etiology can be hereditary, iatrogenic drug administration during pregnancy, or even generated by nutritional imbalances. Some care with the neonate puppy of the anomaly are needed since, this change may affect the nutrition of the same, because it makes the reflection of suction and induce the aspiration of food contents causing aspiration pneumonia. The goal of this report is to describe a case of a dog yearling with primary cleft palate highlighting the importance of proper clinical management to avoid complications from congenital malformation.

KEYWORDS: newborn, congenital defects, cheiloschisis, dog, cleft lip

INTRODUÇÃO

Existem muitas malformações congênitas em cães, sendo que cerca de 1-2% dos filhotes nascem com algum tipo de anomalia. A fenda palatina primária também descrita como queilosquise, corresponde aos defeitos localizados cranialmente ao

forame incisivo envolvendo o lábio e propiciando comunicação entre as cavidades nasais e orais (JURKIEWICZ e BRIANT, 1968; HOWARD, et al., 1976; HETTE e RAHAL, 2004; DUMON, 2005). Tais alterações podem ser de origem hereditária ou decorrente de desequilíbrios nutricionais e de administração de alguns fármacos durante a gestação (HOSKINS, 2001; DUMON, 2005). As raças braquicefálicas são mais predispostas ao desenvolvimento dessa anomalia embora, qualquer raça possa ser acometida (FOX, 1973; DUMON, 2005). Em um RELATO DE CASO, dois animais da raça Bulldog de uma mesma ninhada em que a mãe recebeu suplementação de vitamina A durante a gestação, nasceram com fenda palatina primária e secundária (HETTE e RAHAL, 2004). A correção cirúrgica da malformação é indicada a partir da sétima semana de idade (HOSKINS, 2001). Pode-se ainda optar pelo manejo clínico da fenda palatina primária (HETTE e RAHAL, 2004).

RELATO DE CASO:

Foi atendido um cão, macho, da raça *Shih tzu* com dois dias de idade, com 150 gramas, proveniente de uma ninhada de dois filhotes, cujo um deles apresentava o defeito congênito e o outro aparentemente normal. O histórico do neonato acometido era de rejeição materna desde o nascimento, ingestão pequena quantidade de colostro e fenda labial. O neonato demonstrava-se vigoroso com reflexos de sucção, da procura e endireitamento vestibular presentes, mucosas avermelhadas e com leve desidratação (mucosas secas e urina mais concentrada) sendo que os demais parâmetros clínicos avaliados (temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória, auscultação cardiopulmonar, linfonodos, palpação abdominal, reflexo anogenital, glicemia) encontravam-se dentro da normalidade descrita para faixa etária em questão. Diante do quadro de desidratação administrou-se fluidoterapia com solução de glicose 2,5% aquecida por via subcutânea (6 mL). Os proprietários foram orientados quanto ao manejo do neonato que, além de não receber os cuidados maternos, possuía ainda uma malformação que poderia comprometer a saúde do mesmo se não recebesse cuidados adequados. Os cuidados incluíram: manutenção da temperatura e umidade ambiente adequadas (27-32°C; 52%) e fornecimento de sucedâneo lácteo caseiro (800 ml de leite, 200 ml de creme de leite, duas gemas de ovo e cinco mililitros de complexo vitamínico) na dose de 3 mL a cada 2 horas. O sucedâneo aquecido (37°C) foi administrado somente após a verificação da presença do reflexo da sucção no neonato, a cada duas horas por meio de uma seringa, lentamente para se evitar broncoaspiração. Após cada alimentação o proprietário deveria estimular o neonato a

defecar e urinar massageando a região anogenital com algodão embebido em água morna. Entre cada alimentação recomendou-se administração de pequenos volumes de água (2 mL/100 gramas de peso) para manutenção da hidratação do animal. Foram marcados retornos semanais para monitoramento do ganho de peso e avaliação clínica neonatal. O ganho de peso corporal foi: 220 gramas na 2º semana de vida, 280 gramas na 3º semana, 390 gramas na 5º semana e 600 gramas na 6º semana de idade.

DISCUSSÃO

As raças braquicefálicas são mais predispostas a apresentarem fenda palatina primária (FOX, 1973; DUMON, 2005) sendo a raça *Shih tzu* incluída entre elas. O neonato em questão apresentava fenda palatina primária em lábio superior em concordância com Sorribas (2007) que afirma que geralmente a fissura encontra-se no lábio superior. Segundo a literatura (HETTE E RAHAL, 2004; DUMON, 2005; SORRIBAS, 2007) normalmente é possível observar várias anormalidades associadas, contudo, o neonato não apresentava outra malformação clinicamente detectável no momento da consulta. O paciente era do sexo masculino e a irmã de ninhada não apresentava qualquer anomalia aparente. Em humanos, tanto fenda palatina primária quanto a secundária são alterações pouco comuns com maior incidência no sexo masculino (WOOD, 1941). Embora o animal tenha mamado o mesmo não desenvolveu nenhum sinal respiratório que pudesse sugerir um quadro de pneumonia aspirativa (tosse, regurgitação oronasal, descarga nasal mucopurulenta, tonsilite ou renite), apresentando desenvolvimento corporal adequado para a faixa etária. As fendas localizadas no palato primário que envolve apenas o lábio, como a descrita neste caso, podem ser reparadas cirurgicamente por razões estéticas, pois não causam problemas funcionais (HETTE E RAHAL, 2004). Optou-se, portanto pela não reparação cirúrgica uma vez que o neonato não apresentava outras alterações congênicas mais graves e teve desenvolvimento corpóreo adequado.

CONCLUSÃO

Embora os defeitos congênicos do palato sejam considerados raros, a fenda labial primária compreende o defeito mais facilmente evidenciado. Embora o tratamento desta afecção seja a reparação cirúrgica, a manutenção do paciente neonato hígado até a idade e peso adequado para o procedimento é um desafio ao clínico de pequenos animais. O conhecimento da fisiologia neonatal aliado a técnicas de manejo adequado são fundamentais para o bom prognóstico nesta afecção neonatal congênita.

REFERÊNCIAS

- DUMON, C. Patologia Neonatal do Filhote, os primeiros 15 dias. In: PRATS, A.; DUMON, C.; GARCIA, F.; MARTÍ, SIMÓN; VICTÓRIA, COLL. **Neonatologia e pediatria canina e felina**. p.133-134.
- FOX, M. W. Developmental Abnormalities of the Canine Skull. **Can. J. Comp. Med. Vet. Sci.** v. 27. p. 219-222, 1963.
- HETTE, K.; RAHAL, S. C. Defeitos congênitos do palato em cães. Revisão da literatura e relato de três casos. **Clínica veterinária**. v. 9, n. 50. p. 30-40. 2004.
- HOSKINS, J. D. The digestive system. In: HOSKINS, J. D. **Veterinary pediatrics, dogs and cats from birth to six months**. 3 ed. Philadelphia: Saunders. Cap. 10, p. 149-151. 2001.
- HOWARD, D.R. et al. Primary cleft palate (harelip) and closure repair in puppies. **J Am An Hosp Ass.** v.12, 1976, p.636-640.
- JURKIEWICZ, M.J.; BRIANT, D.L. Cleft lip and palate in dogs: a progress report. **Cleft Palate Journal**. v.5. 1968. p. 30-36.
- SORRIBAS, C. E. El exame do neonato. In: **Atlas de neonatología y pediatria em caninos**. 1 ed. Buenos Aires: Inter-médica. Cap. 5. p. 92-94. 2007.
- WOOD, F. C. INHERITANCE OF HARELIP AND CLEFT PALATE. **British Medical Journal**. v. 2. 1941. p. 65-67.

096. COMPRIMENTO DA CAVIDADE PULPAR DE ACORDO COM OS FORMATOS DE CABEÇA DOS CÃES

SIMONE FALAT MOURA¹, ANTONIA MARIA DO ROCIO BINDER DO PRADO²

¹ Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR - simone.vet@hotmail.com

² Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR - marychello@hotmail.com

RESUMO

A endodontia é o ramo da odontologia que lida com o diagnóstico e tratamento das doenças da polpa. A terapia endodôntica pode solucionar infecções dentárias e periodontais que podem ser resultado não só de lesões locais, mas também sistêmicas. Nos cães, existem diferenças no formato da cabeça, que foram classificadas em três tipos: Doligocefálicos, Braquicefálicos e Mesocefálicos. Sabendo que a forma da cabeça interfere na posição dos dentes, assim como nas suas relações e na predisposição em desenvolver enfermidades. O objetivo deste estudo foi aferir o comprimento da cavidade pulpar de acordo com os formatos de cabeça dos cães (doligocefálicos, braquicefálicos, mesocefálicos, visando o tratamento endodôntico.

Palavras-chave: odontologia, endodontia, cães.

LENGTH OF PULP CAVITY TO THE FORMATS HEAD OF DOGS

ABSTRACT

The Endodontics is the branch of dentistry that deals with diagnosis and treatment of diseases of the pulp. Endodontic therapy may resolve periodontal and dental infections that may result not only of local lesions, but also systemic. In dogs, there are differences in the shape of the head, which were classified into three types: Doligocephalic, and brachycephalic mesocephalic. Knowing the shape of the head interferes with the position of the teeth, and in their relationships and the predisposition to develop diseases. The objective of this study was to estimate the length of the pulp cavity in accordance with the formats of the dogs head (doligocephalic, brachycephalic, mesocephalic, seeking endodontic treatment.

KEYWORDS: *dentistry, endodontics, dogs*

INTRODUÇÃO

A forma da cabeça interfere na posição dos dentes, assim como nas suas relações e na predisposição em desenvolver enfermidades (San Roman, 1999). Nos cães, existe uma diferença no formato da cabeça de acordo com o porte e raça de cada animal, nas quais foram diferenciadas em três tipos: Dolicocefálico (*Dolicho mens long*) - os animais tem uma longa e estreita cabeça, sendo os exemplos mais comuns de raça o Greyhound, Borzoi e Dobermann; Braquicefálico (*Brady mens short*) – os animais tem uma cabeça curta e os pré-molares ficam apinhados, levando a uma doença periodontal, como nos cães da raça Boxer, Pug e Bulldog; Mesocefálico (*Mesatic mens medium*) – é o tipo mais comum, são os que possuem o formato de cabeça mais intermediário, como o Pastor Alemão, Labrador Retriever e Spaniels (Holmstrom, 2000).

A endodontia é o ramo da odontologia que lida com o diagnóstico e tratamento das doenças da polpa e suas seqüelas nos tecidos apical, periapical, radicular e

periradicular. Na doença endodôntica a cavidade pulpar pode ser lesada em: fraturas de coroa; trauma brusco; infecção por propagação hematógena; desgaste rápido, doença periodontal avançada, profundidade da cárie dentária e lesões térmicas. Sem tratamento, o dente provavelmente será uma fonte crônica de dor, levando à infecção bacteriana a longo prazo, fístulas ou doença periodontal secundária (Mitchell, 2004; Leon-Roman; Gioso, 2004). Um dos objetivos do tratamento endodôntico consiste na instrumentação, limpeza e desinfecção do canal radicular. Para diminuir ao máximo possível os traumas operatórios, é muito importante saber o comprimento da cavidade pulpar, promovendo assim, o respeito aos tecidos periapicais, que constitui um dos princípios básicos do tratamento endodôntico. (Saquy, 1996; Estrela et al., 2007). O fracasso em determinar precisamente o comprimento da cavidade pulpar, pode provocar perfurações apicais, sobre instrumentação e sobre obturação, com incidência de dor pós-operatória. O oposto também pode ocorrer, levando a instrumentação e obturação deficientes e/ou incompletas, causando insucesso no tratamento endodôntico (Capelli et al., 2002). O objetivo deste estudo concentrou-se em aferir o comprimento da cavidade pulpar de acordo com os formatos de cabeça dos cães (doligocefálicos, braquicefálicos, mesocefálicos). Estas informações podem minimizar o tempo anestésico do animal e do próprio procedimento endodôntico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados cabeças de cadáveres de cães adultos. Os animais possuíam idade entre 4 e 9 anos. A pesquisa foi dividida em duas fases: Fase 1 – Exodontia e Radiografia odontológica; Fase 2 – Aferição do comprimento da cavidade pulpar. Na fase 1, realizou-se a exodontia de todos os dentes de cada cabeça, e identificou-se os dentes de acordo com o Sistema Triadan Modificado para cães. Para uma identificação correta dos dentes, tomou-se por base a face vestibular de todos os dentes, identificando como RAIZ 1 - a raiz mesial, mais próxima da fissura mandibular e RAIZ 2 - a raiz caudal, já para os dentes tri radiculares (com 3 raízes), identificamos a RAIZ 1 e 2 da mesma forma, porém a RAIZ 3 é a raiz que se localiza na face lingual., em formulário próprio elaborado para a pesquisa. Utilizando aparelho de raio-x odontológico e filmes oclusais, realizou-se as radiografias e as revelações. Com um negatoscópio, a raiz do dente foi visualizada e com a ajuda de um compasso geométrico foram realizadas as medidas do comprimento da cavidade pulpar. Fixou-se uma haste do compasso no canal radicular (proximal ao ápice radicular) e a outra haste foi fixada até a câmara pulpar. As hastes do compasso foram sobrepostas a uma régua milimétrica, figura 3, e as medidas anotadas em outro formulário próprio. Com os

dados obtidos foram realizadas as análises estatísticas, utilizando o teste kruskall-Wallis e teste de Dunn's. Os dados foram demonstrados em Tabela do Excel demonstrando média, desvio padrão e nível de significância: 5% ($\alpha=0,05$). Todos os cálculos foram realizados utilizando o *Software* estatístico *GraphPad Prism* version 3.00 for Windows, San Diego – Califórnia, EUA.

RESULTADOS

No maxilar direito, os cães Mesocefálicos apresentaram a cavidade pulpar de todos os dentes com menor comprimento, quando comparados com os cães braquicefálicos e doligocefálicos. Já os dentes 101 a 107 apresentaram menor comprimento nos cães braquicefálicos, quando comparados com cães doligocefálicos. E os dentes 108 a 110 (triradiculares) apresentaram um menor comprimento nos cães doligocefálicos, quando comparados com cães braquicefálicos. O mesmo resultado foi encontrado, quando comparamos os dados referentes ao dentes do maxilar esquerdo dos cães.

Na mandíbula direita dos cães, os cães Mesocefálicos apresentaram a cavidade pulpar da maioria dos dentes com menor comprimento, quando comparados com os cães braquicefálicos e doligocefálicos, com exceção dos dentes 302, 303, 305 e 306 que apresentaram um comprimento maior que dos braquicefálicos e menor do que os doligocefálicos. Os dentes 307 e 308 apresentaram maior comprimento nos cães braquicefálicos, quando comparados com cães doligocefálicos. A maioria dos dentes dos cães doligocefálicos apresentaram maior comprimento, quando comparados com os cães braquicefálicos e mesocefálicos, com exceção dos dentes 307 e 308 que apresentaram um comprimento menor quando comparados com os braquicefálicos.

O mesmo resultado foi encontrado, quando comparamos os dados referentes ao dentes da mandíbula esquerda dos cães, conforme gráfico 4.

DISCUSSÃO

Desde o início do século, os endodontista estão em busca de métodos para determinar o comprimento da cavidade pulpar, para que os tratamentos sejam fáceis, rápidos e precisos. Vários métodos foram propostos para esse fim, tais como: resposta do paciente à dor provocada pela ultrapassagem de um instrumento pelo forame apical, Crane (1921); aplicação do teorema de Talles, Bregman (1950); sistemas geométricas, Best et al (1962); e sistemas eletrônicos Sunada (1962), Stoianov (1978) e Yamaoka et al(1989), porém na Odontologia Veterinária ainda não havia sido realizado nenhum estudo sobre tais dados. Esta pesquisa, torna-se portanto, o primeiro estudo que determina o comprimento da cavidade pulpar dos cães, diferenciando ainda a

particularidade das diferenças existentes nos três formatos de cabeça dos cães. Com o resultado dessa pesquisa, podemos concordar com Holmstrom (2000), que afirma existir diferenças significativas entre os formatos de cabeça.

CONCLUSÃO

Através desta pesquisa, conclui-se que existem diferenças no comprimento da cavidade pulpar dos cães, quando comparadas entre os 3 diferentes tipos de cabeça. Cães mesocefálicos são os que apresentaram a cavidade pulpar menor, quando comparados com os braquicefálicos e dolicocefálicos.

Além do conhecimento das técnicas e posicionamentos radiográficos, observou-se que para a visualização das estruturas dentárias e a elaboração de um diagnóstico, tratamento e prognóstico preciso, é necessário que o profissional esteja preparado para identificar e correlacionar a anatomia da cavidade oral com os elementos dentários da imagem radiográfica.

REFERÊNCIAS

- CAPELLI, Alexandre ; SEIXAS, Fabio Heredias ; PECORA, J. D. . Instrumentação rotatória eletromecânica dos canais radiculares. **Revista Gaúcha de Odontologia**, Porto Alegre RS, v. 50, n. 02, p. 89-92, 2002.
- ESTRELA, Carlos ; BRUGNERA JÚNIOR, Aldo ; ESTRELA, C. ; PECORA, J. D. . Dor pós-operatória em dentes com infecções endodônticas secundárias: revisão sistemática. **Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas**, v. 61, p. 195-2002, 2007.
- HOLMSTROM, Steven E. **Veterinary dentistry for the technician & office staff**. Philadelphia: W. B. Saunders Co., 2000.
- LEON-ROMAN. M.A; GIOSO, M. A. Endodontia – anatomia, fisiopatologia e terapia das afecções dos tecidos internos do dente. **Medvet Revista Clínica Veterinária**, Ano 2004, n.7, p.195-203.
- MITCHELL, PAUL Q. **Odontologia de pequenos animais**. SÃO PAULO: ROCA, 2004.
- SAN ROMAN, F. **Atlas de odontologia de pequenos animais**. São Paulo: Manole, 1999.
- SAQUY, Paulo César ; PECORA, J. D. . **Orientação Profissional Em Odontologia**. 1. ed. São Paulo: SANTOS, 1996. v. 1. 67 p.

097. INTRUSÃO TRAUMÁTICA DE DENTE INCISIVO NA ARTICULAÇÃO INTERMANDIBULAR EM UM SHIH TZU

Víviam Nunes Pignone¹, Aline Macedo¹, Emerson Antonio Contesini¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul – vividogodonto@gmail.com

RESUMO

A sínfise mandibular em cães é formada por um tecido fibroso localizado na região rostral responsável pela união dos ramos horizontais. As raças braquicefálicas apresentam como característica anatômica uma articulação intermandibular mais ampla, que permite uma leve movimentação entre os ramos horizontais na região dos dentes incisivos centrais. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de intrusão traumática de um dente incisivo, na sínfise mandibular, em um canino da raça Shih Tzu, diagnosticada após radiografia intra-oral da região afetada, que teve como tratamento a exodontia do elemento dentário.

PALAVRAS-CHAVES exodontia, dente, cão, sínfise mandibular

TRAUMATIC INCISOR INTRUSION IN INTERMANDIBULAR JOINT IN A SHIH TZU

ABSTRACT

The mandibular symphysis in dogs consists of a fibrous tissue located in the rostral responsible for the union of the horizontal branches. Brachycephalic breeds the characteristic anatomical articulation intermandibular a broader, allowing a slight movement among the horizontal branches in the region of the central incisors. The present work aims to report a case of traumatic intrusion of an incisor tooth, in the mandibular symphysis, in a canine breed Shih Tzu, diagnosed after intra-oral radiographs of the affected area, which was to treat the extraction of the tooth.

KEYWORDS extraction, tooth, dog, mandibular symphysis.

INTRODUÇÃO

A sínfise mandibular em cães e gatos é formada por uma união fibrosa que une os ramos mandibulares e é o local mais frequentemente acometido por lesões traumáticas (Wiggs e Lobprise, 1997). Esta união permite uma leve mobilidade fisiológica (Wiggs e Lobprise, 1997), em especial às raças braquicefálicas, que têm

como característica uma maior abertura entre as mandíbulas contralaterais, ou seja, encontraram-se mais separadas uma da outra (Hofmann, 2008). O exame radiográfico consiste em um meio diagnóstico de extrema importância que permite detectar a etiologia e a fisiopatologia, além de orientar no tratamento das afecções orais (Wiggs e Lobprise, 1997; Neves et al., 2010). Como diagnósticos diferenciais de aumento de volume gengival destacam-se as neoplasias, os cistos ósseos/odontogênicos, os abscessos e as fraturas (Wiggs e Lobprise, 1997, Lago et al., 2006, Neves et al., 2010). Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de intrusão traumática de um incisivo na articulação intermandibular em um Shih Tzu.

RELATO DE CASO:

Um canino da raça Shih Tzu, fêmea, com um ano de idade, chegou à clínica apresentando aumento de volume na gengiva na região os dentes incisivos inferiores direitos há duas semanas, com leve projeção do ramo mandibular rostral, porém sem histórico de sangramento oral. A proprietária informou que o paciente costumava brincar com bolinha, sendo que eventualmente batia o focinho na porta ao ir busca-la. Apesar da alteração oral, o canino continuava alimentando-se e bebendo água normalmente.

Ao exame clínico pode-se observar ausência de dois incisivos centrais e desconforto ao palpar a região gengival com aumento de volume. Como exame diagnóstico foi realizado radiografia intra-oral, que revelou a presença de um incisivo central na região da sínfise mandibular na articulação intermandibular e outro incisivo incluso, distal ao incisivo intermédio. Com uma agulha hipodérmica e seringa punccionou-se o aumento de volume gengival, que confirmou a presença de sangue, justificando a origem traumática.

Com o paciente sob anestesia geral inalatória iniciou-se o preparo do retalho mucoperiosteal na região da sínfise mandibular para realizar a exodontia do incisivo intruído. Finalizado o descolamento do periósteo pode-se visualizar a coroa dentária que foi apreendida pelo fórceps a fim de realizar sua avulsão. Posteriormente, este retalho foi reposicionado e suturado com fio absorvível poliglactina 910 4-0 e padrão isolado simples. No pós-operatório o paciente foi medicado com amoxicilina associado com clavulonato de potássio, meloxicam e cloridrato de tramadol durante 5 dias. No sétimo dia pós-operatório o paciente retornou à clínica ativo, sem sinais de dor e alimentando-se normalmente.

DISCUSSÃO

A união fibrosa na sínfise mandibular predispõe a traumas e disjunções com frequência, especialmente as raças braquicefálicas por possuírem um maior espaço desta articulação intermandibular a ponto de alojar um incisivo completamente. O aumento de volume aliado à ausência de dentes incisivos e idade do paciente sugere diversas etiologias, tornando o exame radiográfico fundamental, tanto no diagnóstico como no tratamento, principalmente neste relato, onde não foi observado qualquer sangramento oral nem diminuição do apetite do animal pelo proprietário.

CONCLUSÃO

Conclui-se que as lesões traumáticas não devem ser descartadas em cães, especialmente jovens, tornando-se indispensável a radiografia intra-oral, sem sobreposição de estruturas, para chegar ao diagnóstico definitivo. A exodontia do elemento dentária alojada nesta articulação intermandibular é de fácil execução, porém não dispensa conhecimento anatômico e nem prática pelo cirurgião.

REFERÊNCIAS

WIGGS, R.B.; LOBPRISE, H.B. **Veterinary dentistry – Principles & Practice**. Saint Louis: Lippincott-Raven, 1997. 748 p.

HOFMANN, F.A. **Estudo comparativo da forma do crânio de cães braquicefálicos e mesaticefálicos por meio de técnicas de morfometria geométrica em três dimensões**. 2008. São Paulo, 101f. Dissertação (Mestrado em Clínica Cirúrgica Veterinária) – Curso de Pós-graduação em Clínica Cirúrgica Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo.

NEVES, C.C.; MANISCALCO, C.L.; CANOLA, J.C. et al. Estudo radiográfico retrospectivo de lesões ósseas mandibulares em cães. **Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária**, ano VIII, n.15, p.1-16, 2010. Disponível em: <<http://www.revista.inf.br/veterinaria15/artigos/artigos.htm>>. Acesso em: 13/01/2012.

LAGO, C.A.; CAUÁS, M. PEREIRA, A.M. et al. Cisto ósseo traumático em mandíbula: RELATO DE CASO. *Revista de cirurgia e traumatologia buco-maxilo-facial* v. 6, n. 2, 2006. Disponível em: <<http://www.revistacirurgiabmf.com/2006/v6n2/v6n23.pdf>>. Acesso em: 13/01/2012.

098. ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA MICROBIOTA PERIODONTAL DE CÃES DA CIDADE DE BELÉM, PARÁ

Lorena Aviz Pinho¹; Tamires Danielle Cardoso Viana¹; Roseli do Socorro Dias Monteiro¹; Naiara Maria Oliveira dos Santos¹; Roberto de Faria Espinheiro¹, Hilma Lúcia Tavares Dias¹

¹Laboratório de Investigação e Diagnóstico de Enfermidades Animais, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Federal do Pará. lorena.aviz@hotmail.com

RESUMO

Realizou-se um estudo sobre a microbiota periodontal de 23 cães adultos e filhotes com objetivo de identificar bactérias aeróbicas presentes na cavidade oral. Com auxílio de swabs estéreis, as amostras foram coletadas e semeadas em placas de Petri contendo os meios de Ágar Mitis salivarius, Ágar Sangue e Ágar MacConkey e colocadas para incubar a 37°C durante 72 horas. As bactérias isoladas de maior ocorrência em cães adultos foram: *Staphylococcus* spp., *Proteus rettgeri* e *Streptococcus* spp. em filhotes foram: *Staphylococcus* sp. coagulase negativa, *Enterobacter* sp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Hafnia* sp. e *Aeromonas formicans*.

PALAVRAS-CHAVE: cães, filhotes, adultos, microbiota, periodontal

ISOLATION AND IDENTIFICATION OF DOGS PERIODONTAL MICROBIOTA OF THE CITY OF BELEM, PARÁ

ABSTRACT

We conducted a study on the periodontal microbiota of 23 adult dogs and puppies in order to identify aerobic bacteria present in the oral cavity. With the aid of sterile swabs, samples were collected and sown in Petri dishes containing the means of Mitis salivarius agar, blood agar and MacConkey and placed to incubate at 37°C for 72 hours. The most frequent bacteria isolated in adult dogs were *Staphylococcus* spp., *Proteus rettgeri*, and *Streptococcus* spp. in offspring were: *Staphylococcus* sp.coagulase negative, *Enterobacter* sp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Hafnia* sp. and *Aeromonas formicans*.

KEYWORDS dogs, puppies, adults, microbiota, periodontal.

INTRODUÇÃO

Estudos têm relatado a importância da microbiota oral de cães no desenvolvimento de infecções por meio de contaminação de feridas por mordidas em seres humanos e outros animais e em contaminações de feridas cirúrgicas de cães devido à interferência dos mesmos (DOMINGUES, et al. 1999; BRAGA, et al., 2011). Sendo assim, realizou-se um estudo sobre a microbiota periodontal de 23 cães adultos e filhotes com objetivo de identificar bactérias aeróbicas presentes na cavidade oral.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 23 cães (16 fêmeas e 07 machos), sem raça definida, na faixa etária entre 2 meses a 7 anos, sem descrição de doença periodontal. As amostras foram coletadas com auxílio de swabs estéreis e mantidos em caldo BHI para pré-enriquecimento. As amostras foram semeadas em meio de Ágar Sangue e Ágar MacConkey e colocadas para incubar a 37°C durante 48 horas. As amostras também foram inoculadas em Ágar Mitis salivarius, seletivo para estreptococos do grupo mutans, e incubadas a 37°C por 72 horas. As colônias isoladas foram caracterizadas pela morfologia e perfil bioquímico.

RESULTADOS

Os resultados obtidos para comparação entre os cães adultos e filhotes foram respectivamente: *Staphylococcus* sp. coagulase negativa (02 e 05); *Staphylococcus* spp. (0 e 03), *Streptococcus* spp. (0 e 01), *Proteus vulgaris* (01 e 03), *Proteus rettgeri* (0 e 01), *Aeromonas formicans* (01 e 0), *Enterobacter* sp. (01 e 0), *Hafnia* sp. (01 e 0) e *Escherichia coli* (02 e 0).

DISCUSSÃO

No presente estudo a microbiota oral tanto em cães jovens como adultos houve a predominância de *Staphylococcus* sp., *Proteus rettgeri*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* sp. coagulase negativa, *Enterobacter* sp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli*, *Proteus vulgaris*, *Hafnia* sp. e *Aeromonas formicans*, dados estes semelhantes aos relatados na literatura científica, entretanto o conhecimento sobre as espécies bacterianas com potencial patogênico na mucosa oral de cães auxilia na prevenção e tratamento da doença periodontal.

CONCLUSÃO

Os resultados revelados no presente estudo, demonstram que dos micro-organismos isolados houve predominância de cocos Gram-positivos em animais jovens.

REFERÊNCIAS

BRAGA, C. A. da S. B; REZENDE, C. M de F; COSTA, J. E et al. Importância da avaliação clínica no diagnóstico de doença periodontal em cães da raça pastor alemão. **Pesquisa Ciência Animal Brasileira** [1518 – 2797] Vol. 5, Nº 1, 2006.

DOMINGUES, L.M; ALESSI, A. C; DUTRA, L. S et al. Microbiota saprófita associada à doença periodontal em cães. **Pesquisa Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**. Vol. 51 Nº 4, Agosto 1999.

FONSECA, S. A; GALERA, P. D; BRITO D. L. et al. Análise microbiológica da placa bacteriana da doença periodontal em cães e o efeito da antibioticoterapia sobre ela. **Pesquisa Ciência Rural**, Vol. 4, Nº 8, P. 1424 – 1429, agosto 2011.

099. TÉCNICA PARA ODONTOSECÇÃO DE RAIZ SUPRANUMERÁRIA BILATERAL EM CÃO DA RAÇA DACHSHUND

Víviam Nunes Pignone¹, Lanucha Fidelis da Luz Moura¹, Luciana Andreatta Torelly Pinto¹, Emerson Antonio Contesini¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul – vividogodonto@gmail.com

RESUMO

A exodontia é uma das técnicas cirúrgicas mais realizadas durante os tratamentos periodontais, tanto de dentes mono como multirradiculares. Para realiza-la corretamente é necessário conhecimento anatômico do periodonto, número de raízes e estrutura da coroa. Anatomicamente, apenas os três últimos dentes superiores possuem três raízes nos cães, ou seja, o quarto pré-molar, o primeiro e o segundo molares. Entretanto, anormalidades no desenvolvimento do germe dentário podem ocorrer, inclusive de caráter genético e hereditário. Este trabalho tem como objetivo descrever a técnica utilizada para extrair o terceiro pré-molar superior que apresentava raiz supranumerária na face palatina e abscesso periapical em um canino da raça Dachshund.

PALAVRAS-CHAVES exodontia, dente, multirradicular, raiz supranumerária, maxila.

ODONTOSSECTION TECHNIQUE FOR UPPER THIRD PREMOLAR WITH SUPERNUMERARY ROOT IN DOG

ABSTRACT

The extraction is one of the most commonly performed surgical techniques during the periodontal treatment, both as mono or multirooted teeth. To perform correctly it is necessary anatomical knowledge of the periodontium, root number and crown structure. Anatomically, only the last three upper teeth have three roots in dogs, ie, the fourth premolar, first and second molars. However, abnormalities in the development of tooth germ may occur, including genetic and hereditary character. This paper aims to describe the technique used to extract the third premolar supernumerary which had roots in the palatal side and periapical abscess in a Dachshund.

KEYWORDS exodontia, tooth, multirooted, supernumerary root, upper jaw

INTRODUÇÃO

A exodontia ou extração dentária é uma das intervenções cirúrgicas mais frequentemente realizada nos tratamentos periodontais de cães e gatos (Gioso, 2007). A incidência de raízes supranumerárias em cães é rara correspondendo a 2,87%, sendo o terceiro pré-molar (44,44%) e o primeiro pré-molar (33,33%) maxilares os dentes mais comumente afetados, e a raça Greyhound a mais atingida (36,4%).

Lacerda et al. (2000) acrescenta que a ocorrência de raiz supranumerária unilateral é maior do que bilateral. Esta alteração radicular é causada pelo distúrbio na bainha epitelial de Hertwig e pode estar associada à presença de cúspide supranumerária, tanto na dentição decídua como na permanente (Niemieć, 2010). Os dentes com raízes supranumerárias têm relevância clínico-cirúrgica nos tratamentos periodontais, endodônticos e na exodontia, o que torna o exame radiográfico indispensável para orientar a terapêutica (Wigg e Lobprise, 1997). Normalmente, os dentes com esta alteração apresentam uma raiz palatina quando o terceiro pré-molar é acometido (Lacerda et al., 2000; DuPont e DeBowes, 2009; Niemieć, 2010). O objetivo deste trabalho é descrever a técnica cirúrgica para exodontia do terceiro pré-molar com raiz palatina supranumerária em um canino Dachshund que apresentava abscesso periapical neste dente.

RELATO DO CASO

Um canino dachshund, fêmea, com 12 anos de idade apresentava uma fístula infraorbitária no lado direito com fratura e exposição da polpa no dente carniceiro. Com o paciente sob anestesia geral inalatória foi realizada radiografia intra-oral para confirmar qual dente e raiz estava sendo acometida e orientar o tratamento. Na imagem radiográfica pode-se visibilizar a presença de abscesso periapical na raiz distal do quarto pré-molar, além de observar uma raiz supranumerária palatina no terceiro pré-molar, que também apresentava um halo radioluscente e reabsorção óssea vertical na raiz mesial. Após o achado radiográfico, constatou-se a presença de outra pequena coroa na face palatina. Para realizar a exodontia foi necessário confeccionar um retalho mucoperiosteal a partir de duas incisões, uma mesial e outra distal do terceiro pré-molar, seguido da sindesmotomia com elevador de periósteo. Com uma broca carbide tronco-cônica n. 701, em caneta de alta rotação sob irrigação, foi realizada a odontosseção, separando às três raízes existentes - a mesial, a distal e a palatina - em forma de "T", semelhante à técnica realizada no primeiro e segundo molares superiores. A próxima etapa realizada foi a luxação do ligamento periodontal com auxílio de alavanca apical e movimentos semi-circulares ao redor de toda a raiz,

seguida da avulsão com fórceps, em cada raiz isoladamente. Os alvéolos foram curetados e irrigados com clorexidina 0,12% e posteriormente suturou-se com fio poliglactina 910 e padrão isolado simples.

DISCUSSÃO

A presença de raiz supranumerária, apesar de ser considerada rara, no presente caso o dente acometido foi o mais incidente conforme a literatura. Entretanto, por ser um animal idoso, não se sabe se esta alteração só estava presente na dentição permanente, mas em contra partida a alteração era bilateral. O exame radiográfico foi importante no diagnóstico do abscesso periapical, além de permitir a visibilidade da raiz supranumerária que também estava com alteração periodontal. Apesar de não encontrar referências sobre técnica de extração nestes casos, o conhecimento anatômico, a radiografia intra-oral e os princípios de exodontia de dente multirradicular foram fundamentais para realizá-la.

CONCLUSÃO

A técnica de odontosseção aliada às manobras para exodontia de dente multirradiculares mostraram-se eficazes na extração do terceiro pré-molar superior com raiz supranumerária, contudo a presença da cúspide palatina auxiliou na sua execução.

REFERÊNCIAS

GIOSO, M.A. **Odontologia veterinária para o clínico de pequenos animais**. São Paulo: Manole, 2007, 145p.

LACERDA, M.S.; OLIVEIRA, S.T.; QUEIROZ D.N. Variações anatômicas na dentição de cães sem raça definida. **Ciência Rural**, v.30, n.4, p. 655-659, 2000.

NIEMIEC, B.A. **A color handbook – Small animal dental, oral e maxillofacial disease**. London: Manson Publishing, 2010, 273p.

WIGGS, R.B.; LOBPRISE H.B. **Veterinary dentistry – principles e practice**. Saint Louis: Lippincott, 1997, 748p.

DUPONT, G.A.; DEBOWES L.J. **Atlas of dental radiography in dogs and cats**. Philadelphia: Elsevier, 2009, 268p.

100. UTILIZAÇÃO DE OBTURADOR PARA CORREÇÃO DE FENDA PALATINA ADQUIRIDA EM UM FELINO: RELATO DE CASO

Luciano Jose Eigio Isaka¹; Mayron Tobias da Luz¹; Cristiane Garcia¹, Marilis Beckert Feijó Santos¹, Corinne Fernandes¹, Antonia Mario do Prado Binder²

1. Médico veterinário residente UHAC-Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
2. Docente do curso de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

RESUMO

A fenda palatina é a comunicação anormal entre a cavidade oral e nasal podendo ocorrer em diferentes regiões do palato, o que torna a severidade e os sinais clínicos variáveis. A fenda pode ocorrer de maneira hereditária ou adquirida. Os sinais clínicos são dificuldade para se alimentar, drenagem de alimento pelas narinas, espirros recorrentes e pneumonia por aspiração. Há uma grande quantidade de procedimentos cirúrgicos para correção das fendas, no entanto. O objetivo desse trabalho é descrever um RELATO DE CASO de fenda palatina adquirida em um felino da raça Siamesa, onde foi utilizado um obturador como forma de tratamento.

Palavras-chave: fenda palatina, obturador, cirurgia oral

USE OF SHUTTER FOR CORRECTION OF ACQUIRED CLEFT PALATE IN A FELINE: A CASE REPORT

ABSTRACT

The cleft palate is an abnormal communication between the oral and nasal cavities which might affect different regions of the palate, what make its severity and clinical signs variable. The main signs are difficulties with breast-feeding, rhinitis, recurrent sneezing and in severe cases of pneumonia by aspiration. There are a lot of surgical procedures to repair the cleft palate. The aim of this paper is to describe a case of acquired cleft palate in a feline, which was used an oral shutter as form of treatment.

KEYWORDS: cleft palate, shutter, oral surgery

REVISÃO DE LITERATURA:

A fenda palatina é a comunicação anormal entre a cavidade oral e nasal que pode envolver o palato mole, o palato duro (fenda primária), o osso incisivo e o lábio superior (fenda secundária) (HEDLUND, 2002). Os defeitos de palato ocorrem quando não há fusão entre os ossos palatinos, ou de maneira adquirida, como laceração por mordidas, acidentes com arma de fogo e fios de condução elétrica (BECK & STRIZEK, 1999). O método diagnóstico é através da inspeção visual direta da cavidade oral durante o exame físico (HEDLUND, 2002). As fendas secundárias devem ser corrigidas cirurgicamente pelo risco de pneumonia por aspiração (HARVEY & EMILY, 1993). Várias técnicas foram desenvolvidas, porém devido à alta taxa de insucesso, tratamentos conservativos têm sido desenvolvidos. Segundo Gioso (2007), obturadores podem ser utilizados para solução do problema, porém os mesmos devem ser trocados a cada seis meses.

MATERIAL E MÉTODOS

Felino da raça Siamês, macho, adulto, apresentando fenda palatina adquirida após ter mordido um fio de alta tensão. O paciente apresentava espirros crônicos, secreção de alimento e pus pelas narinas. Ao exame visual da cavidade oral foi observada a fenda envolvendo o palato duro e mole. Devido ao tamanho da fenda, não foi possível realizar cirurgia corretiva, optando então pela colocação de um obturador palatino confeccionado com acrílico termopolimerizável, para oclusão do defeito e revitalização da mucosa oral. O obturador foi fixo aos caninos do animal após a aplicação de ácido ortofosfórico e resina acrílica. Até o presente momento o animal está com o obturador e não apresenta sinais clínicos e nem complicações devido ao defeito palatino.

DISCUSSÃO

O paciente é um felino da raça siamesa que apresenta maior predisposição às anomalias hereditárias do palato (JONES et. al., 2000), porém no caso acima descrito a fenda foi de origem adquirida. Segundo HARVEY & EMILY (1993) os sinais mais comuns são rinite e drenagem de saliva e alimentos pelas narinas, como o apresentado pelo paciente. Nos casos de fenda palatina secundária o animal necessita obrigatoriamente de tratamento (HARVEY & EMILY, 1993). Como a fenda possuía dimensões que não possibilitavam a redução cirúrgica, foi optado pela

utilização de um obturador palatino para a oclusão do defeito como cita GIOSO (2007). Após seis meses do tratamento, a felino não apresentou mais os sinais clínicos acima descritos, mostrando a eficácia do tratamento.

CONCLUSÃO

Com esse trabalho podemos concluir que os obturadores palatinos podem ser uma boa opção no tratamento de fendas palatinas adquiridas em pacientes felinos.

REFERÊNCIAS

BECK, J. A., STRIZEK, A.A. **Fullthickness resection of the hard palate for treatment of osteossarcoma in a dog**. Australian Veterinary Journal, v. 77: p. 163-165, 1999.

GIOSO, M. A. **Odontologia Veterinária para Clínicos de Pequenos Animais**. São Paulo: FMVZ-USP. 2007. p. 119-125.

HARVEY, C. E., EMILY, P.P. **Oral surgery**. Small animal dentistry. St. Louis: Mosby. 1993, p. 312-377.

HEDLUND C. S. **Surgery of the oral cavity and oropharynx**. In: FOSSUM, T. W. (2002). Small Animal Surgery. 2. ed. St. Louis: Mosby, p. 274-307.

JONES T. C., HUNT R. D., KING N. W. **Sistema digestivo**. In: JONES, T. C., HUNT R. D., KING, N. W (2000). Patologia veterinária. 6. ed. São Paulo: Manole., p.1063-113

101. ACHADOS OCULARES HISTOPATOLÓGICOS EM UM COELHO INFECTADO POR *ENCEPHALITOZOON CUNICULI*

André Tavares Somma¹, Suelen Berger Baldotto¹, Leandro Lima¹, Letícia Olbertz¹,
Camila Luba¹, Fabiano Montiani-Ferreira¹

1 Hospital Veterinário *campus* Curitiba, UFPR. andresomma@gmail.com

RESUMO O *Encephalitozoon cuniculi* é um parasita intracelular obrigatório de muitos mamíferos. Nos lagomorfos causa doença crônica, com eventual manifestação ocular. No Brasil não há estudo sobre sua soroprevalência. Relata-se o caso de um coelho infectado pelo parasita supracitado com manifestação ocular de uveíte linfocítica-plasmocítica facioinduzida, catarata e consequente glaucoma, diagnosticados mediante histopatologia. Sugere-se incluir a doença na lista de diagnósticos diferenciais de coelhos apresentando catarata e uveíte no Brasil.

PALAVRAS-CHAVES coelho, olho, parasita.

OCULAR HISTOPATHOLOGY OF A RABBIT INFECTED BY *ENCEPHALITOZOON CUNICULI*

ABSTRACT *Encephalitozoon cuniculi* is an obligate intracellular parasite with a wide range of mammalian hosts. Rabbits infected by this parasite developed chronic disease that eventually manifests ocular signs. In Brazil there is no serological survey about this parasite yet. We describe a case of a rabbit infected by *E. cuniculi* that manifests ocular signs characterized by lens-induced lymphocytic-plasmocytic uveitis, cataracts and consequent glaucoma, diagnosed by histopathology. We suggest this disease should be included on the list of differential diagnoses of rabbits with cataracts and uveitis in Brazil.

KEYWORDS: rabbit, eye, parasite

INTRODUÇÃO

O *Encephalitozoon cuniculi* é um microsporídio, parasita intracelular obrigatório que nos lagomorfos causa doença crônica diagnosticada durante necropsias por meio de lesões específicas principalmente nos rins e no cérebro

(Maxie e Youssef, 2007). Nestes animais a doença é relatada como causa de catarata e uveíte facoinduzida (Wilcock, 2007).

RELATO DO CASO

Um coelho da Nova Zelândia de 4 anos de idade foi apresentado para avaliação oftálmica com ausência de reflexos pupilares, catarata e luxação da lente em ambos os olhos (Figura 1). A pressão intraocular do olho esquerdo (OS) era de 44 mmHg caracterizando glaucoma, já no olho direito (OD) era de 24mmHg, valor considerado normal, no entanto havia escavação do nervo óptico observada na microscopia óptica. Tal lesão é patognomônica do glaucoma. Os achados oftálmicos fizeram suspeitar de uma infecção por *Encephalitozoon cuniculi*. Foi realizada colheita de sangue para análise sorológica através de imunofluorescência direta, a qual resultou soropositividade para o microsporídio supracitado. Os olhos do animal foram removidos (enucleados) e encaminhados para análise histopatológica.

Figura 1 – Olho direito de um coelho da raça Nova Zelândia, apresentando crescente afácica (seta azul), evidenciando luxação anterior da lente secundária ao glaucoma.

No exame macroscópico, observou-se megalocórnea, adelgaçamento da túnica fibrosa, catarata, liquefação do corpo vítreo e escavação do nervo óptico (sinal patognomônico do glaucoma) em ambos os olhos.

A análise microscópica dos olhos evidenciou edema corneano (Figura 2A), rachaduras na membrana de Descemet (estrias de Haab) (Figura 2B), uveíte linfocítica-plasmocítica, vasos uveais congestos (Figura 2C), avanço do epitélio anterior da lente para a face posterior desta, formação de *bladder cells* na lente, infiltrado inflamatório subcapsular (Figura 2D), gliose, malácia e necrose do nervo óptico (Figura 2E). Na retina de OS foi possível observar nódulo de Dálen-Fuchs (agrupamento hemisférico de células fagocíticas epitelióides e, ocasionalmente, linfócitos, abaixo do epitélio pigmentar da retina) (Figura 2F). Atrofia de retina e macrófagos e eosinófilos livres no corpo vítreo foram vistos em ambos os olhos.

Com base nos achados clínicos e laboratoriais deu-se o diagnóstico de uveíte facoinduzida por encefalitozoonose em OS e OD, com consequente glaucoma.

Figura 2: A) Edema de córnea, caracterizado pela perda do arranjo trabeculado das fibras de colágeno (H.E., x2,5); B) Rachadura na membrana de Descemet (H.E., x10); C) Infiltrado inflamatório linfocítico-plasmocítico e congestão de vasos sanguíneos na íris (H.E., x2,5); D) Catarata cortical e subcapsular caracterizada pela formação de *bladder cells* e infiltrado inflamatório subcapsular (H.E., x2,5); E) Malácia e gliose no nervo óptico (H.E., x10); F) Nódulo de Dálen-Fuchs (H.E., x10).

DISCUSSÃO

O *Encephalitozoon cuniculi* é parasita capaz de infectar ampla gama de mamíferos, como os seres humanos. Trata-se de uma zoonose com soroprevalência ainda não definida no Brasil, cujos diagnósticos diferenciais são a toxoplasmose e a neosporose (Maxie e Youssef, 2007). Em alguns casos manifesta-se nos olhos causando catarata e uveíte facoinduzida. Porém, poucas vezes o microsporídio pode ser visto em cortes histológicos de olhos com lesões (Giordano *et al.*, 2005; Dubielzig *et al.*, 2010), como ocorreu neste caso. Sugere-se a pesquisa deste parasita no soro sanguíneo de coelhos apresentando catarata, diagnosticada clínica ou histopatologicamente.

REFERÊNCIAS

DUBIELZIG, R.R.; KETRING, K.L.; McLELLAN G.J.; *et al.* **Veterinary ocular pathology: a comparative review**. Philadelphia:Saunders Elsevier, 2010.p.335-336.
GIORDANO, C.; WIGT, A.; VERCELLI, A. *et al.* Immunohistochemical identification of *Encephalitozoon cuniculi* in phacoclastic uveitis in four rabbits. **Veterinary Ophthalmology** (2005) 8, 4, 271-275.

MAXIE, M.G.; YOUSSEF, S. Nervous system. WILCOCK. B.P. Eye and ear. **Jubb, Kennedy, and Palmer's pathology of domestic animals**. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2007. p. 432-435, 503.

102. AVALIAÇÃO DE IMPLANTE MUCO-CONJUNTIVAL DE QUITOSANA E OFLOXACINO PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES OCULARES EXTERNAS

Gustavo de Oliveira Fulgêncio¹, Fernando Antônio Bretas Viana¹, Juçara Ribeiro Franca², Ricardo Martins Duarte Byrro², André Augusto Gomes Faraco², Armando da Silva Cunha-Júnior²

¹ Departamento de Oftalmologia, Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – fulgenciobr@yahoo.com.br

² Departamento de Fármacos e Medicamentos, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO

No presente estudo comparamos a eficácia e segurança de implantes muco-conjuntivais de quitosana e ofloxacino desenvolvidos com a apresentação comercial de ofloxacino a 0,3% em coelhos. Além disso, investigamos o potencial de inibição bacteriana em meio de cultura e tempo máximo de liberação *in vivo*.

Palavras-chave: Implantes, quitosana, ofloxacino, infecções oculares

DEVELOPMENT OF MUCOCONJUNCTIVAL CHITOSAN FILMS WITH OFLOXACIN FOR TREATMENT OCULAR EXTERNAL INFECTIONS

ABSTRACT

The present study compared the efficacy and safety of chitosan coated ofloxacin mucoadhesive films developed with 0.3% ofloxacin commercial ophthalmic solution in rabbit model. In addition, it investigates inhibition of bacterial grows, and maximum release time of these implants *in vivo*.

KEYWORDS: Delivery device, chitosan, ofloxacin, ocular infections

INTRODUÇÃO

Ofloxacino (OF) é uma fluoroquinolona de segunda geração frequentemente utilizado em infecções oculares externas. Geralmente é prescrito uma gota a cada 2 hs por no mínimo 7 dias (Regnier, 2007). Mecanismos oculares protetores como ato de piscar, lacrimejamento constante e drenagem lacrimal importantes para a

acuidade visual contribuem para remoção dos fármacos na superfície ocular (Urtti, 2006). Quitosana é um biopolímero biodegradabilidade e não tóxico obtido da quitina, polissacarídeo abundante de crustáceos, comumente utilizado nos implantes oculares (Felt et al., 1999). O objetivo deste trabalho é comparar a eficácia e segurança de implantes muco-conjuntivais de quitosana e OF desenvolvidos com a apresentação comercial de OF a 0,3% em coelhos. Além disso, investigar o potencial de inibição bacteriana em meio de cultura e tempo máximo de liberação *in vivo*.

MATERIAL E MÉTODOS

Implantes foram produzidos através da técnica de solvatação e evaporação. A caracterização baseou-se na calorimetria exploratória diferencial, teste de infra-vermelho e teste de liberação *in vitro*. O implante, disco estéril embebido em Oflox[®], disco controle e implante sem fármaco foram colocados em 12 meios de cultura com *Staphylococcus aureus* (n=6) e *Pseudomonas aeruginosa* (n=6). Dezoito coelhos albinos foram utilizados e divididos em dois grupos; no primeiro foi instilado 50 µl de OF (Oflox[®]) no olho direito (OD) em seis animais às 6hs 14hs e 22hs por 7 dias e no segundo foi administrado o implante no OD. Amostras de lágrimas foram coletadas às 6:30, 8, 10 e 13hs diariamente no grupo 1 e 0,5, 2, 5, 10, 16, 24, 48, 72, 96, 120, 144 e 168hs após administração do implante no grupo 2 e, posteriormente, analisadas em Sistema cromatógrafo líquido de alta eficiência. Exame oftalmológico incluindo biomicroscópio com lâmpada de fenda foi realizado diariamente em todos os animais. Após 7 dias, os coelhos foram eutanasiados e OD removidos para estudos histopatológicos.

RESULTADOS

A caracterização confirmou a presença e estabilidade do OF no implante sendo liberado em 1h *in vitro* e 120hs *in vivo*. Observou-se, em ambos os meios, maior halo de inibição bacteriana no implante em comparação ao disco estéril com Oflox[®], disco controle e quitosana sem o fármaco (Fig. 1). A concentração máxima do OF no grupo 1 foi $121,09 \pm 10,84$ (C_{max} µg/mL) às 0,5h e mínima de $12,04 \pm 1,78$ (C_{min} µg/mL) às 7hs com AUC_(0.5-7h) = 191µg/mL. No grupo 2 foi máxima em $1095,54 \pm 121,59$ (C_{max} µg/mL) às 0,5h reduzindo para o mínimo de $12,78 \pm 1,39$ (C_{min} µg/mL) às 120hs com AUC_(0.5-120h) = 13250µg/mL. Identificou-se OF em 10 e 7 amostras coletadas às 144hs e 168hs, respectivamente, entretanto não foi possível

quantificá-lo. Não houve diferença estatísticas na concentração do OF coletado às 2hs no grupo 1 e as 72hs no grupo 2 ($P=0.454$) e às 7hs no grupo 1 comparado com 120hs no grupo 2 ($P=0.833$). Após a administração *in vivo* o implante formou um gel no saco conjuntival (Fig. 2). Discreta hiperemia conjuntival foi observada em 2 coelhos com resolução espontânea após 24hs. Nenhuma alteração histológica foi identificada nas estruturas em contato direto com o implante (Fig. 3).

<p>Figura 1. Notar maior halo de inibição do implante (seta) no meio de cultura.</p>	<p>Figura 2. Implante em forma de gel no saco conjuntival de coelho (estrela).</p>	<p>Figura 3. Epitélio da conjuntiva bulbar íntegro (estrela). HE 10X</p>

DISCUSSÃO

A caracterização e teste de liberação *in vitro* confirmam que o OF está disperso na matriz polimérica e não foi inativado durante o desenvolvimento farmacotécnico. Idêntica metodologia de produção foi descrito recentemente com sucesso carregando dexametasona pelo mesmo grupo de pesquisa (Rodrigues et al., 2009). O aumento de uma camada neste implante desenvolvido desperta expectativa para maior tempo de liberação *in vivo* possibilitando tratamento prolongado de infecções oculares.

CONCLUSÃO: Implantes oculares representam alternativa segura, eficiente e inovadora à terapêutica convencional com futuro promissor na prevenção e tratamento de infecções oculares externas.

Referências:

- REGNIER, A. Clinical pharmacology and therapeutics. Part 1: drug delivery. In: GELATT, K.N. **Veterinary ophthalmology**. 4.ed. Victoria: Blackwell publishing, 2007, Cap. 7, p. 271-287.
- FELT, O., FURRER, P., MAYER, J.M., et al. Topical use of chitosan in ophthalmology: tolerance assessment and evaluation of precorneal retention. **International Journal of Pharmaceutics**, v. 180, p. 185-193, 1999.

URTTI, A. Challenges and obstacles of ocular pharmacokinetics and drug delivery. **Advanced Drug Delivery Reviews**, v. 58, p. 1131-1135, 2006.

RODRIGUES, L.B., LEITE, H.F., YOSHIDA, M.I., et al. In vitro release and characterization of chitosan films as dexamethasone carrier. **International Journal of Pharmaceutics**, v. 23, p. 1-6, 2009.

103. CIRCULAÇÃO RETINIANA EM COELHOS TRATADOS COM CITRATO DE SILDENAFIL

Andréia Vitor Couto do Amaral¹, Germana Alegro Silva², Roberta Renzo², Ana Paula Araújo Costa¹, José Luiz Laus²

¹Universidade Federal de Goiás – andreiavcvet@hotmail.com

²Universidade Estadual Paulista (FCAV/UNESP)

RESUMO

Considerando-se a ação vasodilatadora do citrato de sildenafil, foram estudados seus efeitos sobre a circulação retiniana em 27 coelhos machos adultos, albinos, homozigotos, da raça Nova Zelândia Branca, distribuídos aleatoriamente em três grupos de seis animais para tratamento com citrato de sildenafil na dose de 3,5mg/kg a cada 24 horas, por 7, 15 dias e 30 dias e em nove animais para controle. Foi realizada angiografia fluoresceínica antes e ao final dos tratamentos. Observou-se que as fases arterial, artério-venosa e venosa iniciaram-se mais rapidamente nos animais, após 7 e 15 dias de tratamento, indicando maior perfusão na circulação retiniana, quando comparados aos valores basais.

PALAVRAS-CHAVES Angiografia fluoresceínica, inibidor da PDE-5, vasodilatação.

RETINAL CIRCULATION IN RABBITS TREATED WITH SILDENAFIL CITRATE

ABSTRACT

Considering the vasodilating action of sildenafil citrate, were studied their effects on retinal circulation in 27 adult male rabbits, albino homozygotes, the New Zealand White, randomly assigned to three groups of six animals treated with sildenafil citrate in dose of 3.5 mg / kg every 24 hours for 7, 15 days and 30 days and nine control animals. Fluorescein angiography was performed before and immediately after the treatments. It was observed that the arterial phase, venous and arterial-venous initiated more rapidly in animals after 7 and 15 days of treatment, indicating increased perfusion in the retinal circulation, compared to baseline.

KEYWORDS: Fluorescein angiography, PDE-5 inhibitor, vasodilation.

INTRODUÇÃO

São reconhecidas as ações dos inibidores da fosfodiesterase do tipo 5, usados na medicina para o tratamento da disfunção erétil. Seu principal

representante, o sildenafil, atualmente é também utilizado para o tratamento da hipertensão pulmonar devido seu efeito vasodilatador no local. Adjunto, seus efeitos potenciais sobre a retina, o coração e a pressão arterial têm sido alvo de investigações (KURAHASHI et al. 2002, FORESTA et al., 2008). Evidências científicas mostram que o citrato de sildenafil aumenta a circulação sanguínea retiniana e especula-se que o evento decorra do aumento do fluxo, por vasodilatação, à semelhança do que se passa no âmbito do corpo cavernoso (KOKSAL et al., 2005). O objetivo desse estudo foi descrever a atividade vasodilatadora promovida pelo citrato de sildenafil na retina de coelhos hígidos utilizando-se de angiografia fluoresceínica.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 27 coelhos machos adultos, albinos, homozigotos, da raça Nova Zelândia Branca, distribuídos aleatoriamente em 3 grupos de 6 animais para tratamento com citrato de sildenafil na dose de 3,5mg/kg a cada 24 horas, por 7, 15 dias e 30 dias e em nove animais para controle. O exame angiográfico da retina foi realizado antes e após os tratamentos, com os animais anestesiados empregando-se a associação de 8 mg/kg de midazolam e 50 mg/kg de cetamina, pela via intramuscular. As pupilas foram dilatadas utilizando-se colírio de tropicamida a 1% e a veia marginal da orelha foi canulada para aplicação de 10 mg/kg de fluoresceína sódica a 10% em bolus. Uma seqüência de imagens foi formada para o angiograma das fases arterial, arterio-venosa e venosa, a partir da injeção do contraste, utilizando-se retinógrafo (TRC 50-DX, TopCon) com programa Angioimage.

RESULTADOS

O início da fase arterial, da artério-venosa e da venosa deu-se, respectivamente, em $5,00 \pm 0,44$, $10,33 \pm 1,56$ e $14,33 \pm 1,40$ segundos. A fase arterial, nos animais tratados por 7 dias, foi de $4,00 \pm 0,51$ segundos, nos tratados por 15 dias, foi de $3,83 \pm 0,54$ segundos, observando-se diminuição do tempo com relação ao basal, entretanto, não se evidenciou diferença significativa. O tempo para o início da fase arterial nos tratados por 30 dias foi de $5,33 \pm 0,21$, sendo semelhante aos valores basais. O tempo médio de aparecimento da fase artério-venosa nos animais tratados por 7 dias foi de $8,00 \pm 1,15$ segundos, nos tratados por 15 dias, foi de $6,16 \pm 0,70$ segundos e nos tratados por 30 dias foi de $9,16 \pm 1,68$ segundos. A fase

venosa dos animais tratados com sildenafil por 7 e 15 dias iniciou-se mais rapidamente quando comparada ao basal, contudo, sem significância estatística. Nos animais tratados por 7 dias foi de $10,33 \pm 1,43$ segundos, nos tratados por 15 dias foi de $9,33 \pm 1,282$ segundos e nos tratados por 30 dias foi de $12,33 \pm 1,38$ segundos.

DISCUSSÃO

No presente estudo, o aumento da velocidade do fluxo sanguíneo na retina foi observado com a diminuição do tempo para início das fases arterial, artério-venosa e venosa, após o tratamento com citrato de sildenafil por 7 e 15 dias. Esse aumento pôde ser atribuído à dilatação dos vasos arteriais retinianos, justificado pela maior disponibilidade de GMPc, segundo mensageiro para ação do óxido nítrico, dada a inibição da PDE-5 propiciada pelo sildenafil (SCHWARZ, 2007). De forma semelhante, KOKSAL et al. (2005) descobriram que o citrato de sildenafil provoca um significativo aumento do fluxo sanguíneo da artéria oftálmica, provavelmente como consequência inibição da PDE5 em células musculares lisas. A identificação de uma maior perfusão de sangue na retina propiciará importantes subsídios clínicos, sobretudo para pacientes portadores de quadros hipertensivos com vasoconstrição compensatória das arteríolas retinianas.

CONCLUSÃO

Pôde-se concluir que o citrato de sildenafil promoveu maior perfusão do fluxo sanguíneo na retina de coelhos hígidos, sem apresentar, contudo, significância estatística.

Comitê de Ética: o trabalho foi aprovado na Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UNESP) sob protocolo n.º 005/2010.

Referências:

FORESTA, C.; CARETTI A, N.; ZUCCARELLO, D.; POLETTI, A.; BIAGIOLI, A.; CARETTI, L.; GALAN, A. Expression of the PDE5 enzyme on human retinal tissue: new aspects of PDE5 inhibitors ocular side effects. **Eye**, v. 22, p. 144–149, 2008.

KOKSAL, M.; OZDEMIR, H.; KARGI, S.; YESILLI, C.; TOMAC, S.; MAHMUTYAZICIOGLU, K. Effects of sildenafil on ocular blood flow. **Acta Ophthalmologica Scandinavica**, v.3, p.355–359, 2005.

KURAHASHI, A.; NASCIMENTO, M.; MARCONDES, A. M.; FILHO, N. M.; BARACAT, J.; COSTA, V. P. Estudo da circulação retrobulbar e do campo visual após dose única de citrato de sildenafil (Viagra®). **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia**, v. 1, 2002.

SCHWARZ, E. R.; KAPUR, V.; RODRIGUEZ, J.; RASTOGI, S.; ROSANIO, S. The effects of chronic phosphodiesterase-5 inhibitor use on different organ systems. **International Journal of Impotence Research**, v. 12, p. 381–391, 2007.

104. DISPLASIA DE RETINA BILATERAL EM CÃO - RELATO DE CASO

Rodrigo Barros¹, Gabriela Rodrigues Sampaio², Luís Guilherme de Faria², Fernando Yoiti Kitamura Kawamoto², Filipe Curti², Katia Gibson²

¹Universidade Federal de Lavras/DMV – guigo@veterinario.med.br

²Universidade Federal de Lavras/DMV

RESUMO

Displasia de retina é uma diferenciação anormal da retina, de caráter não progressivo. Pode ser hereditária ou de etiologia adquirida. Os sinais clínicos proporcionam três classificações distintas. Não há tratamento para a displasia de retina, e é recomendado que o animal acometido não seja utilizado como reprodutor. Relata-se o caso de um cão com displasia de retina bilateral, o qual apresentava baixa acuidade visual.

Palavras-chave: displasia, retina, cão

BILATERAL RETINAL DYSPLASIA IN DOG - CASE REPORT

ABSTRACT

Retinal dysplasia is a differentiation of an abnormal retina, of non-progressive character. It can be hereditary or acquired etiology. The clinical signs provide three different classifications. There is no treatment for retinal dysplasia, and there is recommended that the affected animal don't be used like breeder. We report a case of a dog with bilateral retinal dysplasia, which presented low visual acuity.

KEYWORDS: dysplasia, retina, dog

INTRODUÇÃO:

A displasia de retina é definida por uma diferenciação anormal da retina, de caráter não progressivo, e pode estar associada com alguma desordem sistêmica, ou ser uma desordem primária (Narfstrom e Petersen-Jones, 2007). Compromete múltiplas camadas da retina e, em alguns casos mais graves, pode haver comprometimento inclusive do vítreo (Slatter, 2005). Pode ser um defeito único ou concomitante com outras alterações, tais como microftalmia (Holle et al., 1999). Suas etiologias podem ser: infecções virais, deficiência de vitamina A, certos medicamentos, irradiação por raio-X, trauma intrauterino e, principalmente, caráter

hereditário (Smith, 2007). A visão pode ou não estar diminuída, dependendo das alterações concomitantes, além da gravidade da displasia (Slatter, 2005). Os sinais clínicos constituem três diferentes classificações: 1- Displasia de retina focal ou multifocal; 2- Displasia de retina geográfica; 3- Displasia de retina completa com descolamento da retina. Geralmente a primeira forma (multifocal) não compromete a visão, enquanto que a forma geográfica pode gerar certo déficit visual, e a displasia de retina completa com descolamento pode ocasionar cegueira (Narfstrom e Petersen-Jones, 2007). A displasia de retina não causa dor ou desconforto ocular (Smith, 2007).

As raças mais predispostas são English Springer Spaniel, Labrador Retriever, Cocker Spaniel, entre outras. Não há tratamento para a displasia de retina, e é recomendado que o animal acometido não seja utilizado como reprodutor (Slatter, 2005).

RELATO DE CASO

Atendeu-se no Hospital Veterinário um cão com dois anos de idade, raça Maltês, com fotofobia, epífora e déficit de acuidade visual. Ao exame físico o animal não apresentava alterações dignas de nota, e seus exames laboratoriais se apresentaram normais (hemograma completo, plaquetas, perfil hepático, perfil renal). Ao exame oftalmológico externo observou-se ulceração corneana superficial bilateral. À oftalmoscopia direta bilateral visualizou-se refletividade tapetal reduzida na região dorsal da retina, acima do disco óptico, observando-se apenas os vasos dorsais da retina. Instituiu-se tratamento para ulceração corneana e, quanto ao exame direto de fundo de olho, concluiu-se tratar de displasia de retina bilateral. Por ser uma alteração sem tratamento, solicitaram-se retornos periódicos para reavaliações dos bulbos oculares e seus anexos, devido a possibilidade de futuras complicações, como glaucoma, catarata e hemorragia de vítreo. Orientou-se a proprietária em relação a situação oftalmológica de seu animal, para que o mesmo fosse retirado da reprodução e recebesse cuidados especiais devido à sua baixa acuidade visual.

DISCUSSÃO

A displasia de retina é uma afecção de desafio diagnóstico para o médico veterinário (Narfstrom e Petersen-Jones, 2007). Por se tratar de uma alteração que geralmente acomete o animal nas suas primeiras semanas de vida, em plena fase

de desenvolvimento, o exame oftalmológico é complicado de ser realizado totalmente e a única constatação do proprietário é a baixa acuidade visual do animal (Haider et al., 2001; Smith 2007).

Para concluir o diagnóstico de displasia de retina, é ainda necessário algum instrumento oftalmológico, tal como oftalmoscópio (direto ou indireto), além da experiência oftalmológica para classificar a afecção e examinar as demais estruturas em busca de outras possíveis alterações (Vainisi e Wolfer, 2004).

CONCLUSÃO

Por se tratar de uma afecção sem tratamento, seu diagnóstico acaba sendo frustrante para o médico veterinário e o proprietário, principalmente nos casos com comprometimento visual e outras desordens concomitantes. Apesar disso, seu diagnóstico é de extrema importância, para que o animal acometido não seja utilizado na reprodução e receba reavaliações oftalmológicas periódicas.

Referências:

SMITH, P. J. Vítreo e Retina. In: SLATTER, D. **Manual de Cirurgia de Pequenos Animais**. 3 ed., Barueri, SP: Manole, 2007, v. 2, cap. 94, p. 1418-1429.

HAIDER, N. B.; NAGGERT, J. K.; NISHINA, P. M. Excess cone cell proliferation due to lack of functional NR2E3 causes retinal dysplasia and degeneration in rd7/rd7 mice. **Human molecular Genetics**, v. 10, n. 16, p. 1619-1626, 2001.

HOLLE, D. M.; STANKOVICS, M. E.; SARNA, C. S. et al. The geographic form of retinal dysplasia in dogs is not always a congenital abnormality. **Veterinary Ophthalmology**, v. 2, n. 1, p. 61-66, 1999.

NARFSTROM, K.; PETERSEN-JONES, S. Diseases of the canine ocular fundus. In: GELATT, K. N. **Veterinary Ophthalmology**. 4.ed. Ames, Iowa: Blackwell, 2007, v.2, cap.21, p.944-1025.

SLATTER, D. Retina. In:_____. **Fundamentos de oftalmologia veterinária**, 3 ed., São Paulo: Roca, 2005, cap. 16, p. 451-488.

VAINISI, S. J.; WOLFER, J. C. Canine retinal surgery. **Veterinary Ophthalmology**, v. 7. n. 5, p. 291-306, 2004.

105. DUPLO SEPULTAMENTO DE GLÂNDULA DA TERCEIRA PÁLPEBRA: MODIFICAÇÃO DA TÉCNICA DE MORGAN E MOORE EM 10 CÃES

Rodrigo Barros¹, Gabriela Rodrigues Sampaio², Fernando Yoiti Kitamura
Kawamoto², Filipe Curti², Luís Guilherme de Faria², Katia Gibson²

¹Universidade Federal de Lavras/DMV – guigo@veterinario.med.br

²Universidade Federal de Lavras/DMV

RESUMO

A glândula da terceira pálpebra possui importante papel na produção da porção aquosa do filme lacrimal. Sua protrusão é uma afecção comum e o tratamento definitivo é cirúrgico. Relata-se uma modificação da técnica de Morgan e Moore para sepultamento dessa glândula em 10 cães. O sepultamento foi realizado de forma dupla, com dois planos de sutura em padrão Cushing, com fio de polidioxanona 6-0.

PALAVRAS-CHAVE: glândula da terceira pálpebra, protrusão, sepultamento, cães

DOUBLE BURIAL OF THE THIRD EYELID GLAND: USE OF MODIFIED TECHNIQUE OF MORGAN AND MOORE: IN 10 DOGS

ABSTRACT

The third eyelid gland has an important role in the production of the aqueous portion of the tear film. Your protrusion is a common disorder and the definitive treatment is surgical. We report a modification of Morgan and Moore technique to burial this gland in ten dogs. The burial was realized of double way, with two suture lines in Cushing standard, with polydioxanone 6-0 wire.

Keywords: Third eyelid gland, protrusion, burial, dogs

INTRODUÇÃO

A terceira pálpebra situa-se entre córnea e pálpebra inferior. É composta por cartilagem, glândula, cobertura conjuntival e folículos linfóides (Walde et al., 1998a). A glândula da 3ª pálpebra situa-se sepultada na conjuntiva, e tem importante papel na produção da porção aquosa do filme lacrimal (Cabral et al., 2008). O retináculo mantém a glândula na posição anatômica correta (Walde et al., 1998a). A protrusão não é totalmente elucidada, mas parece ser por um enfraquecimento do retináculo (Delgado, 2005). Tem caráter congênito e provavelmente hereditário (Herrera,

2008). Remoção cirúrgica da glândula prolapsada pode causar ceratoconjuntivite seca (Walde et al., 1998b). Tratamento definitivo é cirúrgico e os principais métodos de reposicionamento são o ancoramento e a criação de um “bolso conjuntival”, com sepultamento da glândula prolapsada (Swanson e Hermann, 2005).

MATERIAL E MÉTODOS

Neste trabalho foram incluídos 10 cães, que apresentaram protrusão da glândula da 3ª pálpebra entre 2007 e 2011. Entre eles, 70% eram da raça Beagle, 20% da raça Shar Pei e 10% da raça Lhasa Apso. Do total, 80% eram fêmeas. Todos os casos eram unilaterais; porém, após um mês, dois animais apresentaram protrusão da glândula contralateral. Todos os animais passaram por avaliação clínica e oftalmológica completa, além de realização dos exames pré-operatórios, apresentando como única alteração a protrusão da glândula da 3ª pálpebra.

Modificou-se a técnica de Morgan e Moore para sepultamento de glândula da 3ª pálpebra. Realizou-se técnica cirúrgica idêntica em todos os animais, sempre pelo mesmo profissional. A técnica original foi alterada nos seus planos de sutura e no fio utilizado. O sepultamento foi realizado de forma dupla, com dois planos de sutura sobrepostos em padrão Cushing, com fio de polidioxanona 6-0. A alteração executada na técnica cirúrgica mostrou-se plenamente satisfatória, com normalização da produção lacrimal, conforto ocular e excelente aparência estética.

DISCUSSÃO

A protrusão da glândula da 3ª pálpebra é uma afecção comum em cães, mas rara em gatos (Schoofs, 1999). Neste trabalho não houve prolapso dessa glândula em gatos durante o período de estudo. Os animais deste estudo eram das raças Beagle, Lhasa Apso e Shar Pei, consideradas predispostas por Stades et al. (1999).

A técnica proposta primeiramente por Morgan e Moore, onde se cria um “bolso conjuntival” para sepultar a glândula com padrão simples contínuo e fio de poliglactina 910, é mais indicada para animais jovens e glândulas recém-prolapsadas (Hedlund, 2008). A técnica empregada no presente estudo ofereceu resultados plenamente satisfatórios, com baixo índice de recidiva e sem risco de atrito do fio à córnea, uma vez que utiliza dois planos de sutura em padrão Cushing, com fio de polidioxanona, considerado um dos melhores fios absorvíveis sintéticos.

CONCLUSÃO

A 3ª pálpebra e sua glândula devem ser preservadas sempre que possível (Walde et al., 1998a). Alguns animais deste estudo foram avaliados por apenas 2 meses pós-cirúrgico, devido à recente realização das cirurgias, e há casos de acompanhamento por até 4 anos. A modificação executada na técnica cirúrgica mostrou-se plenamente satisfatória, pois dos 10 animais operados apenas um apresentou recidiva, devido à ausência de cuidados pós-operatórios por parte dos proprietários, mas um segundo procedimento cirúrgico solucionou o problema.

REFERÊNCIAS

- CABRAL, V. P.; WATANABE, E.; TOSTES, R.A. et al. Protrusão da glândula da Terceira pálpebra em cães. Proposta de um modelo experimental. **Ciência rural de Santa Maria**, v. 38, n. 7, 2008. Disponível em <<http://dx.doi.org/10.1590/s0103-84782008000700018>> acesso em 05/01/2012.
- DELGADO, E. Surgical replacement of the third eyelid gland in dogs using the conjunctival mucosa pocket procedure – 23 clinical cases. **Revista Portuguesa de ciências Veterinárias**, v. 100, n. 553-554, p. 89-94, 2005.
- HEDLUND, C. S. Cirurgia do olho. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3 ed., Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2008, cap. 16, p. 260-285.
- HERRERA, D. Enfermidades palpebrais. In: _____. **Oftalmologia clínica em pequenos animais de companhia**, 1 ed., São Paulo, SP: Medvet, 2008, cap. 6, p. 87-110.
- SCHOOF, S. H. Prolapse of the gland of the third eyelid in a cat: A case report and literature review. **Journal Of the American Animal Hospital Association**, v. 35, n.3, p. 240-242, 1999.
- STADES, F. C.; BOEVÉ, M. H.; NEUMANN, W. et al. Predisposições de raças e doenças oculares hereditárias. In: _____. **Fundamentos de oftalmologia veterinária**, 1 ed., São Paulo, SP: Manole, 1999, cap. 15, p. 191-196.
- SWANSON, J. F.; HERMANN, M. K. Alterações e terapias da membrana nictitante. In: RIIS, R. C. **Segredos oftalmológicos de pequenos animais**, 1 ed, Porto Alegre, RS: Artmed, 2005, cap. 12, p. 91-98.
- WALDE, I.; SCHAFFER, E. H.; KOSTLIN, R. I. G. Considerações anatômicas e fisiológicas. In: _____. **Atlas de clínica oftalmológica do cão e do gato**, 2 ed., São Paulo, SP: Manole, 1998a, cap. 1, p. 3-16.
- WALDE, I.; SCHAFFER, E. H.; KOSTLIN, R. I. G. Afecções da conjuntiva. In: _____. **Atlas de clínica oftalmológica do cão e do gato**, 2 ed., São Paulo, SP: Manole, 1998b, cap. 5, p. 81-92.

106. EPITELIOMA E ADENOMA CONCOMITANTES DAS GLÂNDULAS SEBÁCEAS TARSAIS EM UMA CADELA

Letícia Olbertz¹, Karen Medina Teixeira¹, Suelen Berger Baldotto¹, Christiane Montenegro Coimbra Moura¹, Rafaelle Cristine Dea¹, Fabiano Montiani-Ferreira¹
1 Laboratório de Oftalmologia Comparada, HV/UFPR. leticia.olbertz@gmail.com

RESUMO

As neoplasias palpebrais em cães geralmente apresentam caráter benigno. O epiteloma tarsal é a neoplasia palpebral mais diagnosticada em cães no Brasil, sendo que o adenoma tarsal não é tão comumente diagnosticado. Relata-se um caso de epiteloma tarsal encimado de adenoma tarsal em uma cadela de sete anos de idade, da raça Dogue Alemão, diagnosticado por meio da histopatologia e com remissão completa após exérese cirúrgica.

PALAVRAS-CHAVES cão, pálpebra, neoplasia

PALPEBRAL SEBACEOUS GLAND EPITHELIOMA OVER SEBACEOUS GLAND ADENOMA IN A BITCH

ABSTRACT

Eyelid neoplasms in dogs are generally benign. Sebaceous epithelioma is the most commonly neoplasm diagnosed on eyelids in dogs from Brazil, whereas tarsal adenomas are no as common. We report here a sebaceous epithelioma growing over a sebaceous adenoma in a Great Dane bitch, with 7 years of age.

KEYWORDS: dog, eyelid, neoplasm

INTRODUÇÃO

Neoplasias palpebrais em cães geralmente são de caráter benigno. Comumente causam exposição e irritação ocular pelo mau-fechamento das pálpebras, o que faz com que a exérese cirúrgica seja recomendada na maioria das vezes (Montiani-Ferreira *et al.*, 2009). Dentre as neoplasias palpebrais mais comuns nos cães estão o epiteloma tarsal e o melanocitoma. O adenoma tarsal também pode ser algumas vezes diagnosticado no Brasil (Dea *et al.*, 2011). Relata-se um caso de adenoma tarsal encimado de epiteloma tarsal em um cão.

RELATO DO CASO

Uma cadela da raça Dogue Alemão, de sete anos de idade, foi apresentada para avaliação oftálmica com nódulo na pálpebra superior de olho esquerdo, próximo ao canto temporal, medindo 7 x 6 x 5 mm, o qual causava irritação ocular e lacrimejamento. Ao exame oftálmico o olho afetado apresentou quemose, hiperemia conjuntival e teste lacrimal de Shirmer de 14mm/min.

O nódulo foi excisado cirurgicamente e encaminhado para análise histopatológica. Na microscopia óptica o estroma superficial e médio da pálpebra apresentou proliferação neoplásica nodular de células basais bem diferenciadas, com aparência histológica de glândula sebácea, sem produção de pigmento melânico (adenoma tarsal). Partindo desta proliferação, observou-se outra proliferação de células basais, pouco menos diferenciadas, formando um nódulo exofítico pedunculado expansivo e bem delimitado, porém com poucos focos de diferenciação sebácea e escamosa e bastante produção de pigmento melânico (epitelioma tarsal) (Figura D). Não se evidenciaram sinais de malignidade em qualquer uma das proliferações descritas. Com base nos achados deu-se o diagnóstico de epitelioma encimado de adenoma de glândulas sebáceas tarsais.

Figura – A) Aspecto macroscópico do nódulo. Os asteriscos pretos delineam o nódulo de adenoma sebáceo tarsal, enquanto que os asteriscos brancos delineam o nódulo de epitelioma sebáceo tarsal. Note a aparência clássica com produção de pigmento melânico apenas na porção do epitelioma tarsal; B) Aspecto microscó-

-pico do nódulo. Os asteriscos pretos delineam o adenoma sebáceo tarsal, enquanto que os asteriscos cinza-escuros delineam o epitelioma sebáceo tarsal; C) Detalhe magnificado da região do adenoma sebáceo tarsal. Note a proliferação de células basais com diferenciação sebácea, sem produção de pigmento melânico (H.E., x20); D) Detalhe magnificado da região do epitelioma sebáceo tarsal. Note a proliferação de células basais com pouca diferenciação sebácea e escamosa e abundante produção de pigmento melânico (H.E., x20).

DISCUSSÃO

O adenoma e o epiteloma de glândulas sebáceas tarsais são neoplasias com mesma origem celular, porém com diferenciações pouco distintas, mas, essencialmente benignas. O epiteloma tarsal é a neoplasia palpebral mais diagnosticada em cães no Brasil (Dea *et al.*, 2011) enquanto nos Estados Unidos alguns autores citam o adenoma tarsal como a neoplasia mais diagnosticada e outros autores citam a mesma frequência para ambas as neoplasias (Dubielzig, 2002). De acordo com poucos levantamentos epidemiológicos existentes, o adenoma tarsal é pouco frequente na pálpebra de cães no Brasil, ocupando posição semelhante à do histiocitoma e à do papiloma (Dea *et al.*, 2011).

Embora alguns autores citem que neoplasias de glândulas sebáceas tarsais ocorram igualmente em pálpebras superiores e inferiores, um estudo recente (Dea *et al.*, 2011) sugere maior frequência nas pálpebras superiores, provavelmente pelo fato destas possuírem mais glândulas sebáceas do que as inferiores. No caso apresentado a pálpebra acometida foi a superior. Não há predileção sexual, tanquanto predileção por lado da face acometido em cães (Dea *et al.*, 2011).

Ambas as neoplasias ocorrem principalmente em cães idosos (idade média de 9 anos) e sua excisão cirúrgica costuma ser curativa (Dubielzig, 2002; Dea *et al.*, 2011). A idade da cadela acometida neste estudo (7 anos) é próxima da descrita como mais incidente e o acompanhamento do animal seis meses pós-excisão cirúrgica não demonstrou recorrência da neoplasia. No Brasil, os cães da raça Poodle e da raça Cocker Spaniel Inglês são relatados como as raças mais acometidas por ambas as neoplasias (Montiani-Ferreira *et al.*, 2009; Dea *et al.*, 2011). O cão (Dogue Alemão) relatado neste estudo não se enquadra no perfil de raça predisposta.

A ocorrência concomitante de adenoma tarsal e epiteloma tarsal na pálpebra de cão não havia sido relatada até então.

REFERÊNCIAS

- MONTIANI-FERREIRA, F.; WOUK, A.F.P.F.; LIMA, A.S. *et al.* Neoplasias oculares. In: **Oncologia em cães e gatos**. São Paulo: Roca, 2009.
- DEA, R.C.; MONTIANI-FERREIRA, F.; OLBERTZ, L.; WERNER, J.; LIMA, L. Estudo retrospectivo de 87 epitelomas e adenomas tarsais em cães. In: **Livro de RESUMOs do 19º EVINCI**. Curitiba: Virtual Publicidade, 2011. p. 499.
- DUBIELZIG, R.R. Tumors of the eye. In: MEUTEN, D.J. **Tumors in domestic animals**. Iowa: Blackwell Publishing Company, 2002. p. 739-740.

107. IMPLANTE MUCO-CONJUNTIVAL DE QUITOSANA E MALEATO DE TIMOLOL PARA TRATAMENTO DE GLAUCOMA

Gustavo de Oliveira Fulgêncio¹, Fernando Antônio Bretas Viana¹, André Augusto Gomes Faraco², Armando da Silva Cunha-Júnior²

¹ Departamento de Oftalmologia, Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – fulgenciobr@yahoo.com.br

² Departamento de Fármacos e Medicamentos, Faculdade de Farmácia, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

RESUMO

No presente estudo comparamos a eficácia e segurança de implantes muco-conjuntivais de quitosana e maleato de timolol desenvolvidos com apresentação comercial de maleato de timolol a 0,5% em coelhos normotensos.

Palavras-chave: Implantes, quitosana, maleato de timolol, glaucoma

MUCOCONJUNTIVAL CHITOSAN COATED TIMOLOL MALEATE FILM FOR TREATMENT OF GLAUCOMA

ABSTRACT

The present study compared the efficacy and safety of chitosan coated timolol maleate mucoadhesive films developed with a 0.5% timolol maleate commercial ophthalmic solution in normotensive rabbits.

KEYWORDS: Delivery device, chitosan, timolol maleate, glaucoma

INTRODUÇÃO

Maleato de timolol (MT) é frequentemente utilizado para reduzir a pressão intra-ocular (PIO) em pacientes com glaucoma. Várias administrações diárias são necessárias por longo prazo para eficácia clínica (Kiel e Patel, 1998). Além da dificuldade relacionada com elevada frequência, os mecanismos protetores como ato de piscar, lacrimejamento constante e drenagem lacrimal contribuem para remoção dos fármacos na superfície ocular (Urtti, 2006). Quitosana é um biopolímero obtido da quitina, polissacarídeo abundante de crustáceos, com

características importantes como biodegradabilidade e não toxicidade (Felt et al., 1999). O objetivo deste trabalho é comparar a eficácia e segurança de implantes muco-conjuntivais de quitosana e MT desenvolvidos com apresentação comercial de MT a 0,5% em coelhos normotensos.

MATERIAL E MÉTODOS

Implantes de quitosana e MT foram produzidos através da técnica de solvatação e evaporação. A caracterização baseou-se na calorimetria exploratória diferencial (DSC), teste de infra-vermelho (IV) e teste de liberação *in vitro*. Quinze coelhos albinos foram utilizados e com cinco animais em cada grupo; no primeiro foi instilado 50 µl de solução salina BID e no segundo administrado 50 µl de MT (Timoptol[®]) BID ambos no olho direito (OD) por 15 dias. O grupo 3 recebeu o implante no OD. Exame oftalmológico incluindo biomicroscópio com lâmpada de fenda foi realizado em todos os animais antes, durante e após o experimento. A PIO foi aferida com tonômetro de aplanção a cada 48hs por 12 semanas. Após este período, os coelhos foram eutanasiados e OD removidos para estudos histopatológicos.

RESULTADOS

DSC e teste de IV confirmaram a presença e estabilidade do MT no implante de quitosana (Fig. 1). No teste *in vitro*, 85% do MT foi liberado em duas semanas totalizando em 28 dias. Não houve diferença estatística na intensidade da redução da PIO entre os grupos que receberam Timoptol[®] e implante ($P < 0,05$). No grupo 3, houve redução da PIO durante 10 semanas. Nenhum sinal clínico associado a incômodo e/ou dor ocular foi observado ao exame oftalmológico (Fig. 2). Através da histologia, nenhuma alteração foi identificada nas estruturas em contato direto com o implante como a mucosa conjuntival bulbar e palpebral (Fig. 3).

<p>Figura 1. Implante antes e após hidratação (direita) em solução salina.</p>	<p>Figura 2. Olho de coelho calmo com implante no saco conjuntival (seta).</p>	<p>Figura 3. Epitélio da conjuntiva bulbar íntegro (estrela). HE 10X</p>

DISCUSSÃO

A caracterização e teste de liberação *em vivo* sugerem que o MT está completamente disperso na matriz polimérica e mantém as características farmacodinâmicas, respectivamente (Fulgêncio et al., 2009). Idêntica metodologia de produção foi descrita recentemente com sucesso carreando dexametasona pelo mesmo grupo de pesquisa (Rodrigues et al., 2009). Estudo *in vivo* é fundamental para avaliar a eficácia e segurança dos implantes e deve ser realizado sempre após caracterização e teste de liberação *in vitro*. O aumento de uma camada neste implante desenvolvido desperta expectativa para maior tempo de liberação *in vivo* possibilitando tratamento prolongado, seguro e eficaz em pacientes com glaucoma.

CONCLUSÃO

Implantes oculares representam alternativa segura, eficiente e inovadora à terapêutica convencional com futuro promissor no tratamento de glaucoma.

REFERÊNCIAS

- KIEL, J.W.; PATEL, P. Effects of timolol and betaxolol on choroidal blood in the rabbit. **Experimental Eye Research**, v. 67, p. 501-507, 1998.
- URTTI, A. Challenges and obstacles of ocular pharmacokinetics and drug delivery. **Advanced Drug Delivery Reviews**, v. 58, p. 1131-1135, 2006.
- FELT, O., FURRER, P., MAYER, J.M. et al. Topical use of chitosan in ophthalmology: tolerance assessment and evaluation of precorneal retention. **International Journal of Pharmaceutics**, v. 180, p. 185-193, 1999.

FULGENCIO, G.O., REZENDE, D.L., LARA, D.L. et al Chitosan films for prolonged delivery of timolol maleate. In: 34TH WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION, 2009, São Paulo. **Proceedings...** São Paulo: Associação Brasileira de Clínicos de Pequenos Animais, 2009. p.188.

RODRIGUES, L.B., LEITE, H.F., YOSHIDA, M.I. et al. In vitro release and characterization of chitosan films as dexamethasone carrier. **International Journal of Pharmaceutics**, v. 23, p. 1-6, 2009.

108. MELANOMA COROIDAL EM CÃO - RELATO DE CASO

Eduardo Coelho Mendes Neto¹; Janete Maria Volpato Marques¹; Tatiane Francieli Sebastiani¹; Carolina Barbalho Hungria¹; Letícia Puntel¹; Ana Clara de Lima Fiori¹.

¹ Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná - *campus* Palotina

RESUMO

O melanoma em cães é uma patologia maligna pouco relatada na literatura brasileira e bem divulgada na literatura internacional. As neoplasias melanocíticas coroidais são raras em cães. Este relato descreve o caso de um cão, sem raça definida, macho, com quatro anos de idade, que apresentou buftalmia progressiva há dois meses, uveíte, intenso prurido e secreção purulenta no olho direito. No exame físico constatou-se presença de uma massa de coloração enegrecida, localizada ventralmente ao globo ocular. Optou-se pela exenteração devido às severas alterações envolvendo todo o globo ocular. No exame histopatológico, foi confirmado melanoma coroidal.

PALAVRAS-CHAVE: melanoma, coróide, cão

CHOROIDAL MELANOMAS IN DOG - CASE REPORT

ABSTRACT

Melanoma in dogs is a malignant disease rarely reported in Brazilian literature and very-publicized in the international literature. Choroidal melanocytic neoplasms are rare in dogs. This report describes the case of a dog, mixed breed, male, four years, which showed buftalmia progressive, uveitis, intense itching and pus in the right eye. On physical examination was found a mass of blackish color, located ventral to the eyeball. We opted for exenteration due to severe changes involving the right eye. In the histopathological, choroidal melanoma was confirmed.

KEYWORDS: melanoma, choroid, dog

INTRODUÇÃO:

O melanoma em cães é uma patologia maligna pouco relatada na literatura brasileira e bem divulgada na literatura internacional, apesar da grande variedade de raças puras e mestiças pigmentadas. É uma neoplasia, invasiva e metastática,

apresentando um curso rápido do diagnóstico ao óbito (Cavalcante, 2006). Segundo Willemse (1998, apud Ferreira, et al., 2008), as neoplasias melanocíticas coroidais são aproximadamente 80% de todas as neoplasias melanocíticas oculares em seres humanos, mas são raras em cães. As neoplasias da coróide se apresentam em sua maioria em cães mais velhos (Ferreira, et al., 2008; Willemse, 1998; Slatter, 2005).

Estão predispostos os Doberman pinschers, Airedale terries, Chow chows e Poodles (Willemse, 1998). Os sinais clínicos geralmente resultam em glaucoma, uveíte (Kleiner, et al., 2003) ou endoftalmite, a córnea está quase sempre opaca, apresenta hifema (Ranzani, 2007), e alteração de coloração ou massa visível na íris (Slatter, 2005). O tratamento requer enucleação ou exenteração do globo ocular, dependendo da localização do tumor no mesmo (Millichamp, Dziezyc, 2008; Willemse, 1998; Cavalcante, 2006; Slatter, 2005). O tempo de sobrevida dos cães com melanoma maligno é de 12 meses (Willemse, 1998). O objetivo deste trabalho é relatar o caso de melanoma coroidal em um cão.

RELATO DE CASO

Um cão, sem raça definida (SRD), macho, com quatro anos de idade, de pelagem caramelo, apresentou há dois meses buftalmia progressiva, uveíte, intenso prurido e secreção purulenta no olho direito. No exame físico constatou-se presença de uma massa de coloração enegrecida, localizada cranioventralmente ao globo ocular, logo não foi possível realizar a avaliação de fundo de olho. Optou-se pela exenteração devido às severas alterações envolvendo o globo ocular. Macroscopicamente foi observada uma massa de aproximadamente dois cm de diâmetro, de consistência firme e coloração enegrecida. Na histopatologia foi observada uma proliferação de células neoplásicas não encapsuladas, se originando da camada coróide próxima ao nervo óptico, as quais invadiam a esclera e formavam uma grande massa de células neoplásicas aderidas externamente a mesma. Sendo histologicamente confirmado melanoma coroidal.

DISCUSSÃO

Segundo Willemse (1998), os melanomas ocorrem em animais mais velhos e as neoplasias da coróide se apresentam na sua maioria em cães a partir de oito anos de idade, diferente deste relato, em que o animal apresentou melanoma de coróide

com quatro anos de idade. Em cães, 90% dos melanomas que envolvem as regiões mucocutâneas são malignos (Willemse, 1998). Podem crescer apartir da íris, do corpo ciliar ou, menos comumente, da coróide (Slatter, 2005), no caso relatado se originou da camada coróide próxima ao nervo óptico. O animal citado apresentava uma grande massa de células neoplásicas aderidas externamente a esclera ocular, e segundo Slatter (2005), os melanomas oculares apresentam um prognóstico razoável se o olho for enucleado antes de infiltrado na esclera, porém já se passaram quatro meses desde a exenteração e o animal não demonstrou sinais de metástase.

CONCLUSÃO:

O melanoma coroidal em cão é uma neoplasia pouco relatada na literatura nacional. As alterações como buftalmia progressiva, intenso prurido, secreção ocular purulenta e uveíte, encontradas no exame oftálmico podem ser os únicos sinais clínicos visíveis, onde o clínico deve sempre considerar a possibilidade de uma neoplasia intra-ocular. A exenteração do globo ocular é a forma de tratamento mais indicada.

REFERENCIAS

- CAVALCANTE, J. A.. **Avaliação da incidência do melanoma em um estudo retrospectivo de 37 cães (*Canis familiaris*) com neoplasias, atendidos na clínica escola de medicina veterinária da universidade castelo branco e na clínica veterinária ossian.** Rio de janeiro. 2006. Dissertação de mestrado - Curso de Pós-graduação "lato sensu" em clínica cirúrgica em pequenos animais. Universidade Castelo Branco.
- FERREIRA, F. M., et al.. Neoplasias oculares. In: DALECK, C. R., NARDI, A. B., RODASKI, S.. **Oncologia em cães e gatos.** São Paulo. Editora Roca. 2008. p. 303-304.
- MILLICHAMP, N. J., DZIEZYC, J.. Doenças de retina, coróide e nervo óptico. In: BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. S.. **Manual Saunders de clínica de pequenos animais.** 3º edição. São Paulo. Editora Roca. 2008. p. 1415.
- RANZANI, J. J. T., CREMONINI, D. N., FABRIS, V. E. et al. **Melanoma intra-ocular em cão.** Acta Scientiae Veterinariae. 35(Supl 2): s631-s632, 2007.
- SLATTER, D.. **Fundamentos de oftalmologia veterinária.** 3º edição. São Paulo. Editora Roca. 2005. p. 358-359.
- WILLEMSE, T.. Doenças neoplásicas/Melanoma. In: _____. **Dermatologia clínica de cães e gatos.** 2º edição. Editora Manole LTDA. São Paulo – SP. 1998. p. 115.

109. ADENOCARCINOMA APÓCRINO MISTO NASAL CANINO: RELATO DE CASO

Sílvia Manduca Trapp¹, Kleber Moreno², Bernardo Kemper¹.

¹Universidade Norte do Paraná - UNOPAR – smanducatrapp@gmail.com

².Universidade Estadual de Londrina - UEL

RESUMO

Tumores nasais em cães são raros, geralmente malignos e localmente invasivos. Em parte, a terapêutica cirúrgica não é de escolha em decorrência do diagnóstico tardio, da extensão da doença e da propensão desses tumores em atingir ossos inacessíveis, sendo a radioterapia o tratamento de eleição. Objetiva-se relatar a retirada cirúrgica do tumor adenocarcinoma apócrino misto nasal em cão como opção terapêutica.

PALAVRAS-CHAVES tumor nasal, adenocarcinoma, cão

NASAL MIXED APOCRINE ADENOCARCINOMA IN DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

Nasal tumors in dogs are rare, usually malignant and locally invasive. In part, the surgical treatment is not choice due to late diagnosis, extent of disease and the propensity of tumors to reach inaccessible bones, radiotherapy is the treatment of choice. The objective is to report the surgical removal of apocrine mixed tumor nasal adenocarcinoma in a dog as a treatment option.

KEYWORDS: nasal tumor, adenocarcinoma, dog.

INTRODUÇÃO

Neoplasias da cavidade nasal são raras em cães sendo a incidência entre 0,3 e 2,4% dos tumores caninos (Hedlund, 2007). Esses tumores, a maioria malignos, normalmente ocorrem em animais mais velhos. Localmente invasivos, os tumores malignos podem envolver uma ou ambas as narinas resultando no comprometimento do fluxo de ar em virtude da presença de secreção e obstrução nasal. Deformidades dos ossos da face e da cavidade oral, eventualmente, podem ser observadas (Hawkins, 2010). É baixa a ocorrência de metástases sendo que estas surgem tardiamente nos casos avançados de tumores nasais (Turek e Lana,

2007). A confirmação diagnóstica se dá por meio do exame histopatológico e a determinação da extensão da doença auxilia a escolha terapêutica. Visto que os tumores nasais raramente apresentam metástase, a terapia é direcionada ao controle localizado da doença (Maruo et al., 2011). Dentre as possibilidades terapêuticas tem-se radioterapia exclusiva ou associada à cirurgia e/ou quimioterapia. Em muitos casos, a dificuldade em retirar todo o tecido anormal inviabiliza a cirurgia como opção terapêutica. O uso associado de quimioterápicos e antiinflamatórios não é considerado efetivo (Maruo et al., 2011). Objetiva-se relatar a retirada cirúrgica do tumor adenocarcinoma apócrino misto nasal em cão como opção terapêutica.

RELATO DO CASO

Foi atendido um cão da raça Cocker spaniel inglês, fêmea, 18 Kg, 10 anos de idade com uma massa nasal ulcerada de aproximadamente 4cm envolvendo praticamente toda a área do espelho nasal, cuja evolução foi de seis meses. A inspeção e a palpação não foi identificado acometimento das tonsilas e/ou linfonodos regionais. O diagnóstico de adenocarcinoma apócrino misto foi obtido após realização de biópsia e exame histopatológico. Não foram identificadas alterações radiográficas no crânio que sugerissem maior extensão da doença. Com o paciente em decúbito esternal foi realizada incisão cutânea marginando a neoformação em dois cm, a qual incluiu a mucosa da região labial e do palato duro. Imediatamente, o tecido subcutâneo foi divulsionado com tesoura facilitando a identificação do tecido osso. Desta forma, foi possível a osteotomia da região maxilar rostral incluindo todo o plano nasal e os dentes incisivos. A hemostasia foi realizada com auxílio de pinças e ligaduras com fio de poligalactina 910 (3-0). Para a correção plástica do defeito criado, utilizou-se a técnica retalho de avanço labial bilateral suturando a pele a mucosa com pontos isolados simples. No período pós-operatório o animal foi medicado com cefalexina, carprofeno, cloridrato de tramadol e dipirona sódica. Além da recomendação de uso de colar elisabetano, limpeza dos pontos com solução de clorexidine 0,2% e dieta pastosa. Após 10 dias os pontos foram removidos sem sequelas ou presença de complicações. Passados três meses da cirurgia, não foram observados sinais clínicos compatíveis com a recidiva da neoplasia. O resultado estético e a melhora dos sinais clínicos foram considerados satisfatórios, inclusive ao proprietário.

DISCUSSÃO

A apresentação clínica inicial dos tumores nasais em cães é intermitente justificando o diagnóstico tardio. A natureza avançada do tumor quando do diagnóstico, a propensão desses tumores a invadir ossos que são inacessíveis ou incapazes de serem removidos e o tempo de sobrevivência médio semelhante ao dos pacientes não tratados tornam a cirurgia uma opção terapêutica não desejável (Hedlund, 2007; Turek e Lana, 2007). Entretanto, a cirurgia pode ser paliativa quanto aos sinais clínicos em alguns cães para proporcionar alívio de obstruções e epistaxes (Hedlund, 2007). No caso em questão relatado, a inacessibilidade a radioterapia, a ausência de alterações radiográficas sugestivas de comprometimento mais extenso da doença e a busca pela melhora dos sinais clínicos influenciaram a adoção da cirurgia como opção terapêutica.

CONCLUSÃO

A remoção cirúrgica, mesmo que paliativa, do adenocarcinoma nasal em cães proporciona alívio e melhora dos sinais clínicos, sendo uma alternativa terapêutica para pacientes que não tem acesso a radioterapia.

REFERÊNCIAS

- HAWKINS, E. C. Distúrbios do sistema respiratório – tumores nasais. In: NELSON, R.W.; COUTO, C.G. **Medicina interna de pequenos animais**. 4 ed. Rio de Janeiro: Mosby Elsevier. 2010, p.230-232.
- HEDLUND, C.S. Surgery of the upper respiratory system. In: FOSSUM, T.W. **Small animal surgery**. 3 ed. St. Louis: Mosby Elsevier. 2007, p. 857-864.
- MARUO, T. et al. Retrospective study of canine nasal tumor treated with hypofractionated radiotherapy. **J. Vet. Med. Sci.** v.73, n.2, p.193-197, 2011.
- TUREK, M. M.; LANA, S. E. Canine nasosinal tumors. In: WITHROW, S. J.; VAIL, D. M. **Small animal clinical oncology**. 4 ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2007. p. 525-539.

110. CARCINOMA INTESTINAL DIFUSO EM CÃO COM ENTERITE CRÔNICA - RELATO DE CASO

Sabrina m. Rodigheri¹, Leticia s. Castanho¹, Eros I. Sousa¹, Tatiana Giordano¹,
Karine Lodi², Cinthia P. Pedroso²

¹ Serviço de Clínica e Cirurgia do Hospital Veterinário Batel – Ctba/PR

² Acadêmico de Medicina Veterinária da Faculdade Evangélica do Paraná

RESUMO

O presente relato descreve o caso de um cão com histórico de diarreia crônica há dois anos que apresentou diagnóstico histopatológico de carcinoma intestinal difuso e metastático após laparotomia exploratória. Sugere-se que a enterite crônica seja componente importante da etiologia da neoplasia. A quimioterapia antineoplásica promoveu remissão completa dos sinais clínicos e tem proporcionado maior tempo de vida ao paciente com qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVES oncologia, neoplasia intestinal, quimioterapia antineoplásica

DIFUSE INTESTINAL CARCINOMA IN DOG WITH CRONIC ENTERITIS – CASE REPORT

ABSTRACT

This report describes the case of a dog with a history of chronic diarrhea for two years presented histological diagnosis of diffuse and metastatic intestinal carcinoma after exploratory laparotomy. It is suggested that chronic enteritis is an important component of the etiology of this cancer. The antineoplastic chemotherapy promoted complete remission of clinical signs and has provided the longest-living patient quality of life.

KEY WORDS: oncology, intestinal neoplasia, antineoplastic chemotherapy

INTRODUÇÃO

As neoplasias intestinais são incomuns em cães, representando menos de 10% de todos os tumores. O trato gastrointestinal pode ser acometido por neoplasias de origem epitelial, mesenquimal, de células redondas ou tumores neuroendócrinos, entretanto o linfoma e o carcinoma são as neoplasias de maior prevalência (Selting, 2007).

Os carcinomas intestinais podem ser classificados histologicamente em adenocarcinoma, carcinoma mucinoso e carcinoma sólido ou indiferenciado. Frequentemente possuem prognóstico reservado a longo prazo em decorrência do estágio avançado no momento do diagnóstico (North e Banks, 2009)

O objetivo deste trabalho é relatar os aspectos clínicos, métodos de diagnóstico e tratamento de um carcinoma intestinal indiferenciado difuso em cão portador de enterite crônica.

RELATO DE CASO

Um paciente da espécie canina, Yorkshire, macho, de 9 anos de idade, foi atendido com histórico de fezes pastosas alternando com fezes líquidas, com evolução de 2 anos. Ao exame clínico o paciente apresentava sensibilidade à palpação abdominal e presença de gases em alças intestinais. Foram realizados como exames complementares coproparasitológico, hemograma, bioquímica sérica

hepática e renal e ecografia abdominal exploratória, onde constatou-se hipoalbuminemia e infestação por cistos *Giardia sp.* Na ecografia foi observado espessamento de duodeno com paredes irregulares e líquido livre abdominal.

Iniciou-se tratamento clínico para giardíase e dieta hiperprotéica. Frente a piora clínica do paciente optou-se por laparotomia exploratória, onde foi observado aderências a vesícula biliar e hiperplasia de parede intestinal em toda a extensão do intestino delgado. Foi realizado colicistectomia e biopsia de duodeno, jejuno e íleo.

O exame histopatológico conferiu o diagnóstico de carcinoma intestinal difuso indiferenciado associado a presença de êmbolos neoplásicos no interior de vasos linfáticos dilatados e enterite crônica. Não foram detectadas alterações metastáticas em radiografia de tórax.

Em virtude do comprometimento difuso do intestino delgado e da disseminação metastática da neoplasia identificada no exame histopatológico, foi instituído protocolo de quimioterapia antineoplásica com carboplatina (250mg/m² – IV) e doxorrubicina (25mg/m² – IV), alternadas a cada 21 dias. Após o início do tratamento, o paciente apresentou remissão completa dos sinais clínicos e até o presente momento está com quatro meses de sobrevida com qualidade de vida.

DISCUSSÃO

Com exceção da influência retroviral no desenvolvimento do linfoma intestinal em felinos, não existem agentes etiológicos definidos para o desenvolvimento das neoplasias intestinais em animais de companhia. Processos inflamatórios crônicos podem levar a mutações gênicas que resultam em transformação neoplásica, o que pode justificar a ocorrência do carcinoma intestinal no caso relatado como consequência da enterite crônica (Selting, 2007).

A maioria dos carcinomas intestinais caninos localiza-se no cólon e no reto, entretanto o paciente referido apresentou carcinoma difuso em intestino delgado. Os sítios de predileção das metastases dos tumores intestinais incluem linfonodos mesentéricos, fígado, baço, rins, ossos, peritônio, pulmão e pele (North e Banks, 2009).

A modalidade terapêutica de eleição para os carcinomas intestinais localizados é a ressecção cirúrgica do segmento comprometido. A quimioterapia antineoplásica é indicada como terapia adjuvante ou paliativa, entretanto a sua eficácia não foi comprovada. Protocolos utilizando 5-fluoruracil, doxorrubicina e agentes alquilantes podem ser utilizados. O tempo médio de sobrevida para pacientes com doença metastática no momento do diagnóstico é de três meses (Selting, 2007; North e Banks, 2009). Até o presente momento, o paciente referido está com quatro meses de sobrevida com qualidade de vida, o que sugere que o protocolo quimioterápico utilizado possa ser uma boa alternativa no tratamento dos carcinomas intestinais.

REFERÊNCIAS

- SELTING, K. A. Intestinal tumors. In: WITHROW, S. J.; VAIL, D. M. **Small Animal Clinical Oncology**, 4 ed. St. Louis: Saunders Elsevier, 2007, cap. 21, p. 491- 503.
- NORTH, S.; BANKS, T. Tumours of the gastrointestinal tract and associated structures. In: NORTH, S.; BANKS, T. **Introduction to small animal oncology**. Saunders Elsevier, 2009, cap. 15, p.128-143.

111. ELETROFORESE DE PROTEÍNAS SÉRICAS PELA TÉCNICA DE ACETATO DE CELULOSE EM FELINOS COM LINFOMA

Ana Luiza Nairismagi Alves¹, Valter de Medeiros Winkel¹, Sílvia Regina Ricci Lucas¹, Samantha Iye Miyashiro¹, Jéssica Soares Garcia¹.

¹Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo.

RESUMO

O linfoma é a neoplasia hematopoiética mais frequentemente diagnosticada em felinos. Por se tratar de uma neoplasia linfóide, podem ocorrer alterações na produção de proteínas tanto pelo fato da neoplasia desencadear uma resposta de fase aguda quanto pela alteração na concentração de gamaglobulinas. Foi objetivo deste estudo avaliar o perfil eletroforético, pela técnica de acetato de celulose, das proteínas séricas em 13 gatos com linfoma no momento do diagnóstico, comparando-o com o de 12 gatos saudáveis. Os valores encontrados nos animais saudáveis concordaram com os relatados na literatura e a análise estatística não evidenciou diferença significativa entre os grupos.

PALAVRAS-CHAVES eletroforetograma, gatos, neoplasias, proteínas.

SERUM PROTEINS ELECTROPHORESIS BY THE TECHNIQUE OF CELLULOSE ACETATE IN CATS WITH LYMPHOMA

ABSTRACT

Lymphoma is the most frequently diagnosed hematopoietic neoplasm in cats. Since this is a lymphoid neoplasia, changes may occur in the production of proteins either for the fact of cancer triggering an acute phase response or changing concentration of immunoglobulins. The aim of this study was to evaluate the serum protein electrophoretic profile by the technique of cellulose acetate in 13 cats with lymphoma at diagnosis, comparing it with 12 healthy cats. The values found in healthy animals agreed with those reported in the literature and statistical analysis showed no significant difference between groups.

KEYWORDS: electrophorethogram, feline, neoplasia, protein.

INTRODUÇÃO

O linfoma é a neoplasia hematopoiética mais diagnosticada em felinos, podendo ser classificada de acordo com sua localização anatômica, imunofenótipo e morfologia celular¹. Por se tratar de uma neoplasia linfóide, podem ocorrer

alterações na produção de proteínas tanto pelo fato da neoplasia desencadear uma resposta de fase aguda quanto pela alteração na concentração de imunoglobulinas. A eletroforese é uma técnica de separação de proteínas séricas pela aplicação de um campo elétrico, na qual as macromoléculas migram em diferentes velocidades dependendo de suas características físico-químicas². Foi objetivo deste estudo a avaliação do perfil eletroforético das proteínas séricas em gatos com linfoma em comparação a gatos saudáveis.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram incluídos no estudo 13 felinos com linfoma (8 machos e 5 fêmeas), com idade média de $8,7 \pm 3,2$ anos, sendo nove animais com a forma alimentar, dois com a forma multicêntrica, um mediastinal e outro renal, atendidos no Serviço de Clínica Médica do Hospital Veterinário da FMVZ-USP, no período de agosto de 2010 a setembro de 2011, sem quaisquer tratamentos prévios. O grupo controle foi constituído por 12 felinos saudáveis, machos ou fêmeas com idade média $3,1 \pm 1,2$ anos. As amostras de soro sanguíneo foram coletadas no momento do diagnóstico, previamente à instituição de terapia, aliqüotadas e estocadas a -70°C . A concentração de proteína total foi determinada em analisador automático Daytona RX da Randox[®] e a eletroforese, em fitas de acetato de celulose analisadas com o software Vision Works[®]. Foram calculadas as concentrações absolutas das frações e a relação entre albumina e globulina para cada animal. Para comparar os grupos estudados utilizou-se o teste de Mann-Whitney.

RESULTADOS

Os valores das medianas das concentrações das proteínas séricas são apresentados na tabela abaixo:

Tabela 1: Valores das medianas das concentrações de proteínas séricas pela técnica de acetato de celulose, em gatos saudáveis e gatos com linfoma, em g/dL. São Paulo, 2011.

	PT	Alb	GT	Alfa1	Alfa2	Beta1	Beta2	Gama	A:G
Linfoma	70,62	23,63	37,61	4,16	6,55	4,35	5,65	19,32	0,59
Controle	71,82	26,13	39,57	4,51	4,75	3,62	5,41	19,70	0,65

Leg.: PT = proteína total, Alb = albumina, GT= globulinas totais, A:G = relação albumina:globulinas

Não foram encontradas diferenças significativas para as medianas entre os grupos controle e com linfoma em relação às concentrações de proteína total ($p=0,8066$), albumina ($p=0,1086$), alfa1-globulina ($p=0,3695$), alfa2-globulina

($p=0,1086$), beta1-globulina ($p= 0,5679$), beta2-globulina ($p= 0,9350$), gamaglobulina ($p= 0,7237$), relação albumina:globulina ($p= 0,2012$) e na concentração das globulinas totais ($p= 0,6438$).

DISCUSSÃO

Não houve variação das proteínas em relação aos intervalos de normalidade descritos na literatura, tanto nos gatos sadios quanto naqueles com linfoma. Há poucos estudos sobre o perfil eletroforético de proteínas séricas em felinos com linfoma, não sendo os dados bem definidos para essa espécie, havendo um relato de diminuição nas concentrações de albumina e aumento na fração de betaglobulinas³. Em geral, os estudos são centrados na ocorrência de hiperproteinemia visto ser esse um fator complicador na evolução da doença. Na eletroforese, picos monoclonais poderiam ocorrer nos linfomas de células B ou em infecções secundárias associadas⁴. As limitações deste estudo estão relacionadas a um número pequeno de casos e a ausência de imunofenotipagem, entretanto, ainda assim é possível inferir que alterações nas frações protéicas não parecem ser freqüentes em gatos com linfoma.

CONCLUSÃO

Considerando as condições de realização deste estudo, não houve diferença no perfil eletroforético de proteínas séricas e nas concentrações das diversas frações em gatos com linfoma em relação a animais sadios.

REFERÊNCIAS

- ¹ VAIL, D. M. Feline lymphoma and leukemia. In: WITROW, S.J; VAIL, D.M. (Edit.) **Withrow & MacEwen's Small Animal Clinical Oncology**. Elsevier, 2007. Cap. 31, seção B.
- ² CÉRON, J.J; CALDIN, M.; MARTINEZ-SUBIELA, S. Electrophoresis and Acute Phase Protein Measurement. In: Weiss, J.D.; Wardrop, K.J.(Edit.) **Schalm's Veterinary Hematology Sixth Edition**. Willey-Blackwell, Iowa, 2010. Cap.145.
- ³ GEROU-FERRIANI, M.; MCBREARTY, A. R.; BURCHMORE, R. J.; et al. **Agarose gel serum protein electrophoresis in cats with and without lymphoma and preliminary results of tandem mass fingerprinting analysis.**

Veterinary Clinical Pathology, v. 40, p. 159–173, 2011. DOI: 10.1111/j.1939-165X.2011.00310.x

⁴ TAYLOR, S.S.; TAPPIN, S.W.; DODKIN, S.J.; et al. **Serum protein electrophoresis in 155 cats.** Journal of Feline Medicine and Surgery, v. 12, p. 643-653, 2010. DOI: 10.1016/j.jfms.2010.03.018.

112. EPIDEMIOLOGIA E APRESENTAÇÃO CLÍNICA DAS NEOPLASIAS MAMÁRIAS CANINAS

Felipe P. M. Kodo¹, Leandro Dallagrana¹, Sabrina M. Rodigheri², Taíse Fuchs²,
Rebeca Bacchi², Patricia E. Mosko²

¹Acadêmico do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Evangélica do Paraná

²Docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Evangélica do Paraná

RESUMO

As neoplasias mamárias representam os tumores de maior prevalência em cadelas, sendo responsáveis por elevados índices de mortalidade. Acometem preferencialmente fêmeas de idade média a avançada, que não foram submetidas a ovariectomia precoce. Em maior expressão são observados tumores malignos, múltiplos, localizados de forma difusa na cadeia mamária. O pulmão e o baço são os órgãos mais acometidos por metástases distantes.

PALAVRAS-CHAVES oncologia, tumores da glândula mamária, cães

EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL PRESENTATION OF CANINE MAMMARY NEOPLASMS

ABSTRACT

The mammary neoplasms represent the most prevalent tumors in bitches, being responsible for high mortality rates. They primarily affect middle to advanced aged dogs, which have not submitted to early ovariohysterectomy. A high expression is observed of malignant and multiple tumors, localized diffusely in the mammary chain. The lung and spleen are the organs most affected by distant metastases.

KEYWORDS: oncology, mammary gland tumors, dogs

INTRODUÇÃO

Atualmente as neoplasias são consideradas a principal causa de óbito em cães. Tumores mamários representam 52% de todas as neoplasias em fêmeas da espécie canina. Tipos histológicos múltiplos podem acometer as diferentes glândulas mamárias, entretanto, o adenocarcinoma representa o tipo histológico predominante.

Metástases para linfonodos regionais, pulmão, baço, fígado e encéfalo frequentemente acompanham a evolução desta neoplasia (Lana et al., 2007)

Os principais objetivos deste estudo foram determinar os aspectos epidemiológicos e a apresentação clínica de tumores mamários em fêmeas da espécie canina visando a prevenção e o diagnóstico precoce destas neoplasias.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados os prontuários de fêmeas da espécie canina diagnosticadas com neoplasia mamária (n=67), no período de julho de 2010 a novembro de 2011. Informações quanto a idade, raça, terapia contraceptiva, tempo de evolução da neoplasia, localização do tumor, ulceração cutânea, presença de metástases detectáveis clinicamente e classificação histopatológica foram avaliadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média de idade dos cães com neoplasia mamária avaliados neste estudo foi de 9 anos, corroborando com Henry (2010), que refere que a maior incidência dos tumores de mama é observada em fêmeas de 9 a 11 anos. Em relação a predisposição racial, houve maior prevalência de neoplasias mamárias em cadelas sem raça definida (36%), Poodle (27%), Labrador (7%) e Rottweiler (6%). Segundo Lana *et al* (2007), as raças mais predispostas a neoplasias mamárias são Poodle, Dachshund e Cocker Spaniel. Cães sem raça definida representam a população de maior prevalência nos atendimentos clínicos e cirúrgicos na referida unidade hospitalar, o que pode justificar os resultados observados neste estudo.

Das 67 fêmeas avaliadas, 64 (96%) eram inteiras e destas, 10 (16%) foram submetidas a terapia contraceptiva. De acordo com Lana *et al* (2007), neoplasias mamárias são hormônio dependentes e a sua incidência pode ser reduzida a 0,05% quando a castração é realizada antes do primeiro ciclo estral.

O tempo de evolução dos tumores foi de 30 a 90 dias em 11 casos (16%); 91 a 180 dias em 20 casos (30%); 181 a 360 dias em 17 casos (26%) e acima de 361 dias em 13 pacientes (19%), revelando diagnóstico tardio na maioria dos pacientes. O diagnóstico e o tratamento precoces são imprescindíveis para a obtenção de cura das neoplasias mamárias (Lana *et al.*, 2007).

Em relação a apresentação clínica dos tumores, constatou-se que apenas quatro pacientes (6%) possuíam nódulos únicos, enquanto 63 (94%) possuíam

nódulos múltiplos. Em 33 animais (49%), os tumores apresentavam localização unilateral e em 34 (51%) bilateral. 61% dos tumores localizavam-se tanto nas mamas torácicas quanto nas abdominais e inguinais e 4% acompanhavam ulceração cutânea, o que indica prognóstico desfavorável (Lana *et al.*, 2007).

Observou-se malignidade tumoral em 80% dos casos, diferindo dos dados descritos por Lana *et al.* (2007), que referem que 41 a 53% dos tumores mamários em cadelas são malignos. Henry (2010) refere que animais de médio e grande porte tem maior propensão a desenvolver tumores malignos, o que pode ser observado no presente estudo, uma vez que 46 animais (69%) eram de médio e grande porte. Dentre as neoplasias malignas houve prevalência de adenocarcinomas, seguidos por carcinossarcomas, sarcomas e mastocitomas. Os tumores benignos foram diagnosticados como adenoma, fibroadenoma, mixoma e lipoma. Dos 54 pacientes com neoplasia mamária maligna, 13 (25%) apresentaram alterações sugestivas de metástases distantes em avaliação radiográfica do tórax e ultrassonográfica do abdômen. Sete pacientes (58%) revelaram sinais de comprometimento pulmonar, cinco (38%) de envolvimento esplênico e um (8%) de comprometimento hepático. Henry (2010) afirma que 50% dos tumores malignos levam à metástases distantes e conseqüentemente a um mau prognóstico.

CONCLUSÃO

A elevada incidência de neoplasias mamárias malignas em cadelas representa uma grande preocupação na rotina clínico-cirúrgica de pequenos animais. Desta forma, os médicos veterinários devem orientar os proprietários quanto ao diagnóstico precoce objetivando maximizar os índices de cura, bem como a castração antes do primeiro cio visando reduzir a incidência desta neoplasia.

REFERÊNCIAS

LANA, S.E.; RUTTEMAN, G.R.; WITHROW, S.J. Tumors of the Mammary Gland. In: WITHROW, S.J.; VAIL, D.M. **Small Animal Clinical Oncology**. 4 ed. St Louis: Elsevier, 2007. cap. 26, p 619-636.

HENRY, C.J. Tumors of the Abdominal Cavity: Mammary Tumors. In: HENRY, C.J.; HIGGINBOTHAM, M.L. **Cancer Management in Small Animal Practice**. Maryland Heights: Elsevier, 2010. cap. 22, p 275-282.

113. ESTUDO RETROSPECTIVO DAS NEOPLASIAS ORAIS DE PEQUENOS ANIMAIS ATENDIDOS NO DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

FILIPÉ CURTI¹, GABRIELA RODRIGUES SAMPAIO², FERNANDO YOITI KITAMURA KAWAMOTO¹, LUÍS GUILHERME DE FARIA¹, RODRIGO BARROS¹, JULIANA FONSECA MONTEIRO³

1. Médico Veterinário Residente em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais – Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras (MG);
2. MV, MSc, DSc, - Professor(a) Adjunto(a) – Departamento de Medicina Veterinária – Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras (MG);
3. Discente em Medicina Veterinária – Universidade Federal de Lavras - UFLA, Lavras (MG);

RESUMO

Os arquivos do setor de clínica cirúrgica foram analisados á procura de registros de ocorrências de tumores orais. A pesquisa compreendeu o período entre 2008 e 2011 e foram encontradas no total de 7 (sete) casos. Sendo que nenhum animal foi acometido por mais do que um tipo de neoplasia. As neoplasias orais mais prevalentes foram fibrossarcoma, carcinoma de células escamosas, ameloblastoma acantomatoso, epulis fibromatoso, papiloma e melanoma.

Palavras – Chave: Tumor, neoplasia, pequenos animais, cavidade oral

RETROSPECTIVE STUDY OF ORAL NEOPLASM OF SMALL ANIMALS SEEN IN DEPARTMENT OF VETERINARY MEDICINE, FEDERAL UNIVERSITY OF LAVRAS

ABSTRACT

The archives sector surgical clinic were analyzed looking for records of occurrences of oral tumors. The study comprised the period between 2008 and 2011 and found a total of 07 (seven) cases. Since no animals were affected by more than one type of cancer. The tumors were most prevalent oral fibrosarcoma, squamous cell carcinoma, ameloblastoma acanthomatous, fibromatous epulis, papilloma and melanoma.

Keywords: Tumor, neoplasia, small animals, oral cavity

INTRODUÇÃO

Os tumores de cavidade oral em cães representam o quarto lugar de ocorrências em pequenos animais, dentre as neoplasias orais malignas mais comuns são citados os melanomas, carcinomas de células escamosas e fibrossarcoma. Já os papilomas e os epúlides representam a maioria das neoplasias benignas. Os animais machos e aqueles com idades avançadas são mais acometidos por esta afecção e também as raças Cocker Spaniel, Pastor Alemão e o Boxer (FERRO, et al., 2005; GOMES, et al., 2007). Os felinos são menos acometidos por neoplasias orais quando comparados aos cães. Os sinais clínicos principais são as halitoses, disfagia, sangramento oral e presença de massa projetando se uma porção para região externa da cavidade oral.

O diagnóstico destas afecções pode ser baseado na idade, sexo, raça, aparência macroscópica e o local do nódulo. A punção aspirativa por agulha fina apresenta a vantagem de ser uma técnica simples, mas com a desvantagem de oferecer risco de disseminação de células tumorais. As biopsias excisionais são adequadas para massas pequenas e pedunculadas, já as biopsias incisionais têm seu valor nas neoplasias de maior tamanho. O exame radiográfico convencional do crânio e as projeções intra orais também atribui informações valiosas ao tratamento e prognóstico (ROZA, 2008).

Os tratamentos para neoplasias orais incluem intervenção cirúrgica, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia com autovacinas, hipertermia e terapia fotodinâmica (SILVA, et al., 2006).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas as fichas do Setor De Clínica Cirúrgica De Pequenos Animais Do Departamento De Medicina Veterinária (DMV) Da Universidade Federal de Lavras. Estas fichas são referentes aos atendimentos e exames realizados no período de 2008 á 2011.

Apenas foram incluídas no levantamento as fichas que possuíam o atendimento de afecções em cavidade oral com os laudos histopatológicos definitivos para neoplasias orais.

Resultado

No total, 07 (sete) casos de neoplasias orais foram atendidos e diagnosticados pelo serviço de Clínica Cirúrgica do DMV – UFLA entre 2008 e 2011.

Os neoplasmas encontrados foram os papilomas (02 casos – 28,6%), fibrossarcoma, carcinoma de células escamosas, ameloblastoma acantomatoso, epulis fibromatoso e melanoma (05 casos – 14,28% cada).

Em relação às raças acometidas estão animais sem raça definida (que foram acometidos pelo fibrossarcoma e o papiloma), Teckel (ameloblastoma acantomatoso), Schnauzer (melanoma), Poodle (papiloma), Doberman (epulis fibromatoso) e apenas um felino da raça Persa apresentou carcinoma de células escamosas. Todos os animais eram machos e apresentavam idade superior a 6 (seis) anos.

DISCUSSÃO

Podemos notar que nos últimos anos o atendimento de neoplasias orais no serviço de Clínica Cirúrgica da UFLA se revelou cada vez mais frequente. Mesmo apresentando poucos atendimentos, 80% dos casos citados acima foram atendidos nos dois últimos anos, demonstrando assim o aumento considerável desta afecção.

CONCLUSÃO

A neoplasia oral cada vez mais se torna uma patologia presente na rotina clínica da medicina veterinária, dentre os recursos para tratamento as intervenções cirúrgicas se apresentam mais eficazes, porém o prognóstico ruim para neoplasias orais malignas são amplamente observados.

REFERÊNCIAS

- FERRO, D. G.; LOPES, F. M.; VENTURINI, M. A. F. A.; CORREA, H. L.; GIOSO, M. A. Prevalência de neoplasias da cavidade oral de cães atendidos no Centro Odontológico Veterinário – Odontovet®-SP – entre 1994 e 2003. **Arquivo de ciências veterinárias e zoologia da UNIPAR**, 7(2): p. 123-128, 2004.
- GOMES, C.; FERREIRA, M. P.; ALIEVI, M. M.; CONTESINI, E. A.; MUCCILLO, M. S.; MELLO, F. P. S. Hemimandibulectomia central combinada com mandibulectomia unilateral rostral direita em um cão: relato de caso. **Revista da FZVA**. Uruguiana, v.12, n.1, p. 217 – 229, 2007.
- ROZA, M. R.; SILVA, L. A. F.; DALECK, C. R.; NARDI, A. B.; FERRAZ, J. R. S. Neoplasias da cavidade oral de cães e gatos – **Parte I. MEDVEP - Revista**

Científica Veterinária de Pequenos Animais e Animais de Estimação, 2008, 6(17): p. 65-73.

SILVA, M. R.; ROCHA, L. T.; MAIA, F. C. L.; TENÓRIO, A. P. M.; COELHO, M. C. O. C.; SÀ, F. B. Mandibulectomia rostral bilateral em cão portador de osteossarcoma.

Revista A Hora Veterinária. a.25, n.150, março.abril. p.24-26, 2006.

114. ESTUDO RETROSPECTIVO DOS CASOS DE TUMOR VENEREO TRANSMISSÍVEL (TVT) CANINO ATENDIDOS NO HOSPITAL VETERINARIO DA UFBA NO PERÍODO DE 2009 A 2011

Nanci Derevtsoff Munford¹, David de Moraes da Silva¹, Renata Veiga Tenório de Albuquerque¹, Sheila dos Santos Andrade¹, Fernanda Mitie Bruno¹

¹Universidade Federal da Bahia – email: nderevtsoff@gmail.com

RESUMO

O tumor venéreo transmissível é uma neoplasia de células redondas de contágio direto, por células transplantáveis que acomete cães sexualmente ativos. Com o intuito de se avaliar a ocorrência do TVT foram levantadas as fichas e classificadas pelo sexo, idade, raça e região corpórea. Constatou-se uma maior incidência em animais sem raça definida, adultos entre 6 a 8 anos e não havendo uma clara predisposição sexual, pelo numero semelhante entre machos e fêmeas. A localização extragenital se apresentou em 26% das nodulações, numero alto comparado com a literatura. Por ser transmitida pelo coito, o impedimento do acesso a rua pelos animais constitui uma forma de prevenção da neoplasia.

PALAVRAS-CHAVES TVT, epidemiologia, tumor venero transmissível

A RETROSPECTIVE STUDY OF CASES OF CANINE TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR (TVT) TREATED AT THE HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFBA FROM 2009 TO 2011

ABSTRACT

The transmissible venereal tumor is a round cell neoplasm of direct contagion, for transplantable cells that affects sexually active dogs. In order to evaluate the occurrence of TVT records were lifted and sorted by gender, age, race, and body region. There was a higher incidence in animals mongrel adults aged 6-8 years and not having a clear sexual predisposition, the number similar between males and females. The location extragenital performed in 26% of nodules, high number compared with the literature. Because it is transmitted by sexual intercourse, the denial of access to the street by the animals is a form of prevention of cancer.

KEYWORDS: TVT, epidemiology, transmissible venereal tumor

INTRODUÇÃO

O tumor venéreo transmissível é uma neoplasia de células redondas, descrito detalhadamente por Sticker em 1905 como uma enfermidade transmissível por células transplantáveis (Chiti e Amber, 1992). É um dos tumores que mais atinge a espécie canina, apresentando predominância em animais jovens, errantes e sexualmente ativos (Veraschin *et al.*, 2001). A cópula entre animais da espécie canina, devido ao contato prolongado, favorece o transplante das células tumorais geralmente envolvendo a genitália externa de cães de ambos os sexos e de diversas raças (Gonzalez *et al.*, 1997). O objetivo do trabalho é o levantamento epidemiológico dos casos de tumor venéreo transmissível diagnosticados por exame citológico.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo dos casos de tumor venéreo transmissível canino diagnosticados por exame citopatológico no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011, no qual foram avaliados os laudos citológicos, sendo feita a classificação pelas variáveis: sexo, idade, raça, e região corpórea atingida.

RESULTADOS

Após organização dos dados se observou um total de 50 casos, sendo destes 50% machos e 50% de fêmeas. Animais sem raça definida representaram 68% dos casos, seguidos de outras raças em menor numero como: Poodle (10%), Cocker Spaniel (6%), Pitt Bull (4%), Pastor Alemão, Pinscher e Fox Hound (2%) e outras. A faixa etária atingida foi de 14,9% em animais menores de 2 anos, 29,8% em 3 a 5 anos, 31,9% em 6 a 8 anos e 23,4% nos maiores de 8 anos. Quanto à localização do tumor, dos 46 nódulos descritos, 74% se apresentavam situados na região genital, e 26% se apresentavam extragenitalmente, em regiões como cabeça (13%), membros (8,6%), tronco (2,2%) e abdômen (2,2%).

DISCUSSÃO

A porcentagem de animais acometidos foi a mesma pra machos e fêmeas, não havendo predisposição para o sexo, assim como observou Amaral *et al.* (2004). No estudo pode se observar que animais sem raça definida tiveram substancialmente um numero maior de casos, que os de raça, semelhante ao estudo

de Silva *et al.*(2007). A faixa etária mais acometida foi entre 6 a 8 anos, fato não correspondente ao estudo de Silva *et al.*(2007) que encontrou maior numero em animais mais jovens, entre 3 a 5 anos, mas de acordo com Santos *et al.* (2008) pode acometer animais sexualmente ativos entre 1 a 15 anos. O TVT afeta primariamente a mucosa genital, porém são relatados sítios extragenitais, tais como, região cutânea, pavilhão auditivo, olhos e cavidade nasal. No estudo se observou que 26% dos nódulos foram extragenitais, numero maior do que o relatado por Batamuzi & Kristesen (1996) que é de 5%.

CONCLUSÃO

O TVT constitui uma neoplasia de grande importância na clinica veterinária, principalmente em cães sexualmente ativos e errantes. No estudo não se observou predisposição sexual, nem de uma raça especifica e sim um grande numero de animais mestiços. Foi observado um acometimento maior em animais mais velhos que o relatado na literatura, assim como a quantidade de tumores em localização extragenital foi expressivamente alta, com o que é relatado.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, A.S.; GASPAR, L.F.J.; SILVA S.B.; ROCHA N.S. Diagnóstico citológico do tumor venéreo transmissível na região de Botucatu, Brasil (estudo descritivo: 1994-2003). **Revista Portuguesa de Ciências Veterinárias**. 99(551): 167-171, 2004.
- BATAMUZI, E.K., BITTEGEKO, S.B.P. Anal and perianal transmissible venereal tumour in a bitch. **Veterinary Record**. 129, 556, 1991.
- CHITI, L.; AMBER, E.I. Incidence of tumors seen at the Faculty of Veterinary Medicine, University of Zambia: a four year retrospective study. **Zimbabwe Veterinary Journal**, v.3, n.4, p.143,147, 1992.
- GONZALEZ C.G., SANCHEZ B.C.A., VELEZ H.M.E. & BUEN D.E. Neoplasms of the reproductive system in bitches: retrospective study over 6 years. **Veterinaria Mexico** 28:31-34. 1997.
- SANTOS, D.E.; SILVA, D.T.; TOLEDO-PINTO, E.A.; LOT, R.F.E. Tumor Venéreo Transmissível (TVT): Revisão de Literatura. **Revista Científica Eletônica De Medicina Veterinária**. a.6, n.10. 2008
- SILVA, M.C.V.; BARBOSA, R.R.; SANTOS, R.C.; CHAGAS, R.S.N.; COSTA, W.P. Avaliação Epidemiológica, Diagnóstica E Terapêutica Do Tumor Venéreo Transmissível (Tvt) Na População Canina Atendida No Hospital Veterinário Da UFERSA. **Acta Veterinaria Brasília**, v.1, n.1, p.28-32, 2007.

VERASCHIN M.S., WOUTERS F., BERNIS V.M.O. & SOARES T.M.P. Tumor venéreo transmissível canino na região de Alfenas, Minas Gerais: formas de apresentação clinico-patológicas. **Clínica Veterinária** 32:32-38. 2001.

115. MIELOPATIA COMPRESSIVA POR LIPOMA DE CÉLULAS FUSIFORMES INFILTRATIVO EM CÃO

Angel Rippingler², Alexandre Mazzanti³, Rosmarini Passos dos Santos¹, Glaucia Denise Kommers³, Ricardo Barbosa Lucena¹, Camila Feltrin Giglio¹

¹Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Centro de Ciências Rurais (CCR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

²Acadêmicos do Curso de Medicina Veterinária, CCR, UFSM.

³Professor Dr., Departamento de Clínica de Pequenos Animais, CCR, UFSM.

RESUMO

Relata-se um caso de lipoma de células fusiformes infiltrativo diagnosticado em cadela com sinais de mielopatia compressiva. A mielografia demonstrou compressão extradural do lado direito sobre a quinta vértebra torácica. À necropsia foi observado um neoplasma que invadia o canal vertebral na quarta e quinta vértebras torácicas com compressão acentuada da medula espinhal. A avaliação por imuno-histoquímica, com anticorpo anti-CD34, revelou positividade principalmente nas áreas fusiformes do lipoma.

Palavras-chave: cão, lipoma, imuno-histoquímica.

COMPRESSIVE MYELOPATHY BY INFILTRATIVE SPINDLE CELL LIPOMA IN A DOG

ABSTRACT

A female dog was referred presenting neurological signs of the spinal cord compression. It was observed a right extradural compression of spinal cord over fourth and fifth thoracic vertebrae by spinal myelography. During necropsy evaluation was observed a neoplasm which infiltrated in the spinal canal in the fourth and fifth thoracic vertebrae with marked compression of the spinal cord. Microscopically was found neoplastic adipocyte well differentiated, with areas of spindle cells, diagnosed as infiltrative spindle cell lipoma. The immunohistochemical staining revealed positive CD34 cells mainly in the areas of spindle cells of lipoma.

Key words: dog, lipoma, immunohistochemistry.

INTRODUÇÃO

Os lipomas infiltrativos são invasivos e causam sinais clínicos devido à compressão dos tecidos adjacentes. O lipoma de células fusiformes é uma variante benigna e rara, descrita em humanos e cães. Acometem frequentemente cães de meia idade e as fêmeas tem uma maior predisposição. Os relatos desse neoplasma invadindo o canal vertebral e provocando compressão medular são pouco frequentes. Além disso, há raras descrições de lipomas de células fusiformes em cães e não se conhece descrição dessa variante com comportamento infiltrativo. Os objetivos deste trabalho foram relatar os aspectos clínico-patológicos e os métodos de diagnóstico do lipoma de células fusiformes infiltrativo ocasionando compressão extradural da medula espinhal (ME) torácica em uma cadela.

RELATO DO CASO

Foi atendida no Hospital Veterinário da instituição, uma cadela sem raça definida, com 11 anos de idade, pesando 8,1 quilos, com histórico de aumento de volume na região torácica dorsal direita há quatro meses. No exame neurológico a cadela apresentava ataxia propioceptiva nos membros pélvicos, paraparesia fracamente ambulatoria, reação postural ausente no membro pélvico direito e dor à palpação na coluna vertebral torácica. Os exames complementares realizados foram hemograma, bioquímica sérica, punção aspirativa por agulha fina da massa tumoral, ultrassom de abdome, radiografia simples do tórax, análise do liquor e mielografia. Foi instituída terapia de suporte com prednisona por quinze dias. O quadro clínico evoluiu para paraparesia ambulatoria severa, sendo realizada a eutanásia por opção do proprietário. A necropsia revelou invasão do neoplasma no canal vertebral da quarta e quinta vértebras torácicas causando acentuada compressão da ME. O diagnóstico histopatológico foi de lipoma de células fusiformes infiltrativo. Avaliação imuno-histoquímica (IHQ), feita com anticorpo anti-CD34, confirmou o diagnóstico.

DISCUSSÃO

A evolução progressiva e os sinais neurológicos assimétricos observados em decorrência do envolvimento da ME também foi encontrado por Lewis et al. (1991). A presença de compressão da ME sobre o corpo vertebral, não é considerado sinal patognomônico de compressão extradural provocado por neoplasma (Bagley, 2010), mas estes achados auxiliaram na exclusão da doença do disco intervertebral. O

tratamento cirúrgico não foi aceito pela proprietária e optou-se pelo tratamento com corticóide. O prognóstico é desfavorável para tratamento somente com terapia de suporte. O estudo histopatológico revelou tecido adiposo neoplásico composto por adipócitos maduros bem diferenciados com áreas de células fusiformes, infiltrativo, que se estendia do tecido subcutâneo aos músculos torácicos na região da terceira até a nona vértebra torácica. O lipoma invadia a terceira, quarta e quinta vértebras torácicas comprimindo a ME sobre a quarta e quinta vértebras torácicas. A IHQ revelou positividade para CD34 predominantemente nas áreas de células fusiformes do tumor, confirmando o diagnóstico de lipoma de células fusiformes (Gross et al., 2009).

CONCLUSÃO

O caso traz como relevância clínica os sinais clínicos progressivos, os achados neurológicos, as imagens da mielografia, e a descrição histológica e imuno-histoquímica de uma rara variante de lipoma infiltrativo com padrão de células fusiformes com invasão das vértebras torácicas, comprimindo a ME.

REFERÊNCIAS

- BAGLEY, R.S. Spinal neoplasms in small animals. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v.40, n.5, p.915-928, 2010.
- LEWIS, D.D. et al. Extradural spinal liposarcoma in a dog. *Journal American Veterinary Medical Association*, v.199, n.11, p.1606-1607, 1991.
- GROSS, T. A.; IHRKE, P. J.; WALDER, E. J. et al. Tumores lipocíticos. In: _____. **Doenças da pele do cão e do gato. Diagnóstico clínico e histopatológico**. 2. ed. São Paulo: Roca, 2009. Cap.30, p.750-761.

116. NEOPLASIAS DE GLÂNDULAS HEPATOIDES EM CÃES: AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA EM REGIÕES EXTRAPERIANAIS

NATHALIA CORRÊA LEITE¹; DANIELLA MATOS DA SILVA¹; MARIANA PAVELSKI¹
CLAUDIA MARTINS GALINDO¹; SIMONE DOMIT GUÉRIOS¹; RENATO SILVA DE SOUSA¹

¹Universidade Federal do Paraná: nathalia_correaleite@yahoo.com.br

RESUMO

As neoplasias de glândulas hepatoides são pouco relatadas em regiões anatômicas não perianais. Dos tumores de pele encaminhados para o Laboratório de Patologia Animal do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná (HV-UFPR), entre os anos de 2010 e 2011, 15 foram os casos de neoplasias de glândulas hepatóides. De acordo com os resultados, 47% das neoplasias desenvolveram-se em região extraperianal, ressaltando a importância da inclusão destas neoplasias no diagnóstico diferencial de neoformações cutâneas.

PALAVRAS-CHAVES perianal, adenocarcinoma, adenoma

HEPATOID GLAND TUMORS IN DOGS : PREVALENCE IN REGIONS EXTRAPERIANAIS EVALUATION

ABSTRACT

Hepatoid gland tumors are rarely described in sites other than the perianal region. Of skin tumors referred to the Pathology Laboratory Animal Veterinary of the University Federal of Parana, between the years 2010- 2011, 15 were cases of hepatoid gland neoplasms. According with the results 47% was not located in the perianal region emphasizing the importance of this neoplastic growth as a differential diagnosis of all cutaneous tumors.

KEYWORDS: perianal, carcinoma, adenoma

INTRODUÇÃO

As glândulas perianais, circum-anais ou hepatoides (devido à semelhança morfológica com os hepatócitos) são consideradas glândulas sebáceas modificadas, exclusivas de cães e marsupiais, não secretórias e de função desconhecida (Goldschmidt e Hendrick, 2002). Podem ser descritas como glândulas exócrinas com canalículos secretórios e ductos (Shabadash e Zelikina, 2002), ou como tecido

glandular, uma vez que apresentam características histológicas de epiderme, tais como, membrana basal, células poliédricas, camada granular e córnea (Atoji et.al., 2008). Localizam-se preferencialmente na região perianal e base da cauda, mas também na superfície dorsolateral de membros pélvicos, prepúcio, linha média, dorsal e ventral, da base do crânio a base da cauda (Daleck et al., 2009).

As proliferações neoplásicas de glândulas hepatoides são frequentes em cães adultos a idosos e sua dependência androgênica é bem estabelecida, fato este atribuído a maior incidência em machos inteiros e à regressão tumoral em animais orquiectomizados (Daleck et al., 2009). Histologicamente, as alterações são classificadas em hiperplasia, adenoma, epitelioma, carcinoma bem diferenciado ou pobremente diferenciado (Goldschmidt e Hendrick, 2002).

Existem inúmeros trabalhos abordando neoplasias em glândulas hepatoides. No entanto, a maioria dos mesmos os descrevem na região perianal. O objetivo deste trabalho é enfatizar o potencial desenvolvimento de lesões proliferativas das glândulas hepatoides em regiões anatômicas pouco relatadas na literatura.

MATERIAL E MÉTODOS

Dos tumores de pele encaminhados para o Laboratório de Patologia Animal do HV-UFRP, entre os anos de 2010 e 2011, 15 foram diagnosticados como neoplasias de glândulas hepatoides. Os casos foram classificados de acordo com padrão histológico descrito por Goldschmidt e Hendrick (2002), localização anatômica, sexo e idade.

RESULTADOS

De acordo com o resultado do exame histopatológico, 20% (3/15) dos animais apresentaram tumores malignos, enquanto 80% (12/15) benignos. Quanto ao sexo 7% (apenas 1 caso) eram fêmeas e 93% machos (14 casos). A média de idade foi de 10 anos (5-12). Com relação à localização anatômica 53% (6 benignos e 2 malignos) localizavam-se em região perianal, 20% (3 casos benignos) em cauda, 13% (1 benigno e 1 maligno) em prepúcio, 7% (1 caso benigno) em região abdominal ventral e 7% (1 caso benigno) em região torácica dorsal.

DISCUSSÃO

Neste estudo, os adenomas hepatoides em machos com média de 10 anos de idade foram os mais prevalentes, corroborando com a literatura. Destaca-se que a frequência de tumores em regiões não perianais correspondeu a 47% dos casos estudados. A literatura relata a possibilidade de tal ocorrência, no entanto estudos sobre a prevalência dessas neoplasias em regiões anatômicas não perianais é escassa (Goldschmidt e Hendrick, 2002; Daleck et al., 2009).

Segundo Goldschmidt e Hendrick (2002) os adenocarcinomas hepatoides são incomuns e preferencialmente observados na região perianal, periprepucial e na cauda, concordando com este estudo que apresentou duas formações malignas em região perianal e uma prepucial.

CONCLUSÃO

A partir dos casos diagnosticados, o desenvolvimento de neoplasias de glândulas hepatoides em locais, que não a região perianal, pode ser considerado frequente. Desta forma, sugere-se realização de pesquisas objetivando potenciais sítios de crescimento destas neoplasias e a inclusão no diagnóstico diferencial de neoformações cutâneas em regiões não perianais.

REFERÊNCIAS

ATOJI, Y.; YAMAMOTO, Y.; KOMATSU, T.; SUZUKI, Y.; TSUBOTA, T. Circumanal Glands of the Dog: A New Classification and Cell Degeneration. **The Anatomical Record**, v. 250, p.251-267. 1998.

DALECK, C.R.; RODIGHIERI, S.M.; DE NARDI, A.B.; MOTTA, F.R. Neoplasias Perineais. In: DALECK, C.R.; DE NARDI, A.B.; RODASKI, S. **Oncologia em Cães e Gatos**. São Paulo: Roca, 2009, cap.30, p.472-479.

GOLDSCHMIDT, M.H.; HENDRICK, M.J. Tumors of the Skin and Soft Tissues. In: Meuten, D.J. **Tumors in Domestic Animals**. California: Iowa State Press, 2002. cap. 2, p.45-117.

SHABADASH S.A.; ZELIKINA, T.L. Contradictions in modern data on the structure and function of dog hepatoid circumanal glands. **Izvestiya Rossiiskoi Akademii. Nauk-seriya Biologicheskaya**, v.3, p.286-295, 2002.

117. NEOPLASIAS EM CÃES, ESTUDO RETROSPECTIVO DE 535 CASOS

José Geraldo Meirelles Palma Isola¹, Rodrigo Cezar Sanches¹, Daniela Mosna Xavier², Carlos Roberto Daleck³

¹ Pós graduando do programa de Cirurgia Veterinária pela FCAV – UNESP – Jaboticabal. Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária. E-mail: jgmpi@ig.com.br

² Médica Veterinária, Unidade Integrada de Veterinária – UNIVET, Ribeirão Preto

³ Professor Adjunto, FCAV – UNESP Jaboticabal.

RESUMO

Este estudo retrospectivo teve por objetivo revelar a casuística das neoplasias em cães atendidos pelo serviço de Oncologia de um hospital veterinário universitário, abrangendo 535 cães. Houve maior prevalência de tumores em fêmeas (71%), talvez devido à alta incidência dos tumores mamários que representaram 39% do total. Dentre as medidas terapêuticas, os procedimentos cirúrgicos (46%) foram os mais utilizados comparados às outras terapias. Este estudo elucida o elevado número de atendimentos de variadas patologias oncológicas que acometem os cães, havendo a necessidade de diagnóstico precoce e preciso, permitindo melhor adequação às possibilidades terapêuticas, além de chamar a atenção dos médicos veterinários para a constante atualização do conhecimento sobre este tema.

Palavras-chave: neoplasia, tumor de mama, cão

NEOPLASMS IN DOGS, RETROSPECTIVE STUDY OF 535 CASES

ABSTRACT

This retrospective study aimed to reveal the series of neoplasms in dogs treated at the Oncology Service of a university veterinary hospital, including 535 dogs. There was a higher prevalence of tumors in females (71%), perhaps due to high incidence of mammary tumors which accounted for 39% of the total. Among the therapeutic measures, surgical procedures (46%) were the most used compared with the others therapies. This study elucidates the high number of various types of tumors cases that affect dogs, with the need for early and accurate diagnosis, allowing better

adaptation to the therapeutic, and draw the attention of veterinarians to the constant updating of knowledge on this topic .

KEYWORDS: neoplasm, mammary tumors, dogs

INTRODUÇÃO

Dentre as inúmeras afecções diagnosticadas dentro da rotina da clínica de pequenos animais, os processos de ordem neoplásico, possuem elevada frequência (Borges, et al., 2002, De Nardi et al., 2002; Priebe et al., 2011). De acordo com Borges et al. (2002) e Priebe et al. (2011) vários são os fatores que podem influenciar a carcinogênese em determinada espécie animal, podendo ser de natureza extrínseca ou intrínseca, tais como sexo, alimentação, predisposição ou mesmo agentes cancerígenos.

O presente estudo retrospectivo tem o objetivo de apresentar, de forma regional, a frequência dos processos neoplásicos caninos mais rotineiros, além de verificar a prevalência sexual, bem como os métodos terapêuticos e os tipos tumorais de 535 cães, atendidos no serviço de Oncologia de um hospital veterinário universitário.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo retrospectivo de 535 casos de neoplasias, que acometeram indivíduos da espécie canina, atendidos no serviço de Oncologia de um hospital veterinário universitário. Os processos neoplásicos foram analisados em relação ao sexo, tipo tumoral e procedimentos terapêuticos adotados.

RESULTADOS

Verificou-se que 71% dos cães deste estudo eram fêmeas e talvez, até por este fato, o tumor mais encontrado foi o de mama com 39% de incidência em relação ao total, seguido pelos tumores venéreos transmissíveis (25%), carcinoma espinocelular (5%), melanoma, osteossarcoma, mastocitoma, linfoma com 4% de incidência cada um, seguido de outros tumores menos frequentes neste relato.

Dentre as medidas terapêuticas instituídas, 46% consistiram de procedimentos cirúrgicos, 35% de quimioterapia e 19% de criocauterização associada à quimioterapia, sendo que 16% dos animais em questão foram eutanasiados ou vieram a óbito

DISCUSSÃO

O fato das fêmeas serem mais predispostas que os machos a apresentarem processos tumorais, devido a alta prevalência de tumores mamários, e em geral, seguidos por tumores venéreos transmissíveis e cutâneos, já foi verificado por Maria et al. (1998), Richards (2001), Borges et al. (2002) e Priebe et al. (2011). A frequência dos diferentes tipos de procedimentos terapêuticos observados neste relato são os mesmos relatados por De Nardi et al. (2002).

CONCLUSÃO

Este estudo conclui que é elevado o número de atendimentos de variadas patologias oncológicas que acometem os cães, havendo a necessidade de diagnóstico precoce e preciso, permitindo melhor adequação às possibilidades terapêuticas, além de chamar a atenção dos médicos veterinários para a constante atualização do conhecimento sobre este tema.

REFERÊNCIAS

- BORGES, A. G. ; BRANDÃO, C. V. S. ; RANZANI, J. J. T. et al. Doenças neoplásicas em cães: estudo retrospectivo de 1035 casos. **Revista Brasileira de Ciência Veterinária**. Sup., v.9, n.1, p.84-85, 2002.
- DE NARDI, A. B.; RODASKI, S.; SOUSA, R.S. et al. Prevalência de neoplasias e modalidades de tratamentos em cães, atendidos no hospital veterinário da universidade federal do Paraná. **Archives of Veterinary Science** v.7, n.2, p.15-26, 2002.
- MARIA, P. P.; SOBRAL, R. A.; DALECK, C. R. Casuística de cães portadores de neoplasias atendidos no Hospital Veterinário da UNESP – Jaboticabal durante o período de 01/01/1995 a 01/05/1997. **Anais do III Congresso Brasileiro de Cirurgia e Anestesiologia Veterinária**, p.61, 1998.
- PRIEBE, A. P. S.; RIET-CORREA, G.; PAREDES, L. J. A. et al. Ocorrência de neoplasias em cães e gatos da mesorregião metropolitana de Belém, PA entre 2005 e 2010. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.63, n.6, p.1583-1586, 2011.
- RICHARDS, H. G.; MCNEIL, P. E.; THOMPSON, H. et al. An epidemiological analysis of a canine-biopsies database compiled by a diagnostic histopathology service. **Preventive Veterinary Medicine**, v.51, n.1-2, p.125, 2001.

118. NEOPLASMAS NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE CÃES: 26 CASOS

Rosmarini Passos dos Santos¹, Alexandre Mazzanti², Diego V. Beckmann¹, Amanda Andrades¹, Rafael Figuera²,
Juliana Sperotto Brum¹

¹Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária, Centro de Ciências Rurais (CCR), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

²Professor Dr., Departamento de Clínica de Pequenos Animais, CCR, UFSM.

RESUMO

O objetivo deste estudo retrospectivo foi identificar cães com neoplasmas envolvendo o sistema nervoso central (SNC) e obter informações a respeito da raça, do sexo, da idade, dos sinais neurológicos, da localização, da evolução clínica, do tipo e da origem do tumor. Os neoplasmas incluídos nesse estudo ocorreram principalmente em Boxers, com predomínio de idade entre cinco e 10 anos. Os neoplasmas de origem primária perfizeram um total de 57,7% dos casos, sendo 73,3% encefálicos e 26,7% medulares. O meningioma foi o neoplasma mais comum.

PALAVRAS-CHAVES Neoplasma, encéfalo, medula espinhal

NEOPLASMS IN THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF DOGS: 26 CASES

ABSTRACT

This retrospective study was aimed to identify dogs with neoplasms affecting the central nervous system (CNS) and compile information on the affected breeds, sex, age group, anatomical site of the tumor, type of clinical signs and clinical course. The neoplasms included in this study occurred mainly in Boxers and the predominantly affected age-group was 5-10-year-old. Primary CNS neoplasms accounted for 57.7% of the cases, 73.3% of which were brain tumors and 26.6% spinal cord tumors. Meningioma was the most frequently diagnosed neoplasm.

KEYWORDS: Neoplasm, brain, spinal cord

INTRODUÇÃO

Os neoplasmas do SNC podem ser primários ou secundários. Os primários são mais frequentes e acometem mais o encéfalo do que a medula espinhal (ME). Os sinais neurológicos dependem da localização, do tamanho e da taxa de crescimento do neoplasma. Vários estudos internacionais vêm relatando os sinais clínicos, o diagnóstico, o tratamento e a prevalência dos neoplasmas no SNC de cães. No Brasil, poucos estudos são encontrados. Diante disso, o objetivo deste estudo foi identificar cães com neoplasmas do SNC, atendidos no Hospital Veterinário Universitário da instituição de 2003 a 2011 e obter informações a respeito da raça, sexo, idade, sinais neurológicos, localização, evolução clínica e origem do tumor.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram incluídos neste estudo somente cães com diagnóstico definitivo confirmado pelo exame histopatológico. O exame neurológico completo foi realizado e a localização das lesões foi estabelecida de acordo com os sinais neurológicos. A divisão neuroanatômica da lesão foi definida em tálamo-córtex, tronco encefálico, cerebelo e segmentos medulares (C1-C5, C6-T2, T3-L3 e L4-S3). O tempo de evolução clínica foi determinado a partir do início dos sinais encontrados no exame neurológico até o momento da morte ou eutanásia dos cães.

RESULTADOS

A raça predominante foi a Boxer (35%) e não foi observado diferença em relação ao sexo. A idade foi igual ou superior a cinco anos em 96% dos cães. Nos neoplasmas encefálicos, foi verificado alteração no nível de consciência (58%), andar em círculo (50%), alteração comportamental (50%), crises convulsivas generalizadas (42%), dificuldade de deglutição (33%) e SVC (25%). Nos neoplasmas da ME, foi observado hiperestesia espinhal (57%), paraparesia (29%), claudicação (29%), tetraparesia não ambulatória (29%) e paraplegia. O tálamo-córtex foi afetado em 58% dos casos, seguido pelo tronco-encefálico (17%) e pelo cerebelo (8%). Sinal multifocal ocorreu em 17%. As regiões T3-L3 (43%), seguida de C6-T2 (29%) e C1-C5 (21%), foram mais afetadas. Os neoplasmas primários foram predominantes (57,7%), sendo 73,3% encefálicos e 26,7% medulares. Destes,

46,7% eram meningiomas. A evolução dos sinais clínicos variou em média 84 e 45 dias nos neoplasmas medulares e encefálicos, respectivamente.

DISCUSSÃO

Os cães Boxer são mais acometidos por neoplasmas do SNC, reforçando a hipótese de predisposição racial (Snyder et al., 2006). A crise convulsiva é descrita como a manifestação neurológica mais frequente em neoplasmas encefálicos (Bagley et al., 1999; Snyder et al., 2006), ao contrário deste estudo onde as alterações comportamentais foram prevalentes. Nos neoplasmas medulares a hiperestesia espinhal foi o sinal mais comum provavelmente pelo envolvimento de meninges, periósteo e/ou raiz nervosa. Três cães apresentaram claudicação, inicialmente diagnosticado como problema ortopédico ou músculo-esquelético, demonstrando que é comum este achado em neoplasmas que envolvem as raízes nervosas (Parent, 2010). Os sinais geralmente são compatíveis com lesão focal, mas sinais multifocais podem ser observados (Snyder et al., 2006).

CONCLUSÕES

Cães da raça Boxer foram mais acometidos; a idade variou entre cinco e 10 anos; o tempo de evolução clínica foi maior para os neoplasmas da ME; o sinal neurológico predominante foi a alteração do nível de consciência em cães com neoplasma encefálico e a hiperestesia espinhal naqueles envolvendo a ME; as regiões tálamo-cortical e segmento medular T3-L3 foram as mais acometidos; o meningioma foi o tumor mais comum e os neoplasmas primários predominaram no encéfalo.

REFERÊNCIAS

BAGLEY, R.S.; GAVIN, P.R.; MOORE, M.P. et al. Clinical signs associated with brain tumors in dogs: 97 cases (1992-1997). *Journal of the American Veterinary Medical Association*, v. 215, p. 818-819, 1999.

SNYDER, J.M.; SHOFR, F.S.; VAN WINKLE, T.J. et al. Canine intracranial primary neoplasia: 173 cases (1986-2003). *Journal of Veterinary Internal Medicine*, v. 20, p. 669-675, 2006.

PARENT, J. Clinical approach and lesion localization in patients with spinal diseases. *Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice*, v. 40, p. 733-753, 2010.

119. NÍVEIS DE CÁLCIO IONIZADO EM CADELAS COM CARCINOMA MAMÁRIO - ESTUDO DE 16 CASOS

Danilo Roberto Marques¹, Cláudia Russo², Clarisee Guillem Cardoso³, Thiago Hatore Marques⁴, Ewaldo De Mattos Junior⁵.

¹ Residente do Cesumar – danvetmarques@gmail.com

² Professora de Técnica e Clínica Cirúrgica do Cesumar.

³ Residente do Cesumar

⁴ Residente do Cesumar

⁵ Professor de Anestesiologia do Cesumar

RESUMO

As neoplasias mamárias são os tumores mais comuns em cães. A hipercalcemia é uma complicação de algumas neoplasias malignas. Este trabalho objetivou verificar a ocorrência de hipercalcemia em cadelas portadoras de carcinoma mamário. Foram estudadas 16 fêmeas com carcinoma mamário, realizando a dosagem de cálcio ionizado, sendo que, 68,75% apresentou hipercalcemia.

PALAVRAS-CHAVES carcinoma mamário, hipercalcemia, cães

IONIZED CALCIUM LEVELS IN DOGS WITH CARCINOMA MAMARIUM: STUDY OF 16 CASES

ABSTRACT

The mammary neoplasia are the most common tumors in dogs. The hypercalcemia is a complication of some malignancies neoplasia. This study aimed to verify the occurrence of hypercalcemia in dogs suffering from mammary carcinoma. We studied 16 females with breast carcinoma, performing the ionized calcium, whereas, 68.75% had hypercalcemia.

KEYWORDS: mammary carcinoma, hypercalcenmia dogs

INTRODUÇÃO

As neoplasias mamárias são os tumores mais comuns na fêmea canina e são responsáveis por aproximadamente 52% de todas as neoplasias nesta população animal (Zuccari et al., 2005).

A hipercalcemia é uma das síndromes paraneoplásicas mais bem descritas em medicina veterinária, sendo atribuída à liberação de fatores de reabsorção óssea, como o fator ativador de osteoclastos, por parte de linfócitos neoplásicos. Essas proteínas estimulam a reabsorção óssea e renal do cálcio, de efeito semelhante ao paratormônio (Lucas, 2009).

O objetivo deste estudo é aferir a ocorrência de hipercalcemia associada à carcinomas mamários em cães.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 21 animais portadores carcinoma mamário, com idade entre cinco e 17,5 anos, peso de 2,7 até 32,2 quilogramas, de diferentes raças e sem raça definida, atendidos no Hospital Veterinário do Centro Universitário de Maringá (CESUMAR), PR. Os diagnósticos foram realizados por exames citológicos e/ou histopatológicos.

Foram colhidos 5 mL de sangue, através de punção venosa, utilizando-se seringa e agulha descartáveis, colocados em frasco sem anticoagulante para obtenção de soro no qual foram realizadas as determinações de cálcio ionizado pela método eletrodo seletivo com correção automática para variação de pH, no laboratório Grupo São Camilo – Medicina Diagnóstica, Maringá.

RESULTADOS

A média da idade e do peso dos pacientes foi de 11,53 anos e 14 quilogramas, respectivamente.

Com relação á raça 25% eram sem raça definido e 25% da raça poodle, outras raças presentes no estudo eram: akita, boxer, fila brasileiro, pastor alemão, pinscher, schinauzer, teckel.

Em relação aos níveis de cálcio ionizado em quatro (25%) casos os níveis estavam dentro do valor de referência (1 a 1,35 nmol/L), um baixo (6,25%) e onze acima (68,75%).

DISCUSSÃO

A neoplasia mamaria acomete, com maior freqüência, fêmeas entre nove e doze anos de idade (Piekarz, 2007), dados encontrados nesse estudo. A maior ocorrência no carcinoma mamaria em raça teckel e sem raça definida está de

acordo com outros autores (Piekarz, 2007), que citam que essas raças são mais acometidas por neoplasia mamárias.

O resultado desse estudo não concorda com Martin (1998) e com Lobo e Silva et al (2005) que afirmam que a hipercalcemia é rara em cães portadores de neoplasia mamaria. Mas no presente estudo foi realizado a dosagem de cálcio ionizado, o que difere os estudos anteriores, que foram dosados o valor de cálcio total. No presente estudo 68,75 dos animais com carcinoma mamário apresentaram o cálcio ionizado acima do valor fisiológico.

Segundo Martin (1998) tumores malignos podem ocorrer hipercalcemia devido a produção de Pr-PTH (proteína relacionada ao paratormônio) que promove reabsorção óssea osteoclástica.

CONCLUSÃO

Os resultados sorológicos permitem concluir que cães portadores de carcinoma mamário apresentam hipercalcemia.

REFERÊNCIAS

LOBO E SILVA, M.A.M et al. Níveis de cálcio sérico de cadelas portadoras de tumor de mama. **Bol. Med. Vet.** – UNIPINHAL – Espírito Santo do Pinhal - SP, v. 01, n. 01, jan./dez. 2005.

LUCAS, S. R. R. **Hematologic Alterations in Neoplasia**. 34th World Small Animal Veterinary Congress. 2009 - São Paulo, Brazil.

MARTIN, L.F. Hypercalcemia and hypermagnesemia. **Vet. Clin. North. Am. Small Anim. Pratic.**, v.28, n.3, p. 565 – 585, 1998.

PIEKARZ, C.H. **Expressão da E-Caderina no prognóstico de neoplasias mamárias em cadelas**. 2007. 90.f. Tese (Mestrado em Patologia Veterinária) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba.

ZUCCARI, D.A.P.C. et al. Avaliação imuno-histoquímica do Gene p53 nas neoplasias mamárias caninas. **Ars Veterinária**, Jaboticabal, SP, vol. 21, nº3, p.344-350, 2005.

120. OCORRÊNCIA DE SÍNDROMES PARANEOPLÁSICAS EM 29 CÃES COM NEOPLASIAS LINFOPROLIFERATIVAS

Elisa Barp Neuwald¹, Luciele Varaschini Teixeira¹, Francisco de Oliveira Conrado², Nicole Regina Capacchi Hlavac¹, Mariana Olinto Dreyer da Silva³, Félix Hilario Diaz González⁴

¹PPG-CV da UFRGS – eneuwald@ibest.com.br

²Residente do LACVet da UFRGS

³Aluna da Faculdade de Medicina Veterinária da UFRGS

⁴Professor da Faculdade de Medicina Veterinária da UFRGS

RESUMO

As síndromes paraneoplásicas são alterações ligadas ao tumor que ocorrem longe do sítio primário da doença, e podem ser o primeiro sinal de malignidade. Este trabalho visa relatar a ocorrência das principais síndromes paraneoplásicas observadas em cães com neoplasias linfoproliferativas. Anemia e leucocitose foram as principais alterações encontradas, seguidas de caquexia, trombocitopenia, hiperproteinemia, hipercalcemia e leucopenia. Este trabalho demonstra a importância da avaliação completa do paciente com neoplasia linfoproliferativa para otimizar seu tratamento e a monitoração da doença.

PALAVRAS-CHAVES linfoma, leucemia linfocítica crônica, exames complementares

OCCURRENCE OF PARANEOPLASTIC SYNDROMES IN 29 DOGS WITH LYMPHOPROLIFERATIVE NEOPLASIA

ABSTRACT

The paraneoplastic syndromes are tumor-related changes that occur away from the primary site of disease, and may be the first sign of malignancy. This paper aims to report the occurrence of the paraneoplastic syndromes observed in dogs with lymphoproliferative malignancies. Anemia and leukocytosis were the most common findings, followed by cachexia, thrombocytopenia, hyperproteinemia, hypercalcemia, and leukopenia. This work demonstrates the importance of complete evaluation of patients with lymphoproliferative malignancy to optimize treatment and monitoring of the disease.

KEYWORDS: lymphoma, chronic lymphocytic leukemia, complementary tests

INTRODUÇÃO:

As síndromes paraneoplásicas são alterações funcionais ou estruturais ligadas ao tumor, que ocorrem longe do sítio primário e estão associadas a ações não invasivas do tumor. As principais síndromes paraneoplásicas encontradas em cães com neoplasias linfoproliferativas incluem caquexia, hipercalcemia, hiperglobulinemia, citopenias e leucocitose (Bergman, 2007; Ramos et al., 2008). Este estudo tem por objetivo avaliar a ocorrência das principais síndromes paraneoplásicas encontradas em cães com neoplasias linfoproliferativas.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados 29 cães com diagnóstico citológico ou histopatológico de neoplasias linfoproliferativas atendidos no período de maio de 2010 a janeiro de 2012. Logo após a confirmação do diagnóstico e antes de qualquer terapia os animais foram submetidos ao exame físico completo e exames complementares que incluíram hemograma, perfil bioquímico e mielograma, a fim de avaliar a presença de síndromes paraneoplásicas.

RESULTADOS

Linfoma foi diagnosticado em 27 animais, sendo que 21 apresentavam a forma multicêntrica (4,8% estágio I; 4,8% estágio II; 47,6% estágio III; 28,6% estágio IV e 14,2% estágio V), três apresentavam a forma cutânea, dois a esplênica e um a forma intestinal. Outros dois animais foram diagnosticados com leucemia linfocítica crônica. Anemia foi a alteração mais comumente observada, ocorrendo em 55,2% dos cães, seguida de leucocitose (48,3%). Outras síndromes paraneoplásicas encontradas foram caquexia (24,1%), trombocitopenia (20,7%), hiperproteinemia (17,2%), hipercalcemia (13,8%) e leucopenia (3,5%).

DISCUSSÃO

A anemia é uma das síndromes paraneoplásicas mais comumente observada na oncologia veterinária, sendo detectada em 53% dos pacientes com neoplasias hematológicas (Miller et al., 2009), semelhante ao observado no presente estudo. Outras citopenias encontradas incluíram trombocitopenia e leucopenia. A prevalência de trombocitopenia em cães com câncer antes do início da terapia é de até 36%. Leucocitose já foi associada a uma série de tumores, incluindo o linfoma,

mas normalmente, é de uma significância clínica baixa e responde ao tratamento do tumor primário (Bergman, 2007).

Um efeito sistêmico e importante do câncer em animais é a presença de má-nutrição pronunciada e perda de peso corporal. Apenas 4% dos cães atendidos em um serviço de oncologia apresentaram caquexia (Bergman, 2007), e outro estudo mostrou que 71% dos cães com linfoma apresentaram caquexia/anorexia (Ramos et al., 2008). No presente trabalho observou-se a presença de caquexia em 24,1% dos casos, no entanto, a incidência da caquexia associada a neoplasias na medicina veterinária ainda não está bem definida.

Hipercalcemia e hiperglobulinemia são também frequentemente observadas em cães com distúrbios linfoproliferativos e sua ocorrência está associada a um pior prognóstico (Bergman, 2007). A hipercalcemia associada a neoplasias é a causa mais frequente de hipercalcemia em pacientes hospitalizados, e uma das principais complicações metabólicas do câncer (Barri & Knochel, 1996).

CONCLUSÃO

As síndromes paraneoplásicas ocorrem frequentemente em animais com neoplasias linfoproliferativas, sendo que sua detecção precoce e terapia adequada podem contribuir para o melhor prognóstico do animal.

REFERÊNCIAS

- BARRI, Y.M.; KNOCHEL, J.P. Hypercalcemia and electrolyte disturbances in malignancy. **Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice**, v.10, n.4, p.775-790, 1996.
- BERGMAN, P.J. Paraneoplastic syndromes. In: WITHROW, MACEWEN'S. **Small Animal Clinical Oncology**. Saint Louis: Elsevier, 2007. cap 5, p.77-90.
- MILLER, A.G.; MORLEY, P.S.; RAO, S.; et al. Anemia is associated with decreased survival time in dogs with lymphoma. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, v.23, p.116-122, 2009.
- RAMOS, R.S.; MACHADO, L.H.A.; CONCEIÇÃO, L.C.; HECKLER, M.C.T. Estudo da prevalência das principais síndromes paraneoplásicas de 14 cães com linfoma – relato de casos. **Veterinária e Zootecnia**, v.10, n.3, p.38-39, 2008.

121. OSTEOSARCOMA CONDROBLÁSTICO EXTRAESQUELÉTICO EM CADELA: RELATO DE CASO

Daniella Matos da Silva¹, Arícia Gomes Sprada¹, Mariana Pavelski¹ Nathalia Corrêa Leite¹, Renato Silva de Sousa¹, Simone Domit Guérios¹

¹Universidade Federal do Paraná – sdguérios@ufpr.br

RESUMO

Relata-se o caso de uma cadela de 13kg que apresentava massa em região torácica ventral com tamanho de 14x10x7cm e sinal radiográfico de metástase pulmonar. Foi realizada ressecção cirúrgica e a avaliação histopatológica da massa que foi compatível com osteossarcoma condroblástico. A cadela veio a óbito 6 dias após o procedimento cirúrgico.

PALAVRAS-CHAVES neoplasia, tórax, metástase

EXTRASKELETICAL CHONDROBLASTIC OSTEOSARCOMA IN A BITCH: CASE REPORT

ABSTRACT

We report a case of a bitch, 13kg, with tumor in thoracic ventral region, 14x10x7cm diameter and radiographic signs of lung metastasis. Surgical excision was performed and a chondroblastic osteosarcoma was confirmed by histopathology. Patient died six days after surgery.

KEYWORDS: neoplasia, thoracic, metastasis

INTRODUÇÃO

Os osteossarcomas extraesqueléticos constituem uma neoplasia mesenquimal de tecidos moles que produzem osteóide, mas não envolvem osso ou perióstio, e são raros em cães (Langenbach et al., 1998). Tem sua localização descrita principalmente em tecido mamário, subcutâneo, fígado e baço (Dernell et al., 2007). Apresentam alto potencial metastático e comportamento biológico similar aos de localizações esqueléticas (Daleck et al., 2009).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de osteossarcoma condroblástico extraesquelético em cadela.

RELATO DE CASO

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná uma cadela sem raça definida de 13 kg, 8 anos de idade, não castrada, com histórico de neoformação em região torácica ventral com evolução de 8 meses e emaciação. Ao exame físico observou-se massa de consistência dura, aderida, com tamanho 14x10x7cm, em região torácica direita. A citologia, por meio de biópsia por agulha fina, sugeriu neoplasia mesenquimal maligna. O exame radiográfico de tórax evidenciou imagem sugestiva de múltiplas metástases pulmonares. Não foram observadas alterações relevantes na ultrassonografia abdominal e hemograma. Na avaliação bioquímica foi constatado aumento expressivo da enzima fosfatase alcalina.

Optou-se por realizar ressecção cirúrgica da massa associada à linfadenectomia axilar direita. O tumor pesou 3 kg e o diagnóstico histopatológico foi de osteossarcoma condroblástico subcutâneo com metástase em linfonodo axilar. A paciente veio a óbito 6 dias após o procedimento cirúrgico, a necropsia não foi autorizada.

DISCUSSÃO

O exame clínico da paciente sugere ausência de osteossarcoma esquelético como origem primária e, histologicamente, os osteossarcomas extraesqueléticos condroblásticos, verificado no presente caso, são os menos relatados em cães (Patnaik, 1990).

A paciente foi encaminhada tardiamente para atendimento, pois cerca de 25% de seu peso estava comprometido pela neoplasia. Segundo Araújo et. al. (2006) a procura precoce por tratamento, associada a cirurgia e quimioterapia, aumenta a expectativa de sobrevida do paciente com osteossarcoma extraesquelético e o tamanho da neoplasia contribui para pior prognóstico. O aumento expressivo da fosfatase alcalina sérica também corrobora com prognóstico ruim (Daleck et al., 2009).

Em um estudo que incluiu 14 cães com osteossarcoma ou condrossarcoma extraesqueléticos mais da metade dos animais foram submetidos a eutanásia no momento do diagnóstico e a média de sobrevida foi de apenas 23 dias (Patnaik, 1990), ressaltando a agressividade da neoplasia como verificada neste caso em que a paciente foi a óbito 6 dias após a ressecção cirúrgica.

A via metastática mais comum é a hematogêna sendo pulmão o órgão alvo (Daleck et al., 2009), no entanto foi identificada metástase em linfonodo axilar além da metástase pulmonar.

CONCLUSÃO

O osteossarcoma extraesquelético, apesar de pouco frequente, deve ser considerado no diferencial de tumores subcutâneos em cães e apresenta péssimo prognóstico.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, A.C.P.; GAIGA, L.H.; SEITZ, A.L.; DREIMEIER, D. Osteossarcoma extra-esquelético primário testicular em cão criptorquida. **Acta Scientiae Veterinariae**, v.34, n.2, p.197-200, 2006.
- DALECK, C.R.; REPETTI, C.S.F.; MARTINS, M.R.; DE NARDI, A.B. Neoplasias Ósseas. In: DALECK, C.R.; DE NARDI, A.B.; RODASKI, S. **Oncologia em Cães e Gatos**. São Paulo: Roca, 2009, cap.27, p.399-410.
- DERNELL, W.S.; EHRHART, N.P.; STRAW, R.C.; VAIL, D.M. Tumors of the Skeletal System. In: Withrow, S.J.; VAIL, D.M. **Small Animal Clinical Oncology**. St Louis: Elsevier, 2007. cap. 23, p.540-582, 2007.
- LANGENBACH, A.; ANDERSON, M.A.; DAMBACH, D.M.; SORENMO, K.U.; SHOFER, F.D. Extraskelatal osteosarcoma in dogs: a retrospective study of 169 cases (1986-1996). **Journal of the American Animal Hospital Association**, v.34, n.2, p.113-120, 1998.
- PATNAIK, A.K. Canine Extraskelatal Osteosarcoma and Chondrosarcoma: a Clinicopathologic Study of 14 Cases. **Veterinary Pathology**, v.27, n.1, p.46-55, 1990.

122. PRINCIPAIS AFECÇÕES EM CÃES IDOSOS DIANOSTICADAS EM UM LABORATÓRIO NO PERÍODO DE 2000 a 2010

Letícia Fontoura Moreira¹ ; Cristina Gevehr Fernandes²

¹ Universidade Federal do Rio Grande do Sul – le.mvet@gmail.com

² Laboratório Regional de Diagnóstico da Universidade Federal de Pelotas (LRD-UFPeI)

RESUMO

Esse trabalho objetivou detectar as afecções mais freqüentes em cães maiores de 6 anos de idade. Realizou-se um levantamento da casuística de biopsias e necropsias do laboratório de diagnósticos desde o ano 2000 até 2011, considerando-se cães a partir de 6 anos de idade. Foram totalizados 2610 (dois mil seiscentos e dez) registros. Os cães foram separados em três faixas etárias: de 6 à 11 anos, de 12 à 17 anos e acima de 18 anos; dentro destas, ainda foram divididos em machos e fêmeas. Buscou-se detectar a afecção mais freqüente para cada faixa etária e para cada sexo.

Palavras chave: gerontologia, caninos, diagnóstico, doenças

OLDER DOGS MOST FREQUENT DISEASES AT A DIAGNOSTIC LABORATORY DURING THE PERIOD OF 2000 to 2010

ABSTRACT

This study aimed to evaluate the most frequent diseases in dogs older than 6 years. Diagnostic results from necropsies and biopsies were retrieved from the casuistic dogs diagnosed at the laboratory of diagnostics, during the period of 2000 to 2011. It were obtained 2610 cases and the dogs were layered in 3 ranges: 6 to 11 years, 12 to 17 years and older than 18 years. Each age group was divided into sex groups. The most frequent disease according age and sex group was detected.

KEYWORDS: gerontology, dogs, diagnostic, diseases

INTRODUÇÃO

O processo de envelhecimento está cada vez mais evidente e presente na rotina veterinária, os pacientes necessitam cada vez mais de uma atenção especial

por sua idade avançada. Apesar disso, pouco se sabe no campo de gerontologia veterinária. Buscando alguns esclarecimentos, desenvolvemos uma pesquisa com a finalidade de descobrir os diagnósticos mais freqüentes de cães mais velhos, através da análise dos resultados de avaliações histopatológicas ou de necropsias.

MATERIAL E MÉTODOS

Para tanto, foram analisados todos os laudos de diagnósticos dados a esses cães, no período de 2000 a 2011. Foram detectados 2610 casos. Os animais foram divididos em faixas etárias com intervalos de 5 anos cada, e dentro destas faixas subdivididos em machos e fêmeas. As faixas referidas são: de 6 a 11 anos, de 12 a 17 anos e de 18 anos em diante.

RESULTADOS

Figura 1 – Afecções mais freqüentes em caninos com idade de 6 a 11 anos. A) Diagnósticos em fêmeas e B) em machos.

Figura 2 – Afecções mais freqüentes em caninos com idade de 12 a 17 anos. A) Diagnósticos em fêmeas e B) em machos.

Figura 3 – Afecções mais freqüentes em caninos com idade superior a 18 anos. A) Diagnósticos em fêmeas e B) em machos.

DISCUSSÃO

Foi possível verificar que os neoplasmas predominam nas diversas faixas etárias, independentemente. Sabe-se que os animais idosos são mais acometidos por doenças neoplásicas que os mais jovens (Meuten, 2002; Withrow, 2007). Dentre os neoplasmas predominaram os carcinomas, sendo que seus tipos diferem entre os sexos. Verificou-se que os tipos de carcinomas mais freqüentes em fêmeas foram os mamários e em machos os de células escamosas e os de glândulas perianais. No entanto a partir dos 18 anos não se definiu nenhum padrão predominante.

CONCLUSÃO:

Como os diagnósticos foram bastante variáveis, não foi possível estabelecer até o momento, nenhum percentual significativo.

REFERÊNCIAS:

- MEUTEN, D.J. **Tumors in domestic animals**. Iowa State Press, 4th ed., 2002, p.575-606.
- WITHROW, S.J. Why worry about cancer in pets? In: WITHROW, S.J.; MacEWEN, E.G. **Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology**, St. Louis: Saunders, 4th ed., 2007. p. xv-xvii.

123. QUIMIOTERAPIA NEO-ADJUNVANTE, SEGUIDA DE REMOÇÃO CIRÚRGICA E QUIMIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA NO TRATAMENTO DE MASTOCITOMA DE LÍNGUA EM CÃO – RELATO DE CASO

Débora Cavalcante Nascimento¹, Adamas Tassinari Bonfada², Débora Passos Hinojosa Schaffer¹, Fernanda Magalhães Aguiar³, Morgana Nascimento Freire¹

1. Médico veterinário do Programa de Residência da União Metropolitana para o Desenvolvimento de Educação e Cultura (UNIME).
2. Professor de Cirurgia da UNIME - BA.
3. Aluna de graduação da UNIME.

RESUMO

O acometimento de mastocitoma na língua é uma ocorrência rara. Esse trabalho tem como objetivo relatar o uso da quimioterapia neo-adjuvante no tratamento de mastocitoma na língua de um cão da raça doberman com 10 anos de idade. Foi realizada biópsia incisional, que serviu para confirmação histopatológica de mastocitoma pouco diferenciado. O tratamento quimioterápico associando lomustina com prednisolona previamente e após a cirurgia permitiu a ressecção do tumor com margem adequada e foi considerado eficiente em um caso de mastocitoma na língua de um cão.

Palavras chaves: Lomustina, glossectomia, língua

CHEMOTHERAPY NEO-ADJUNVANTE, FOLLOWED BY SURGICAL REMOVAL AND POSTOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN THE TREATMENT OF DOG IN LANGUAGE MASTOCYTOMA - CASE REPORT

ABSTRACT

The involvement of mast cell tumor on the tongue is a rare occurrence. This paper aims to report the use of neoadjuvant chemotherapy in the treatment of mast cell tumor in the tongue of a dog breed doberman with 10 years of age. Incisional biopsy was performed, which served for histopathological confirmation of poorly differentiated mast cell tumor. Lomustine Chemotherapy associating with prednisolone before and after surgery allowed tumor resection margin was

considered adequate and effective in a case of mast cell tumor in the tongue of a dog.

KEYWORDS: Lomustine, glossectomy, tongue

INTRODUÇÃO

O mastocitoma é definido como uma proliferação desordenada de mastócitos (Morris & Dobson, 2001), e o acometimento da língua em cão é raro (Daleck *et.al.*, 2007). O mastocitoma ocorre principalmente em cães com idade entre 8 e 9 anos, no entanto há relatos em cães com idade entre 3 semanas até 19 anos de idade. Os sinais clínicos de neoplasias na língua incluem dificuldade em apreensão do alimento, mastigação e deglutição, excesso de salivação, halitose (Morris & Dobson, 2001), dispnéia, anorexia, perda de peso (Withrow & MacEwen, 2007) e hemorragias (Carpenter *et al*) . O método de diagnóstico para definição do tratamento e prognóstico é a biópsia, incisional ou excisional. Dentre as opções de tratamento a glossectomia deve ser sempre uma alternativa (Morris & Dobson, 2001; Withrow & MacEwen, 2007), porém há necessidade de definir a graduação do tumor e planejamento adequado, incluindo protocolos quimioterápicos que podem aumentar a expectativa de vida (Morris & Dobson, 2001; Carpenter *et al*). O objetivo deste trabalho é relatar o uso quimioterapia neo-adjuvante seguida de remoção cirúrgica e com quimioterapia pós-operatória como tratamento de mastocitoma na língua de um cão.

RELATO DE CASO

Um cão macho, dobermann, com 11 anos de idade, 42 kg de peso corporal foi atendido com um nódulo ulcerado e multilobulado em região dorsal no terço aboral da língua, medindo cerca de cinco cm de diâmetro e que havia sido observado há cerca de um mês pelo proprietário. Foram coletados pré-cirúrgicos (hemograma, uréia, creatinina, ALT e FA) e radiografia torácica, em duas incidências não evidenciou anormalidades. Foi realizada biópsia incisional e a amostra foi encaminhada para análise histopatológica concluindo mastocitoma. O tratamento quimioterápico neo-adjuvante foi instituído com a associação de prednisolona e lomustina, seguindo o protocolo: prednisolona na dose de 1mg/kg/VO/14 dias, seguida de 0,5mg/kg/14 dias, conjuntamente com a lomustina (50mg/m²/VO) a cada 21 dias. Após a terceira sessão houve remissão de 75% do tumor. O paciente foi

submetido à ressecção do tumor com margem de 1,5 cm. A síntese foi feita com pontos em Swift utilizando-se fio de poliglactina 910, nº 3-0. Após a cirurgia o paciente foi submetido a outras três sessões quimioterápicas de lomustina associadas à prednisolona. A função hepática foi avaliada periodicamente após as sessões de quimioterapia sendo prescrito silimarina na dose de 8mg/kg/VO/TID, para evitar aumento das enzimas ALT e FA, durante todo período de tratamento.

O animal foi avaliado a cada 60 dias após o fim do tratamento, sem evidências de recidivas na língua, em linfonodo e em radiografia torácica, decorridos 15 meses após atendimento inicial.

DISCUSSÃO

Um dos fatores predisponentes para o aparecimento do mastocitoma é a idade, que corresponde à faixa etária considerada por alguns autores (Withrow e MacEwen, 2007), porém não havia sinais de desconforto, apesar do tamanho do tumor e da sua localização que para alguns autores pode significar halitose, disfagia e dor (Bichard e Sherding, 2008). O laudo histopatológico da biópsia foi definitivo para o prognóstico e para a escolha do tratamento. A cirurgia é indicada para os mastocitomas (Carpenter *et al*), assim optou-se pela quimioterapia neo-adjuvante conforme sugerido por alguns autores (Rodaski *et. al.*, 2008) para evitar necessidade de ressecção de mais de 60% da língua. As características microscópicas do laudo histopatológico indicaram grau II de malignidade do tumor o que justificou a escolha deste protocolo, inclusive no pós-operatório, considerando indicação de alguns autores (Withrow e MacEwen, 2007). O animal não apresentou efeitos colaterais, com exceção da hepatotoxicidade da lomustina, com aumento nos níveis de ALT, que foi controlado com o uso da silimarina. Foram realizados exames citológicos dos linfonodos submandibulares após 60 dias do final da quimioterapia, bem como estudo radiográfico do tórax, porém não foi encontrado evidência de recidivas ou metástases, decorridos 15 meses a partir do primeiro atendimento.

CONCLUSÃO

A partir dos dados apresentados conclui-se que o uso da prednisolona associado à lomustina como quimioterapia neo-adjuvante associado à remoção do tumor com margem de segurança e quimioterapia pós-cirúrgica foi eficaz no tratamento do mastocitoma na língua de um cão.

REFERÊNCIAS

- DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. ; SILVA, M. C. V.; EURIDES, D.; DA SILVA, L. A.. F. Neoplasia de Lingual em Cinco Cães. *Ciência Rural*, Santa Maria, v.37, n.2, p.578-582, mar-abr, 2007.
- MORRIS, J. & DOBSON, J. *Small Animal Oncology*. 1 ed. Blackwell Science, 2001.
- WITHROW, S.J.; MacEWEN, E.G. *Small Animal Clinical Oncology* 4 ed. Philadelphia: Saunders, pp. 455 – 475. 2007.
- BICHARD, S.J. SHERDING, R.G. *Manual Saunders - Clinica de Pequenos Animais*. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008.
- CARPENTER, L.G. *et al.* Squamous cell carcinoma on the tongue in 10 dogs. *J Am Anim Hosp Assoc*, v.29, p.17-24, 1993.
- RODASKI, S.; DE NARDI, A. B.; PIEKARK, C. H. Quimioterapia Antineoplásica. In: DALECK, C.R. *et al.* *Oncologia em cães e gatos*. São Paulo: Roca, 2008. cap. 9 p. 162-163.

124. TRATAMENTO COM SULFATO DE VINCRISTINA E POSTERIOR RESSECÇÃO DE ADENOCARCINOMA ANORRETAL EM UM CANINO - RELATO DE CASO

Pollyana Irene Baltazar¹; Natália Silva Leite¹; Nhirneyla Marques Rodrigues²; Videlina Rodrigues De Sousa³; Francisca Barros Bezerra⁴; Francisco Lima Silva⁵

1. Residente em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí (HV/UFPI), Teresina, Piauí, Brasil.
2. Mestranda, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, UPFI.
3. Médica Veterinária autônoma.
4. Médica Veterinária, HVU/UFPI.
5. Professor do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária, UFPI.

RESUMO

Foi atendido no Hospital Veterinário (HV) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), um cão, macho, poodle, 12 anos, apresentando prolapso retal de uma massa avermelhada, friável e hemorrágica. O animal apresentava hematoquezia e tenesmo. Após realização de exame físico do animal e solicitação exames complementares, foi diagnosticado adenocarcinoma anorretal. Optou-se por tratamento cirúrgico e quimioterápico utilizando sulfato de vincristina (de 0,025 mg/kg via intravenosa).

PALAVRAS-CHAVE: cão, cirurgia, oncologia

TREATMENT WITH VINCRISTINE SULFATE AND SUBSEQUENT RESECTION OF ANORECTAL ADENOCARCINOMA IN A CANINE - A CASE REPORT

ABSTRACT

Was attended Hospital Veterinário (HV) of the Universidade Federal do Piauí (UFPI), a male dog, poodle, 12 years, with a rectal prolapse of a mass reddish, friable and hemorrhagic. The animal showed hematochezia and tenesmus. After conducting a physical examination of the animal and request for additional tests, anorectal adenocarcinoma was diagnosed. We opted for surgical treatment and chemotherapy using vincristine sulfate (0.025 mg / kg intravenously).

KEYWORDS: dog, surgery, oncology

INTRODUÇÃO

No cão, cita-se que cerca de 60% das neoplasias do trato alimentar correspondam a tumores do intestino grosso e 45% destes apresentam malignidade, sendo o adenocarcinoma retal o mais comumente encontrado (Walshaw, 1996). Este tipo de neoplasia acomete principalmente animais idosos e machos (Church, 1987), existindo uma maior predisposição nas raças poodle e pastor alemão (Walshaw, 1996). Os sinais clássicos associados à neoplasia retoanal são: diarreia (mucoide), hematoquezia, tenesmo e disquesia. O diagnóstico é clínico, sugerindo-se a realização de exame retal digital e testes diagnósticos complementares: citológico e histopatológico, endoscopia, exame radiográfico do tórax e abdome, e possivelmente a radiografia de contraste (Church, 1987; Walshaw, 1996). Para o tratamento é de suma importância a avaliação do tipo de tumor e estágio da doença, de modo a determinar se há indicação de cirurgia, qual o tipo ressecção conveniente e se há necessidade de tratamento durante o acompanhamento, tais como: quimioterapia ou radioterapia (Matthiesen e Marretta, 1998).

RELATO DE CASO

Um canino, macho, poodle, 12 anos de idade, não castrado, foi atendido no Hospital Veterinário (HV) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), apresentando como queixa principal: prolapso de uma massa avermelhada, friável, com aspecto de couve-flor na região perianal. O animal apresentava histórico de hematoquezia e tenesmo, em razão disso estava sendo tratado para giardíase, os sinais clínicos persistiram e culminaram em prolapso da massa friável.

Ao exame clínico o animal apresentava tumoração de aspecto friável e hemorrágico na região perianal. Foi coletado sangue para exames de rotina, radiografia torácica e citológico da massa tumoral. Não foi evidenciado sinais de metástase e o laudo do exame citológico diagnosticou adenocarcinoma anorretal.

Foi instituído quimioterapia (sulfato de vincristina na dose de 0,025 mg/kg via intravenosa, com intervalos semanais) e mudança na alimentação. Após a 3ª aplicação do quimioterápico observou-se redução do prolapso, constatado através da palpação retal e exame radiográfico contrastado, onde o contorno do tumor reduziu em cerca de 70% de tamanho. Mesmo reduzido, o tumor tornou a prolapsar, optou-se então pela ressecção cirúrgica do tumor através de amputação da porção prolapsada do reto e orquiectomia do animal. O pós-operatório constou de

antibioticoterapia, antiinflamatório, analgésico, pomada cicatrizante e dieta pastosa. Uma semana após a cirurgia foi feita uma dose adicional de sulfato de vincristina.

DISCUSSÃO

A idade avançada, sexo e raça, como do cão do presente relato são condizentes como os dados epidemiológicos deste tipo de neoplasia (Church, 1987; Walshaw, 1996). A técnica de ressecção cirúrgica utilizada condiz com o que se preconiza nas cirurgias oncológicas, onde é removida a massa tumoral e uma margem de tecido de segurança (Daleck e Rodaski, 2008), no caso em questão foi amputado uma porção da ampola retal, na qual o tumor estava localizado, procedimento semelhante a outros relatos de caso. Além do uso neste tipo de neoplasia, o sulfato de vincristina é utilizado terapeuticamente nos casos de tumor venéreo transmissível, enfermidades linfo e mieloproliferativas, carcinomas e sarcomas diversos (Andrade, 2002; Viana, 2007), apresentando bons resultados. São citados efeitos colaterais decorrentes da quimioterapia, no entanto, os mesmos não foram apresentados pelo paciente.

CONCLUSÃO

O êxito no tratamento do paciente pôde ser determinado pela associação da quimioterapia antineoplásica a base de sulfato de vincristina com o procedimento cirúrgico, resultando na notável melhora do quadro clínico do animal, consequentemente na sua qualidade de vida e bem-estar.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, S. F. Terapêutica antineoplásica. In: _____. **Manual de terapêutica veterinária**. 2 ed. São Paulo: Roca, 2002. p. 180-198.
- CHURCH, E. M. et al. Colorectal adenocarcinoma in dogs: 78 caes (1973-1984). **Journal American Veterinary Medical Association**. v. 191, n. 6, p. 727-30, 1987.
- DALECK, C. R.; RODASKI, S. Cirurgia oncológica. In: DALECK, C. R.; DE NARDI, A. B. **Oncologia em cães e gatos**. São Paulo: roca, 2008. p.151-160. Cap. 8.
- MATTHIESEN, D. T.; MARRETTA, S. Afecções do ânus e reto. In: Slatter, D. **Manual de cirurgia de pequenos animais**. 2 ed. São Paulo: Manole Ltda. 1998, p.760-779.

WALSHAW, R. Remoção de neoplasias retoanais. In: BOJRAB, M. J. **Técnicas atuais em cirurgia de pequenos animais**. São Paulo: Roca, 1996. p. 260-275.

VIANA, F. A. B. **Guia terapeutico veterinário**. 2. ed. Lagoa Santa: gráfica e editora CEM, 2007.

125. TRATAMENTO E PROGNÓSTICO DO CARCINOMA DE TIREOIDE CANINO RELATO DE DOIS CASOS

Sabrina M. Rodigheri¹, Kelly C.C.Choque¹, Palloma Rose²,
Eros I. SOUSA¹, Tatiana Giordano¹, Bruno Tammenhain³

¹Serviço de Clínica Médica e Cirúrgica do Hospital Veterinário Batel – Ctba/PR

²Hospital Veterinário da UFPR – Ctba/PR

³Serviço de Oncologia do Hospital Veterinário Garra – Ctba/PR

RESUMO

O presente relato descreve dois casos de carcinoma de tireoide folicular em cães apresentados para atendimento clínico com queixa de aumento de volume em região cervical ventral e sinais clínicos de hipotireoidismo. Ambos pacientes foram submetidos a tireoidectomia, reposição hormonal com levotiroxina e quimioterapia antineoplásica adjuvante. A sobrevida dos pacientes foi superior a relatada na literatura para carcinoma de tireóide aderido aos tecidos adjacentes.

PALAVRAS-CHAVES oncologia, neoplasias da tireóide, tireoidectomia

TREATMENT AND PROGNOSIS OF CANINE THYROID CARCINOMA – TWO CASES REPORT

ABSTRACT

This report describes two cases of follicular thyroid carcinoma in dogs presented for medical care with complaints of swelling in the neck ventral and clinical signs of hypothyroidism. Both patients underwent thyroidectomy, hormone replacement therapy with levothyroxine and anticancer chemotherapy adjuvant. Survival of patients was higher than reported in the literature for thyroid carcinoma adhered to adjacent tissues.

KEY WORDS: oncology, thyroid gland neoplasias, thyroidectomy

INTRODUÇÃO

As neoplasias da tireóide representam de 1 a 4% de todos os tumores caninos e frequentemente são observadas em cães com idade média de dez anos.

A etiologia destas neoplasias é desconhecida e as raças mais predispostas são Boxer, Beagle e Golden Retriever, sem predileção sexual (De Nardi *et al.*, 2009)

Os neoplasmas malignos representam de 50 a 70% dos tumores da tireóide e são classificados histologicamente em carcinomas foliculares ou parafoliculares. A maior parte dos carcinomas tireóideos caninos apresenta-se como uma massa de grande volume, invasiva, não funcional e com potencial metastático para linfonodos, pulmão, fígado e ossos (De Nardi *et al.*, 2009)

O objetivo deste trabalho é relatar a ocorrência de dois casos de carcinoma de tireoide em cães, enfatizando as modalidades terapêuticas e o prognóstico dos pacientes.

RELATO DE CASO

Foram atendidos dois animais sem raça definida, uma fêmea com 7 anos (P1) e um macho com 11 anos de idade (P2), com queixa de aumento de volume em região cervical ventral, com evolução aproximada de 30 dias. Ambos apresentavam histórico de letargia, termofilia e piodermite recorrente.

Ao exame físico constatou-se, em ambos os pacientes, a presença de um tumor isolado, bem circunscrito, de consistência firme, aderido aos tecidos adjacentes e localizado em região tireoidiana. Foi realizada ultrassonografia da região cervical que demonstrou aumento unilateral de lobo tireoidiano, com ecogenicidade heterogênea e vascularização intensa. O lobo contralateral se apresentava diminuído de tamanho. Os dois pacientes apresentavam concentrações séricas reduzidas do hormônio tireoidiano mensuradas pelo método de radioimunoensaio. Não foram detectadas alterações metastáticas em radiografia de tórax e ultrassonografia de abdômen. O estadiamento das neoplasias de ambos pacientes foi definido como T_{3b}N₀M₀.

Os animais foram submetidos a tireoidectomia e paratireoidectomia unilateral com exereses da veia jugular em decorrência das aderências tumorais em P1. Ambos apresentaram hipocalcemia transitória no pós-operatório imediato. As amostras tumorais foram encaminhadas para análise histopatológica e resultaram no diagnóstico de carcinoma de tireóide folicular compacto bem diferenciado. No pós-operatório iniciou-se a reposição hormonal com levotiroxina e quimioterapia antineoplásica com doxorubicina (30mg/m² – IV – a cada 21 dias) em P1 e carboplatina (300mg/m² – IV – a cada 21 dias) em P2, sendo realizadas quatro

sessões. Até o presente momento, P1 apresenta dois anos e P2 dez meses de sobrevida, sem sinais de recidiva local ou metástases distantes.

DISCUSSÃO

Cerca de 60% dos cães com carcinoma de tireoide são eutireoideos e 10% hipertireoideos. Baixas concentrações hormonais, observadas nos casos referidos, podem ser secundárias a destruição da glândula pelo tumor e ocorrem em 30% dos pacientes (North e Banks, 2009).

A remoção cirúrgica dos carcinomas é difícil em razão da natureza invasiva e vascularização acentuada, mas deve ser considerada quando metástases não são detectadas (De Nardi *et al.*, 2009). A artéria carótica, a veia jugular e o tronco vasosimpático podem ser removidos cirurgicamente sem que ocorra morbidade significativa quando há apenas envolvimento unilateral, conforme observado em P1. 70% dos pacientes com carcinomas de tireoide não aderidos apresentam sobrevida de dois anos após tireoidectomia, entretanto, em carcinomas aderidos somente 5% dos pacientes chegam a 1 ano de sobrevida (North e Banks, 2009).

A quimioterapia antineoplásica adjuvante é indicada nos carcinomas de tireoide com o objetivo de evitar recidivas locais e metástases a distância. Entre as possibilidades de antineoplásicos estão a doxorrubicina e a cisplatina. No presente estudo optou-se pela utilização da carboplatina em decorrência do menor potencial nefrotóxico quando comparada a cisplatina (De Nardi *et al.*, 2009).

CONCLUSÃO

Pacientes com carcinoma de tireoide folicular aderido aos tecidos adjacentes podem apresentar sobrevida superior ao descrito em literatura quando submetidos a tireoidectomia associada a quimioterapia antineoplásica adjuvante.

REFERÊNCIAS

- DE NARDI, A. B. et al. Neoplasias do sistema endócrino. In: DALECK, C.R.; DE NARDI, A. B.; RODASKI, S. **Oncologia em cães e gatos**. São Paulo: Roca, 2009. cap. 29, p.438-443.
- NORTH, S.; BANKS, T. Tumors of the endocrine system. In: NORTH, S.; BANKS, T. *Introduction to Small Animal Oncology*, Philadelphia: Saunders Elsevier, 2009, cap. 26, p. 264-266.

126. AGENESIA DE METACARPO, METATARSO E FALANGE EM DOIS CÃES – RELATO DE CASO

Simone Scherer¹, Pâmela Garcia de Almeida², Gabriela Lobo D'ávila², Kairuan
Camera Kunzler², Marcelo Meller Alievi³, Elaine Streda⁴

¹ Doutoranda da Faculdade de Veterinária (FAVET) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – simone.scherer9@hotmail.com

² Aluno de graduação da FAVET-UFRGS.

³ Professor Adjunto do Departamento de Medicina Animal da FAVET-UFRGS.

⁴ Médica veterinária autônoma.

RESUMO

Malformações ósseas em extremidades de membros de cães e gatos são incomuns e as mais relatadas envolvem alterações de rádio ou tíbia. Este trabalho tem por objetivo relatar de agenesia de metacarpos, metatarso e falanges em dois cães, com 30 dias de idade.

PALAVRAS-CHAVES hemimelia, canino, malformação congênita

AGENESIS OF METACARPUS, METATARSUS AND PHALANX IN TWO DOGS CASE REPORT

ABSTRACT

Skeletal malformations in the extremities of dogs and cats are uncommon and the most commonly reported involve radius or tibia. This work aims to report agenesia of metacarpus, metatarsus and phalanx bones in two dogs, with 30 days old.

Keywords: hemimelia, canine, congenital malformation.

INTRODUÇÃO

Malformações das extremidades ou partes delas são variadas em suas manifestações, desde a ausência de uma estrutura única até a ausência parcial ou total dos membros. Alterações como agenesia de rádio (Trevisan et al., 2001) associada ou não a ectrodactilia são as malformações de extremidade de membros mais comumente relatadas em cães e gatos na literatura (Ferreira et al., 2007; Oliveira et al. 2002), sendo que poucos são os relatos de hemimelia de metacarpo, metatarso e falanges sem envolvimento de rádio, ulna, tíbia e fíbula descritos nestas espécies. Este trabalho tem por objetivo relatar dois casos de agenesia em

extremidade de membros em cães.

RELATO DO CASO

Foram atendidos um cão, sem raça definida, fêmea, com 2 meses de idade e outro cão, macho, Border Collie, de 40 dias de idade. O primeiro, apresentava leve desvio varo das extremidades dos membros torácicos, e, ao exame clínico, apresentou hiperextensão bilateral da articulação do carpo (Fig. 1A). Na avaliação radiográfica do membro torácico esquerdo foi observada agenesia do quarto e quinto metacarpiano e falanges proximal, média e distal dos mesmos, enquanto o membro torácico direito apresentou agenesia de quinto metacarpiano esquerdo e falanges proximal, média e distal (Fig. 1B). O segundo caso apresentou ao exame clínico, leve desvio valgo do tarso direito (Fig. 1C). A avaliação radiográfica evidenciou agenesia do quarto metatarsiano e hipogenesia do terceiro e quarto metatarsianos, juntamente com agenesia das falanges proximais do terceiro e quarto dígitos (Fig. 1D). Em ambos os casos foi indicado o uso de órteses temporárias, radiografias controle mensais, até o término do crescimento dos pacientes e posterior correção cirúrgica através da artrodese das articulações acometidas. Foi indicado também posterior esterilização destes pacientes.

Figura 1- (A) caso 1, observe o desvio medial da extremidade dos membros torácicos e ausência de dígitos; (B) radiografia dorsopalmar dos membros torácicos do caso 1 demonstrando as alterações supracitadas; (C) caso 2, observe desvio lateral da extremidade do membro pélvico direito; (D) radiografia dorsoplantar da extremidade distal do membro pélvico direito demonstrando as alterações supracitadas.

DISCUSSÃO

Diferente das alterações de extremidade de membros relatada por Ferreira et al.(2007) e Oliveira et al. (2006) as alterações encontradas nos dois casos não estão associadas a ectrodactilia. Mas as alterações diagnosticadas foram agenesia e hipoplasia de metacarpos, metatarsos e falanges nestes cães.

O exame radiográfico foi fundamental para a confirmação das malformações,

como agenesia e hipoplasia dos metacarpos, metatarsos e falanges. Como a idade de diagnóstico foi precoce foram indicadas radiografias a cada 30 dias para melhor controle das alterações e possíveis consequências decorrentes das malformações.

A utilização temporária de órteses objetivou oferecer maior conforto a estes pacientes durante a deambulação e término do crescimento, devido a instabilidade articular dos metacarpos e metatarsos acometidos. A indicação de artrodese como método definitivo de estabilização articular corrobora com Frey e Williams (1995) e Innes et al. (2001) para casos mais graves de instabilidade decorrente de malformações e como técnica de salvamento do membro. A indicação de esterilização dos animais acometidos é justificada pelo provável caráter hereditário destas afecções (Frey e Williams, 1995).

CONCLUSÃO

Baseado nestes relatos, deve-se incluir na lista de diagnósticos das afecções dos membros locomotores de cães a agenesia de metatarso, metacarpo e falanges.

REFERÊNCIAS

FERREIRA, M.P.; ALIEVI, M.M.; BECK, C.A.C; et al. Ectrodactilia em cão: relato de caso. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.59, n.4, p.910-913, 2007.

FREY, M.; WILLIAMS, J. What is your diagnosis? (Ectrodactyly in a Chow Chow dog). **Journal of American Veterinary Medicine Association**, v.206, p.619-620, 1995.

INNES, J.F.; McKEE, W.M.; MITCHELL, R.A.S.; et al. Surgical reconstruction of ectrodactyly deformity in four dogs. **Veterinary Compendium of Orthopedics and Traumatology**, v.14, p.201-209, 2001.

OLIVEIRA, D.; ARTONI, S.M.B. Ectrodactillia em cão (*canis domestica*). **Ciência Rural**, Santa Maria, v.32, n.6, p.1063-65, 2002.

TREVISAN, L.; FERREIRA, M.P.; FREIRE, C.D.; et al. Hemimelia (agenesia) em rádio de cão - relato de caso. In: **XIII Salão de iniciação científica – UFRGS**, anais. Porto Alegre, Brasil, out 2001.

127. AVULSÃO DO LIGAMENTO CRUZADO CAUDAL E FRATURA DE SALTER-HARRIS TIPO I EM UM LOBO-GUARÁ (*Chrysocyon brachyurus*)

Willer Guimarães e Silva¹; Luís Guilherme de Faria¹; Leonardo Augusto Lopes Muzzi¹; Fernando Yoiti Kitamura Kawamoto¹; Filipe Curti¹; Rodrigo Barros¹.

1. Universidade Federal de Lavras / DMV - Igfaria.medvet@ymail.com;

RESUMO Descreve-se o caso de um Lobo-Guará (*Chrysocyon Brachyurus*) que, após trauma automobilístico, apresentou no membro pélvico direito avulsão do ligamento cruzado caudal (LCCa) e fratura de Salter Harris tipo I da tíbia. O tratamento cirúrgico consistiu na remoção do LCCa rompido e confecção de duas suturas extracapsulares para estabilização da articulação. O animal apresentou rápido retorno da função articular, fator importante na recuperação de animais silvestres.

PALAVRAS-CHAVE: Lobo-guará, Ligamento cruzado caudal, Articulação do Joelho

AVULSION OF THE CAUDAL CRUCIATE LIGAMENT AND SALTER-HARRIS TYPE I FRACTURE IN A MANED WOLF (*Chrysocyon Brachyurus*)

ABSTRACT A free-ranging maned wolf (*Chrysocyon Brachyurus*), after vehicular trauma, showed in the right hindlimb avulsion of the caudal cruciate ligament (CCL) and Salter-Harris type I fracture in the tibia. Surgical treatment consisted of excision of the ruptured CCL and making two extracapsular sutures for joint stabilization. The animal showed rapid return of joint function, an important factor in the recovery of wild animals.

KEYWORDS: Maned Wolf, Caudal cruciate ligament, Stifle joint

INTRODUÇÃO

O Ligamento Cruzado Caudal (LCCa) atua na prevenção do deslocamento caudal da tíbia e impede sua rotação interna em relação ao fêmur (Sumner et al., 2010). Relatos de ocorrências da ruptura isolada desse ligamento são raros (Soderstrom et al., 1998). A ruptura do LCCa está associada à lesão do menisco medial e à ruptura dos ligamentos colateral medial, colateral lateral e cruzado cranial (Harrari, 1993; Piermattei et al., 1998). Sumner et al. (2010) apontaram a ruptura do

ligamento cruzado cranial como um importante fator predisponente à ruptura do LCCa. A fratura por avulsão da região fisária proximal da tíbia acomete animais em fase de crescimento, sendo que este tipo de fratura pode acometer os ligamentos cruzados e os colaterais (McLaughlin, 1993). Fossum (2008) associou a ocorrência de fraturas fisárias tibiais proximais de Salter tipos I e II às lesões dos ligamentos colaterais.

Devido à baixa ocorrência de lesões ou rupturas do LCCa em canídeos, relata-se um caso de fratura por avulsão do LCCa associada a fratura Salter Harris tipo I em Lobo-Guará (*Chrysocyon Brachyurus*) decorrente de trauma por veículo automotor.

RELATO DE CASO

Foi atendido no Hospital Veterinário, vítima de trauma automobilístico, um Lobo-Guará. Após contenção química com cetamina (15mg/kg) e midazolam (0,5mg/kg), realizaram-se os exames físicos, ortopédicos e radiográficos. À manipulação da articulação fêmoro-tíbio-patelar (FTP) do membro pélvico direito constatou-se presença do movimento de gaveta caudal da tíbia em relação ao fêmur. A imagem radiográfica, na projeção mediolateral, revelou a presença de um pequeno fragmento ósseo na região caudal da superfície do platô tibial e deslocamento caudal da tíbia. Na projeção craniocaudal, visibilizou-se fratura fisária proximal da tíbia com mínimo deslocamento ósseo. Realizou-se a artrotomia da articulação FTP para a remoção do LCCa e do pequeno fragmento ósseo. Não foram constatadas outras alterações articulares. Observou-se uma fissura, abaixo da cabeça da fíbula, a qual fora fixada com um parafuso de osso cortical. Após a limpeza intra-articular com solução fisiológica, foi realizada a capsulorrafia. Para a estabilização articular e anulação do movimento de gaveta caudal foram realizadas duas suturas extra-articulares, uma entre o ligamento patelar e a cabeça da fíbula e outra entre o ligamento patelar e o côndilo medial da tíbia, sendo utilizado fio de nylon de 0,8mm. O espaço subcutâneo foi reduzido e a dermorrafia realizada conforme técnicas de rotina. No período pós-operatório o animal permaneceu em repouso com bandagem tipo Robert Jones por três semanas. Aos 30 dias, no exame ortopédico, verificou-se a ausência de movimento de gaveta caudal ou qualquer alteração na articulação operada. Notou-se neste período, a recuperação da capacidade do animal em apoiar o membro durante as atividades de manejo.

DISCUSSÃO

Neste caso, de acordo com Harari (1993), realizou-se como tratamento da fratura por avulsão do LCCa a retirada do fragmento ósseo e do LCCa. O autor sugere a estabilização extracapsular da articulação FTP quando o tamanho do fragmento ósseo apresenta-se reduzido impossibilitando sua fixação no platô tibial. Segundo Piermattei et al. (2009), o LCCa caracteriza-se por ser mais robusto quando comparado ao LCCr, o que o torna mais resistente à ruptura e propício a avulsão após trauma violento.

McLaughlin (1993) afirmou que fraturas de Salter Harris em placa de crescimento proximal de tibia são incomuns. No entanto, no presente relato é possível observar o discreto deslocamento do platô tibial em relação ao fêmur diagnosticando-se, portanto, fratura de Salter-Harris tipo I em região de epífise proximal de tibia. Devido ao discreto deslocamento da fratura observada neste caso, optou-se em tratá-la como preconizado por Piermattei et al. (2009) que sugerem o uso de bandagem e repouso por três semanas nos casos simples deste tipo de fratura.

CONCLUSÃO:

Neste caso observou-se resultado satisfatório após a excisão do LCCa e do fragmento ósseo e a utilização de técnica extracapsular. A estabilidade articular proporcionada pelas suturas extracapsulares mostrou-se eficaz na anulação do movimento de gaveta caudal. O tratamento conservador para a fratura de Salter-Harris tipo I proporcionou devida reparação óssea, fator de extrema importância quando se trata de um animal silvestre, espécie considerada em extinção e que possui considerável importância na manutenção do bioma do cerrado brasileiro.

REFERÊNCIAS

- SODERSTROM, M. J.; ROCHAT, M. C.; DROST, T. Radiographic diagnosis: Avulsion fracture of the caudal cruciate ligament. **Veterinary Radiology & Ultrasound**, v. 39, n. 6, p. 536-538, 1998.
- SUMNER, J. P.; MARKEL, M. D.; MUIR, P. Caudal cruciate ligament damage in dogs with cranial cruciate ligament rupture. **Veterinary Surgery**, v. 39, n. 8, p. 936-941, 2010.
- HARARI, J. Caudal cruciate ligament injury. **The Veterinary Clinics of North America**, v. 23, n. 4, p. 821-829, 1993.

MCLAUGHLIN, R. J.; Intra-articular stifle fractures and arthrodesis. **The Veterinary Clinics of North America**, v. 23, n. 4, p. 877-895, 1993.

FOSSUM, T. W. **Cirurgia em pequenos animais**. 3. ed. Rio de Janeiro. Elsevier, 2008. 1606p.

PIERMATTEI, D. L.; FLO, G. L.; DECAMP, C. E. **Ortopedia e tratamento de fraturas de pequenos animais**. 4 ed. Barueri: Manole, 2009, 934p.

128. CALCIFICAÇÃO DO TENDÃO SUPRA-ESPINHOSO EM CÃO

RELATO DE CASO

Simone Scherer¹, Pâmela Garcia de Almeida², Aline Gouvêa¹, Marcelo Meller Alievi³,
Ingrith Santarosa⁴, Elaine Streda⁴

¹ Doutoranda do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Veterinária (FAVET) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) – simone.scherer9@hotmail.com

² Aluna da graduação da FAVET-UFRGS

³ Professor Adjunto do Departamento de Medicina Animal da FAVET-UFRGS.

⁴ Médica Veterinária autônoma.

RESUMO

Descreve-se um caso de calcificação do tendão do músculo supra-espinhoso em um cão da raça Pitbull, 3 anos de idade, que foi diagnosticado através de exame físico, radiográfico e ultrassonográfico. Após tratamento clínico sem resposta adequada, foi realizado procedimento cirúrgico com remoção da região calcificada. Após dois meses da cirurgia o animal apresenta uso adequado do membro torácico, sem episódios de claudicação.

PALAVRAS-CHAVES tendinose, ombro, canino

CALCIFICATION OF THE SUPRAESPINATUS TENDON IN ONE DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

This work describes a case of calcification of the supraspinatus tendon in a three-year-old Pitbull dog. The case was diagnosed by physical examination, radiography and ultrasonography. After clinical treatment without response, a surgical procedure was performed for removal of calcified material. Two months after surgery the animal shows normal use of the thoracic limb, without episodes of lameness.

Keywords: tendinosis, shoulder, canine

INTRODUÇÃO:

A tendinose do supra-espinhoso é uma afecção degenerativa, pouco comum que acomete normalmente cães adultos de raças grandes. A causa ainda

permanece desconhecida e muitos cães apresentam calcificação bilateral, mas claudicação unilateral. O diagnóstico deve ser feito após exclusão de outras causas de claudicação no membro torácico (Piermattei et al., 2000). O presente relato tem como objetivo descrever um caso de calcificação do tendão supra-espinhoso em um cão adulto da raça Pitbull.

RELATO DO CASO

Foi atendido um cão, Pitt Bull, fêmea, castrada, 3 anos de idade, com histórico de claudicação discreta do membro torácico esquerdo há dois meses. O exame físico não evidenciou algia à palpação ou a hiperextensão da articulação escápulo-umeral, nem outra região do membro afetado. Não houve resposta a terapia com antiinflamatórios e repouso. Foram realizadas radiografias mediolaterais e tangenciais (Fig. 1), assim como ultrassonografia (Fig. 2) das duas articulações escápulo-umerais, que confirmaram calcificação do tendão do músculo supra-espinhoso bilateralmente. Diante da exclusão de outras causas de claudicação e dos achados radiográficos e ultrassonográficos optou-se pela remoção cirúrgica da calcificação. Aos 30 dias de pós-operatório a paciente teve melhora, mas ainda apresentava claudicação leve, principalmente após exercício intenso. Aos 60 dias de pós-operatório o animal apresentou normalidade deambulatória durante o trote e corrida.

Figura 1- (A) Radiografia tangencial do ombro esquerdo do cão e (B) ultrassonografia da referida articulação demonstrando a calcificação do tendão supraespinhoso (seta)

DISCUSSÃO

A idade de ocorrência, assim como o histórico e sinais clínicos apresentados pelo canino deste estudo corroboram com Piermattei et al. (2009) que descreveram sobre esta afecção. A realização de radiografias em projeção flexionada como as realizadas neste caso fornecem detalhes do sulco intertubercular e permite a

distinção quanto à localização da calcificação, se no tendão do bíceps braquial ou do supra-espinhoso (Piermattei et al., 2000). A avaliação tendínea por ultrassonografia permite a diferenciação da lesão em ruptura, presença de tecido cicatricial, abscesso, inflamação e calcificação. Quando associada a radiografia tangencial do ombro descarta a necessidade de outro exame mais invasivo como a artrografia contrastada e artroscopia, ou mais oneroso como ressonância magnética Mistieri, (2009).

O manejo clínico inclui restrição de exercícios, antiinflamatórios não esteroidais e fisioterapia com *shockwave* (Venzin et al., 2004). O tratamento cirúrgico é pouco realizado e sua aplicação ainda é discutida por muitos autores devido a apresentação bilateral da calcificação na maioria dos casos, apesar da sintomatologia ser unilateral. Assim como neste caso, Gaiga et al., (2007) realizaram o tratamento cirúrgico descrito por Piermattei et al., (2000) em um canino da raça Boxer acometido por esta afecção e obtiveram melhora clínica.

CONCLUSÃO

No presente caso, o método diagnóstico e o tratamento cirúrgico foram efetivos a despeito de toda discussão sobre o tratamento ideal desta afecção.

REFERÊNCIAS

MISTIERI, M.L.A.; KAMER, M. et al. Tendinose do supra-espinhoso em cães. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 30, n. 3, p. 693-700, 2009.

PIERMATTEI, D.L.; FLO, G.L. et al. A articulação escapuloumeral. In: **Ortopedia e tratamento de fraturas em pequenos animais**. 4ª. Ed, SP: Manole, 2009. Cap. 10, p. 319-24.

VENZIN, C.; OHLERTH, S. et al. Extracorporeal shockwave therapy in a dog with chronic bicipital tenosynovitis. **Schweiz Archiv Tierheilkunde**, Band 146, Heft 3, p. 136-141, 2004. Disponível em: <
http://dkoch.ch/xp_wysiwyg_media/Publikationen/Venzin_Ohlerth_Koch_Spreng_EC_SW_SAT_2004.pdf> Acesso em: 15/12/2010.

GAIGA, L. H.; VOLL, J. et al. Calcificação do tendão do músculo supra-espinhal em cão – relato de caso. **Acta Scientiae Veterinariae**. 35 (supl. 4), p.1403-04, 2007.

129. OSTEOSÍNTESE COM PLACA MINIMAMENTE INVASIVA EM FRATURA COMINUTIVA DA DIÁFISE TIBIAL EM CÃO: RELATO DE CASO

Benito Juarez Nunes Alves de Oliveira¹, Larissa Graziella Caixeta de Lima²,
Luiz Gustavo Florêncio³, Nadson Fernandes de Castro⁴,
Luiz Augusto de Souza¹, Luiz Antônio Franco da Silva¹

¹ Universidade Federal de Goiás - EV/UFG. benito@ortoneurovet.com

² União Pioneira de Integração Social - UPIS

³ Universidade de Brasília - UnB

⁴ Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

RESUMO

A osteossíntese com placa minimamente invasiva é uma técnica cirúrgica que promove a estabilização de fraturas mediante a inserção de placas por pequenas incisões. Foi atendido um cão macho da raça Golden Retriever apresentando fratura cominutiva da diáfise tibial direita. Uma incisão medial foi realizada para a abordagem da epífise proximal e criado um túnel epiperiosteal até a epífise distal, sendo inserido uma placa bloqueada de 12 furos. Radiografias aos 32 e 75 dias demonstraram a formação do calo ósseo e novo osso cortical, respectivamente.

Palavras-chave: placa bloqueada, osteossíntese biológica, consolidação óssea

MINIMALLY INVASIVE PLATE OSTEOSYNTHESIS FOR DIAPHYSEAL TIBIAL COMMUNUTED FRACTURE IN A DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

Minimally invasive plate osteosynthesis is a surgical technique that making fracture stabilization through plate insertion by small incisions. Was attended a male dog Golden Retriever showing right diaphysis tibial comminuted fracture. Medial incision was performed to approach the proximal epiphysis, and an epiperiosteal tunnel was created until distal epiphysis. A 12 hole locked plate was used for stabilization and fixed with four screws proximally and three screws distally. Radiographic findings at 32 and 75 days showed fracture callus and new cortical bone, respectively.

Keywords: locked plate, biological osteosynthesis, bone healing

INTRODUÇÃO

Diversos métodos de estabilização têm sido desenvolvidos no tratamento de fraturas tibiais, e a redução aberta com fixação interna (ORIF) utilizando placas é a mais comumente praticada. Técnicas abertas facilitam a observação e redução dos fragmentos, porém devido ao trauma cirúrgico adicional, essa abordagem pode comprometer o suporte sanguíneo e colocar em risco a cicatrização óssea (Guiot e Déjardin, 2011). A osteossíntese com placa minimamente invasiva (MIPO) segue os princípios da osteossíntese biológica, ou seja, utiliza técnicas de redução fechadas ou indiretas; inserção das placas epiperiosteais mediante pequenas incisões e mínima dependência de implantes e enxertos (Tong e Bavonratanavech, 2007). O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de um cão com fratura cominutiva da diáfise tibial submetido à técnica de MIPO.

RELATO DE CASO

Um cão macho da raça Golden Retriever com dez meses de idade foi atendido com a queixa de não apoio do membro pélvico direito, bem como edema e crepitação. As imagens radiográficas látero-lateral e cranio-caudal revelaram uma fratura cominutiva da diáfise tibial direita, com formação de três esquírolas ósseas. Foi realizada abordagem medial da tibia mediante pequenas incisões na epífise próxima e distal, sem expor o foco de fratura. No fragmento proximal, após incisão na fáscia crural, foi criado um túnel até a epífise distal para inserção da placa óssea.

A redução da fratura foi realizada por tração, observando-se o correto alinhamento entre a patela, crista tibial e o osso calcâneo. Utilizou-se uma placa bloqueada de 3,5mm com 12 furos, fixada com quatro parafusos no fragmento proximal e três no distal. Radiografias foram realizadas nos dias 0, 32 e 75 dias do pós-operatório para avaliar a evolução da cicatrização óssea.

DISCUSSÃO

No caso relatado, observamos que a técnica MIPO se demonstrou versátil, de fácil execução e principalmente, realizada em tempo cirúrgico menor que outros métodos convencionais de fixação. Observou-se que o trauma aos tecidos moles adjacentes foi mínimo, reduzindo os riscos de infecções e danos vasculares à fratura. Segundo Nolte et al. (2005), a deficiência de tecidos moles na região da diáfise tibial aumentam a susceptibilidade à lesões vasculares, e podem explicar as

severas complicações relacionadas as fraturas tibiais cominutivas. Para Schmökel et al. (2007), os modelos de placas não afetam a vascularização óssea tanto quanto os traumas relacionados ao acesso cirúrgico, e ressalta a importância das abordagens minimamente invasivas na preservação da osteossíntese biológica. Ainda, o uso de placas bloqueadas, cuja função principal é estabilizar a fratura sem causar compressão excessiva ao periósteo, permite maior neovascularização no local da fratura em relação às placas compressivas (Kubiak et al., 2006). A técnica MIPO se demonstrou eficiente pelo rápido retorno à deambulação do paciente (15 dias), e complicações pós-operatórias não foram constatadas. Em um estudo, os tempos médios de reparação de fraturas tibiais por ORIF ou redução fechada e fixação externa foram de 87 e 69 dias, respectivamente (Dudley et al., 1997). Na avaliação radiográfica aos 32 dias, observou-se a reabsorção das esquirolas e formação do calo periosteal, sendo novo osso cortical constatado aos 75 dias após a cirurgia.

CONCLUSÃO

Contudo, concluímos que a MIPO deve ser recomendada no tratamento de fraturas cominutivas da diáfise tibial de cães e, em associação ao uso de placas bloqueadas, podem promover uma melhor reparação óssea quando comparado com as técnicas abertas de estabilização.

REFERÊNCIAS

- DUDLEY, M.; JOHNSON, A.L.; OLMSTEAD, M. et al. Open reduction and bone plate stabilization, compared with closed reduction and external fixation, for treatment of comminuted tibial fractures: 47 cases (1980–1995) in dogs. **Journal of American Veterinary Medical Association**, v.211, n.8, p.1008-1012, 1997.
- GUIOT, L.P.; DÉJARDIN, L.M. Prospective evaluation of minimally invasive plate osteosynthesis in 36 nonarticular tibial fractures in dogs and cats. **Veterinary Surgery**, v.40, n.2, p.171-182, 2011.
- KUBIAK, E.N.; FULKERSON, E.; STRAUSS, E. et al. The evolution of locked plates. **The Journal of Bone and Joint Surgery**, v.88, p.189-200, 2006.
- NOLTE, D.M.; FUSCO, J.V.; PETERSON, M.E. Incidence of and predisposing factors for nonunion of fractures involving the appendicular skeleton in cats: 18 cases **Journal of American Veterinary Medical Association**, v.226, p.77-82, 2005.

SCHMOKEL, H.G.; STEIN, S.; RADKE, H. et al. Treatment of tibial fractures with plates using minimally invasive percutaneous osteosynthesis in dogs and cats. **Journal of Small Animal Practice**, v.48, p.157-160, 2007.

TONG, G.O.; BAVONRATANAVECH, S. **Minimally Invasive Plate Osteosynthesis (MIPO)**. 1 ed. Davos, Switzerland, AO Publishing, 2007.

130. OSTEOSÍNTESE DE OLÉCRANO EM LOBO-GUARÁ (*Chrysocyon brachyurus*) – RELATO DE CASO

Rodrigo Barros¹, Leonardo Augusto Lopes Muzzi¹, Luciane dos Reis Mesquita¹,
Fernando Yoiti Kitamura Kawamoto¹, Filipe Curti¹, Luís Guilherme de Faria¹.

1. Universidade Federal de Lavras – guigo@veterinario.med.br

RESUMO

Um lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) foi diagnosticado com fratura do olécrano por consequência de traumatismo por automóvel. A osteossíntese do olécrano foi primeiramente realizada com o uso de placa de reconstrução e parafusos ósseos. Entretanto, devido às dificuldades de cuidados pós-operatórios, houve frouxidão e falha do implante. Submeteu-se o lobo à uma nova cirurgia, optando-se pelo uso de pinos de Kirschner associados a uma faixa de tensão com fio de cerclagem. O último método utilizado permitiu adequada redução óssea e posteriormente consolidação, comprovados por meio de exames ortopédicos e radiográficos.

PALAVRAS-CHAVES Lobo-guará, Fratura, Osteossíntese, Olécrano, Faixa de tensão

OLECRANON OSTEOSYNTHESIS IN A FREE-RANGING MANED WOLF (*Chrysocyon brachyurus*) – CASE REPORT

ABSTRACT

A free-ranging maned wolf (*Chrysocyon brachyurus*) was diagnosed with olecranon fracture, after overrunning by motor vehicle. Firstly, the osteosynthesis of the olecranon was performed with a reconstruction bone plate and screws. However, due to difficulties with post-operative care, there was implant laxity and failure. The wolf was submitted a new surgery with the use of Kirschner's pins associated with tension band wire. The last method allowed a proper fracture reduction and bone healing, supported by orthopedic and radiographic exams.

Key Words: Wolf, Fracture, Osteosynthesis, Olecranon, Tension band

INTRODUÇÃO

O lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) é uma espécie selvagem, sendo considerado o maior cánido da América do Sul (Rodrigues, 2002). O tecido ósseo (principalmente os ossos longos) se torna vulnerável às fraturas nos acidentes

automobilísticos, devido a grande força de impacto e a pouca massa muscular do animal (Boudrieau, 2007). A fratura do olécrano (ulna) pode ser classificada em extra ou intra-articular, sendo importante observar a preservação funcional da articulação ao se realizar o tratamento (Lewicky et al., 2008; Johnson, 2008). Dependendo do tipo de fratura, um animal pode apresentar desde um leve incômodo local até um membro afuncional, e em caso de um animal selvagem e de vida livre, pode significar além de sua liberdade, sua sobrevivência (Rodrigues, 2002). Para estabilização de uma fratura de olécrano, pode-se optar por placa e parafusos ósseos ou por fios de cerclagem em faixa de tensão (Palmer et al., 1988; Dearo et al., 2010). O período para consolidação óssea varia entre dois a três meses, porém, mesmo ocorrendo adequada consolidação óssea, o animal pode não se reabilitar novamente à vida livre, sendo necessária sua permanência em cativeiro (Rodrigues, 2002; Boudrieau, 2007).

RELATO DE CASO

Um lobo-guará adulto jovem foi encaminhado ao Hospital Veterinário após ter sido atingido por um automóvel. Após exames ortopédicos e radiográficos diagnosticou-se fratura de olécrano, sendo indicada a fixação cirúrgica da fratura. O animal foi anestesiado com cetamina (15mg/kg) associado ao midazolam (0,3 mg/kg), ambos por via intramuscular. Induziu-se com propofol intravenoso (5mg/kg) seguida da intubação orotraqueal para anestesia inalatória com isoflurano/oxigênio.

O acesso à fratura foi por incisão cutânea caudolateral ao olécrano. Fixou-se a fratura com placa óssea de reconstrução de 2,7mm e 8 parafusos ósseos, variando de 16mm até 20mm. Devido à dificuldade de manejo do animal selvagem, não foi possível realizar um pós-operatório adequado, ocorrendo assim frouxidão do implante e instabilidade dos fragmentos ósseos. Foi necessário novo procedimento cirúrgico após sete dias do primeiro. Foram retirados os parafusos e a placa, e foram inseridos dois pinos de Kirschner atravessando o foco de fratura. Em seguida, um fio de cerclagem foi colocado em faixa de tensão. Após 60 dias foi realizado exame radiográfico e comprovado a eficiência do implante e a consolidação óssea. Observou-se redução da amplitude de movimentos na articulação úmero-radio-ulnar.

DISCUSSÃO

Há duas técnicas cirúrgicas principais para a correção de fraturas de olécrano: a faixa de tensão ou o uso de placas ósseas (Lewicky et al., 2008; Johnson, 2008). Além do tipo de osso acometido, do escore de avaliação da fratura e da habilidade do cirurgião, devemos também levar em consideração o animal que receberá o implante (Boudrieau, 2007). Neste caso, optou-se primeiramente pela placa óssea por se tratar de um implante que confere maior estabilidade à fratura, e se tratando de um animal silvestre, facilitaria o manejo pós-operatório (Boudrieau, 2007). Com a falha do implante, optou-se pelos pinos de Kirschner associados à faixa de tensão. A complicação dos pinos é a migração dos mesmos, sendo necessária uma nova intervenção para sua retirada, o que justificou não ser a escolha primária (Palmer et al., 1988). Entretanto, não se observou complicações com este método no caso relatado. Apesar da adequada reparação da fratura, observou-se redução da amplitude de movimentos na articulação úmero-radio-ulnar e o animal foi encaminhado para vida em cativeiro sob recomendação de atividades fisioterápicas.

CONCLUSÃO:

Os pinos de Kirchner associados ao fio de cerclagem em faixa de tensão foram eficazes em promover a consolidação óssea, permitindo a recuperação da mobilidade motora. O tipo de fratura, forma de tratamento e consolidação óssea foram semelhantes aos observados nos caninos domésticos.

REFERÊNCIAS

- JOHNSON, A. L. Tratamento de fraturas específicas. In: FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais, 3 ed, Rio de Janeiro: Elsevir, 2008, cap. 32, p. 1015-1142
- BOUDRIEAU, R. J. Fraturas do rádio e ulna. In: SLATTER, D. **Manual de cirurgia de pequenos animais**. 3.ed. Barueri, SP: Manole, 2007, v.2, cap.139, p.1953-1973
- PALMER, R. H.; ARON, D. N.; CHAMBERS, J. N. A combined tension band and lag screw technique for fixation of olecranon osteotomies. **Veterinary Surgery**, v. 17, n.6, p. 328-332, 1988
- DEARO, A. C. O.; FONTEQUE, J. H.; VIDAL, F. D. et al. Reparação cirúrgica de fratura de olécrano em equino. **Ciências Agrárias Londrina**, v. 31, n. 1, p. 197-204, 2010
- RODRIGUES, F. H. G. **Biologia e conservação do lobo-guara na estação ecológica de Aguas Emendadas, DF**. 2002. Campinas, 174f. Dissertação

(Doutorado em Ecologia) – Curso de Pós-Graduação Instituto de Biologia, Universidade Federal de Campinas.

LEWICKY, Y. M.; SHEPPARD, J. E.; RUTH, J. T. Olecranon osteotomy repair: the tensioned locking plate technique. **Orthopedics**, v. 31, n. 6, p. 565-572, 2008.

131. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO DE JOELHO EM UM GATO

LENISE NASCIMENTO FLÔRES¹, MARIANNE LAMBERTS¹, MONALYZA CADORI GONÇALVES¹

¹ HCV – UFRGS; lenisevet@yahoo.com.br

RESUMO

O presente relato descreve o caso de um felino adulto com luxação traumática de joelho tratado cirurgicamente. Além da ruptura dos ligamentos colateral medial e cruzados cranial e caudal, havia ruptura da origem da cabeça medial do gastrocnêmio com deslocamento da fabela medial. A fabela medial e musculatura foram fixadas ao fêmur com parafuso. A instabilidade articular foi corrigida por suturas extracapsulares. Após 30 dias, o animal apresentava deambulação.

Palavras-chave: luxação, joelho, ligamento, gastrocnêmio, felino

SURGICAL TREATMENT FOR STIFLE JOINT DISPLACEMENT IN A CAT

ABSTRACT

An adult cat with a traumatic stifle joint displacement was surgically treated. The collateral medial and both cranial and caudal cruciate ligaments were ruptured. The gastrocnemius' medial head, with its fabella, was displaced at its origin. The medial fabella and muscle were fixed to the femur with a screw and the joint instability was corrected through extracapsular sutures. After 4 weeks, the animal had a normal gait.

KEYWORDS: luxation, stifle, ligament, gastrocnemius, feline

INTRODUÇÃO:

A luxação do joelho, geralmente resultante de traumatismo grave, caracteriza-se por lesões ligamentares múltiplas e requer intervenção cirúrgica (Vasseur, 1998).

RELATO DO CASO

Um felino, macho, castrado, de 4,5 kg, com cerca 2 anos, foi apresentado com impotência funcional do membro pélvico esquerdo, edema local e perfurações na pele da região distal da coxa, compatíveis com mordida de cão. Ao exame físico, evidenciou-se deslocamento crânio-dorsal da tíbia e rupturas ligamentares. O exame radiográfico confirmou a luxação da articulação femoro-tíbio-patelar.

A cirurgia, realizada em decúbito lateral direito, foi iniciada através de artrotomia parapatelar lateral, observando-se ruptura dos ligamentos cruzados cranial e

caudal e do ligamento colateral medial. A origem da cabeça medial do músculo gastrocnêmio encontrava-se rompida e afastada do fêmur.

Após o reposicionamento da tíbia e, através de artrotomia medial, a fabela e a cabeça medial do gastrocnêmio foram fixadas dorso-medialmente ao côndilo femoral correspondente utilizando-se um parafuso cortical (figura 1). A crista da tíbia foi perfurada para ancoragem das suturas fabelo-tibiais extracapsulares lateral e medial, realizadas com duplo náilon monofilamentar nº 2-0. A ancoragem medial foi apoiada no parafuso (figura 2). Seguiu-se com as artrorrafias e sutura da fáscia lata, para, depois, serem então finalizados os nós das suturas fabelo-tibiais extracapsulares. Após o aferimento da estabilidade articular na flexão e extensão do joelho, o espaço morto subcutâneo foi reduzido e a pele fechada.

Figura 1 - INTRODUÇÃO do parafuso cortical fixando a fabela medial ao fêmur.

Figura 2 - Suturas fabelo-tibiais extracapsulares lateral e a medial ancorada no parafuso.

No pós-operatório, não foi empregada imobilização externa, mas o ambiente foi limitado ao interior da casa. A recuperação da deambulação iniciou-se com o apoio dos dedos em 24 horas, sendo que, aos 30 dias, apresentava-se inteiramente recuperada. Em 26 meses, não houve relato de alteração clínica locomotora.

DISCUSSÃO

O tratamento cirúrgico na correção da luxação do joelho visa devolver o movimento articular normal com a restituição de sua estabilidade (Vasseur, 1998).

Embora a posição anatômica da fabela medial seja caudo-dorsal ao côndilo femoral (Evans e de Lahunta, 1994), sua fixação mais medialmente conferiu maior estabilidade à articulação, uma vez que o ligamento colateral medial estava rompido. A escolha do parafuso, ao invés de suturas (Bloomberg, 1998), permitiu a ancoragem da sutura extracapsular fabelo-tibial medial.

A técnica de ancoragens fabelo-tibiais, medial e lateral, foi selecionada por contrapor simultaneamente as forças de deslocamento cranial e caudal das superfícies articulares femoral e tibial (Vasseur, 1998). Sendo uma técnica extracapsular, e o animal tendo menos de 15 Kg, o retorno rápido ao uso ativo do membro foi favorecido (Brinker et al, 1986).

A orientação de manter o animal sem imobilizações contribuiu para o retorno precoce à deambulação (Fossum, 2008).

CONCLUSÃO

O retorno à funcionalidade normal do membro foi obtido com o apropriado reposicionamento anatômico e a adequada estabilização da articulação.

REFERÊNCIAS

- BLOOMBERG, M. Músculos e Tendões. In: SLATTER, D. (2ed.). **Manual de Cirurgia de Pequenos Animais**. Manole, 1998. Cap. 137, p. 2149-2201.
- BRINKER, W.O.; PIERMATTEI, D.L.; FLO, G.L. **Manual de Ortopedia e Tratamento das Fraturas dos Pequenos Animais**: Diagnóstico e Tratamento dos Estados Ortopédicos do Membro Posterior. Manole, 1986. cap. 20, p. 282-376.
- EVANS, H. & DE LAHUNTA, A. **Guia para a Dissecção do Cão**: Sistema Esquelético e Muscular. 3 ed. Guanabara Koogan, 1988. p. 4-66.
- FOSSUM, T.W. **Cirurgia de Pequenos Animais**: Afecções Articulares. 3ed. 2008. Rio de Janeiro, Elsevier, cap. 33, p.1143-1315.
- VASSEUR, P. B. Articulação do Joelho. In: SLATTER, D. (2ed.). **Manual de Cirurgia de Pequenos Animais**. Manole, 1998. Cap. 137, p. 2149-2201.

132. CITOLOGIA SANGUÍNEA NO DIAGNÓSTICO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM CÃES DA BAIXADA CUIABANA, MATO GROSSO

Álvaro Felipe de Lima Ruy Dias¹, Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida¹, Eveline da Cruz Boa Sorte¹, Naiani Domingos Gasparetto¹, Valéria Régia Franco Sousa¹, Yolanda Paim Arruda Trevisan¹.

¹Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT

RESUMO

A leishmaniose visceral canina é uma doença que atinge diversas regiões do Brasil, tendo os cães como principais reservatórios urbanos. Diante disso, o presente estudo objetivou avaliar a ocorrência de leishmaniose visceral canina na Baixada Cuiabana. Assim, pesquisou-se por citologia do esfregaço sanguíneo, em ponta de orelha, a presença de formas amastigotas de *Leishmania sp.* em 179 amostras de cães, sendo examinadas 46 amostras, das quais apenas uma (2,17%) apresentou o parasito.

PALAVRAS-CHAVES *Leishmani chagasi*, Cuiabá, Cão

BLOOD CYTOLOGY IN THE DIAGNOSIS OF VISCERAL LEISHMANIASIS IN DOGS OF BAIXADA CUIABANA, STATE OF MATO GROSSO.

ABSTRACT

The canine visceral leishmaniasis is a disease that affects many regions of Brazil, it have been the dogs as the main urban reservoirs. Therefore, this study aimed to evaluate the occurrence of canine visceral leishmaniasis in the area of Baixada Cuiabana. Thus, it searched to check by blood smear cytology in the ear tip the presence of amastigotes forms of *Leishmania sp.* in 179 samples of dogs, it have being examined 46 samples, from which only one (2,17%) had the parasite.

KEYWORDS: *Leishmani chagasi*, Cuiabá, Dog

INTRODUÇÃO

No Brasil, a leishmaniose visceral (LV) transmitida pelo vetor *Lutzomyia longipalpis*, é resultante da infecção pelo agente etiológico *Leishmani chagasi*, sendo a espécie canina considerada o principal reservatório, sobretudo em áreas urbanizadas (BRASIL, 2006).

Segundo Camiá (1999), os primeiros registros de casos autóctones humanos de leishmaniose visceral (LV) em Cuiabá ocorreram em 1998. No estudo de Moura et al. (1999), os relatos de cães sorologicamente positivos a leishmaniose visceral canina

(LVC), no município de Cuiabá, foram detectados em 1997 e 1998.

O diagnóstico da doença é realizado por exames parasitológicos e sorológicos, sendo o parasitológico baseado na demonstração do parasito em esfregaço de aspirado de baço, medula óssea, linfonodos, fígado e esfregaço sanguíneo (BRASIL, 2006). Diante do exposto, buscou-se verificar através da citologia do esfregaço sanguíneo de ponta de orelha a presença de amastigotas de *Leishmania* sp. em cães domiciliados na Baixada Cuiabana.

MATERIAL E MÉTODOS

Os cães avaliados compreendem aqueles domiciliados na Baixada Cuiabana no período de setembro/2011 a julho/2012, sendo que os dados obtidos são preliminares nos resultados, pois de 179 amostras de esfregaço sanguíneo de ponta de orelha foram examinadas 46 amostras.

Em todos os animais foi realizado esfregaço de sangue periférico obtido de ponta de orelha. As lâminas confeccionadas foram submetidas à coloração do tipo Romanowsky (Panótico/Giemsa), sendo examinadas em microscópio óptico para pesquisa de formas amastigotas, percorrendo, no mínimo cerca de 200 campos com objetiva de imersão (x 100).

RESULTADOS

Das 179 amostras de cães, foram examinadas 46 amostras de esfregaço sanguíneo de ponta de orelha, diagnosticando-se formas amastigotas de *Leishmania* sp. em apenas uma (2,17%) amostra.

DISCUSSÃO

Semelhante aos resultados de Ikeda-Garcia et al. (2003), o presente estudo até o momento observou formas amastigotas de *Leishmania* sp. em apenas uma (2,17%), dentre as 46 amostras, demonstrando ser um achado ocasional.

A especificidade dos métodos parasitológicos é de 100%, já a sensibilidade é variável, devido à distribuição dos parasitos não ser homogênea no mesmo tecido, a depender da fase da infecção, assim como, do processamento da amostra e habilidade do observador (LAURENTI, 2009). A técnica de esfregaço sanguíneo tem sido considerada de valor limitado no diagnóstico de LV em decorrência da baixa carga parasitaria circulante no sangue periférico (COURTENAY et al., 2002). Porém, em pesquisas rotineiras de hemoparasitos em esfregaço sanguíneo de ponta de orelha, formas amastigotas podem ser observadas, concluindo o diagnóstico de LV.

CONCLUSÃO

Com os dados obtidos até o presente momento, permite-se concluir que a observação de formas amastigotas em esfregaço sanguíneo de ponta de orelha estabelece o diagnóstico de leishmaniose visceral, porém na inobservância deve-se optar por exames complementares mais sensíveis como sorológicos e moleculares.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral**. Brasília: MS, 2006. 122p.
- CAMIÁ, R. P.; RINALDI, J.; FONTE, C. J. F.; HUEB, H. Foco de Leishmaniose Visceral em Mato Grosso. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 32, p. 127-128, 1999.
- COURTENAY, O.; QUINELL, R. J.; GARCEZ, L. M.; DYE, O. Low infectiousness of a wildlife host of *Leishmania infantum*: the crab-eating fox is not important for transmission. **Parasitology**, v. 125, n. 5, p. 407-414, 2002.
- LAURENTI, M. D. Correlação entre o diagnóstico parasitológico e sorológico da leishmaniose visceral americana canina. **Boletim Epidemiológico Paulista**, São Paulo, v. 6, p. 13-23, 2009.
- MOURA, S. T.; FERNANDES, C. G. N.; PANDOLPHO, V. C.; SILVA, R. R. Diagnóstico de leishmaniose canina na área urbana do município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil. **Brazilian Journal of Veterinary Research Animal Science**, São Paulo, v. 36, n. 2, p. 101-102, 1999.
- IKEDA-GARCIA, F. A.; CIARLINI, P. C.; FEITOSA, M. M.; GONÇALVES, M. E.; LUVIZOTTO, M. C. R.; LIMA, V. M. F. Perfil hematológico de cães naturalmente infectados por *Leishmania chagasi* no município de Araçatuba, São Paulo: estudo retrospectivo de 191 casos. **Clínica Veterinária**, v. 47, p. 42-47, 2003.

133. FREQUÊNCIA DE PARASITAS GASTROINTESTINAIS EM CÃES (*Canis lupus familiares*) DOMICILIADOS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE

Allan Andrade Rezende¹, Allisson Fabiano Silva Ferro¹, Silvia Letícia Bomfim Barros²,
Alexsandro Machado Conceição², Arianne Dantas Meneses³

¹Discente em Medicina Veterinária, Faculdade Pio Décimo, Aracaju-SE.

²Docente em Medicina Veterinária, Faculdade Pio Décimo, Aracaju-SE.

³Médica Veterinária do Hospital Veterinário Dr. Vicente Borelli, Aracaju-SE.

RESUMO

Em 206 amostras fecais coletadas em cães do município de Aracaju, no período de janeiro a dezembro de 2011, 128 amostras obtiveram resultados positivos para alguma verminose tais como *Ancylostoma* spp, *Toxocara* spp, *Strongyloides* spp, *Dipylidium* spp, *Trichuris* spp etc. Esses parasitos podem representar sérios riscos à saúde pública, por serem os causadores de zoonoses, fator que torna importante pesquisa sobre o tema.

PALAVRAS-CHAVES parasitas, gastrointestinal, cão

FREQUENCY OF GASTROINTESTINAL PARASITES IN DOGS (*Canis lupus familiaris*) DOMICILED IN THE CITY OF ARACAJU/SE

ABSTRACT

From 206 stool samples that were collected from dogs in Aracaju city, in the period, 2011, to January from December, 128 samples obtained positive results for some worms as *Ancylostoma* spp., *Toxocara* spp., *Strongyloides* spp., *Dipylidium* spp., *Trichuris* spp., etc. These parasites can represent serious risks to public health because they are the principal representative of zoonoses, factor that it has become important in research because it will help in preventive studies in the future

KEYWORDS: Parasites, gastrointestinal, dogs

INTRODUÇÃO

Dentre as doenças parasitárias mais frequentes em cães estão a Ancilostomíase e a Toxocaríase, causadas respectivamente pelos helmintos *Ancylostoma* sp. e *Toxocara* sp., capazes de produzir em seres humanos a *Larva Migrans Cutânea* e a *Larva Migrans Visceral* (OLIVEIRA et al., 2009).

Alguns protozoários também podem ser encontrados infectando o trato gastrintestinal dos canídeos, destacando-se *Giardia* sp. e *Cryptosporidium* sp., que também são zoonoses (ACHA & SZYFRES, 1986).

O presente estudo tem por objetivo determinar a ocorrência de endoparasitos gastrointestinais em cães atendidos em um hospital veterinário no município de Aracaju/ Sergipe no período de janeiro a dezembro de 2011.

MATERIAL E MÉTODOS

No período de janeiro a dezembro de 2011, 206 amostras fecais de cães de diferentes idades, sexos e tipos de criação, foram encaminhadas para exames parasitológicos, sendo mantidas até o momento da análise sob refrigeração. Todas as amostras foram submetidas a três técnicas de diagnóstico: Sedimentação Simples (HOFFMANN et al., 1934), Método flutuação de Willis-Mollay (WILLIS, 1921) e o Método de Dennis, Stone e Swanson modificado (HOFFMAN, 1987).

RESULTADOS

Verificou-se que das 206 amostras de fezes examinadas, 128 (62,1%) foram positivas em pelo menos uma das técnicas utilizadas e que as infestações por helmintos foram mais frequentes que por protozoários.

Os parasitas encontrados foram o *Ancylostoma spp* em 36,6% (47/128) das amostras, *Toxocara spp* em 28% (36/128), *Strongyloides spp* em 10,1% (13/128), *Dipylidium spp* em 5,76% (7/128) e *Trichuris spp* em 4,68% (6/128). Cistos de *Giardia spp.* foram observados em 11,7% (15/128) das avaliações.

Quando consideradas as associações entre os parasitas verificou-se a simultaneidade de infestação por *Ancylostoma spp* e *Toxocara spp.* em 6,25% (8/128) e do *Ancylostoma spp* e *Giardia spp.* em 9,37% (12/128) das amostras, sendo essas associações as mais frequentemente observadas.

DISCUSSÃO

A maior frequência do *Ancylostoma spp.* também foi evidenciada por outros estudos realizados em outras localidades brasileiras, trabalhos realizados em diversas cidades do país – a exemplo de Goiânia-GO (OLIVEIRA et al,2009), que relata o *Ancylostoma sp.* e o *Toxocara canis* como os parasitos de maior frequência em cães.Em estudo anterior realizado na cidade de Aracaju (FERREIRA et al., 2009) observou-se semelhante comportamento.

CONCLUSÃO

As elevadas taxas de infecção dos cães do presente estudo sugerem a necessidade de conscientização da população quanto aos riscos que alguns parasitas representam à saúde pública, por serem os causadores de zoonoses. Recomendam-se exames parasitológicos periódicos dos cães, seguidos de vermifugação adequada, além de medidas higiênicas tais como evitar o trânsito de animais em áreas públicas, e a retirada de animais errantes das mesmas.

REFERÊNCIAS

- AC H A, P.N. & SZYFRES, B. Zoonosis y Enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales. 2.ed. Washington D.C.: **Organizacion Panamericana de Salud Publica**, 1986.
- FERREIRA, M. A. S. ; RODRIGUES, J. S. ; ANDRADE, R. L. F. S. ; JESUS, H. A. ; BARROS, S. L. B. . **Avaliação de endoparasitas em cães domiciliados, de abrigo e errantes na cidade de Aracaju, Sergipe**. Medicina veterinária (UFRPE), v. 3, p. 20-25, 2009.
- HOFFMAN, R. P. **Diagnóstico de parasitismo veterinário**. Porto Alegre: Sulina, 1987.
- HOFFMANN, W.A. et al. **The sedimentationconcentration method in Schistosomiasis mansoni.Puerto Rico**. Journal of Public Health, v.9, p.281-298, 1934.
- OLIVEIRA, V. S. F.; MELO, D. P. G.; FERNANDES, P. R.; SCHULZE, C. M. B.; GUIMARÃES, M. S.; SILVA, A. C. **Ocorrência de helmintos gastrintestinais em cães errantes na cidade de goiânia – Goiás**. Revista de Patologia Tropical, v.38, n.4, p. 279-283, 2009.
- WILLIS, H.H. **A simple levitation method for the detection of hookworm ova**. Medical Journal of Australia, v.8, p.375-376, 1921.

134. INFECÇÃO POR *RANGELIA VITALLI* EM CANINO – RELATO DE CASO

Rose Karina Reis Correa¹; Veronica Noriega Torres²; Rafaela Rosa Barcellos³; Priscila Natasha Casper⁴; Alexandra Tagliari⁵; Carlos Afonso de Castro Beck⁶

^{1;2;3;5;6}: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina Veterinária.

⁴: Médica Veterinária autônoma. Contato: roserrel@ig.com.br

RESUMO

A Rangeliose afeta cães, principalmente na região Sul do Brasil. *Rangelia vitalli* é um protozoário transmitido por *Amblyomma aureolatum* e *Rhipicephalus sanguineus*. O perfil hematológico de cães infectados consiste em anemia hemolítica extravascular autoimune. Podem apresentar icterícia, febre, esplenomegalia, aumento de linfonodos, epistaxe, hemorragias gastrointestinais, petéquias nas membranas mucosas visíveis e edema dos membros posteriores. O presente trabalho objetiva relatar o caso de um canino com histórico de anorexia e sangramento na face externa e borda das orelhas. No exame de sangue periférico foram encontrados microrganismos compatíveis com *Rangelia vitalli*. O tratamento clínico instituído foi satisfatório, obtendo a melhora do paciente.

PALAVRAS-CHAVE: *Rangelia vitalli*, carrapato, cão

RANGELIA VITALLI INFECTION IN DOG – CASE REPORT

ABSTRACT

The Rangeliose affects dogs, mainly in southern Brasil. *Rangelia vitalli* is a protozoan transmitted by *Amblyomma aureolatum* and *Rhipicephalus sanguineus*. The hematological profile of dogs infected with this parasite is consistent with that of an extravascular hemolytic anemia autoimmune. They may also have anemia, jaundice, fever, splenomegaly, generalized swelling of lymph nodes, persistent bleeding from the nostrils (epistaxis), gastrointestinal bleeding, petechial visible mucous membranes and swelling of the hind limbs. This study aimed to report the case of a dog, presenting history of anorexia and bleeding on the outside and edge of the ears. On examination of peripheral blood, microorganisms were found compatible with *Rangelia vitalli*. Clinical treatment was satisfactory, obtaining the patient's improvement.

KEYWORDS: *Rangelia vitalli*, tick, dog

INTRODUÇÃO

A Rangeliose é uma enfermidade descrita somente no Brasil (Fighera, 2010), principalmente nas regiões sul e sudeste. Afeta principalmente cães jovens, das zonas rurais. (Loretti e Barros, 2004) e na periferia das cidades (Krauspenhar et al., 2003). O ciclo evolutivo da *R. vittalli* ainda não é totalmente conhecido. A literatura relata um estágio de desenvolvimento eritrocitário e outro exoeritrocitário (Loretti e Barros, 2004). Os sinais clínicos são icterícia, esplenomegalia, linfonodmegalia, epistaxe, sangramento persistente na cavidade oral, bordas e face externa das orelhas, hemorragias gastrointestinais, petéquias em membranas mucosas visíveis e edema dos membros pélvicos. O perfil hematológico de cães infectados por esse parasita é consistente com o de uma anemia hemolítica extravascular autoimune. (Loretti e Barros, 2004²; Krauspenhar et al., 2003).

RELATO DE CASO

Canino fêmea, Pastor Belga, onze meses de idade, 25,4 kg, proveniente de propriedade rural. Histórico de anorexia, carrapatos de cor amarela, sangramento na face externa e nas bordas das orelhas, apresentando mucosas pálidas, linfonodos submandibulares e poplíteos reativos, desidratação leve e esplenomegalia. O hemograma evidenciou anemia regenerativa normocítica hipocrômica com desvio a esquerda, hipoproteïnemia, trombocitopenia acentuada e plasma icterico, linfócitos reativos, monócitos ativados, anisocitose e linfopenia. Lâminas de sangue periférico foram coradas com Panótico e encontraram-se microrganismos compatíveis com *Rangelia vitalli*, de 1,5 a 2,5 µm de diâmetro, em monócito e livres. Instituiu-se tratamento com Prednisona (2 mg.kg⁻¹), Cloridrato de Doxiciclina (10 mg.kg⁻¹), Sulfato de Atropina (0,04 mg.kg⁻¹) e Dipropionato de Imidocarb (5 mg.kg⁻¹). Foi realizado novo hemograma após 21 dias, o qual não apresentou alteração.

DISCUSSÃO

Segundo Loretti e Barros (2004), o diagnóstico presuntivo é feito com base no histórico, quadro clínico e resposta favorável ao tratamento; e o definitivo pela observação do parasita na citologia ou na histologia de células endoteliais de capilares sanguíneos de amostras colhidas na necropsia. No referido caso o diagnóstico foi realizado pelo esfregaço de sangue periférico. O protozoário foi visualizado no interior de monócito e livre na corrente sanguínea. Segundo Fighera et al., *Ehrlichia canis*

normalmente teria localização nos monócitos e *R. vitalli* extravascular, mas já cita o achado de *R. vitalli* em um caso em monócitos e neutrófilos de um cão. Sendo assim, esse achado não pode ser usado para diferenciá-las. Contudo, Loretti e Barros citam que em *E. canis*, em geral há anemia não regenerativa e hiperproteinemia, que foi o oposto encontrado nesse caso. Em relação à Babesiose, há hemólise intravascular com consequente hemoglobinemia, o que não ocorre na Rangeliose (Fighera et al., 2010). A resposta foi positiva ao tratamento, estando de acordo com a indicação de Loretti e Barros (2004) para essa e para outras protozooses e riquetsioses sanguíneas em cães.

CONCLUSÃO

Há muitas dúvidas referentes à *R. vitalli*, sendo necessários estudos para esclarecer seu ciclo, meios diagnósticos e diferenciá-lo efetivamente de outros hemoparasitas.

REFERÊNCIAS

- FIGHERA, R.A.; SOUZA, T.M.; KOMMERS, G.G.; et al. **Patogênese e achados clínicos, hematológicos e anatomopatológicos da infecção por *Rangelia vitalii* em 35 cães (1985-2009)**. Pesquisa Veterinária Brasileira, V.30 n.11 RJ, Nov. 2010. Disponível em: <http://www.pvb.com.br/pdf_artigos/09-12-2010_20-49Vet%20876_2031%20PA.pdf>. Acesso em 28/12/2011.
- LORETTI, A.P.; Barros S.S. **Parasitismo por *Rangelia Vitali* em cães (“Nambiuvú”, Peste de Sangue) – uma revisão crítica sobre o assunto**. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v.71, n.1, p.101-131, jan./mar., 2004. Disponível em: <http://www.pvb.com.br/pdf_artigos/09-12-2010_20-49Vet%20876_2031%20PA.pdf>. Acesso em: 28/12/2011.
- KRAUSPENHAR, C. Fighera R. A.; GRAÇA, D. L. **Anemia hemolítica em cães associada a protozoários**. Medvet - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação, 1(4): 273-81 Curitiba, 2003.

135. OCORRÊNCIA DE HEPATOOZONOSE EM CÃES DA ZONA RURAL DE TERESINA, PIAUÍ

Francisco de Assis Leite Souza¹, Aíla Alves Rocha Vieira¹, Juliana Fortes Vilarinho Braga², Luciano Santos da Fonseca¹, Alexandre Celso Dias¹, Silvana Maria Medeiros de Sousa Silva¹.

¹Setor de Patologia Animal, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí – chicoleite@hotmail.com

²Escola de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais.

RESUMO

O objetivo do trabalho foi descrever a ocorrência de hepatozoonose canina na zona rural do município de Teresina, Piauí. Foram utilizados 384 cães sem distinção de raça, sexo e idade, provenientes da zona rural de Teresina, dos quais foram colhidas amostras para pesquisa parasitológica. Dos esfregaços de sangue analisados foi detectado *Hepatozoon canis* em 0,26% (1/384) dos animais. O presente estudo relata pela primeira vez a ocorrência de *H. canis* em cães da zona rural de Teresina, Piauí.

PALAVRAS-CHAVES *Hepatozoon canis*, hemoparasito, carrapato.

OCCURRENCE OF HEPATOOZONOSIS IN DOGS OF THE RURAL AREA IN TERESINA, PIAUI

ABSTRACT

The aim was to study the occurrence of canine hepatozoonose in rural area municipality of Teresina, Piauí. Were used 384 dogs without distinction of breed, sex and age, from the rural area of Teresina-PI, of which samples were collected for parasitological examination. Of blood smears examined *Hepatozoon canis* was detected in 0.26% (1/384) of animals. The present study reports the first occurrence of *H. canis* in dogs from rural areas of Teresina, Piauí.

KEYWORDS: *Hepatozoon canis*, hemoparasites, tick

INTRODUÇÃO

A hepatozoonose canina é uma hemoparasitose de ocorrência mundial causada por protozoários das espécies *Hepatozoon americanum*, transmitido pelo *Amblyoma* spp. e *H. canis*, transmitido pelo carrapato de cães *Rhipicephalus sanguineus* (Baneth et al., 2003). Esses protozoários parasitam mamíferos, principalmente cães, mas também répteis, gatos selvagens, leopardos e raposas (Forlano et. al., 2007; Metzger

et. al., 2008). O cão acometido pode apresentar febre, tosse, linfadenopatia, prostração e anemia. No Brasil a hepatozoonose em cães tem sido diagnosticada durante os exames laboratoriais ou durante os estudos epidemiológicos em áreas urbanas ou rurais (O'Dwyer et al., 2001). O presente trabalho tem por objetivo descrever a ocorrência de hepatozoonose canina na zona rural do município de Teresina, Piauí.

MATERIAL E MÉTODOS

Nesse estudo foram utilizados 384 cães sem distinção de raça, sexo e idade, número determinado a partir do modelo matemático desenvolvido pelo Centro Panamericano de Zoonoses (1979). Dos animais amostrados foi realizado esfregaços de sangue periférico da borda da orelha que foram corados com Giemsa para pesquisa dos hemoparasitas em microscópio de luz .

RESULTADOS

Em apenas um animal entre os 384 cães analisados foi possível a visualização de esquizontes de *H. canis* em esfregaço sanguíneo (Figura 1), podendo observar uma baixa ocorrência (0,26%) desse protozoário quando diagnosticado por meio dessa técnica. Foi observada também a presença de outros parasitas, tais como *Babesia canis*, *Leishmania* sp., *Anaplasma platys* e *Ehrlichia canis* entre as amostras analisadas.

Figura 1. Esquizonte de *H. canis* (seta) em um esfregaço sanguíneo periférico de ponta da orelha.

DISCUSSÃO

Este resultado condiz com os observados por Otranto et. al. (2011) onde se sugere que o baixo número de animais positivos pelo esfregaço do sangue periférico é devido à fase inicial de infecção ou baixa parasitemia. A baixa prevalência dessa enfermidade por técnica de esfregaços de sangue periférico pode ser observada também em um estudo realizado em Dourado-MS, onde essa prevalência variou de 0,29% a 2,22% de cães positivos para *H. canis* (Paiz et al., 2010). No nordeste, são poucos os estudos realizados com pesquisa de *Hepatozoon* sp, destacando-se o

trabalho realizado em cães no Pernambuco (Ramos et al., 2010) e em gatos selvagens do Maranhão e Ceará (Metzger et al., 2008).

CONCLUSÃO

Este RESUMO relata pela primeira vez a ocorrência de *Hepatozoon canis* em cães da zona rural de Teresina, Piauí.

O trabalho foi conduzido com autorização do Comitê de Ética da UFPI aprovado sob o número 031/2010.

REFERÊNCIAS

- BANETH, G.; MATHEW, J.S.; SHKAP, V. et al. Canine hepatozoonosis: two disease syndromes caused by separate *Hepatozoon* spp. **Trends in Parasitology**, v.19, p.27-31, 2003.
- FORLANO, M.D.; TEIXEIRA, K.R.S.; SCOFIELD, A. et al. Molecular characterization of *Hepatozoon* sp. from Brazilian dogs and its phylogenetic relationship with other *Hepatozoon* spp. **Veterinary Parasitology**, v.145, p.21-30, 2007.
- METZGER, B.; PADUAN, K.S.; RUBINI, A.S. et al. The first report of *Hepatozoon* sp. (Apicomplexa: Hepatozoidae) in neotropical felids from Brazil. **Veterinary Parasitology**, v.152, p.28–33, 2008.
- O' DWYER, L.H.; MASSARD, C.L.; PEREIRA DE SOUZA, J.C. *Hepatozoon canis* infection associated with dog ticks of rural areas of Rio de Janeiro State, Brazil. **Veterinary Parasitology**, v.94, p.143-150, 2001.
- OTRANTO, D.; DANTAS-TORRES, F.; WEIGL, S. et al. Diagnosis of *Hepatozoon canis* in young dogs by cytology and PCR. **Parasites and Vectors**, v.4, p.55, 2011.
- PAIZ, L.M.; LEITE, L.O.C.; SATAKE, F. Prevalência de *Hepatozoon canis* em cães atendidos na rotina do Hospital Veterinário do Centro Universitário da Grande Dourados, Dourados-MS, no período de 2005 a 2010. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, XVI, 2010, Campo Grande. **Anais...** Campo Grande: Colégio Brasileiro de Parasitologia Veterinária, 2010, Pr 253.
- RAMOS, R.; RAMOS, C.; ARAÚJO, F. et al. Molecular survey and genetic characterization of tick-borne pathogens in dogs in metropolitan Recife (north-eastern Brazil). **Parasitology Research**, v.107, p.1115–1120, 2010.

136. PESQUISA DE FORMAS AMASTIGOTAS DE *LEISHMANIA* SPP. PELA CITOLOGIA DE LINFONODO E MEDULA ÓSSEA EM CÃES DA BAIXADA CUIABANA

Juliana Yuki Rodrigues¹, Arleana do Bom Parto Ferreira de Almeida¹, Naiani Domingos Gasparetto¹, Eveline da Cruz Boa Sorte¹, Valéria Régia Franco Sousa¹, Yolanda Paim Arruda Trevisan¹

¹ Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT

RESUMO

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a ocorrência da forma amastigota da *Leishmania* spp. em cães domiciliados na baixada cuiabana, estado de Mato Grosso através de exames citológicos de linfonodos poplíteos e medula óssea de 250 cães. Até o atual momento foram observadas amostras de 106 cães, que mostraram 28 amostras positivas, onde somente nove (32,14%) animais foram positivos nas amostras de linfonodos e medula óssea, cinco (17,85%) animais foram positivos somente nas amostras de linfonodos e 14 (50%) animais foram positivos somente nas amostras de medula óssea.

PALAVRAS-CHAVE: cão, *Leishmania* spp; baixada cuiabana, linfonodo, medula óssea

RESEARCH AMASTIGOTES OF *LEISHMANIA* SPP. CYTOLOGY OF THE MARROW AND LYMPH IN DOGS OF LOWER CUIABANA.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the occurrence of the amastigote form of *Leishmania* spp. in dogs residing in the valley Cuiabá, Mato Grosso through cytological examination of popliteal lymph nodes and bone marrow of 250 dogs from six different locations of the low cuiabana. Until the present time 196 samples were observed, which showed 28 positive samples, where only nine (32,14%) positive animals in the samples of lymph nodes and bone marrow, five (17,85%) positive animals only in samples of lymph nodes and 14 (50%) positive animals only in bone marrow samples.

KEYWORDS: dog, *Leishmania* spp, baixada cuiabana, lymph nodes, bone marrow

INTRODUÇÃO

As leishmanioses são doenças parasitárias causadas por protozoários da ordem *Kinetoplastida*, família *Trypanosomatidae*, gênero *Leishmania*, e antropozoonoses de regiões tropicais e subtropicais dos chamados Velho e Novo Mundo (TASCA et al., 2009). No estado de Mato Grosso, a leishmaniose visceral é descrita em 34 dos 114

municípios (SOUSA e ALMEIDA, 2008). Para seu diagnóstico podem ser realizadas técnicas sorológicas, parasitológicas e moleculares (Laurenti, 2009). Nas técnicas parasitológicas, os exames citológicos podem demonstrar formas amastigotas do parasito em esfregaços de linfonodos, medula óssea, aspirado esplênico, biópsia hepática e esfregaços sanguíneos corados com corante de rotina como Giemsa, Wright e panótico (TASCA et al., 2009). O objetivo do presente trabalho foi estudar a ocorrência da leishmaniose por exame citológico em amostras de linfonodos e medula óssea.

MATERIAL E MÉTODOS

Estudo transversal para leishmaniose visceral canina realizado em comunidades ribeirinhas da baixada cuiabana: Barranco Alto, Praia do Poço, Engenho Velho, Bom Sucesso, Passagem da Conceição, Varginha e São Gonçalo Beira Rio, no período de agosto a dezembro de 2011, foram analisados 250 cães de ambos os sexos e de raças variadas, sendo coletadas 188 amostras de linfonodo e 179 de medula óssea. Os esfregaços confeccionados foram fixados com álcool metílico por 5 minutos e posteriormente corados com corante rápido panótico e pesquisadas em até 100 campos microscópicos na objetiva de 100X, visando a visualização de formas amastigotas de *Leishmania* sp.

RESULTADOS

Até o momento foram analisadas amostras de 106 cães, sendo 100 amostras de linfonodos poplíteos e 96 amostras de medula óssea, e foram encontradas 28 amostras positivas, sendo apenas nove (32,14%) animais positivos em ambas, cinco (17,85%) animais foram positivos somente nas amostras de linfonodos poplíteo e 14 (50%) animais foram positivos somente nas amostras de medula óssea.

DISCUSSÃO

De acordo com Laurenti (2009) a especificidade do exame citológico é de 100%, entretanto a sensibilidade depende do grau de parasitismo, do tipo de material coletado, do seu processamento e coloração e do observador. Os resultados obtidos até o momento demonstram, de maneira geral, pouca positividade, mas, a baixa sensibilidade em exames citológicos no diagnóstico da leishmaniose é descrita na literatura, segundo Silva et al. (2007), que também ressalta que resultados negativos são comuns, especialmente em casos crônicos. A obtenção das amostras em um

inquérito canino, onde 46% dos cães não apresentava clínica da doença, pode ter contribuído para este baixo resultado.

Quanto aos resultados positivos, observou-se uma diferença significativa entre as amostras de linfonodos poplíteos (17,85%) e medula óssea (50%), contradizendo o estudo de Laurenti (2009), que diz que a sensibilidade do exame em material de linfonodo varia de 30% a 85%. O estudo também foi contra ao de Laurenti (2009), pois teve maior presença de formas amastigotas nas amostras de medula óssea.

CONCLUSÃO

As amostras obtidas de medula óssea apresentaram um maior percentual de positividade em relação às de linfonodos poplíteos, entretanto ao se optar entre medula óssea e linfonodo para o diagnóstico citológico da leishmaniose, o primeiro órgão é o de eleição quando se trata de animais assintomáticos, que apresentam maior grau de dificuldade para realização da coleta das amostras.

REFERÊNCIAS

- LAURENTI, M.D. Correlação entre o diagnóstico parasitológico e sorológico da leishmaniose visceral americana canina. **Boletim Epidemiológico Paulista**, São Paulo, v.6, p. 13-23, 2009.
- SILVA et al. Avaliação parasitológica em amostras obtidas de linfonodos e medula óssea de cães sorologicamente positivos para leishmaniose. **Ciências agrárias e da Saúde**, Andradina, v.7, p. 7-12, 2007.
- SOUSA, V. R. F; ALMEIDA, A. B. P. F. Co-infecção entre leishmaniose visceral e erlichiose monocíticas em cães de Cuiabá, Mato Grosso. **Acta Scientiae Veterinariae**, 36: 113-117.
- TASCA et al. Exames parasitológicos, imunoistoquímicos e histopatológicos para detecção de *Leishmania chagasi* em tecidos esplênicos de cães com leishmaniose visceral. **Rev. Bras. Parasitol. Vet.**, Jaboticabal, v.8, n.1, p. 27-33, 2009.

137. ANÁLISE HEMATOLÓGICA DE ARARAS DE CATIVEIRO EM MATO GROSSO DO SUL

PAULO HENRIQUE BRAZ¹; TATIANA SCANONI GOMES²; ALDA IZABEL DE SOUZA³; LETICIA MARIE LIRA UMEDA¹; WILLIAN TAKASHI HONDA⁴; ROBERTA MARTINS PASSOS HUMBERG⁴

1 Residentes em Patologia Clínica Veterinária pelo Hospital Veterinário Anhanguera-Uniderp.

2 Médica Veterinária autônoma

3 Professora Doutora responsável pelo setor de Patologia Clínica da Universidade Anhanguera-Uniderp

4 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Anhanguera-Uniderp.

5 Médica Veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, MS.

RESUMO

A hematologia aviária é um método de diagnóstico e de controle de doenças, que muitas vezes permite um prognóstico, sendo importante para a manutenção de animais saudáveis. A literatura brasileira conta com poucas referências sobre estudos hematológicos de aves silvestres, principalmente de psitacídeos. Atualmente, há pouco conhecimento sobre os parâmetros clínicos e laboratoriais de espécies silvestres em cativeiro. O presente estudo tem como meta determinar valores hematológicos das araras (*Ara ararauna*, *Ara chloroptera*), visando à colaboração para a conservação destas espécies e preocupação geral com o meio ambiente.

PALAVRAS-CHAVE: Psittacidae; Ornitopatologia; Hematologia

HEMATOLOGIC ANALYSES OF MACAWS IN CAPTIVITY IN MATO GROSSO DO SUL

ABSTRACT

The avian hematology is a method of diagnosis and disease control, which often allows a prognosis. it is important for the maintenance of healthy animals. The Brazilian literature has with few references about hematological studies of wild birds, mainly psitacídeos. Nowadays, there is little knowledge about the clinical and laboratory parameters of wild species in captivity. The present study to has goal determine hematological macaws (*Ara ararauna*, *Ara chloroptera*), to collaboration for the conservation of these species and general concern for the environment.

KEYWORDS: Psittacidae; Ornithopathology, Hematology

INTRODUÇÃO

A hematologia é o ramo da medicina que lida com o relacionamento das alterações dos estados patológicos primários ou secundários subjacentes, e inclui o estudo da morfologia e dos tecidos formadores do sangue (Bister & Ford, 1997).

O conhecimento dos valores hematológicos normais e suas variações regionais são necessários para a interpretação correta de alterações provocadas por diferentes quadros clínicos, assim como para a determinação do grau de reação do organismo (Guerci, 1985). Porém, para as aves silvestres, especialmente os psitacídeos da fauna brasileira, esse conhecimento ainda é escasso, e um campo de trabalho científico pouquíssimo explorado, (Garcia-Navarro e Pachhaly, 1994).

Portanto esse trabalho teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento da fauna de Mato Grosso do Sul, por meio da determinação dos valores hematológicos em indivíduos adultos das espécies *Ara ararauna* (Araras Canindé) e *Ara chloroptera* (Araras Vermelha) de um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS-IMASUL).

MATERIAL E MÉTODOS

Durante o estudo foram realizados colheitas de sangue de 22 indivíduos adultos, sem sexo definido, sendo 19 (86,36%) da espécie *Ara ararauna* (arara canindé) e 3 (13,64%) da espécie *Ara chloroptera* (arara-vermelha), mantidos em recintos específicos, pertencentes ao CRAS-IMASUL em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul.

O sangue foi colhido mediante punção da veia ulnar, utilizando-se seringas de 3 mililitros e agulhas hipodérmicas 25x7 milímetros descartáveis e envasados em tubos de ensaio contendo EDTA (etilenodiaminotetrácetico de sódio) para realização de hemograma.

A contagem total de eritrócitos e leucócitos foram realizadas em hematocítmetro de Neubauer, utilizando diluição com corante Natt & Herrick. A contagem diferencial de leucócitos foi efetuada através de esfregaços, que foram corados pelos corantes Giemsa e Panótico. Os índices hematimétricos, Volume Corpuscular Médio (VGM) e Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM) foram calculados segundo Campbell (1995). As proteínas plasmáticas totais (PPT) e fibrinogênio foram determinadas pelo método de refratometria.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os indivíduos estudados estavam em boas condições corporal e sem sinal externo de doença. Os valores médios para eritrócitos, VG, VGM e CHGM foram compatíveis com os obtidos por SANTOS (1999) e corresponderam respectivamente, a $1,5 \times 10^6$ /L, 42,9 %, 282,54 fL, 25,22 g/dL e 11,16 g/dL.

Em relação ao número total de leucócitos observou-se que o valor médio encontrado, (7,68/mm³) assemelhou-se aos valores obtidos por Campbell (2000), e Santos (1999). Os valores dos monócitos encontram-se acima dos apresentados por Rupley (1999) e Santos (1999). A contagem de eosinófilos mostrou-se elevada em 77% dos animais, quando comparado a vários autores (Rupley,1999; Santos,1999; McDonald, 2002). Nos animais estudados não foram encontrados basófilos e corroboraram os achados de Rupley (1999). A média dos valores de proteínas plasmáticas encontrada no presente trabalho foi de 4,2mg/dl verificando-se semelhança com as concentrações descritas por Rupley (1999), Santos (1999),

O valor médio de fibrinogênio plasmático foi de 0,3mg/dl, e está de acordo com as concentrações encontradas por Santos(1999).

CONCLUSÃO

Por ser uma área ainda com poucos estudos houve dificuldade em encontrar bibliografia com os padrões hematológicos para espécies estudadas, e, portanto permitem concluir que os valores encontrados para as diferentes variáveis de um hemograma podem ser utilizadas como referência auxiliando o diagnóstico de diversas doenças.

REFERÊNCIAS

- BISTNER, S. I., Ford, R. B. Hematologia: Interpretação de achados laboratoriais. **Manual de procedimentos veterinários e tratamento de emergências**. São Paulo: Roca 1997. p.611.
- CAMPBELL, T. W. **Avian hematology and cytology**. E.U.A.: Iowa State University Press, Ames, 1995. p. 104.
- GARCIA-NAVARRO, C.E.K.; PACHALY, J.R. **Manual de hematologia veterinária**. São Paulo: Varela, 1994. p.169.
- RUPLEY, A.E. **Manual de clínica aviária**. São Paulo: Roca, 1999. p.582.
- SANTOS, L. C, **Laboratório ambiental**. Cascavél:Edunioeste, 1999. p.333.

138. COMPORTAMENTO DOS PARÂMETROS RDW-CV, RDW-SD E VCM EM CÃES COM ANEMIA NÃO RESPONSIVA

Bianca Manguiera da Silva¹, Márcia Ferreira Rosa Sobreira², Beatriz Nuala Soares Milano¹, Ricardo Ferreira Leite¹, Roberta V. P. Casale², Eveline Simões Azenha¹.

¹Graduanda em Medicina Veterinária - Universidade Camilo Castelo Branco – Descalvado

²Docente do curso de Medicina Veterinária- Universidade Camilo Castelo Branco – Descalvado

RESUMO

Para diagnóstico de anemias por automação, utilizam-se métodos laboratoriais baseados nos resultados de VCM (volume corpuscular médio) e CHCM (concentração de hemoglobina corpuscular média) associados ao RDW (amplitude de distribuição eritróide): RDW-CV (coeficiente de variação) e RDW-SD (desvio padrão), seus resultados são parâmetros complementares da avaliação do VCM, porém o RDW é considerado índice mais sensível na avaliação da morfologia dos eritrócitos, sendo necessário para um diagnóstico mais exato se fazer a correlação entre estes parâmetros para se conseguir classificar o tipo de anemia, e se chegar a um diagnóstico mais confiável e tratamento eficaz.

PALAVRAS-CHAVES diagnóstico, eritrócitos, correlação, distribuição eritróide

PARAMETERS BEHAVIOR, RDW-CV, RDW-SD AND VCM IN DOGS WITH ANEMIA

ABSTRACT

For the diagnosis of anemias by automation, is used laboratory methods based on the results of VCM and HCM in association with RDW: RDW-CV (coefficient of variation) and RDW-SD (standard deviation), the results are parameters for VCM, RDW is the most sensitive index to evaluation the morphology of erythrocytes. To get more precision on the diagnosis its necessary make comparison of the parameters to classify the type of anemia. With the full diagnose its possible make the correct and effective treatment.

KEYWORDS: diagnosis, erythrocytes, correlation, erythroid distribution

INTRODUÇÃO

A anisocitose indica o grau de variação do tamanho dos eritrócitos observado ao microscópio, no hemograma automatizado através de dois parâmetros: RDW-CV

refere-se à amplitude de distribuição dos eritrócitos medido como coeficiente de variação e RDW-SD o mesmo sendo medido como Desvio Padrão, que são calculados a partir do volume corpuscular médio (VCM), que representa a média do tamanho dos eritrócitos. Os dois parâmetros RDW (Red Cell Distribution Width) e o VCM (Volume Corpuscular Médio) podem auxiliar no diagnóstico diferencial de diversas enfermidades, em especial alguns tipos de anemias, como assim analisado no presente trabalho, a anemia não responsiva, normocítica e normocrônica (ANN).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados 85 hemogramas de cães adultos com anemia não responsiva, sem distinção de raça e sexo. Os valores considerados normais para RDW-CV, RDW-SD e VCM foram: RDW-CV < 15% e RDW-SD < 49.1 fL e VCM entre 80-100 fL (7).

RESULTADOS

Os resultados encontram-se descritos na tabela 01 a seguir.

Tabela 01- Médias e respectivos desvios-padrão dos parâmetros hematológicos de cães com erliquiose. Descalvado (SP), 2012.

	Hemácia	Hemoglobina	Hematócrito	VCM	RDW-SD	RDW-CV
Hemácia	1.00	0.93707	0.88952	-0.14665	-0.10631	-0.44661
		<.0001	<.0001	0.1805	0.3418	<.0001
Hemoglobina	0.93707	1.00	0.91143	0.03318	-0.09763	-0.44931
	<.0001		<.0001	0.7631	0.3829	<.0001
Hematócrito	0.88952	0.91143	1.00	0.05345	-0.04190	-0.41945
	<.0001	<.0001		0.6271	0.7086	<.0001
VCM	-0.14665	0.03318	0.05345	1.00	0.16366	-0.02382
	0.1805	0.7631	0.6271		0.1418	0.8287
RDW-SD	-0.10631	-0.09763	-0.04190	0.16366	1.00	0.63495
	0.3418	0.3829	0.7086	0.1418		<.0001
RDW-CV	-0.44661	-0.44931	-0.41945	-0.02382	0.63495	1.00
	<.0001	<.0001	<.0001	0.8287	<.0001	

DISCUSSÃO

Diferentemente do esperado, não houve correlação significativa entre RDW-CV e VCM em animais com anemia não responsiva. Já no caso do RDW, a análise é feita mais detalhadamente, por este possuir alta sensibilidade a pequenas alterações.

Quanto à hemácia, pudemos concluir que esta tem maior influencia aos níveis de hemoglobina, hematócrito e RDW-CV. Sendo que, o nível de RDW-CV, possui uma correlação negativa, porém altamente significativa. Já com relação à hemoglobina, os níveis de hemácias, hematócrito, e RDW-CV; aparecem alterados. E novamente o

RDW-CV também tem sua correlação negativa. O hematócrito, assim como os outros, também possui correlação negativa com RDW-CV, além dos níveis positivos de hemácias e hemoglobina. O RDW-SD, por sua vez, encontra-se relacionado apenas com o RDW-CV. Porém, diferentemente dos outros, obtém correlação positiva. E finalmente, representando maior influencia ao presente trabalho, o RDW-CV. Este possui relação direta entre RDW-SD, hematócrito, hemoglobina e hemácia; sendo os três últimos de correlação negativa.

CONCLUSÃO

Pudemos concluir que o VCM não possui índices significativos de correlação com os coeficientes analisados pelo método de Spearman; o RDW-SD por sua vez tem importância aos níveis de RDW-CV e deixando assim este com maiores correlações entre os níveis de hemoglobina, hemácia, hematócrito e RDW-SD.

REFERÊNCIAS

BROLLO, CLÁUDIA, TAVARES, REJANE GIACOMELLI. **Avaliação Comparativa dos Parâmetros Hematológicos RDW-CV e RDW-SD.** NewsLab: ed.103, 2010.

MONTEIRO, LEILA. **Valores de referência do RDW-CV e do RDW-SD e sua relação com o VCM entre os pacientes atendidos no ambulatório do Hospital Universitário Oswaldo Cruz - Recife, PE.** Rev. Bras. Hematol. Hemoter. vol.32 no.1, feb. 2010, pub. Mar 19, 2010. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-84842010005000013>>. Acesso em: 29/11/11

NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES PIRES. **Por Que na Relação entre a Concentração de Hemoglobina Globular Média e a Contagem de Hemácias a Avaliação do RDW-SD é Importante?.** Fundação para Assistência as Anemias, Parasitoses e Desnutrição (FANEPA) – Salvador BA.

FERREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS. **FREQÜÊNCIA DE ANEMIAS, ATRAVÉS DA INTERPRETAÇÃO DO ERITROGRAMA POR AUTOMAÇÃO, NO CHAGAS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS EM UBAITAITA – BAHIA.** Salvador-Bahia: jan 2004.

139. CRIPTOCOCOSE DISSEMINADA EM UM CÃO

Thiago Vaz Lopes¹, Sandro de Vargas schons², Nayche Tortato Vieira², Cristiane da Silva Pereira², Felipe Gibim Rezende¹ & Taciane Letícia de melo¹

¹ Centro Universitário Luterano de Ji-paraná/CEULJI

² Universidade Federal de Rondônia/UNIR- sandroschons@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho relata o caso de criptococose canina disseminada diagnosticada no exame pós-morte e histopatológico. A manifestação clínica foi inicialmente observada na pele e progressão para o sistema respiratório e nervoso, sugerindo que a via de infecção tenha sido o tecido cutâneo associado à presença de fezes de pombos no ambiente. Medida de restrição de aves sinantrópicas ao local pode ser uma importante medida de prevenção desta enfermidade.

PALAVRAS-CHAVES *Cryptococcus neoformans*, cão, micose sistêmica

DISSEMINATED CRIPTOCOCOSE IN A DOG

ABSTRACT

This paper reports the case of canine disseminated cryptococcosis diagnosed in postmortem examination and histopathology. The clinical presentation was initially observed in the skin and progressing to respiratory and nervous system, suggesting that the infection has been associated to the skin tissue associated to the presence of pigeons excrements in the environment. Measure restriction site synanthropic birds may be an important measure of prevention of this disease

KEYWORDS: *Cryptococcus neoformans*, dog, systemic mycosis

INTRODUÇÃO

A criptococose é uma doença fúngica causada pelo *Cryptococcus neoformans*, incomum, mas potencialmente fatal, que acomete os animais e o homem. O *C. neoformans* é cosmopolita e pode ser isolado em frutas, solos, mucosa oronasal e pele de animais e pessoas saudáveis (Queiroz et al., 2008). Em solos ricos em fezes de aves, particularmente pombos, o agente pode permanecer viável por no mínimo dois anos, quando não exposto a ambiente seco ou luz solar (Reolon, 2004). A infecção e o quadro clínico da enfermidade esta estreitamente relacionada com a imunidade do hospedeiro (Taboada, 2004). Os sinais clínicos observados podem ser divididos em quatro síndromes principais; a síndrome respiratória, mais freqüente em gatos,

síndrome neurológica, comum em cães e as síndromes cutâneas e oculares. A forma de infecção ainda não está bem esclarecida. Sugere-se que a infecção ocorra principalmente pela inalação dos esporos e sua deposição no trato respiratório, assim como, há relatos de infecção cutânea, com disseminação hematogena ou linfática para outros órgãos e sistema nervoso central (SNC) (WILKINSON, 1988). Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de criptococose disseminada em um cão.

RELATO DO CASO

Um cão da raça Pinscher, de 5 anos, macho foi encaminhado ao Hospital Veterinário (HV) do Centro Universitário Luterano de Ji-paraná/CEULJI, com quadro clínico de lesões alopécicas, descamativa e ulcerativas na região do dorso e cabeça. O diagnóstico das lesões foi de dermatite bacteriana. Após 10 dias, o animal retornou ao HV com sinais de corrimento nasal, estertores respiratórios, tosse, dispnéia, desorientação, diminuição da consciência, espasticidade dos membros, ataxia, dilatação pupilar, convulsão e coma. O animal não respondeu ao tratamento e morreu após dois dias. Posteriormente, realizou-se a necropsia e fragmentos de vísceras foram coletados, fixados em formalina tamponada a 10%, e processadas na rotina do Laboratório de Histopatologia. As lesões de necropsia eram caracterizadas por múltiplas áreas de hemorragia nos pulmões, os rins apresentavam áreas de infarto na região cortical e no SNC, hidrocefalia não comunicante no ventrículo lateral direito. As lesões histopatológicas foram observadas na pele, pulmões, rins e cérebro e eram caracterizadas por infiltrado inflamatório granulomatosa difuso com áreas de necrose. Em todos os órgãos citados eram visualizados basidiósporos de *C. neoformans*, que se apresentavam esféricos, ovais ou elípticos, com parede fina rósea de 5 a 15 µm de diâmetros. Baseado no histórico clínico, sinais clínicos e nos achados macroscópicos e histopatológicos foi diagnosticado criptococose disseminada.

DISCUSSÃO

A criptococose é uma enfermidade fúngica mais freqüente nos felinos do que nos caninos e esta associado comumente a cães debilitados, desnutridos, o uso prolongado de corticosteróides e infecções virais concomitantes (Queiroz et al., 2008). Conforme o proprietário, o animal não apresentava sinais clínicos de outra enfermidade antes do aparecimento das lesões de pele e não foi administrado corticosteróide. Foi relatado também, que no local havia inúmeros pombos e diversas vezes eram encontradas fezes de aves misturadas à ração. Diversos autores relatam a

identificação do *C. neoformans* em fezes de pombos e a presença em grandes concentrações possibilita a dispersão e inalação de grande quantidade de propágulos, o que pode determinar a doença em cães imunocompetentes (Reolon, 2004). A via de infecção mais comum da Criptococose é a respiratória, através da inalação de esporos e leveduras, e posterior disseminação por via hematógena, podendo atingir outros órgão e SNC (Queiroz et al., 2008). Neste relato os primeiros sinais clínicos foram observados no tecido cutâneo e ao fim do curso clínico sinais respiratórios e neurológicos. Sugerindo que a via de infecção tenha sido a pele e posterior disseminação para outros tecidos.

CONCLUSÃO

A criptococose é uma enfermidade rara, mas potencialmente fatal em humanos e animais imunocomprometidos. O estudo epidemiológico e a identificação das fontes de contaminação são indispensáveis na adoção de medidas preventivas e controle de portadores, especialmente as aves sinantrópicas.

REFERÊNCIAS

- QUEIROZ, J.P.A.F.; SOUSA, F.D.N.; LAGE, R.A.; IZAEL, M. A.; SANTOS, A.G. Criptococose- uma revisão bibliográfica. **Acta Veterinario Brasilica**, v 2, n.2, p. 32-38, 2008.
- REOLON, A.; PEREZ, L.R.R.; MEZZARI, A. Prevalência de *Cryptococcus neoformans* nos pombos urbanos da cidade de Porto Alegre, Rio grande do Sul. **J. Bras. Patol. Med. Lab.** v.40, n.5, p. 293-298, 2004.
- TABOADA, J. Micose sistêmicas. In: ETTINGER, S.J.; FELDMAN, E.C. **Tratado de medicina interna veterinária: doenças do cão e do gato**. 5º Ed., Rio de Janeiro, editora Guanabara & Koogan, 2004, p. 478-503.
- WILKINSON, G.T. Criptococcosis. In: BARLOUGH, J.E. **Manual of small animal infectious diseases**. Nova York: Churchill Livingstone, 1988. P. 319-326

140. EFEITO DE TRÊS DIFERENTES DOSES DO FATOR ESTIMULANTE DE COLONIA DE GRANULÓCITOS RECOMBINANTE HUMANO (RHG-CSF) SOBRE O NÚMERO DE LEUCÓCITOS E PLAQUETAS DE CÃES SADIOS

ANA LÍVIA MOTTA SILVA¹, ANA PAULA MASSAE NAKAGE CANESIN², RAFAELA BORTOLOTI VIEIRA², MARIANA SANTOS MARTINS², LORENA KARINE SOARES¹, AUREO EVANGELISTA SANTANA¹

¹Universidade Estadual Paulista– anamedvet@hotmail.com

²Centro Universitário Barão de Mauá

RESUMO

O G-CSF reverte a neutropenia de pequenos animais, entretanto há relatos de que sua utilização reduz os valores de plaquetas. O objetivo do trabalho foi avaliar três diferentes doses do rhG-CSF sobre a contagem de leucócitos e plaquetas em cães sadios. Três grupos, com cinco cães cada, receberam as doses de 5, 10 e 20 µg/kg/dia durante quatro dias. O sangue coletado foi avaliado por 10 dias consecutivos com auxílio do contador automático de células. A elevação leucocitária neutrofílica ocorreu 24 horas após a primeira aplicação com queda aos níveis basais 48 horas após a última aplicação. O número de plaquetas reduziu após a primeira aplicação e não retornou aos valores basais até o último dia de análise. O G-CSF na dose de 5µg/kg/dia eleva o valor de neutrófilos, embora reduza o valor de plaquetas.

PALAVRAS-CHAVES cães, plaquetas, leucócitos, G-CSF

EFFECT OF THREE DIFFRENT DOSES OF RHG-CSF ON THE VALUES OF LEUKOCYTES AND PLATELETS OF HEALTHY DOGS

ABSTRACT

The G-CSF reverses neutropenia in small animals and the dose is mainly used 5µg/kg/dia, however there are reports that its use reduces the platelets. The aim of this study was to evaluate three different doses of rhG-CSF on white blood cell count and platelets in healthy dogs. Three groups of five dogs each, received doses of 5, 10 and 20µg /Kg /day for four days. The blood collected was evaluated for 10 days consecutive with the help of automatic cell counter. The increase in neutrophilic leukocytes occurred 24 hours after the first application with a drop to baseline levels 48 hours after the last application. The number of platelets decreased after the first application and did not return to baseline until the last day of analysis. The G-CSF at a dose of 5µg/kg/d raises the value of neutrophils, although the value of platelet reduced.

KEYWORDS: dogs, platelets, leukocytes, G-CSF

INTRODUÇÃO

O G-CSF estimula a produção e ativação de neutrófilos, sendo utilizado na clínica médica em cães com neutropenia (YAMAMOTO et al., 2011). Entretanto, há redução no número de plaquetas após o uso em humanos (WEAVER et al., 1998) e cães (SILVA et al., 2010). O objetivo deste trabalho foi determinar o efeito de três diferentes doses do rhG-CSF sobre leucócitos e plaquetas de cães saudáveis.

MATERIAL E MÉTODOS

Três grupos com cinco cães sadios receberam 5 (G1), 10 (G2) e 20 $\mu\text{g/Kg/dia}$ (G3) de rhG-CSF durante quatro dias. Contagem de leucócitos e plaquetas foi feita durante dez dias em um contador automático de células ABC Vet (HORIBA ABX – São Paulo/Brasil) e a contagem diferencial de leucócitos feita em esfregaço sanguíneo corado com Panótico®.

RESULTADOS

A leucocitose ocorreu devido à elevação dose-dependente de neutrófilos segmentados que ocorreu 24 horas após a aplicação do medicamento com diferença estatística. Entretanto, 48 horas após a última dose, os valores retornaram aos níveis basais nos três grupos. O número de plaquetas reduziu após a primeira dose e não recuperou até o último momento de avaliação.

Figura 1 e 2: Valores médios de NS e de plaquetas dos cães nos diferentes momentos de avaliação

DISCUSSÃO

Neste estudo, verificou-se elevação significativa na contagem de leucócitos e neutrófilos segmentados, que se inicia 24h após a primeira aplicação do rh-GCSF (SUTTROP et al., 2011); permanece elevada durante os quatro dias de administração, sendo dose-dependente (YAMAMOTO et al., 2011); e retorna aos valores basais dois dias após o término da aplicação. A redução na contagem plaquetária também foi relatada por Weaver et al. (1998) em humanos após a primeira aplicação de rhG-CSF.

CONCLUSÃO

Apesar da elevação dose-dependente, a dose de 5µg/Kg/dia é suficiente para elevar os neutrófilos, sendo sua aplicação viável por ser menos oneroso. Entretanto deve-se ter cautela em utilizá-lo em pacientes trombocitopênicos.

NOTA: aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal (Protocolo n. 007958/11, 12 de maio de 2011).

REFERÊNCIAS

- SILVA, A.L.M.; CANESIN, A.P.M.N.; CÁPUA, M.L. et al. Avaliação plaquetária de cães com linfoma submetidos à quimioterapia, transplante de medula óssea e fator estimulante de colônia de granulócitos (G-CSF). **Revista Acadêmica de Ciências Agrárias e Ambientais**, v. 8, n. 3, p. 307-317, 2010.
- SUTTROP, M.; HOFFMAN, B.; SIPPEL, W.G. Prevention of oestradiol-associated toxicosis in a dalmatian by early intervention with granulocyte colony-stimulating factor. *Veterinary Record*, v. 151, n.8, p. 244-245
- WEAVER, C.H.; BIRCH, R.; GRECO, L. et al. Mobilization and harvesting of peripheral blood stem cells: randomized evaluations of different doses of filgrastim. **British Journal of Haematology**, v. 100, n. 2, p. 338-347, 1998.
- YAMAMOTO, A.; FUJINO, M.; TSUCHIYA, T. et al. Recombinant canine granulocyte colony-stimulating factor accelerates recovery from cyclophosphamide-induced neutropenia in dogs. **Veterinary Immunology and Immunopathology**, v. 142, n. 3-4, p. 271-275, 2011

141. EFEITO DO FATOR ESTIMULANTE DE COLÔNIA DE GRANULÓCITOS RECOMBINANTE HUMANO (RHG-CSF) NA MOBILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO HEMATOPOÉTICAS CD34⁺ PARA O SANGUE PERIFÉRICO DE CÃES SAUDÁVEIS

ANA LÍVIA MOTTA SILVA¹, ANA PAULA MASSAE NAKAGE CANESIN², RAFAELA BORTOLOTI VIEIRA², MARIANA SANTOS MARTINS², FABIANA ROSSETO³, AUREO EVANGELISTA SANTANA¹

¹Universidade Estadual Paulista– anamedvet@hotmail.com

²Centro Universitário Barão de Mauá

³Universidade de São Paulo

RESUMO

O rhG-CSF é uma citocina que eleva o número de neutrófilos e mobiliza células-tronco hematopoéticas (CTH) para o sangue periférico. O objetivo foi estabelecer a dose de rhG-CSF que permita a mobilização das células-tronco ao sangue periférico de cães sadios. Três grupos com cinco cães saudáveis receberam as doses de 5, 10 e 20µg/Kg/dia de rhG-CSF durante quatro dias. O sangue foi coletado e analisado por citometria de fluxo para quantificar o número de células-tronco CD34⁺/µL. Após 24 horas da primeira aplicação ocorreu elevação no número de células CD34⁺ ao sangue periférico para os grupos G2 e G3, porém não no G1. A aplicação de rhG-CSF em cães saudáveis nas doses de 10 e 20 µg/Kg/dia foram suficientes para elevar o número de CTH no sangue periférico, entretanto 5µg/Kg/dia não promove adequada mobilização.

PALAVRAS-CHAVES cães, G-CSF, CD34⁺, sangue periférico mobilizado.

EFFECT RECOMBINANT HUMAN GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR (RHG-CSF) IN THE MOBILIZATION OF HEMATOPOIETIC STEM CELL CD34⁺ TO THE PERIPHERAL BLOOD OF HEALTHY DOGS

ABSTRACT

The rhG-CSF is a cytokine that increases the number of neutrophils and also mobilizes hematopoietic stem cells (HSC) into peripheral blood. The aim of this study was to determine what dose of rhG-CSF mobilizes stem cells to peripheral blood of healthy dogs. Three groups of five healthy dogs that received doses of 5, 10 and 20µg/Kg/d for four days. Blood was collected and analyzed by flow cytometry to quantify the number of CD34⁺ stem cells /µL. After 24 hours the first application elevation occurred in the number of CD34⁺ peripheral blood to the G2 and G3, but did not occur in G1. The application of rhG-CSF in healthy dogs in doses of 10 and 20µg/Kg/d were sufficient to increase the number of HSC in peripheral blood, however the dose 5µg/Kg/d does not promote mobilization.

KEYWORDS: dogs, G-CSF, CD34+, mobilized peripheral blood

INTRODUÇÃO

O rhG-CSF pode ser aplicado para mobilizar células-tronco hematopoéticas (CTH) da medula óssea para a circulação periférica (WEAVER, 1998). As CTH são células progenitoras caracterizadas pelo antígeno de superfície CD34 e podem ser **identificadas** com a utilização de anticorpos monoclonais (AcMo) num procedimento denominado citometria de fluxo (GODOY, 2010). O objetivo foi determinar entre três diferentes doses a que promova mobilização de, pelo menos, 10 **células** CD34⁺/μL para o sangue periférico.

MATERIAL E MÉTODOS

Três grupos com cinco cães saudáveis receberam rhG-CSF, por via subcutânea, durante quatro dias consecutivos, nas doses de 5 (G1), 10 (G2) e 20 (G3) μg/kg/dia. O sangue coletado foi marcado com AcMo anti-CD34⁺ canino e analisado no citômetro de fluxo FACSCANTO (Becton Dickinson, San Jose, CA) com auxílio do software FACSDiva.

RESULTADOS

Para os grupos G2 e G3 ocorreu elevação dose-dependente estatisticamente significativa no valor de CTH 24h após primeira aplicação de rhG-CSF; no G1 os valores não elevaram. Houve queda estatisticamente significativa 24h após a última aplicação nos grupos experimentais 2 e 3.

Figura 1: Valores médios de CTH CD34⁺/μL dos cães nos diferentes momentos de avaliação

DISCUSSÃO

Neste estudo, verificou-se elevação significativa dose-dependente na contagem de células CD34⁺/μL após a primeira aplicação (PARK et al., 2007) nos grupos 2 e 3 com queda significativa após a última dose (KOBBE et al., 1999). Enquanto as doses de 10 e 20 μg/Kg/dia mobilizaram adequadamente (WEAVER, 1998), a dose de 5 μg/Kg/dia não mobilizou (GODOY, 2010).

CONCLUSÃO

A dose de 5µg/Kg/dia não é suficiente para mobilizar CTH ao sangue periférico de cães saudáveis.

NOTA: aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP, Jaboticabal (Protocolo n. 007958/11, 12 de maio de 2011).

REFERÊNCIAS

- GODOY, A. V. **Avaliação leucométrica e citofluorométrica do sangue periférico de cães com linfoma após os uso de rhG-CSF, submetidos ou não ao transplante de medula óssea.** Jaboticabal: UNESP, 2010. 58p. Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Veterinária, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2010.
- KOBBE, G. SOHNGEN, D., BAUSER, U. et al. Factors influencing G-CSF-mediated mobilization of hematopoietic progenitor cells during steady-state hematopoiesis in patients with malignant lymphoma and multiple myeloma. **Annals of Hematology**, v. 79, n. 10, p. 456-462, 1999.
- PARK, C., YOO, J.H., JEON, H.W. et al. Therapeutic trial of *Granulocyte-Colony Stimulating Factor* for dilated cardiomyopathy in three dogs. **Internal Medicine**, v. 69, n. 9, p. 951-955, 2007.
- WEAVER, C.H.; BIRCH, R.; GRECO, L. et al. Mobilization and harvesting of peripheral blood stem cells: randomized evaluations of different doses of filgrastim. **British Journal of Haematology**, v. 100, n. 2, p. 338-347, 1998.

142. ESTUDO RETROSPECTIVO DOS RESULTADOS CITOPATOLOGICOS DE TUMORES MAMÁRIOS EM CADELAS ATENDIDAS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ANIMAIS DE COMPANHIA DA PUCPR (UHAC)

Thais de A. Knopf¹, Marina Rodacki³, Liv C. Miara²; Rita Maria V. M .Rocha²

1- Médico veterinário residente na Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

2- Professora Adjunta da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

3- Graduanda do curso de Medicina Veterinária Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

RESUMO

A avaliação citopatológica é caracterizada como uma ferramenta de auxílio diagnóstico de baixo custo e de grande rapidez na rotina clínica veterinária. O objetivo do presente trabalho é analisar os resultados obtidos pelas citologias aspirativas por agulha fina realizadas no período entre janeiro de 2003 a dezembro de 2011 na UHAC da PUCPR. Das 1.485 avaliações citopatológicas realizadas 336 foram referentes a tumores mamários. Diagnósticos sugestivos de neoplasia foram alcançados em 49,1% das amostras analisadas e a maioria (12,5%) dos tumores foram classificados como neoplasia maligna de origem epitelial.

PALAVRAS-CHAVES: tumor, mamário, citopatologia

CYTOPATHOLOGY RETROSPECTIVE STUDY OF RESULTS IN BREAST TUMORS OF BITCHES ANSWERED IN HOSPITAL UNIT OF PET ANIMALS OF PUCPR (UHAC)

ABSTRACT

The cytopathological assessment is characterized as a tool to aid diagnosis of low cost and great speed in routine veterinary practice. The objective of this study is to analyze the results obtained by fine needle aspiration cytology in the period between January 2003 and December 2011 in UHAC PUCPR. Of the 1485 avaliation smear performed 336 assessments were related to mammary tumors. Suggestive of cancer diagnoses were achieved in 49.1% of the samples and the majority (12.5%) tumors were classified as malignant neoplasm of epithelial origin.

KEYWORDS: tumor, mamary, citopathology

INTRODUÇÃO

Tumor mamário é qualquer distúrbio do crescimento da glândula mamária, seja ele neoplásico, podendo ser benigno ou maligno, ou não-neoplásico como a hiperplasia (FILHO *et al.*, 2010). As neoplasias representam entre 25 a 50% dos tumores, onde metade deles é classificada como maligno. Para o diagnóstico precoce são fundamentais a confirmação e a classificação desses tumores através da citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) e pela histopatologia, esse último sendo o método mais adequado e eficaz para a classificação das neoplasias mamárias (FILHO, 2010).

A citologia aspirativa proporciona um diagnóstico rápido e de baixo custo que muitas vezes evita a internação, sendo muito utilizada na abordagem inicial de uma lesão para identificar sua origem. Estudos demonstram que as neoplasias mamárias compõem parte significativa da rotina citopatológica e que pode haver resultados falso-negativos (DE OLIVEIRA *et al.*). Segundo Withrow (2007), a maioria das neoplasias mamárias é de origem epitelial e a minoria é de origem mesenquimal.

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizado um estudo retrospectivo de nove anos (2003 á 2011) dos resultados das citologias aspirativas por agulha fina analisadas no Laboratório de Análises Clínicas da Unidade Hospitalar de Animais de Companhia da PUCPR. De um total de 1.485 citopatologias realizadas na UHAC, 336 amostras são provenientes de tumores da glândula mamária em cadelas.

RESULTADOS

O total de 1.485 exames citopatológicos foram realizados em animais da espécie canina, incluindo várias raças, idades e ambos os sexos. Dentre esses, 336 eram referentes a tumores da glândula mamária, significando 22,6%. Analisando apenas os resultados dos exames citológicos mamários, 42 (12,5%) sugeriram carcinoma mamário; 36 (11%) adenocarcinoma mamário; 27 (8%) reação inflamatória; 23 (7%) tumor misto mamário, 8 (2%) sarcoma mamário, 5 (1%) adenoma mamário e , junto aos sinais clínicos e a lesão macroscópica, 3 (1%) carcinoma inflamatório mamário. Outras neoplasias como mastocitoma, tumor venéreo transmissível, lipoma foram diagnosticadas em 21 (6%) das citologias mamárias. Outros achados como debris celulares, contaminação por sangue, material necrótico, material fibroso, cistos e abscessos foram responsáveis por 57 casos (17%).

DISCUSSÃO

A grande incidência de tumores mamários em cadelas é evidente, representando quase 25% do total das citologias realizadas no UHAC, estando de acordo com a literatura segundo FILHO et al, 2010. De acordo com Withrow (2007), 41 a 53% dos tumores de mama são malignos, a avaliação citopatológica obtida pelo presente estudo demonstrou que 32,4% dos tumores mamários eram malignos. Cerca de 17% dos casos apresentaram quadro citológico sugestivo inconclusivo e sem material celular neoplásico, concordando com FILHO (2010) que cita que a CAAF tem resultados falso-negativos e as características malignas devem ser confirmadas com a histopatologia.

No presente trabalho a maioria dos tumores mamários malignos são de origem epitelial, ou carcinomas, e os sarcomas são a minoria, como pode ser observado em Withrow, 2007. Em 138 (41%), das 336 amostras analisadas, o diagnóstico sugestivo foi alcançado pela minuciosa avaliação do tipo celular e aspectos de malignidade, o que mostra que a CAAF pode ser um auxílio diagnóstico rápido e menos invasivo nos tumores mamários em cadelas.

CONCLUSÃO

É crescente a incidência de tumores de mama em cadelas e tal fato gera a necessidade de mais estudos relacionados ao comportamento maligno das neoplasias.

A histopatologia ainda é o exame de escolha para a realização do diagnóstico definitivo, porém a avaliação citopatológica é mais rápida, com menor custo, menos invasiva e cada dia mais toma seu espaço na rotina diária do Médico Veterinário Patologista.

REFERÊNCIAS

- FILHO J.C.O ; KOMMERS G.D ; MASUDA. E.K.; MARQUES. B.M.F.P; FIGHERA.R.A; IROGOYEN L. F; BARROS. C.S.L; Estudo retrospectivo de 1.647 tumores mamários em cães. **Pesq. Vet. Bras.** vol.30 no.2 Rio de Janeiro Feb. 2010 [acessado em 20/04/2011].
- MacEWEN, E.G. e WITHROW, S.J. Tumors of the mammary gland. In: WITHROW,S.J., MacEWEN, E.G. **Small animal clinical oncology**. 4ed. Saunders Elsevier, p.356-372. 2007.

143. FREQUÊNCIA DOS GRUPOS SANGÜÍNEOS A, B E AB EM GATOS DOMÉSTICOS MISTIÇOS NA CIDADE DE PATOS, PARAÍBA, BRASIL

Rodrigo de Souza Mendes¹, Thiago Araújo Gurjão¹, Luciana de Almeida Lacerda², Almir Pereira de Souza¹, Rosângela Maria Nunes da Silva¹, Kamila Nunes de Araújo¹

¹Universidade Federal de Campina Grande – CSTR/Patos PB.

² Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias, LACVET/UFRGS – Porto Alegre, RS.

RESUMO

Objetivou-se com este estudo a determinar da frequência de antígenos eritrocitário do sistema AB em felinos mestiços na cidade Patos, Paraíba, Brasil. Foram utilizados 96 felinos sem raça definida atendidos no HV/UFCG, tipados pelo método de hemaglutinação em tubo de ensaio. A frequência de antígenos eritrocitários A, B e AB em sua totalidade obtidas neste estudo foram de 97,9% (n = 94), 1,05% (n = 1) and 1,05% (n = 1), respectivamente. A população de felinos estudada na cidade de Patos apresentou uma maior frequência de antígeno eritrocitário A.

PALAVRAS-CHAVES antígeno eritrocitário, gatos, imunohematologia

FREQUENCY OF BLOOD GROUPS A, B AND AB IN MIXED BREED DOMESTIC CATS IN THE CITY OF PATOS, PARAIBA, BRAZIL

ABSTRACT

The objective of this study to determine the frequency of the system AB erythrocyte antigens in mixed breed domestic cats in the city Patos, Paraíba, Brazil. We used 96 mixed breed domestic cats treated at the HV / UFCG, typed by the hemagglutination method in a test tube. The frequency of erythrocyte antigens A, B and AB in its entirety in this study were obtained 97,9% (n = 94), 1,05% (n = 1) and 1,05% (n = 1), respectively. The population of cats studied in the city of Patos had a higher frequency of erythrocyte antigen A.

KEYWORDS: erythrocyte antigen, cats, immunohematology

INTRODUÇÃO

Os tipos sangüíneos são definidos por antígenos espécie-específicos presentes na superfície dos eritrócitos (Harvey, 1997). Na medicina veterinária, o significado clínico dos tipos sangüíneos está associado às reações transfusionais e à isoeritrólise neonatal (Hohenhaus, 2004). Em felinos, a nomenclatura que designa os tipos

sangüíneos A e B foi usada pela primeira vez em 1962. Um terceiro tipo AB foi descrito em 1980 (Hohenhaus, 2004). Segundo Knottenbelt et al. (2002), pesquisas sobre a prevalência de cada tipo sangüíneo foram realizadas em diversos países e os resultados destes estudos possuem aplicação prática na clínica de pequenos animais. Desta forma, objetivou-se com esta pesquisa determinar a freqüência de tipos sangüíneos em uma população de gatos mestiços na cidade de Patos, Paraíba, Brasil.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 96 gatos domésticos sem definição racial, atendidos no hospital veterinário da Universidade Federal de Campina Grande. Para determinação dos tipos sangüíneos foi adotado o método de tipagem por hemaglutinação em tubo de ensaio como descritos por Knottenbelt (2002) e Knottenbelt (1999). Que consiste na adição da suspensão de eritrócitos previamente lavados em soluções específicas (Solução anti A – soro sangüíneo de gato B, solução anti B – *Triticum vulgaris* e solução controle – tampão PBS), onde são incubadas durante 15 segundos, centrifugadas e ressuspendidas para observação de aglutinação e evidenciação de antígenos eritrocitário do sistema AB felino.

RESULTADOS

Neste estudo a freqüência de antígenos eritrocitários A, B e AB em sua totalidade foram de 97,9% (n = 94), 1,05% (n = 1) and 1,05% (n = 1), respectivamente.

DISCUSSÃO

Os dados de freqüência obtidos nesta população demonstrou uma predominância do antígeno eritrocitário do tipo A. Resultados semelhantes foram obtidos em estudos nas cidades brasileiras e em outros países (Lacerda et al., 2008; Knottenbelt, 2002). Uma maior prevalência deste tipo sangüíneo, principalmente na população de gatos mestiços podem estar relacionados com a maior predominância de gatos homozigotos para o alelo A nesta população (Lacerda et al., 2008). As freqüências do tipo sangüíneo B e AB se comportou em comum com grande parte dos estudos de prevalência conduzidos no Brasil e em todo o mundo, situação que reforça a predominância de felinos homozigotos para o alelo A (Lacerda et al 2008). Variações na freqüência destes tipos sangüíneos foram registradas no Brasil e em outros países,

tais condições são explicadas por uma maior incidência de felinos fenótipos homozigotos recessivos na população estudada para o alelo B (Auer & Bell, 1981), onde nestas populações o alelo AB parece estar mais presentes (Knottenbelt, 2002; Auer & Bell, 1981).

CONCLUSÃO

A população de felinos estudada na cidade de Patos apresentou uma maior frequência de antígeno eritrocitário A.

REFERÊNCIAS

- AUER L. & BELL K. The AB blood group system of cats [abstract]. *Animal blood groups and biochemical genetics*. 12(4), 287-297. 1981.
- HARVEY, J. W. The erythrocyte: physiology, metabolism and biochemical disorders. In: KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. **Clinical biochemistry of domestic animals**. 5. ed. San Diego: Academic Press USA, cap.7, p. 157-203. 1997.
- HOHENHAUS, A. E. Importance of blood groups and blood group antibodies in companion animals. **Transfusion Medicine Reviews**, v. 18, n. 2, p. 117- 126, 2004.
- KNOTTENBELT, C. M. The feline AB blood group system and its importance in transfusion medicine. **Journal of Feline Medicine and Surgery**, v. 4, n. 2, p. 69-76, 2002.
- KNOTTENBELT, C.M.; ADDIE, D.D.; DAY, M.J. & MACKIN, A.J. Determination of the prevalence of feline blood types in the UK. *Journal of Small Animal Practice*. 40(3), 115-118. 1999.
- LACERDA, L.A.; OLIVEIRA, S.T.; GUERRA, T.A.; STEIN, G.G.; GONZÁLEZ, F.H.D. Prevalência dos tipos sanguíneos A, B e AB em gatos domésticos mestiços da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. **Braz. J. vet. Res. anim. Sci.**, São Paulo, v. 45, suplemento, p. 46-53, 2008.

144. INCLUSÃO DE *HEPATOZOON* EM CÉLULAS DE TUMOR VENÉREO TRANSMISSÍVEL CANINO

Vivian ertel¹, Danieli B. Martins^{1,2}, Sonia T. A. Lopes¹, Marcos M. B. Corrêa¹,
Marilia A. Valandro^{2*}, Carine R. Stefanello²

¹ Universidade Federal de Santa Maria (UFSM-RS)

² Universidade de Cruz Alta (UNICRUZ-RS). * Apresentadora do trabalho.

Email: vetdanielimartins@yahoo.com.br

RESUMO

Hepatozoon sp. é um parasita canino, transmitido pela ingestão de carrapatos contaminados. O tumor venéreo transmissível (TVT) é uma neoplasia benigna e sexualmente transmissível, transmitido por contato de mucosas em cães. Para este relato, foi realizada citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) de um nódulo cervical, corado com panótico rápido e realizado exame microscópico, onde foram encontradas células compatíveis com TVT, que apresentavam inclusões características de *Hepatozoon* sp.. é possível que a presença de merozoítos de *Hepatozoon* sp. em células de TVT tenha relação com epítomos comumente encontrados também em macrófagos.

PALAVRAS-CHAVE: hepatozoonose, neoplasma transmissível, citologia, cão

INCLUSION OF *HEPATOZOON* IN CANINE TRANSMISSIBLE VENEREAL TUMOR CELLS

ABSTRACT

Hepatozoon sp. is a canine parasite, transmitted by ingestion of infected ticks. The transmissible venereal tumor (TVT) is a benign and sexually transmitted infection, transmitted by contact with mucous membranes in dogs. For this report, we performed fine-needle aspiration cytology (FNAC) of a node in the neck, stained with diff-quick and microscopic examination performed, where cells were found compatible with TVT, wich showed characteristic inclusions of *Hepatozoon* sp.. None of the species of the parasite seems to have tropism for neoplastic cells. It's possible that the presence of merozoites of *Hepatozoon* sp. in TVT cells has a relation to epitopes commonly found in macrophages.

KEYWORDS: hepatozoonosis, transmissible venereal tumor, cytology, node

INTRODUÇÃO

A hepatozoonose canina é uma doença transmitida pela ingestão de carrapatos contaminados com o protozoário do gênero *Hepatozoon* (BANETH et al., 2003). Alguns merozoítos penetram em neutrófilos ou monócitos e se desenvolvem em gametócitos (GONDIM, 1998). No geral, a hepatozoonose causada pelo *H. canis* apresenta-se, como doença inaparente e sub-clínica (BANETH et al., 2003). O diagnóstico é feito por esfregaço sanguíneo, onde são encontrados gametócitos do parasita dentro de neutrófilos e monócitos (GONDIM, 1998).

O tumor venéreo transmissível canino (TVT) é uma neoplasia benigna, contagiosa e sexualmente transmissível. A transmissão acontece por contato com mucosas e a propagação é facilitada em presença de abrasão ou perda da integridade da superfície (AMARAL, 2004). O diagnóstico definitivo é feito com exame citopatológico (MAGALHÃES, 2001).

MATERIAL E MÉTODOS

Foi realizada citologia aspirativa por agulha fina (CAAF) de nódulo em região cervical dorsal direita, de aproximadamente 6 cm de diâmetro com aspecto friável e sangrante, de crescimento progressivo (Figura 1A). A lâmina foi corada com panótico rápido, e realizada avaliação microscópica da mesma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na microscopia, foram encontradas células redondas com alta relação núcleo citoplasma, nucléolo evidente, vacuolização e basofilia citoplasmática, cromatina grumosa a frouxa e algumas figuras de mitose, compatíveis com TVT (Figura 1B). Tais células apresentavam inclusões translúcidas, de formato retangular e que estavam sobrepostas e comprimiam seu núcleo, características de *Hepatozoon* sp., algo não relatado em literatura.

Animais com TVT extragenital comumente apresentam imunossupressão, assim como a presença de inclusões de *Hepatozoon* nos leucócitos. Nenhuma das espécies deste gênero parece ter tropismo por células neoplásicas.

Levando em consideração que o TVT é uma neoplasia ímpar, pois não parte da replicação de células caninas e sua origem não é bem esclarecida, é provável que a presença das inclusões nestas células neoplásicas se deva à presença de epítomos comumente encontrados em macrófagos, como provado por Marchal et al. (1997), o

que justificaria a invasão destas células pelos merozoítos de *Hepatozoon* sp. Já foi relatada a presença da forma amastigota de *Leishmania infantum* em células de TVT (ALBANESE et al., 2002), corroborando com esta teoria de origem histiocitóide desta neoplasia.

Fatos não antes relatados, como a presença de *Hepatozoon* sp. em células neoplásicas, como as células de TVT demonstradas neste relato, demonstram que ainda não se sabe ao certo quais células podem ser atingidas pelo parasita.

Figura 1- Tumor venéreo transmissível canino (TVT). A) Cão apresentando nódulo cervical. B) Citologia do nódulo cervical com células compatíveis de TVT parasitadas por *Hepatozoon* sp. (setas).

REFERÊNCIAS

- ALBANESE F.; POLI A.; MILLANTA F.; ABRAMO F. Primary cutaneous extragenital canine transmissible venereal tumour with *Leishmania*-laden neoplastic cells: a further suggestion of histiocytic origin? **Veterinary Dermatology**. Nº 13, 2002, pg. 243-246.
- AMARAL, A. S.; GASPAR, L. F. J.; SILVA, S. B.; ROCHA, N. S. Diagnóstico citológico do tumor venéreo transmissível na região de Botucatu, Brasil (estudo descritivo: 1994-2003). **RPCV**. Vol. 99, nº 551, 2004, pg. 27-31
- BANETH, G.; MATHEW, J. S.; SHKAP, V. et al. Canine hepatozoonosis: two disease syndromes caused by separate *Hepatozoon* spp. **Trends Parasitol**. Vol. 19, 2003, pg. 27-31.
- GONDIM, L. F. P.; KONAYAGAWA, A.; ALENCAR, N. X. et al. Canine hepatozoonosis in Brazil: description of eight naturally occurring cases. **Vet. Parasitol**. Vol. 74, 1998, pg. 319-323.
- MAGALHÃES, A. M.; RAMADINHA, R. R.; BARROS, C. S. L.; PEIXOTO, P. V. A. Comparative study between cytology and histopatology for the diagnosis of canine neoplasms. **Pesquisa Veterinária Brasileira**. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Seropédica – RJ, 2001.
- MARCHAL, T.; CHABANNE, L.; KAPLANSKI, C.; RIGAL, D.; MAGNOL, J. P. Immunophenotype of the canine transmissible venereal tumour. **Veterinary Immunology and Immunopathology**. Nº 57, 1997, pg. 1-11.

145. ÍNDICES DE ATIVIDADE DE GAMAGLUTAMILTRANSEPTIDASE URINÁRIA EM CÃES ADULTOS SAUDÁVEIS.

Thais de A. Knopf¹, Ronaldo Viana², Juliane Possebom¹, Rita Maria V. M. Rocha³,
Carolina Z. Cavalcante³

1- Médico veterinário residente da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

2- Graduando de Medicina Veterinária da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

3- Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

RESUMO

A gamaglutamiltranspeptidase (GGT) na urina está presente na borda em escova dos túbulos contornados proximais renais e ela é usada como um bom método diagnóstico para disfunção tubular renal. O objetivo do trabalho é estabelecer o índice de atividade desta enzima na urina de cães adultos saudáveis, correlacionar achados da urinálise e o que possa influenciar na sua dosagem. Foram avaliados treze cães adultos, com e sem definição racial, de ambos os sexos e clinicamente saudáveis a fim de estabelecer índices de atividade de GGT na urina. Os valores da não sofreram influência entre sexos, infecção do trato urinário inferior e hematuria microscópica, porém três amostras de urina que apresentaram valores aumentados de GGT urinária possuíam associado cilindúria no sedimento, o que podem indicar uma associação com lesão ou disfunção tubular renal.

PALAVRAS-CHAVES: *GGT, urinária, enzima*

INDICE OF URINE GLUTAMILTRANSEPTIDASE ACTIVITY IN CLINICALLY NORMAL ADULT DOGS

ABSTRACT

The gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) in urine is present in the brush border of renal proximal convoluted tubule and is used as a good diagnostic method for renal tubular dysfunction. The objective of this study is to establish the level of activity of this enzyme in the urine of healthy adult dogs, urinalysis and correlate findings that may affect your dosage. Thirteen adult dogs were evaluated with and without racial definition of both sexes, clinically healthy in order to establish levels of GGT activity in urine. The values were not influenced by sexes, lower urinary tract infection and microscopic hematuria, but three urine samples that showed increased values of GGT had associated urinary casts in the sediment, which may indicate an association with renal tubular injury or dysfunction.

KEYWORDS: GGT, urinary, enzyme

INTRODUÇÃO:

O exame mais comumente utilizado na avaliação da taxa de filtração glomerular é a mensuração dos valores de uréia e creatinina séricas, porém a azotemia renal se instala somente quando 70-75% da capacidade funcional dos néfrons estiver afuncional (BRUNKER, 2009). Devido à baixa sensibilidade dos métodos de avaliação renal disponíveis, enzimas urinárias têm sido utilizadas para avaliação renal em humanos e em cães. A GGT urinária se encontra nos túbulos contornados proximais renais e sua detecção na urina é um bom método diagnóstico para lesão ou disfunção tubular renal (DeSCHEPPER, 1989). Estudos demonstram diferenças significativas dos resultados da GGT urinária com base no pH urinário, mas não há evidências de que a diferença entre sexo, a hematúria e a bacteriúria influencie nos resultados (BRUNKER, 2009).

Existem poucos estudos que determinem valores de referência dessa enzima na urina. O presente trabalho tem como objetivo estabelecer o índice de atividade desta enzima na urina de cães adultos saudáveis, correlacionar os achados da urinálise e o que possa influenciar na sua dosagem.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados 13 cães, dentre esses sete machos e seis fêmeas (entre 1 e 8 anos) clinicamente saudáveis para avaliação hematológica e urinária afim de excluir enfermidades sistêmicas. Para avaliação hematológica, 2 mL de sangue total foram coletados e armazenados em tubo com o anticoagulante EDTA. As amostras de urina foram coletadas assepticamente através de cistocentese. Após a coleta, foi realizado o exame físico, químico e do sedimento urinário. A determinação da atividade da GGT urinária foi realizada imediatamente após a urinálise, com 100 µL do sobrenadante da urina. Essa determinação foi realizada com o reagente comercial GGT Liquiform® baseado no princípio do método de Szasz por espectrofotometria em modo cinético. Foi considerado o valor de GGT urinária normal de referência de 13 U/L a 92 U/L segundo DeSchepper, 1989.

RESULTADOS

Em um total de 13 urinas, 3 cães (23,1%) apresentaram hematúria microscópica (5-75 eritrócitos/campo). A densidade urinária foi acima de 1,050 em 3 cães; e variou entre 1,025 e 1,050 em 10 cães. Somente uma urina apresentou infecção do trato urinário (7,7%), duas (15,4%) apresentaram cilindrúria (1/campo) e duas (15,4%) urinas

apresentaram cristalúria (estruvita e carbonato de cálcio). Das 13 urinas analisadas, três (23,1%) tiveram valores acima do intervalo normal de referência. Dentre as 13, nove (69,2%) apresentaram valores entre 20 e 40 U/L. Nas 13 urinas presentes no estudo, o pH variou entre 5,0 (1 cão) e 9,0 (2 cães); valores < 7,0 foram vistos em 6 urinas (46,1%) e ≥ 7,0 em 7 urinas (53,8%).

DISCUSSÃO

No presente estudo, a atividade da GGT urinária não sofreu influência do pH urinário, segundo BRUNKER et al, (2009) esta enzima é inativada quando o pH se encontra ≤ 4,7 e há alteração quando a urina se encontra ácida ou básica. Não houve aumento da GGT urinária nas três urinas que apresentaram hematúria microscópica e também na única urina que apresentou infecção do trato urinário, segundo BRUNKER et al, (2009), urinas com bacteriúria e com hematúria podem alterar os valores da GGT urinária. Porém, das três urinas que apresentaram GGT acima de 100 U/L, duas (66,6%) apresentaram cilindrúria (1/campo), provavelmente devido a alguma lesão renal presente (BRUNKER, 2009).

CONCLUSÃO:

Devido à baixa sensibilidade demonstrada pelos métodos de avaliação renal disponíveis, enzimas urinárias têm sido estudadas e descritas como marcadores precoces de nefrotoxicidade e lesão renal tubular aguda. Mais estudos são precisos para o estabelecimento de índices de atividade da GGT urinária e para determinar a sensibilidade e a especificidade de enzimas urinárias e o que realmente influencia no seu resultado.

REFERÊNCIAS

BRUNKER JD; PONZIO NM; PAYTON ME; Indices of urine N-acetyl-B-D-glucosaminidase and –glutamyl transpeptidase activities in clinically normal adult dogs. **American Journal of Veterinary Research**, vol 70, n2, 2009.

DeSCHEPPER, J. Urinary gama-glutamyltransferase and degree of renal dysfunction in 75 bitches with pyometra. **Res Veterinary Science**, v46, p.396-400, 1989.

146. LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÔNICA EM FILHOTE – RELATO DE CASO

Miucha de Almeida Furtado¹, Joana d’Arc Gomes de Oliveira¹, Julia Liger de Freitas¹,
Camila Paes Burger⁴

1. Médica Veterinária Residente do setor de Clínica Médica de Pequenos Animais do HOSPMEV-UFBA
2. Professora substituta assistente – Departamento de Patologia e Clínica – EMVZ / UFBA
3. Daniela Farias Larangeira

Professora adjunta Universidade Federal da Bahia

4. Luis Fernando Pita Gondim

Professor Adjunto Universidade Federal da Bahia

RESUMO

A Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) é definida como proliferação anormal de linfócitos maduros, morfolologicamente normais, na medula óssea ou no sangue periférico. Esse trabalho tem como objetivo relatar o caso de Leucemia Linfocítica Crônica em um cão da raça Bulldog Francês, macho, de três meses de idade, atendido no Hospital Veterinário da UFBA. Após observação de linfocitose severa no hemograma, o animal foi encaminhado para punção de medula óssea, a qual confirmou o diagnóstico. Diante desse resultado o presente trabalho demonstra a importância da realização de exames laboratoriais para a determinação de um diagnóstico na presença de sinais clínicos inespecíficos.

Palavras – chaves: leucemia linfocítica crônica, neoplasias, cão

LEUKEMIA IN CHRONIC LYMPHOCYTIC PUPPY - CASE REPORT

ABSTRACT

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is defined as abnormal proliferation of mature lymphocytes, morphologically normal bone marrow or peripheral blood. This study aims to report the case of chronic lymphocytic leukemia in a dog's French Bulldog, male, three months old, Veterinary Hospital of the university. After observing severe lymphocytosis in blood count, the animal was sent for bone marrow puncture, which confirmed the diagnosis. Given this result, the present work demonstrates the importance of laboratory tests for determining a diagnosis in the presence of nonspecific clinical signs.

KEYWORDS: chronic lymphocytic leukemia, cancer, dog

INTRODUÇÃO

A leucemia linfocítica crônica (LLC) é descrita como uma proliferação anormal de linfócitos maduros, morfolologicamente normais, na medula óssea ou no sangue periférico (SLATTER, 1998). É uma doença de curso longo (NELSON & COUTO,

2006), que acomete, principalmente, cães machos, com idade média de 10 anos. Os sinais clínicos mais relatados incluem diminuição do apetite, letargia e perda de peso (MCDONOUGH & MOORE, 2000). O diagnóstico pode ser obtido através da combinação dos sinais clínicos, avaliação hematológica, aspiração de medula óssea e biópsia, imunofenotipagem e pelo teste de reação em cadeia de polimerase (PRESLEY *et al*, 2006). O tratamento recomendado envolve uma combinação de clorambucil e prednisona (O'BRIEN *et al*, 1995). O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso de leucemia linfocítica crônica em um Buldog Francês de três meses de idade.

RELATO DE CASO

Um cão da raça Buldog Francês, macho, de três meses de idade, foi atendido no Hospital de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, para avaliação pediátrica. Durante a anamnese o proprietário relatou ausência de ganho de peso e subdesenvolvimento, a despeito de normorexia. Ao exame físico verificou-se hipotermia, mucosas hipocoradas, linfonodos aumentados e abdômen abaulado. O hemograma demonstrou anemia normocítica hipocrômica e intensa linfocitose. Foi solicitada punção de medula óssea, que apresentou moderado infiltrado de linfócitos pequenos e maduros. Quatro semanas após o primeiro atendimento, instituiu-se tratamento imunossupressor à base de prednisona, na dose de 1mg, durante 15 dias. O animal apresentou remissão progressiva da linfocitose e, na última revisão, foi observado bom estado geral do paciente, que apresentou peso vivo 7,4kg.

DISCUSSÃO

No presente relato o diagnóstico de Leucemia Linfocítica Crônica foi obtido através da punção de medula óssea, corroborando com os achados de Thrall (2002). A doença também pode ser diagnosticada através da imunofenotipagem ou pelo teste de reação em cadeia pela polimerase (BURNETT *et al*, 2003). Segundo Leifer e Matus (1986), a LLC acomete, geralmente, cães de meia idade a idosos, entretanto, no presente relato, o diagnóstico foi realizado em um filhote de 3 meses, sem sinais clínicos evidentes. A sintomatologia pode variar amplamente, embora a maioria dos animais apresente-se assintomática (MCDONOUGH E MOORE, 2000). Muitas vezes, a doença é diagnosticada por acaso, através da observação de linfocitose severa no hemograma de rotina (ETTINGER, 2004), conforme observado no presente caso. O tratamento não é instituído até que haja sinais clínicos significativos de anemia, neutropenia e trombocitopenia, que coloquem em risco a vida do paciente (ETTINGER,

2004). Visto que o animal não apresentava nenhuma sintomatologia clínica, optou-se apenas por uma terapia imunossupressora, com o objetivo de reverter a linfocitose.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leucemia linfocítica crônica é uma doença incomum, de prognóstico favorável e sintomatologia inespecífica. O diagnóstico, geralmente feito a partir de alterações nos exames de rotina, é confirmado através da punção de medula óssea. O tratamento depende de cada quadro, mas o proprietário deve ser orientado a respeito do acompanhamento regular do paciente.

REFERÊNCIAS

- BURNETT RC, VERNAU W, MODIANO JF, OLVER CS, MOORE PF, AVERY AC. Diagnosis of canine lymphoid neoplasia using clonal rearrangements of antigen receptor genes. **Vet Pathol** 2003;40(1):32–41.
- ETTINGER, J. S.; FELDMAN, E. C. **Tratado de medicina interna veterinária - doenças dos cães e gatos**, 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004, p. 1955-1956.
- LEIFER, C. E.; MATUS, R. E. Chronic lymphocytic leukemia in the dog: 22 cases (1974-1984). **J Am Vet Med Assoc**, v. 189 (2), p. 214-7, 1986.
- MCDONOUGH SP, MOORE PF. Clinical, hematologic, and immunophenotypic characterization of canine large granular lymphocytosis. **Vet Pathol** 2000;37(6):637–46
- NELSON, R. W.; COUTO, C. G. **Medicina interna de pequenos animais**, 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, 890-894 p.
- O'BRIEN S, DEL GIGLIO A, KEATING M. Advances in the biology and treatment of B-cell chronic lymphocytic leukemia. **Blood** 1995;85(2):307–18.
- PRESLEY, R., MACKIN, A., VERNAU. W. Lymphoid Leukemia in Dogs. Compendium Vet.com Disponível em <http://pt.scribd.com/doc/23752087/Lymphoid-Leukemia-in-Dogs>. Acesso em 27/01/2012
- SLATTER, D. **Manual de cirurgia de pequenos animais**, 2ª ed. São Paulo: Manole, 1998, v. 2, 2498-2499 p.
- THRALL, M.. In: **Veterinary Hematology & Clinical Chemistry** 1ed- Blackwell Pub Professional, p.167-184, 2002.

147. PAINEL DE PCR EM TEMPO-REAL NA DETECÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE DIARRÉIA EM CÃES E SUAS CO-INFECÇÕES

Aline b. Rocha gizzi, dvm^{1,3}; Simone T. Oliveira dvm, ms, phd¹; Christian Leutenegger, dvm, phd²; Denise A. Kozemjak³, dvm, msc; Mary Marcondes, dvm, ms, phd⁴; Alexander W. Biondo, dvm, ms, phd¹.

¹Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil - abiondo@illinois.edu. ²Idexx Laboratories, Sacramento, EUA. ³Clinilab Laboratório de Patologia Animal, Curitiba, Brasil. ⁴Universidade Estadual Paulista, Araçatuba, Brasil.

RESUMO

Foram analisadas amostras de fezes de cães com diarreia por painel de PCR em tempo-real, incluindo o vírus da Cinomose Canina, o Coronavírus Entérico Canino, o Parvovírus Canino 2 (PC2), *Clostridium perfringens* enterotoxina A, *Cryptosporidium* spp., *Salmonella* spp. e *Giardia* spp. Do total das amostras, 71/104 (68.27%) apresentaram pelo menos um agente etiológico, sendo 39/71 (54.93%) com infecção única e 32/71 (45.07%) apresentando co-infecções, das quais 21/32 (65,62%) possuíam dois agentes etiológicos associados, 5/32 (15,63%) com três e 6/32 (18,75%) associação de quatro. Em CONCLUSÃO, co-infecção com até quatro patógenos é frequente na diarreia em cães.

PALAVRAS-CHAVES diarreia, canina, PCR em tempo real, painel

PANEL OF REAL-TIME PCR FOR DETECTION OF AGENTS IN CAUSING DIARRHEA IN DOGS AND CO-INFECTIIONS

ABSTRACT Feces samples from dogs with diarrhea were analyzed by panel of Real Time PCR, including Canine Distemper Virus, Canine Enteric Virus, Canine Parvovirus 2 (CP-2), *Clostridium perfringens* enterotoxin A, *Cryptosporidium* spp., *Salmonella* spp. and *Giardia* spp. Out of the total of samples, 71/104 (68.27%) presented at least one agent; 39/71 (54.93%) single infection and 32/71 (45.07%) co-infection, of which 21/32 (65.62%) with two, 5/32 (15.63%) with three and 6/32 (18.75%) with four infections agents. In conclusion, co-infection with up to four pathogens is frequent in dogs with diarrhea.

KEYWORDS: diarrhea, canine, Real Time PCR, panel

INTRODUÇÃO

O manejo e diagnóstico definitivo da diarreia canina é um desafio, devido a variedade de patógenos, sinais clínicos não específicos e presença concomitante de co-infecções. Além de ser potencial indutor de doença em cães, muitos enteropatógenos apresentam riscos zoonóticos para os seres humanos. As zoonoses caninas intestinais (em particular, *Giardia* spp., *Cryptosporidium* spp., *Salmonella* spp. e *Campylobacter* spp.) são consideradas de extrema importância.¹ Técnicas tradicionais para diagnóstico laboratorial destes patógenos, como por exemplo a cultura fecal, apresentam baixa sensibilidade. A utilização de painéis de PCR em tempo real para cães e gatos com diarreia confere uma nova perspectiva na detecção rápida e sensível de genes de toxinas e agentes infecciosos.² O presente estudo teve como objetivos detectar a prevalência dos principais agentes responsáveis por diarreia em cães por meio de RT-PCR e avaliar a presença de co-infecções.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas 104 amostras de fezes de cães com diarreia e 43 amostras de fezes normais (grupo controle). As amostras foram estocadas sob refrigeração por um período não superior a 05 dias até o momento da extração total do ácido nucléico e da realização do PCR em tempo real. O painel diarreia de PCR em tempo-real incluiu a detecção molecular do vírus da Cinomose canina, Coronavírus entérico canino, Parvovírus canino 2, *Clostridium perfringens* enterotoxina A, *Cryptosporidium* spp., *Giardia* spp. e *Salmonella* spp.

RESULTADOS

Dos 104 cães com diarreia, 71(68.27%) foram positivos para pelo menos um agente etiológico. A prevalência de infecções por um único agente foi de 39/71(54.93%), sendo que 32/71 (45.07%) apresentaram mais de um enteropatógeno nas fezes. Destas amostras 9/104 (8.65%) foram positivas para o vírus da Cinomose Canina, 12/104 (11.54%) para Coronavírus Entérico Canino, 36/104 (34.62%) para Parvovírus Canino 2 (PC2), 40/104 (38.46%) para *Clostridium Perfringens* enterotoxina A, 8/104 (7.69%) para *Cryptosporidium* spp., 1/104 (0,96%) para *Salmonella* spp. e 14/104 (13.46%) para *Giardia* spp. No grupo controle não foi observada co-infecção, onde das 43 amostras, 02 (4.65%) foram positivas para *Cryptosporidium* spp., 02/43 (4.65%) para *Giardia* spp., 03/43 (6.98%) para Coronavírus Entérico Canino e 06/43

(13.95%) para *Clostridium Perfringens* enterotoxina A. Não foram detectadas nas fezes o vírus da Cinomose Canina, Parvovírus Canino 2 (PC2) e *Salmonella* spp. e, 30/43 (69.77%) das amostras controles foram negativas. Houve uma associação entre a presença de enteropatógenos e o desenvolvimento de diarreia com valor de $P=0.000026$. Os agentes de maior prevalência neste estudo foram Parvovírus Canino 2 e *Clostridium Perfringens*, com valor de $P = 0.000004$ e $P = 0.005703$ respectivamente.

DISCUSSÃO

Este estudo revelou uma alta incidência destes patógenos contribuindo para a diarreia em cães e também alta prevalência de co-infecções quando comparado a um estudo semelhante realizado com fezes diarreicas nos Estados Unidos que obteve 24.9% de co-infecções (LEUTENEGGER*). Diferentemente deste estudo americano, onde o *Clostridium Perfringens* e o Coronavírus Entérico Canino foram os agentes mais prevalentes, o Parvovírus Canino 2 foi o agente etiológico de maior importância.

CONCLUSÃO:

A utilização da técnica de PCR em Tempo Real demonstrou ser uma excelente ferramenta para identificação dos agentes etiológicos de diarreias caninas, auxiliando o clínico veterinário no manejo e tratamento destes pacientes, bem como na escolha de medidas profiláticas especialmente quando se trata de zoonoses.

AGRADECIMENTOS: Somos gratos aos Médicos Veterinários do Hospital Veterinário Clinivet, Curitiba, Brasil, pela preciosa assistência no fornecimento de dados epidemiológicos e amostras de fezes.

REFERÊNCIAS

- 1- HACKETT T, LAPPIN MR. Prevalence of enteric pathogens in dogs of north-central Colorado. **J Am Anim Hosp Assoc.** 2003 Jan-Feb;39(1):52-6.
- 2 - MARKS SL, RANKIN SC, BYRNE BA, WEESE JS. Enteropathogenic bacteria in dogs and cats: diagnosis, epidemiology, treatment, and control. **J Vet Intern Med.** 2011 Nov-Dec;25(6):1195-208.

*LEUTENEGGER, C. IDEXX laboratories. Comunicação pessoal, 2011.

148. PRESENÇA DE GAMETÓCITO EM HEMÁCIAS DE TUIUIU (*Jabiru myceria*) DE VIDA LIVRE

Paulo Henrique Braz¹; Letícia Marie Lira Umeda¹; Alda Izabel de Souza²; Willian Takashi Honda³; Roberta Martins Passos Humberg⁴

1 Residentes em Patologia Clínica Veterinária pelo Hospital Veterinário Anhanguera-Uniderp.

2 Professora Doutora responsável pelo setor de Patologia Clínica da Universidade Anhanguera-Uniderp.

3 Acadêmico do curso de Medicina Veterinária pela Universidade Anhanguera-Uniderp.

4 Médica Veterinária do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, MS.

RESUMO

O hemoparasita *Haemoproteus* spp. é um hematozoário encontrado principalmente em aves. O ciclo de vida desse protozoário é completado na mosca do gênero Hippoboscidae, seu principal vetor. O objetivo deste trabalho foi relatar a ocorrência de *Haemoproteus* spp em um Tuiuiu (*Jabiru myceria*) de vida livre atendido em um Hospital Veterinário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Durante a pesquisa de hemoparasitas foi observado a presença de gametócitos de *Haemoproteus* spp. em hemácias. Na análise hematológica constatou-se anemia macrocítica e hipocrômica com leucopenia, monocitose e linfopenia.

Palavras chaves: *Haemoproteus* spp.; Tuiuiu

PRESENCE OF TUIU GAMETOCYTES IN RED BLOOD CELL (*Jabiru myceria*) FREE LIFE

ABSTRACT

The hemoparasites *Haemoproteus* spp. Is a hematozoon found mainly in birds. The cycle of life of this parasite is completed on the fly of the genus Hippoboscidae, your principal vector. The objective of this study was to report the occurrence of *Haemoproteus* spp. In a Tuiuiu (*Jabiru myceria*) free-living served in a veterinary hospital in Campo Grande, Mato Grosso do Sul. During the research of hemoparasites, went to observe the presence of gametocytes of *Haemoproteus* spp. in red blood cells. In analysis hematologic was found anemia macrocytic and hypochromic, monocytosis and leukopenia.

Key words: *Haemoproteus* spp.; Tuiuiu

INTRODUÇÃO

O hemoparasita do gênero *Haemoproteus* vive em répteis, aves e mamíferos, tendo maior facilidade de ser encontrado em aves, o *Haemoproteus columbae* (Kruse, 1890). O parasitismo pode causar alterações em parâmetros fisiológicos de aves silvestres.

Os vetores mais conhecidos de *Haemoproteus* são os insetos hematófagos da família Hippoboscidae, Ceratopogonidae e Tabanidae. Os Hippoboscidae apresentam distribuição cosmopolita e não parasitam apenas aves, mas também ovinos mamíferos, silvestres e equídeos, sendo que a espécie *Pseudolynchia canariensis* (Macquart, 1926) (Diptera Hippoboscidae) é considerada como a principal transmissora do hemoparasita *Haemoproteus columbae*. (Meyer; Olsen, 1980; Fortes, 2004; Gredilha et al., 2008). O seu ciclo possui a reprodução assexuada na ave e finaliza seu ciclo na mosca Hippoboscidae.

A morfologia de *Haemoproteus* no sangue dos columbídeos apresenta-se como gametócitos de forma afilada que circundam o citoplasma do eritrócito, podendo ocorrer o aparecimento de dois gametócitos no mesmo eritrócito. (Bennett et al., 1994; Fortes, 2004).

RELATO DE CASO

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Anhanguera-Uniderp, Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS), um Tuiuiu (*Jabiru myceria*) de vida livre, filhote, encaminhado pelo Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS-IMASUL) apresentando fratura no segmento final do fêmur esquerdo (Figura 2). Para avaliação dos parâmetros fisiológicos do animal, foi coletado, por meio de punção da veia ulnar, sangue com anticoagulante EDTA para realização do hemograma.

Os esfregaços sanguíneos para pesquisa de hemoparasitas foram realizados no momento da colheita, utilizando-se sangue sem anti-coagulante e posteriormente corados com corante comercial Panótico rápido onde, por meio de microscopia óptica, em aumento de 100X, foram encontrados gametócitos em hemácias, compatíveis com o hematozoário *Haemoproteus* spp (Figura 2).

No hemograma foi constatado anemia macrocítica e hipocrômica com leucopenia, monocitose e linfopenia. Foram constatadas hemácias com intensa anisocitose e policromasia.

Figura 1 – Fratura do fêmur esquerdo

DISCUSSÃO

O *Haemoproteus* é um hemoparasito de alta ocorrência em algumas espécies de aves. Adriano e Cordeiro (2001) relataram ocorrência de 90% de pombos infectados por *Haemoproteus columbae* na cidade de Junqueirópolis/SP. Grande parte das infecções é assintomática e quando ocorre manifestação clínica, na maioria dos casos, está relacionada com a ruptura dos eritrócitos levando a um quadro de anemia (Garnham, 1960).

A análise de esfregaços sanguíneos para se estimar o número de eritrócitos infectados não fornece determinação precisa do número de parasitos presentes. Além disso, um período preestabelecido de tempo para o exame dos esfregaços pode não ser uma estimativa confiável do número total de eritrócitos examinados (Godfrey et al., 1987).

A detecção direta de parasitos em esfregaços sanguíneos não é uma tarefa fácil durante as fases crônicas ou latentes, que correspondem à situação da maioria das aves infectadas (Atkinson e van Riper III, 1991). Apesar das desvantagens apresentadas pelo método, ele ainda é considerado essencial para a detecção do parasito na ave, sendo utilizado extensivamente como método de diagnóstico padrão.

CONCLUSÃO

Embora seja um hemoparasito comum de ser encontrado em aves silvestres, há poucos relatos a respeito da parasitose em Tuiuiu. Diante disso, é importante se atentar a novos relatos e pesquisas em tal espécie animal para novos conhecimentos científicos do seu efeito patogênico.

REFERENCIAS

- ADRIANO, A. E.; CORDEIRO, N. S. **Prevalence and intensity of *Haemoproteus columbae* in three species of wild doves from Brazil.** *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*, v. 96, p. 175-178, 2001.
- BARKER, Jr. R. H.; BANCHONGAKSORN, T.; COURVAL, J. M. et al. **A simple method to detect *Plasmodium falciparum* directly from blood sample using the polymerase chain reaction.** *Am. J. Trp. Med. Hyg.*, v. 46, p. 416-426, 1992.
- Bennett G e Peirce M (1988). **Morphological form in the avian *Haemoproteidae* and an annotated checklist of the genus *Haemoproteus* Kruse, 1890.** *J Nat Hist*, 22: 1683-1696.

149. “VARIAÇÃO DOS ÍNDICES RDW (AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS ERITRÓCITOS) E PDW (AMPLITUDE DE DISTRIBUIÇÃO DAS PLAQUETAS) EM CÃES COM ERLIQUIOSE”

Eveline Simoes Azenha¹, Márcia Ferreira Rosa Sobreira², Bruna Vieira de Souza¹, Roberta Vanessa Pinho Casale², Vando Edésio Soares², Bianca Manguiera da Silva¹.

¹Graduanda em Medicina Veterinária - Universidade Camilo Castelo Branco – Descalvado

²Docente do curso de Medicina Veterinária- Universidade Camilo Castelo Branco – Descalvado. marciafrsobreira@gmail.com

RESUMO

A Eriiquiose canina é uma grave doença infecciosa que acomete animais da família **canidae**. O prognóstico pode ser determinado pela situação do paciente e através do eritrograma. No eritrograma, são avaliados vários fatores como a determinação do RDW, que indica a amplitude de distribuição dos eritrócitos, já no plaquetograma, as plaquetas são contadas e seu tamanho médio e variação de volume são determinados (MPV e PDW). Estes dados permitem indicativos diagnósticos que, quando cruzados com outros dados e/ou resultados, são de extrema importância clínica e prognóstica. O presente trabalho analisou o RDW e o PDW de cães diagnosticados clinicamente e laboratorialmente com eriliquiose e os resultados obtidos foram analisados e comparados com a finalidade de auxiliar na determinação do prognóstico.

PALAVRAS-CHAVES índices eritrocitários, índices plaquetários, diagnóstico

“VARIATION IN RDW (RED CELL DISTRIBUTION WIDTH) AND PDW (PLATELET DISTRIBUTION WIDTH) IN DOGS WITH EHRlichiosis”

ABSTRACT

The Canine Ehrlichiosis is a serious infectious disease affecting animals of the family Canidae. The prognosis can be determined by the situation of the patient and through erythrogram. In erythrogram many indices are determined as the RDW, which indicates the erythrocytes amplitude distribution, in the platelet evaluation, platelets are counted and their average size and volume change is determined (MPV and PDW). These data allow that, when crossed with other results, they can be important indicatives of clinical diagnoses and prognostic. This study analyzed the RDW and PDW in dogs with clinical

and laboratory erliquiose diagnose, and the results were analyzed and compared in order to help determine the prognosis.

KEYWORDS: erythrocyte, platelet, diagnosis

INTRODUÇÃO

O prognóstico da Erliquiose depende de diversos fatores. Índices encontrados no eritrograma e plaquetograma podem auxiliar na sua determinação. A presente proposta visa avaliar o RDW e o PDW, através da avaliação da avaliação eritrocitária e plaquetária, de cães diagnosticados clinicamente e laboratorialmente com erliquiose, com a finalidade de auxiliar na determinação do prognóstico, pois quanto maior a amplitude das plaquetas e dos eritrócitos melhor serão as suas funções no organismo.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados hemogramas de 45 cães, machos ou fêmeas, adultos, com raças variadas, sendo 10 animais sadios incluídos no grupo controle (Gc) e 35, com PCR positivo para *E. canis*., incluídos no grupo de cães com erliquiose (Ge).

RESULTADOS

Os resultados encontram-se descritos tabela 01 a seguir.

PARAMETROS	TABELA 1 - TESTE DE COMPARAÇÃO DE MÉDIAS			
	<i>Ehrlichia canis</i>		Controle	
na Eritrócito x10 ³	6,6 ±	2,6 A	7,2 ±	0,7 A
Hemoglobina g/dL	15,4 ±	7,7 A	16,1 ±	1,3 A
Hematócrito %	43,4 ±	18,7 A	45,8 ±	4,9 A
Plaquetas x10 ³	102,6 ±	76,1 B	458,9 ±	178,1 A
RDW fL	35,5 ±	2,6 A	13,3 ±	1,6 B
PDW %	14,0 ±	1,6 B	16,9 ±	1,4 A
VPM fL	11,0 ±	6,3 A	6,3 ±	1,3 B
VCM fL	63,74 ±	3,42 B	66,55 ±	8,78 A

DISCUSSÃO

Segundo a contagem de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito encontram-se normais, então provavelmente não há anemia acompanhada da erliquiose, nestes casos. Os valores relacionados ao VCM se encontram menores no grupo com erliquiose (Ge). Podendo indicar microcitose, indicando que não há resposta

proliferativa. O RDW se encontra com valores altos no grupo Ge, ou seja, população eritrocitária heterogênea, formada por células de diversos tamanhos, indicando uma possível não proliferação, porém com variação no tamanho das hemácias, não se encontra explicações para a diferença nesses fatores na literatura. O VCM tem correlação positiva com eritrócito, hemoglobina e hematócrito, porém não com o RDW. E o RDW, não tem correlação com nenhum dos parâmetros com exceção ao VPM em que a correlação é negativa. Foi observado número reduzido de plaquetas no grupo Ge, corroborando os achados na literatura, porém não tão baixo quanto o esperado.

Nível de plaquetas baixo pode indicar diversos fatores. O VPM encontra-se aumentado no grupo Ge, isso pode indicar uma redução da sobrevivência das plaquetas, aumento da renovação plaquetária. Comparando com PDW provavelmente mostra uma população homogênea de plaquetas por estar abaixo dos valores do Gc. Além disso, o número de plaquetas não apresenta correlação com o VPM e PDW no grupo Ge, já a correlação entre VPM e PDW é positiva. Não foram encontradas, na literatura, discussões relacionadas a variação desses índices e suas correlações. Portanto, maiores estudos devem ser feitos nessa área.

CONCLUSÃO

Os achados obtidos no presente estudo, nas condições testadas, indicam ausência de anemia nos cães acometidos e diminuição quantitativa de plaquetas, com aumento no VPM.

REFERÊNCIAS

- MONTEIRO, L. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2009;31(3):178-182. **Valores de referência do RDW-CV e do RDW-SD e sua relação com o VCM entre os pacientes atendidos no ambulatório do Hospital Universitário Oswaldo Cruz**, 2009.
- FIGHERA, R.A.; SOUZA, T.M.; KOMMERS, G.G; et al. **Patogênese e achados clínicos, hematológicos e anatomopatológicos da infecção por *Rangelia vitalii* em 35 cães** (1985-2009). Departamento de Patologia, Universidade Federal de Santa Maria, 2010.
- GROTTO, H.Z.W. Rev. Bras. Hematol. Hemoter. 2009;31(3):178-182. **O hemograma: importância para a interpretação da biópsia. Depart de Patologia Clínica da Faculdade de Ciências Médicas de Campinas-SP**, 2009.
- XAVIER, M.S.; ALMONSY, N.R.P.; NASCIMENTO, M.D.; et al. **Avaliação da coagulação plasmática e plaquetometria em cães não infectados e infectados experimentalmente com *Ehrlichia* spp.** Faculdade de Veterinária – UFF Rua Vital Brasil – Niterói, RJ. Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., v.61, n.5, p.1049-1053, 2009.

150. GESTAÇÃO ECTÓPICA ASSOCIADA À MUMIFICAÇÃO FETAL EM CADELA

Fernanda Soldatelli Valente¹, Simone Passos Bianchi¹, Viviam Nunes Pignone²,
Fabiane Reginatto dos Santos¹, Alessandra Ventura da Silva³, Emerson Antonio
Contesini⁴

¹Médica Veterinária Residente – Hospital de Clínicas Veterinárias da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – fevalente5@hotmail.com

²Doutoranda PPGCV-UFRGS.

³Médica Veterinária Autônoma.

⁴Professor Adjunto da Faculdade de Medicina Veterinária - UFRGS

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma gestação ectópica em uma cadela da raça Boxer, com presença de fetos mumificados e encapsulados na cavidade abdominal. A terapêutica instituída foi a excisão cirúrgica dos fetos e, após, ovariossalpingohisterectomia.

PALAVRAS-CHAVES: prenhez extra-uterina, ovariossalpingohisterectomia, canina

ECTOPIC PREGNANCY ASSOCIATE TO FETAL MUMMIFICATION IN DOG

ABSTRACT

The present work has as goal reporting an ectopic pregnancy in a Boxer female dog, with the presence of mummified and encapsulated fetus in abdominal cavity. The therapy instituted was surgical excision of fetuses and, in due course, ovariossalpingohisterectomy.

KEYWORDS: extra-uterine pregnancy, ovariossalpingohisterectomy, canine

INTRODUÇÃO

A gestação extrauterina ou ectópica é uma condição patológica na qual o embrião ou feto desenvolve-se ou encontra-se fora da cavidade uterina. Esta doença pode ser classificada em tubária ou abdominal; e primária e secundária (Alves, 2012). A gestação primária ocorre quando o óvulo fertilizado sofre total desenvolvimento fora do trato reprodutivo, enquanto na secundária há evasão do óvulo desenvolvido, embrião ou feto do ovário, oviduto ou útero para cavidade abdominal. O óvulo que se perde dentro da cavidade peritoneal, geralmente, degenera, porém, em casos raros, pode resultar em uma gestação ectópica (Grunert e Birgel, 1982).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de gestação ectópica associada a fetos mumificados e encapsulados na cavidade abdominal de uma cadela.

RELATO DO CASO

Um cão da raça Boxer, seis anos de idade, não castrada, foi atendida com histórico de aumento de volume na glândula mamária. A paciente apresentava cios regulares, relato de duas gestações com partos eutócicos e aplicação de progestágenos. Foram solicitados exames complementares pré-cirúrgicos como radiografia torácica e ecografia abdominal, os quais revelaram a presença de fetos na cavidade abdominal. No exame ultrassonográfico, observou-se a perda das características anatômicas e de vitalidade, com morte fetal aproximadamente aos 52 dias de gestação, avaliados pela distância biparietal.

A paciente foi encaminhada para a laparotomia exploratória onde foram identificados quatro fetos encapsulados na cavidade abdominal, sendo dois deles envolvidos pelo omento e dois pelo mesentério aderidos às alças intestinais. Os fetos encontravam-se mumificados e foram divulsionados, cuidadosamente, das estruturas adjacentes. Logo realizou-se a ovariosalpingohisterectomia através da técnica das três pinças modificada seguido da laparorrafia. A paciente retornou para revisão e retirada dos pontos em 15 dias, encontrando-se em ótimo estado geral.

DISCUSSÃO

O que se observa na maioria dos casos é uma falsa gestação extrauterina devido à ruptura da parede uterina durante a gestação. Esse traumatismo pode ser ocasionado por torção uterina durante distocias ou após injeções excessivas de progestágenos (Mialot, 1988), conforme histórico referido pela proprietária desse caso. O embrião implanta-se numa superfície peritoneal e, eventualmente, a irrigação sanguínea inadequada resulta em morte e mumificação do feto. Os sinais desse distúrbio gestacional podem ser vagos ou ausentes (Wallace e Davidson, 1997).

O diagnóstico pode ser obtido através de radiografia ou ultrassonografia abdominais, sendo, nessa paciente, confirmado pela laparotomia exploratória. Em muitos relatos de gestação ectópica em animais, as investigações têm revelado que o fenômeno decorre pela ruptura da musculatura uterina (Jones e Hunt, 1983). Durante o procedimento de ovariosalpingohisterectomia, não foi possível identificar nenhuma solução de continuidade no útero. Porém, sabe-se que o miométrio pode regenerar,

deixando pouco ou nenhum tecido cicatricial, o que pode explicar o fracasso em encontrar uma cicatriz nesse e em outros relatos (Corpa, 2006).

CONCLUSÃO

O presente trabalho relatou um caso de gestação ectópica associada ao encapsulamento e mumificação fetal na cavidade abdominal. Essa doença gestacional é considerada rara, sendo diagnosticada durante exames complementares pré-cirúrgicos. A terapêutica cirúrgica instituída nessa paciente foi eficaz e de fácil execução, sem apresentar complicações no período trans e pós-operatório, além de extinguir possíveis falhas reprodutivas em futuras gestações.

REFERÊNCIAS

- ALVES, F. S. Mumificação fetal extra-uterina em uma cadela – relato de caso. **Clínica Veterinária**, 2012, n. 96, p. 88-94.
- CORPA, J. M. Ectopic pregnancy in animals and humans. **Reproduction**. Cambridge, 2006, v. 131, n. 4, p. 631-640.
- GRUNERT, E.; BIRGEL, E. H. Patologias da prenhez. In: **Obstetrícia veterinária**. Porto Alegre: Sulina, 1982. p. 71-72.
- JONES, D. D.; HUNT, R. D. **Veterinary pathology**. Philadelphia: Lea & Fabiger, 1983. 5.ed. p. 1001-1002.
- MIALOT, J. P. Patologia da reprodução dos carnívoros domésticos. **Hora Veterinária**. Porto Alegre, 1988. p. 90-112.
- WALLACE, M. S.; DAVIDSON, A. P. Anormalidades na gestação, parto e período periparturiente. In: ETTINGER, S. J. & FELDMANN, E. C. **Tratado de medicina interna veterinária: moléstias do cão e do gato**. São Paulo: Manole, 1997. 4.ed. p. 2227-2241.

151. MALFORMAÇÃO FETAL APÓS O USO DE ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA NO INÍCIO DA GESTAÇÃO EM CADELA E GATA

Yamê Fabres Robaina Sancler da Silva¹, Carla Regina Barbieri Simões¹, Isabelle Rayanne Sousa de Oliveira¹, Luana de Cássia Bicudo¹, Carolina Nogueira de Moraes¹
Nereu Carlos Prestes¹

¹Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia – FMVZ, campus Botucatu - Departamento de Reprodução Animal e Radiologia Veterinária.

RESUMO

O objetivo do presente trabalho foi relatar o caso de uma fêmea da espécie canina e uma da espécie felina submetidas a tratamento de acetato de medroxiprogesterona no início da gestação. Como resultado, observou-se prolongamento da gestação, morte e mal formação dos fetos.

PALAVRAS CHAVES: contracepção, malformação, cadela, gata

FETAL MALFORMATION AFTER THE USE OF MEDROXYPROGESTERONE ACETATE IN EARLY PREGNANCY IN BITCH AND QUEEN.

ABSTRACT

The aim of this study is to report the case of a bitch and a queen treated by medroxyprogesterone acetate in early pregnancy. As a result, there was prolongation of pregnancy, death and malformation of the fetus.

KEY WORDS: contraception, malformation, bitch, queen

INTRODUÇÃO

A supressão de ocorrência do cio, e suas manifestações clínicas, bem como da monta indesejada são duas das causas mais freqüentes de consulta na prática reprodutiva da fêmea canina e felina (Romagnoli, 2002). A contracepção pode ser alcançada utilizando-se métodos temporários, mediante uso de hormônios, ou definitivos, mediante ovariosalpingohisterectomia (OSH). A esterilização cirúrgica dos animais domésticos tem sido realizada por muitos séculos e é considerado o mais comum, confiável, eficaz e mais seguro método contraceptivo (Luz et al., 2005). Análogos sintéticos da progesterona, também denominados progestágenos, são compostos farmacêuticos comumente utilizados no controle do ciclo reprodutivo de animais domésticos. Do ponto de vista clínico todos os progestágenos agem da mesma maneira, bloqueando a produção e/ou liberação de GnRH no hipotálamo (González-Domínguez, 2006). Diversos efeitos indesejáveis dos progestágenos são descritos, tais como hiperplasia cística endometrial, podendo progredir para o quadro de piometra,

hiperplasia mamária, hiperadrecorticismo, aumento na produção de prolactina, aumento na produção do hormônio de crescimento, podendo cursar com acromegalia, diabetes, alteração em comportamento, hiporexia, redução de peso, polidipsia, depressão, e redução de libido (Romagnoli, 2002). Em cadelas e gatas gestantes o uso da progesterona pode causar masculinização de fetos femininos, quando administrado no início da gravidez (durante o período de organogênese), ou atraso no parto, se administrado no terço final da gestação, levando à morte dos fetos e necessidade de intervenção cirúrgica (Luz et al., 2005).

RELATO DE CASO

Cadela de dois anos de idade, sem raça definida e gata de um ano e meio de idade, sem raça definida, foram atendidas apresentando histórico de sangramento vaginal, iniciado há três dias, hiporexia e letargia. Ambos os proprietários relataram que as fêmeas apresentaram cio há aproximadamente dois meses, e utilizaram acetato de medroxiprogesterona após acasalamento das fêmeas com machos contactantes da mesma espécie. Ambas as fêmeas apresentaram partos normais e prole saudável em gestações anteriores. No exame físico geral da cadela e gata observou-se, como alterações em comum, hipertemia (39,6° C e 39,8° C , respectivamente), desidratação moderada, taquipnéia, taquicardia, mucosas hiporcoradas, aumento de volume abdominal com presença de estruturas firmes à palpação digital. No exame físico específico do aparelho genital, observou-se secreção vaginal sanguinolenta de odor fétido. Procedeu-se o exame ultrassonográfico dos animais no qual revelou presença de fetos a termo com ausência de batimentos cardíacos. Optou-se pela realização de OSH. Após o procedimento cirúrgico foi realizado a inspeção do útero, e constatou-se a presença de fetos mal formados, apresentando gastroquise e agenesia de ossos longos.

DISCUSSÃO

Cadelas e gatas possuem particularidades reprodutivas diferenciadas quando comparadas a outras espécies domésticas. A gestação nessas espécies é mantida pela manutenção dos níveis de progesterona proveniente exclusivamente do corpo lúteo, havendo redução nos níveis séricos poucos dias antes do desencadeamento do parto (Luz et al., 2005). Segundo Romagnoli, (2002) os progestágenos têm sido utilizados em cães e gatos por um período curto (tratamento iniciado antes do início do proestro), ou por um período longo (tratamento iniciado no anestro), quando se objetiva

o adiamento do estro; ou de maneira tardia quando se deseja a supressão do estro (tratamento iniciado após o início do proestro). O uso de progestágenos injetáveis, como o acetato de medroxiprogesterona, amplamente utilizado por proprietários para tentar inibir a ovulação de cadelas e gatas, pode resultar em não desencadeamento do parto, quando administrado em fêmeas gestantes. Nestes casos, embora haja maturação fetal com produção de cortisol, na tentativa de desencadear o parto fisiologicamente, as altas concentrações de progesterona, de origem exógena, não possibilitam que ocorra contração uterina, dilatação cervical e expulsão do feto. Com isso ocorre prolongamento da gestação, morte e maceração fetal (Luz et al., 2005). O efeito teratogênico dos análogos sintéticos da progesterona é citado como possível efeito colateral na literatura, entretanto comunicações científicas são ausentes na mesma.

CONCLUSÃO

A contracepção mediante utilização de progestágenos tem sido utilizada indiscriminadamente pelos proprietários de cães e gatos, uma vez que apresenta baixo custo e fácil obtenção. Com base em evidências experimentais relatadas na literatura sobre os efeitos secundários adversos do uso de análogos sintéticos da progesterona, deve-se optar pela esterilização cirúrgica através de OSH quando não há interesse reprodutivo na fêmea.

REFERÊNCIAS

- Romagnoli, S. Clinical use of hormones in the control of reproduction in bitches and queens [Utilização de hormonas no controlo da reprodução em cadelas e gatas]. Congresso de Ciências Veterinárias [Proceedings of the Veterinary Sciences Congress], p. 162-166, 2002.
- Luz, M.R.; Freitas, P.M.C.; Pereira, E.Z. Gestação e parto em cadelas: fisiologia, diagnóstico de gestação e tratamento das distócias. *Revista Brasileira de Reprodução Animal*, v.29, n.3/4, p.142-150, 2005.
- González-Domínguez, M.S.; Zoot, MV; Maldonado-Estrada, J.G. Gestación prolongada asociada con la prescripción inadecuada de medroxiprogesterona acetato. ¿Es racional y ético el uso de progestágenos exógenos en perras?. *Revista Colombiana de Ciencias Pecuárias*. Vol. 19:4, p 442-450, 2006.

152. PSEUDO HERMAFRODITISMO EM CÃO: RELATO DE CASO

ARÍCIA GOMES SPRADA¹, DANIELLA MATOS DA SILVA¹, SIMONE DOMIT
GUÉRIOS¹

¹Universidade Federal do Paraná – sdguerios@ufpr.br

RESUMO

Relata-se o caso de um cão que apresentava comportamento masculino apesar de suas características sexuais femininas. Ao exame físico observou-se estrutura pênis-símile em assoalho vaginal. Foi realizada esterilização cirúrgica e avaliação histopatológica para confirmação da intersexualidade.

PALAVRAS-CHAVES: hermafrodita, intersexo, pastor alemão

PSEUDOHERMAPHRODITISM IN A DOG: CASE REPORT

ABSTRACT

We report a case of a dog with masculine behavior despites feminine phenotype. During physical examination a penis-like structure was observed on vaginal floor. Surgical spaying and histopathological evaluation were done to confirm intersexuality.

KEYWORDS: hermaphrodite, intersex, German shepherd dog

INTRODUÇÃO

A intersexualidade é uma anomalia do desenvolvimento reprodutivo que se contrapõe às características determinadas pelo cromossomo sexual levando o indivíduo a apresentar características de ambos os sexos (Peter et al., 1993), sendo infrequente em cães (Hare, 1976). Essa anomalia pode ser classificada de acordo com as características morfológicas em hermafroditismo verdadeiro e pseudo hermafroditismo. O primeiro consiste na presença dos dois tipos de tecido gonadal (ovário e testículo ou ovariotestis), enquanto que o segundo caracteriza-se pela existência, no mesmo animal, de estruturas de tecido testicular ou ovariano com aspecto fenotípico do sexo oposto (Hare, 1976).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de pseudo hermafroditismo masculino em cão da raça pastor alemão contribuindo para estudos referentes às anomalias congênitas reprodutivas em cães.

RELATO DE CASO

Foi atendido no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná um cão da raça pastor alemão de um ano de idade com fenótipo feminino. Ao exame físico o animal não apresentava alterações, exceto pela presença de estrutura semelhante ao pênis em região de assoalho vaginal que se projetava pela vulva. Segundo o proprietário, o aparecimento da estrutura ocorreu aos cinco meses de idade, o paciente possuía comportamento masculino e não havia entrado em estro. O exame ultrassonográfico abdominal revelou imagens de estruturas semelhantes a ovário esquerdo e corpo uterino, não sendo possível a visualização do ovário direito e cornos uterinos.

Optou-se pela esterilização cirúrgica do animal. A exploração da cavidade abdominal revelou estruturas bilaterais semelhantes a testículos em região de pólo caudal dos rins que se conectavam aos cornos e corpo uterino. Foi procedida a exérese das gônadas e útero. Realizou-se também a ressecção da estrutura peniana através de episiotomia, com preservação do orifício uretral que se encontrava no assoalho vaginal, seguida de vulvoplastia.

O exame histopatológico das estruturas removidas confirmou a observação transcirúrgica de testículos, com atrofia bilateral e leve fibrose intersticial; útero e pênis sem alterações.

DISCUSSÃO

A intersexualidade caracterizada pelo pseudo hermafroditismo masculino é a de maior ocorrência em cães (Hare, 1976), como verificado no presente relato, no entanto, sua etiopatogenia não é bem esclarecida (Ticianelli et al., 2011). O diagnóstico pode ser realizado pelas alterações clínicas e avaliação cromossômica (Ticianelli et al., 2011). Porém, segundo Krob et al. (1994), a análise histopatológica do tecido gonadal é utilizada para confirmação diagnóstica, como realizado neste caso. A presença de alteração tecidual em região vaginal deve ser diferenciada de afecções mais comumente observadas em cadelas como a hiperplasia de assoalho vaginal e tumor venéreo transmissível (Fossum, 2007).

A avaliação ultrassonográfica abdominal não permitiu diferenciação do tecido testicular, sugerindo presença de ovários, mas contribuiu para descarte de outras afecções concomitantes. A intervenção cirúrgica para esterilização constitui, portanto,

método de diagnóstico e terapêutica, sendo a técnica de escolha em cães hermafroditas (Abdo et al., 2008).

CONCLUSÃO

Conclui-se que apesar de pouco frequente a intersexualidade deve ser considerada no diagnóstico diferencial de fêmeas com alterações morfológicas vulvovaginais.

REFERÊNCIAS

- ABDO, H.D.; NEVES, M.F.; SACCO, S.R. Hermafroditismo em cão: relato de caso. **Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária**, n.10, 2008.
- FOSSUM, T.W. **Small Animal Surgery**. St. Louis: Elsevier, 2007. 1632p
- HARE, W.C.D. Intersexuality in the dog. **Canine Veterinary Journal**, v.17, n.1 p.7-15, 1976.
- KROB, G.; BRAUN, A.; KUHNLE, U. True hermaphroditism: Geographical distribution, clinical findings, chromosomes and gonadal histology. **Europe Journal Pediatric**, v.153, n.1, p.2-10, 1994.
- PETER, A. T.; MARKWELDER, D.; ASEM, E.K. Phenotypic feminization in a genetic male dog caused by nonfunctional androgen receptors. **Theriogenology**, v.40, n.5, p.1093-1105, 1993.
- TICIANELLI, J.S.; OLIVEIRA, B.M.M.; ZOGNO, M.A.; ARRUDA, R.P.; CELEGHINI, E.C.C. Intersexo e outras anomalias do desenvolvimento do aparelho reprodutor nos animais domésticos e o auxílio da citogenética para o diagnóstico. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 35, n.1, p.26-32, 2011.

153. ACIDENTES DE TRABALHO DE UM HOSPITAL VETERINÁRIO DE UBERABA

Cláudio Yudi Kanayama¹, Rodrigo Supranzetti De Rezende¹, Diego Borges de Melo²,
Viviane Silva Alves³, Patricia Beatriz Silva Bonfim⁴

1. Médico veterinário, docente do Curso de Medicina Veterinária, Instituto de Estudos Avançados em Veterinária “José Caetano Borges”, Universidade de Uberaba (UNIUBE/FUNDRAGRI-FAZU/ABCZ), MG. Email: claudio.kanayama@uniube.br
2. Enfermeiro, Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Veterinário de Uberaba (HVV)
3. Administradora, Analista de Controle de Qualidade do Hospital Veterinário de Uberaba (HVV)
4. Técnica de Segurança do Trabalho da Universidade de Uberaba (UNIUBE)

RESUMO

Este estudo analisa a prevalência dos acidentes de trabalho em hospital veterinário no município de Uberaba, MG, no ano de 2011, a fim de dimensionar a magnitude do problema. Identificaram-se 15 notificações de acidentes. A mordedura corresponde a 53,3% das atividades que ocasionaram acidentes. Dos profissionais acidentados, 66,7% são do sexo masculino. A categoria de auxiliar de enfermagem sofreu 40% dos acidentes. Os cães são a espécie mais envolvida em acidentes, com 53,9%. As mãos foram as regiões do corpo mais acometidas, com 60% dos casos.

Palavras-chaves: hospital veterinário; acidentes de trabalho; riscos ocupacionais

ACCIDENTS AT WORK OF A VETERINARY HOSPITAL UBERABA

ABSTRACT

This study examines the prevalence of accidents at work in the veterinary hospital in the city of Uberaba, MG, in 2011, in order to scale the magnitude of the problem. We identified 15 reports of accidents. The bite represents 53.3% of the activities that caused accidents. Professionals involved in accidents, 66.7% are male. The category of nursing assistant suffered 40% of accidents. Dogs are the species most involved in accidents, with 53.9%. The hands were the most affected body regions, with 60% of cases.

KEYWORDS: veterinary hospital, accidents at work; occupational hazards

INTRODUÇÃO

Na instituição hospitalar veterinária os trabalhadores sofrem desgastes de variadas naturezas, especialmente aqueles que se ocupam da assistência direta ao paciente, devido a diversos riscos inerentes a sua atividade, do desgaste físico

decorrente do ritmo de trabalho, da organização e divisão do trabalho, do convívio com a dor e a morte, entre outros (Secco et al., 2008). Os acidentes estão associados a diversos fatores, combinados ou não. Dentre eles, destacam-se a não observação das normas de biossegurança, sobrecarga de trabalho, negligência e precariedade das condições de trabalho (Marziale et al., 2007). Coloca-se como objetivo do estudo analisar a prevalência dos acidentes de trabalho ocorridos com os profissionais em um hospital do município de Uberaba, no ano de 2011, visando dimensionar a magnitude do problema.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizou-se um estudo descritivo de caráter retrospectivo, com análise dos acidentes ocupacionais, por meio de técnica de estatística descritiva, das fichas de notificação de acidentes atendidas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) em 2011, do Hospital Veterinário.

RESULTADOS

Foram registrados 15 acidentes. Destes 66,7% com homens e 33,3% com mulheres. Os profissionais mais envolvidos foram os da enfermagem 40%, seguido por 26,6% veterinários residentes, 20% veterinários contratados, 6,7% tratadores e 6,7% técnico de laboratório. Destes profissionais 93,3% acidentaram uma vez e 6,7% duas vezes. Das situações que ocorreram acidentes, 53,3% foram mordedura, 20% trauma por manipulação de animais, 20% perfurocortante e 6,7% exposição da mucosa ocular e oral por material biológico. As espécies envolvidas nos acidentes foram 53,9% canina, 15,4% bovina, 23% equina e 7,7% felina. A região topográfica atingida nos acidentes foram 60% mãos, 13,2% antebraço, 6,7% tronco, 6,7% membro inferior e 6,7% cabeça.

DISCUSSÃO

O auxiliar de enfermagem são os profissionais que mais se acidentaram. Esse grupo de trabalhadores com pouca ou nenhuma qualificação profissional estão mais expostos aos riscos de acidentes, pois estão em contato direto com o paciente, na maior parte do tempo, na contenção física dos animais, realização de curativos, administração de medicamento, entre outros (Marziale, Rodrigues, 2002; Caixeta, Barbosa-Branco, 2005). O acidente de trabalho no hospital veterinário teve como maior agente causador a mordedura por cães, diferente dos trabalhos em hospitais humanos

em que a prevalência de acidentes são com objetos perfurocortantes (Marziale, Rodrigues, 2002). O maior percentual por mordeduras causadas por cães são objeto de preocupação devido a possibilidade de transmissão de zoonoses, como a raiva, o desenvolvimento de infecções bacterianas secundárias e de sequelas físicas (Plaut et al. , 1996), mesmo considerando que 66,7% dos profissionais acidentados haviam recebido o esquema vacinal pré-exposição contra a raiva.

CONCLUSÃO

A partir do exposto, concluiu-se que os profissionais da enfermagem são os mais acometidos por acidentes de trabalho; mordedura por cães são os mais frequentes; as mãos são a região mais acidentada; existe o risco de contaminação por zoonoses; é necessário contínuo treinamento e supervisão sistemática da equipe de profissionais do hospital veterinário, para melhor adesão e sensibilização visando redução de acidentes.

REFERÊNCIAS

- CAIXETA, R. B.; BARBOSA-BRANCO, A. Acidente de trabalho, com material biológico, em profissionais de saúde de hospitais públicos do Distrito Federal, Brasil, 2002/2003. **Caderno de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 737-746, jun. 2005.
- MARZIALE M. H. P, RODRIGUES C. M. A produção científica sobre acidentes de trabalho com material perfurocortante entre trabalhadores de enfermagem. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 10, n. 4, p. 571-77, jul. 2002.
- MARZIALE, M. H. P.; SILVA, E. J.; HAAS, V. J.; ROBAZZI, M. L. C. C. Acidentes com material biológico em hospital da Rede de Prevenção de Acidentes do Trabalho – REPAT. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v.32, n.115, p.109-119, 2007.
- PLAUT, M.; ZIMMERMAM, E. M.; GOLDSTEIN, R. A. Health hazards to humans associated with domestic pets. **Annual Review in Public Health**, v.17, p.221- 245, 1996.
- SECCO, I. A. O.; ROBAZZI, M. L. C. C.; SHIMIZU, D. S.; RUBIO, M; M; S. Acidentes de trabalho típicos envolvendo trabalhadores de hospital universitário da região sul do Brasil: epidemiologia e prevenção. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, Ribeirão Preto, v. 16, n. 5, p. 824-831, out. 2008.

154. ANÁLISE BACTERIANA E PARASITOLÓGICA DAS ÁGUAS DE PARQUES PÚBLICOS DE CURITIBA, COMO INDICADORES DOS NÍVEIS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL E DE SUSTENTABILIDADE

Caius Cesar Motta¹, Isabel B. Wistuba¹, , Marcia A. Barbosa¹, Mario A. Ferraz¹, Matilde Cavali¹, Tatiane I. Wosch¹, Vera L. S. Garcia¹, Dayane V. G. Silva², (*) Dicezar Gonçalves³

¹ Acadêmicos de Medicina Veterinária da Faculdade Evangélica do Paraná.

² Biotecnóloga do Laboratório de Microbiologia da FEPAR.

³ Prof. Dr. de Parasitologia e Saneamento e Zoonoses do Curso de Veterinária da FEPAR

RESUMO

Este trabalho objetivou pesquisar e quantificar coliformes e enteroparasitos, em amostras de água dos parques públicos da cidade de Curitiba. Analisou-se 30 amostras de água de 13 parques públicos, utilizando o kit “Aquateste coli” (Laborclin). Na análise parasitológica, usaram-se os métodos de Hoffman e Faust modificados e observou-se os níveis de turbidez e pH das amostras. Os resultados revelaram $13,75 \pm 7,52$ UFC/100mL de coliformes totais e $12,56 \pm 7,31$, UFC/100mL de coliformes termotolerantes, pH de $6,22 \pm 0,92$, e 16 espécimes de enteroparasitos, dois deles causadores de zoonoses. Evidenciou-se alta poluição, possíveis problemas ambientais e de saúde.

PALAVRAS CHAVE: Análise, água, lagos de parques, contaminação, sustentabilidade

BACTERIAL AND PARASITOLOGIC WASTEWATERS ANALYSIS OF PUBLIC PARKS OF CURITIBA, AS INDICATORS OF CONTAMINATION LEVELS AND ENVIROMENTAL SUSTAINABILITY.

ABSTRACT

This work objectified to search and to quantify coliform bacteria and enteroparasites in water samples of the public parks in Curitiba city. We analyzed 30 water samples of 13 public parks, by means of the kit “Aquatest coli” (*Laborclin*). In parasitological analysis the methods modified of Hoffman and Faust had been used. In addition we observed the level of turbidity and the pH. The results showed pH around 6.22 ± 0.92 and the microbiological determinations showed 13.75 ± 7.52 UFC /100mL of total coliforms and 12.56 ± 7.31 , UFC/100mL of *E. coli*. To enteroparasites we found 16 specimens, two of their causing zoonosis. It was proven pollution, possible ambient and health problems.

KEYWORDS: Monitoring, water, public parks, contamination, sustainability

INTRODUÇÃO

Para avaliar a água, visando detectar contaminação fecal e patógenos potenciais, empregam-se indicadores de contaminação, especialmente coliformes totais e termotolerantes, estes associados à *Escherichia coli*, *Citrobacter* sp, *Klebsiella* sp e *Enterobacter* sp, (Yamanaka et al., 2010a), além de enteroparasitos. O objetivo deste trabalho foi pesquisar e quantificar coliformes e enteroparasitos provenientes de animais domésticos, silvestres e do ser humano, como indicadores dos níveis de contaminação ambiental e de sustentabilidade, em amostras de água de lagoas de parques, rios e fontes, na cidade de Curitiba.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisadas 30 amostras de água, por meio do método do substrato cromogênico “Aquateste coli” (Laborclin), das quais 26 lagos, 2 fontes (Yamanaka et al., 2010b), e 2 rios. As amostras foram colhidas segundo recomenda a FUNASA, Brasil, (2009). Os procedimentos foram realizados até 6 horas após a coleta (BRASIL, 2009). Esse método foi usado para definir e quantificar o grupo coliforme, como bactérias produtoras da enzima β -D-galactosidase que cliva os substratos cromogênicos ortonitrofenil- β -D-galactopiranosideo (ONPG), ou o 5-bromo-4-cloro-3-indolyl- β -D-galactopiranosideo (β CIG ou X-gal), ou ainda o clorophenol-red- β -D-galactopiranosideo (CPRG), com aparecimento da cor amarela e a formação de gás pela fermentação da lactose baseando-se na presença de luz UV. Para detecção de *E.coli* usou-se uma parte da alíquota da cultura, baseando-se na expressão da enzima β -glucuronidase para o substrato 4-metil-umbeliferil- β -D-glucuronide (MUG) que em presença de luz UV, emite fluorescência, indicando resultado positivo (BEUX et al. 2010) em Número Mais Provável por 100 mL (NMP/100mL). O pH, foi determinado por meio de potenciômetro digital, considerando os Valores Médios Permitidos (VMP) de 6,0 a 9,0, e a turbidez (NTU-Nephelometric Turbidity Unit) até o VMP de 100. Para a pesquisa de enteroparasitos, utilizou-se os métodos de sedimentação espontânea Hoffman et al. (1928) e de centrifugo-flutuação (Faust et al. 1934) modificados CARDOSO et al. (2010). Para análise de Hoffman et al. colocou-se três gotas do sedimento em lâmina de vidro e já para a análise de Faust, retiraram-se três alças microbiológicas do menisco formado nos tubos, ambas as análises foram visualizadas em microscópio óptico. Os dados obtidos foram analisados estatisticamente por meio da média, amplitude, análise da variância e desvio padrão.

RESULTADOS

Os resultados de pH, mostraram amplitude de 4,5 e 7,5, com média de $6,22 \pm 0,92$ entre as amostras. A turbidez (NTU) até o VMP de 100 foi de que 53,85% das amostras apresentaram turbidez média, e 46,15% alta turbidez, e não apresentaram correlação matemática com os níveis de contaminação por bactérias e enteroparasitos. A presença de coliformes totais (NMP/100 mL) apresentou média de $13,75 \pm 7,52$ UFC/100mL, e para coliformes termotolerantes indicaram média de $12,56 \pm 7,31$, UFC/100mL. A variância observada entre estes dados, como era de se esperar, foi de 560,55 % e 530,44 % respectivamente. Os enteroparasitos encontrados foram *Toxoplasma gondii* em 30,77% das amostras, *Oxyurid* em 30,77%, *Ameba* sp em 23,07%, *Giardia intestinalis* em 53,85%, Coccidios em 46,15%, *Trichuris* spp em 30,77%, *Eimeria* spp em 23,07%, *Ancylostoma* spp em 46,15%, *Ascaris lumbricoides* em 23,07%, *Balantidium* sp, *Endolimax nana*, *Oesophagostomum* spp, *Capillaria* spp, *Syphacia muris*, *Hymenolepis nana* e *Sarcocystis* spp em 7,7% das amostras (DPDx, 2011). Em 15,38% das amostras não apresentaram nenhuma forma de enteroparasito. O delineamento espacial dos dados obtidos mostrou os parques públicos com maior nível de contaminação (RIBEIRO e DIGGLE, 2006).

DISCUSSÃO

É notória a contaminação por coliformes totais e termotolerantes. Essa contaminação por coliformes deve-se segundo Yamanaka et al. 2010 a,b às fezes humanas e de animais, despejadas de esgotos devido a inexistência de fossas sépticas. A presença parasitária enfatiza essa contaminação fecal, com fezes de animais e seres humanos que habitam os parques públicos (CARDOSO et al. 2010). A metodologia utilizada mostrou-se eficiente e confiável, com rapidez de resultados.

CONCLUSÃO

Esta pesquisa demonstrou o alto nível de contaminação encontrada nestes mananciais, os quais necessitam de medidas de saneamento que possam garantir a sustentabilidade deste ecossistema.

REFERÊNCIAS:

BEUX, M. R. et al. Análise Comparativa entre o Método do Substrato Cromogênico "Aquateste Coli" e o Método de Fermentação da Lactose na Pesquisa de Coliformes

em Água de Consumo Humano. In: INTERNACIONAL CONGRESS ON BIOPROCESS IN FOOD INDUSTRIES, 4., 2010. Curitiba. Anais...Curitiba: sbCTA, 2010.

BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Manual prático de análise de água. 3. ed. Brasília: Fundação Nacional de Saúde, 2009, 144 p.

CARDOSO, J. C. P. et al. Análise Microbiológica e Parasitológica na Água do Lago do Parque "Anulfho Fioravanti" do Município de Dourados, MS. In: INTERNACIONAL CONGRESS ON BIOPROCESS IN FOOD INDUSTRIES, 4., 2010. Curitiba. Anais...Curitiba: sbCTA, 2010.

DPDx, DIVISION OF PARASITIC DISEASES, Laboratory Identification of Parasites of Public Health Concern. Disponível em: <http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/Default.htm>, 2011

FAUST, E. C. et al. **A critical study of clinical laboratory technics for the diagnosis of protozoan cysts and helminth eggs in feces.** Amer. J. Trop. Med., n.18, p.169-83, 1938.

HOFFMAN, W. A. et al. **The sedimentation concentrations method in Schistosomiasis mansonii.** Puerto Rico J. Publ. Hlth, n. 9, p. 283-298, 1934.

RIBEIRO, PJ, DIGGLE, PJ. geoR: Package for Geostatistical Data Analysis. An illustrative session Last update: November 21 **geoR, 2006.**

YAMANAKA, E. H. U. et al. Pesquisa de Indicadores Bacterianos em Águas de Consumo de Fontes Alternativas. In: INTERNACIONAL CONGRESS ON BIOPROCESS IN FOOD INDUSTRIES, 4., 2010. Curitiba. Anais...Curitiba: sbCTA, 2010. (a)

YAMANAKA, E. H. U. et al. Drinking Water Monitoring from Fountains in Public Parks in Curitiba/PR. In: INTERNACIONAL CONGRESS ON BIOPROCESS IN FOOD INDUSTRIES, 4., 2010. Curitiba. Anais...Curitiba: sbCTA, 2010. (b)

155. DONOS COM MENOS RENDA NÃO POSSUEM MAIS CÃES: MODELAGEM NA CONTAGEM DE ANIMAIS DE ACORDO COM SEUS DONOS

Camila Marinelli Martins¹, Ahmed Mohamed², Ana Marcia Sá Guimarães², Cristiane da Conceição de Barros³, Raquel dos Santos Pampuch³, Walfrido Svoboda¹, Fernando Ferreira⁴, Alexander Welker Biondo¹

¹Depto de Med. Veterinária, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, PR, Brasil.

²Depto de Patobiologia Veterinária, Purdue University, West Lafayette, IN, EUA.

³Depto de Vigilância em Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Pinhais, PR, Brasil.

⁴Depto de Med. Vet. Preventiva, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.

Resumo:

O objetivo deste estudo foi associar o número de cães e gatos à renda dos proprietários em Pinhais-PR. Questionários foram aplicados em 2007 e analisados por qui-quadrado. Foram entrevistadas 13.555/30.380 (44,62%) famílias. A maioria (62,43%) tem um ou mais cães e 90% não tem gatos. Uma vez o proprietário já tendo um cão ou gato, a renda não foi preditor, porém os proprietários de baixa renda foram estatisticamente mais prováveis a ter zero cães. A renda não foi um preditor para o número de cães ou gatos em residências que já possuem animais de estimação.

PALAVRAS-CHAVE: pets, estimativa de população canina, relação gato:cão

LOW INCOME OWNERS DO NOT HAVE MORE DOGS: MODELING ANIMAL COUNT ACCORDING TO THEIR OWNERS

ABSTRACT

The aim of this study was to associate number of dogs and cats to income of owners in Pinhais-PR. Questionnaires were applied in 2007 and analyzed by qui-square. Were interviewed 13.555/30.380 (44.62%) families. The majority (62.43%) has one or more dogs and cats do not have 90%. Once the owner already has a dog or cat, the income was not a predictor for the number of them. The income was not a predictor for the number of dogs or cats in homes that already have pets.

KEYWORDS: pet ownership, dog population estimative, cat:dog ratio

INTRODUÇÃO

A população de animais em centros urbanos deve ser estimada com precisão para servir aos serviços de saúde pública. Características do proprietário associadas ao respectivo número de animais de estimação têm sido estudados (Downes et al, 2009; Murray et al, 2010), porém, não tem sido avaliado baseado em variáveis socioeconômicas. O objetivo deste estudo foi avaliar se o rendimento monetário está associado ao número de cães e gatos.

MATERIAL E MÉTODOS

A cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, tem, hoje, aproximadamente 117.166 habitantes distribuídos em 30.680 domicílios de 15 bairros. Foram aplicados questionários entre janeiro e fevereiro de 2007 por agentes do Centro de Controle de Zoonoses, devido a um estudo não relacionado (Programa Nacional de Prevenção da Dengue). As perguntas incluíram número de pessoas, renda familiar e número de cães e gatos. Com base no salário mínimo (SM) de R\$380,00 no momento, a renda foi dividida em 4 categorias (<1, 1-2, 2-4 e >4 SM). A análise estatística foi o teste qui-quadrado simples no Stata 11.2 (StataCorp, College Station, TX, EUA), considerando $p < 0,05$ significativo.

RESULTADOS

Foram realizadas 13.555/30.380 (44,62%) entrevistas. A maioria (62,43%) das famílias tem pelo menos um cão e a posse de gatos por residência foi muito mais baixa ($p=0,0001$), sendo que cerca de 90% das famílias não tem gatos. Uma vez proprietário já tendo um cão ou gato, a renda não foi um preditor estatisticamente significativo para o número de animais de estimação. Ao comparar residências com ou sem cães, as famílias de renda mais alta foram mais propensas a ter cães. O número médio de gatos por propriedade não apresentou diferenças.

DISCUSSÃO

Nosso estudo mostrou uma preferência muito maior por cães do que gatos, como já observado em outros estudos (Alves et al, 2005). Constatou-se que a renda do proprietário não está associada ao número de cães ou gatos em residências que já possuem animais e que proprietários de baixa renda são mais prováveis de ter zero cães. Constatação semelhante foi observada na Holanda, em que proprietários de animais tem rendimentos mais elevados do que os não-proprietários (Edinburgh et al.,

1990). Isso é interessante porque a maioria das iniciativas educacionais de controle de animais está concentrada em comunidades pobres.

CONCLUSÃO

Uma vez que o dono já tem um cão ou gato, a renda não é preditor para o número de animais de estimação.

REFERÊNCIAS

- Alves, M. C. G. P., M. R. Matos, M. L. Reichmann, and M. H. Dominguez, 2005: Estimation of the dog and cat population in the state of Sao Paulo. *Rev. Saude Publica* 39, 1–7.
- Downes, M., M. J. Canty, S. J. More., 2009: Demography of the pet dog and cat population on the island of Ireland and Human factors influencing pet ownership. *Prev Vet Med* 92, 140-149.
- Murray, J. K., W. J. Browne, M. A. Roberts, A. Whitmarsh, T. J. Gruffydd-Jones, 2010: Numbers and ownership profiles of cats and dogs in the UK. *Veterinary Record* 166, 163-168.
- Endenburg, N., H. Hart and H. W. de Vries, 1990: Differences between owners and nonowners of companion animals. *Anthozoos* IV: 2, 120-126.

156. ESTUDO SOROLÓGICO DA TOXOPLASMOSE CANINA PELA PROVA DE HEMAGLUTINAÇÃO INDIRETA EM JATAÍ - GO

Eliane Alves dos Santos¹, Hamanda Martins Alves², Edismauro Garcia Freitas-Filho²,
Jacqueline de Brito Paiva², Karla Alvarenga Nascimento², Cecília Nunes Moreira³.

¹Discente do curso de Ciências Biológicas, UFG, Campus Jataí.

²Discentes do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Goiás
(UFG), Campus Jataí.

³Professora Adjunta do Departamento de Medicina Veterinária, UFG, Campus
Jataí. *Autor para correspondência: cissanm@yahoo.com.br.

RESUMO

Com o objetivo de contribuir com dados sobre a frequência de anticorpos anti-*Toxoplasma* em caninos domiciliados na cidade de Jataí, Goiás, soros de 110 animais foram testados pela técnica sorológica de Hemaglutinação Indireta (HAI). O exame sorológico revelou que 50% dos animais foram reagentes. Sugerindo que esses cães, em algum momento de sua vida, foram expostos ao agente infeccioso por ingerir oocistos no ambiente ou carne crua ou mal cozida contendo cistos, refletindo no alto risco de contaminação para os humanos.

PALAVRAS-CHAVES: cães; HAI; prevalência; *Toxoplasma gondii*; toxoplasmose

SEROLOGICAL STUDY OF CANINE TOXOPLASMOSIS BY THE INDIRECT HAEMAGGLUTINATION TEST, IN JATAÍ – GO

ABSTRACT

If order to contribute with data on the frequency of anti-*Toxoplasma* antibodies in domiciled canine in Jataí, Goiás, serum from 110 animals were tested by Indirect Haemagglutination test (IHA). The serologic test revealed that 50% of the animals were positive. Suggesting that these dogs, at some point in their lives, they were exposed to the infectious agent or through ingestion of oocysts in the environment or raw and undercooked meat containing cysts, reflecting the high risk of contamination for humans.

KEYWORDS: dogs; HAI; prevalence, *Toxoplasma gondii*; toxoplasmosis

INTRODUÇÃO

A toxoplasmose é a protozoonose mais comum no mundo, cujo agente etiológico é o *Toxoplasma gondii* (Urquhart et al., 1998). A investigação da infecção na população

canina é um indicador da contaminação ambiental doméstica e possível risco ao ser humano, pois a exposição humana e canina ocorre frente a uma fonte comum de infecção (Brito et al., 2002). O Brasil apresenta índices de prevalências em humanos que se encontram entre os mais altos, com inquéritos sorológicos demonstrando uma variação de 37% a 91% (Ministério Da Saúde, 2006). O presente estudo objetivou determinar a prevalência de anticorpos anti-*Toxoplasma gondii* em cães aparentemente saudáveis no município de Jataí - GO.

MATERIAL E Métodos

Foram analisadas amostras de soro de 110 cães de Jataí - GO para diagnóstico sorológico da toxoplasmose. Para as determinações qualitativas e semiquantitativas de anticorpos sorológicos para *T. gondii*, foi realizada a técnica de Hemaglutinação Indireta (HAI) utilizando o kit comercial Imuno HAI® (WAMA Diagnóstica). As amostras com títulos iguais ou superiores a 1:64 foram consideradas positivas para o teste. Sendo estas amostras submetidas a diluições sequenciais na base quatro até a diluição de 1:512 para o teste quantitativo.

RESULTADOS

Foi verificada a frequência de 50% (55/110) dos cães soropositivos, sendo entre os machos a prevalência de 51,28% (20/39) e entre as fêmeas de 49,3% (35/71). Quanto aos títulos sorológicos encontrados na HAI, 27,27% (15/55) dos animais foram positivos na titulação de 1:64, 21,81% (12/55) dos cães apresentaram titulação de 1:128, 14,54% (8/55) com 1:256, e 36,36% (20/55) com 1:512. Não ocorreu diferença entre os sexos.

DISCUSSÃO

A soropositividade de 50% dos cães com anticorpos anti *T. gondii* é semelhante à de outros estudos no Brasil, sendo relativamente alta (Fernandes e Barbosa, 1972; Brito et al., 2002), e não ocorrendo diferença entre os sexos (Garcia et al., 1999). A população estudada era composta principalmente de cães errantes capturados pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade corroborando com relatos de Jackson et al. (1987) sobre a elevada prevalência da toxoplasmose em cães, visto que a infecção é facilitada pelos seus hábitos alimentares e estreito contato com o solo (Duran et al., 1995).

CONCLUSÃO

A elevada soropositividade para o *T. Gondii* na espécie canina em Jataí – GO é um indicador da contaminação ambiental doméstica e possível risco ao ser humano, pois a exposição humana e canina ocorre frente a uma fonte comum de infecção.

REFERÊNCIAS

- BRITO, A.F.; SOUZA, L.C.; SILVA, A.V. et al. Epidemiological and serological aspects in canine toxoplasmosis in animals with nervous symptoms. **Memórias Instituto Oswaldo Cruz**, v.97, p.1-5, 2002.
- DURAN, F.P., CABRAL, D.D., FERREIRA, F. et al. Frequência de anticorpos anti-*Toxoplasma gondii* (NICOLLE E MANCEAUX , 1909) em cães clinicamente sadios da cidade de Uberlândia - MG. In: IX SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA, 1995. Campo Grande, MS. **Anais...** Campo Grande, 1995, p. 228.
- FERNANDES, W.J.; BARBOSA, W. Toxoplasmose – Notas sobre sua ocorrência em animais domésticos em Goiânia – 1970. **Revista de Patologia Tropical**, vol.1, n.2, p.259-265. 1972.
- GARCIA, J.L.; NAVARRO, I.T.; OGAWA, L. et al. Soroepidemiologia da toxoplasmose em gatos e cães de propriedades rurais do município de Jaguapitã, estado do Paraná, Brasil. **Ciência Rural**, v. 29, n. 1, p. 99-104, 1999.
- JACKSON, M.H., HUTCHISON, W.M., SIIM, J.C. Prevalence of *Toxoplasma gondii* in meat animals, cats and dogs in central Scotland. **Brasilian of Veterinarian Journal**, v. 143, n. 2, p. 159-165, 1987.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE, SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. **Surto de Toxoplasmose no Município de Anápolis - GO, fevereiro de 2006**. Disponível em: <<http://portal.saude.gov.br>>. Acesso em: 20 janeiro. 2012.
- URQUHART, G. M.; ARMOUR, J.; DUNCAN, J. L. et al. **Parasitologia veterinária**. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 273p.

157. FREQUÊNCIA DE HELMINTOS EM FEZES DE CÃES ERRANTES COLETADAS DO SOLO DAS PRAÇAS DA CIDADE DE CASTANHAL - PA

Paula Barbosa da Silva¹, Ene Almeida Oliveira Madeira², Daniella Kaísa de Oliveira Bezerra², Nielton Nazareno Lameira de Souza², Cristiane Costa Pimenta²,
Julio Israel Fernandes²

¹Universidade Federal do Pará – paulabdasilva@gmail.com

²Universidade Federal do Pará

RESUMO

Com o objetivo de verificar a frequência de helmintos zoonótico e sua importância em saúde pública, foram coletadas 130 amostras de fezes do solo das praças de 13 bairros, no Município de Castanhal, Pará. Verificou-se que 59,2%(77/130) eram positivas para pelo menos uma espécie de helminto, contra 40,8%(53/130) negativas. As amostras positivas continham ovos de *Acylostoma* sp. e *Toxocara* sp., possíveis causadores de zoonoses, além de *Trichuris* sp. Os resultados reforçam a necessidade de medidas efetivas de saúde pública para que seja reduzida a frequência desses parasitos e sua possível transmissão ao homem.

PALAVRAS-CHAVES: Praça, cães, helminto, zoonoses

FREQUENCY OF HELMINTHS IN FECES OF STRAY DOGS FOUND ON THE GROUND SQUARES OF THE CITY OF CASTANHAL - PA

ABSTRACT

In order to verify the occurrence of zoonotic helminths and their importance in public health, were collected 130 fecal samples of soil from squares of 13 neighborhoods. It was found that 59,2%(77/130) were positive for at least one species of helminth, against 40,8%(53/130) negative. In positive samples was observed eggs *Ancylostoma* sp. and *Toxocara* sp., possible causes of zoonoses, and *Trichuris* sp..

These results reinforce the implementation of effective public health measurements aiming to reduce the frequency of these parasites, and thus, its potential transmission to humans.

KEYWORDS: square, dogs, helminthes, zoonoses

INTRODUÇÃO

O fácil acesso a praças e parques, presença de grande número de cães errante, somados a carência de informações a respeito dos mecanismos de transmissão das doenças parasitárias contribui sobremaneira na contaminação do ambiente. Isso gera uma maior exposição das pessoas a zoonoses, que correspondem a doenças que afetam comumente o ser humano e animais, embora nem sempre do mesmo modo e intensidade^{1,2,3}. Dentre os agentes zoonóticos destacam-se os helmintos como o *Toxocara* spp. e *Ancylostoma* spp, agentes da *larva migrans* visceral e *larva migrans* cutânea, respectivamente. Embora, eles não sejam a causa frequente de óbitos em humanos, causam alergias, diarreias, anemias, entre outros problemas sistêmicos e gastos com diagnósticos e tratamento. Tornando-se uma preocupação relevante quanto à questão de saúde pública^{4,5}. O objetivo do estudo foi avaliar a ocorrência de ovos de helmintos em praças públicas no Município de Castanhal, Pará.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas 130 amostras de fezes não ressecadas do solo de praças públicas de um total de 13 bairros, sendo 10 amostras por bairro. As fezes foram coletadas em sacos plásticos e levadas ao laboratório, onde eram processadas através do método qualitativo de flutuação de Willis-Mollay. As análises foram feitas pelo sendo observada a morfologia dos ovos para a classificação dos gêneros dos helmintos.

RESULTADOS

Das 130 amostras coletadas 59,2%(77/130) eram positivas. Os ovos de *Ancylostoma* sp. Estavam presentes em 85,7%(66/77), *Trichuris* sp. em 33,7%(26/77) e *Toxocara* sp. em 19,4%(15/77). Do total de amostras, 31,1%(24/77) estavam contaminadas com mais de um gênero, sendo 58,3%(14/24) de *Ancylostoma* sp. e *Trichuris* sp., 37,5%(9/24) de *Ancylostoma* sp. e *Toxocara* sp., e 4,2%(1/24) *Trichuris* sp. e *Toxocara* sp. O bairro de maior incidência apresentou 80%(8/10) de contaminação e o de menor com 20%(2/10). A maioria das praças, 76,9%, estavam localizadas em áreas rurais e ainda apresentavam os maiores níveis de contaminação.

DISCUSSÃO

Do total de 77 amostras positivas o helminto de maior prevalência foi o *Ancylostoma* sp. (85,7%), conforme sugerem outros estudos^{1,4}. A ordem dos parasitos

de maior ocorrência do parasitismo, com 33,7% e 19,4% das amostras contaminadas por *Trichuris* sp. e *Toxocara* sp. respectivamente é compatível com os dados do Rio Grande do Sul⁴. A distância do centro urbano, caracterizado por um pior grau socioeconômico, parece influenciar na prevalência dos helmintos, pois bairros mais distantes tiveram um percentual de contaminação das amostras, maior de 50%, assim como destacado na literatura¹.

CONCLUSÃO

Os resultados demonstraram a alta ocorrência de helmintos nas amostras coletadas em praças públicas, sobretudo em agentes zoonóticos, representando um problema de saúde pública da região.

REFERÊNCIAS

1. CAPUANO, D. M.; ROCHA, G. M. Ocorrência de parasitas com potencial zoonótico em fezes de cães coletados em áreas públicas do município de Ribeirão Preto, SP, Brasil. **Revista brasileira de epidemiologia**, v. 9, n. 1, p. 81-86, 2006.
2. FILHO P.C.C.; BARROS L. M.; CAMPOS J. O.; et al. Parasitas zoonóticos em fezes de cães em praças públicas do município de Itabuna, Bahia, Brasil. **Revista brasileira de parasitologia veterinária**, v. 17, n. 4, p. 206-209, 2008.
3. OLIVEIRA V. S. F.; MELO D. P. G.; FERNADES P. R.; et al. Ocorrência de helmintos gastrintestinais em cães errantes na cidade de Goiânia – Goiás. **Revista de patologia tropical**, v. 38, n. 4, p. 279-283, 2009.
4. SCAINI C. J.; TOLEDO R. N.; LOVATEL R.; et al. Contaminação ambiental por ovos e larvas de helmintos em fezes de cães na área central do balneário Cassino, Rio Grande do Sul. **Revista da sociedade brasileira de medicina tropical**, v. 36, n. 5, p. 617-619, 2003.

158. INFECÇÃO PELA VARIANTE 4 DO VÍRUS RÁBICO EM MORCEGO INSETÍVORO, *Myotis nigricans*, NO BAIRRO DE ITAPUÃ, SALVADOR-BAHIA - PRIMEIRO RELATO.

JOSÉ EDUARDO UNGAR DE SÁ¹, ROBERTO FONSECA DOS SANTOS², NORMÉLIA RANGEL³, HELENA RAHY BRANDÃO⁴

1-Médico Veterinário especialista em Saúde Pública – SESAB / LACEN-BA.

Email: vetfarma@yahoo.com.br

2- Médico Veterinário – SESAB / LACEN-BA

3- Médica Veterinária – SESAB / LACEN-BA

4- Acadêmica de Medicina Veterinária - Universidade Federal da Bahia.

RESUMO

A raiva é uma importante antroponose cujo agente etiológico é um vírus RNA da família Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus, espécie Rabies vírus, presente na saliva de animais infectados. É uma doença transmitida pela inoculação do vírus através de mordedura ou lambedura de mamíferos infectados. Dois ciclos destacam-se na raiva: o ciclo urbano, cujo principal transmissor é o cão; e o ciclo rural, no qual o principal transmissor é o morcego hematófago da espécie *Desmodus rotundus*. O presente trabalho refere-se ao primeiro isolamento do vírus rábico e identificação da variante antigênica através da técnica de anticorpos monoclonais em quiróptero da espécie *Myotis nigricans*, espécie insetívora da família Vespertilionidae, oriundo do bairro de Itapuã, Salvador-Ba, e enviado ao laboratório de raiva. O diagnóstico foi procedido pelas técnicas de imunofluorescência direta e isolamento viral em cérebro de camundongos, seguindo-se a tipificação antigênica por anticorpos monoclonais.

Palavras chave: raiva, vírus, morcego, insetívoro.

INFECTION BY THE 4 VARIANT RABIES VIRUS IN INSECTIVORE BAT, *Myotis nigricans*, IN THE NEIGHBOURHOOD OF ITAPUÃ, SALVADOR-BAHIA - FIRST REPORT

ABSTRACT

Rabies is an important anthroponosis whose etiologic agent is an RNA virus of the family Rhabdoviridae, genus Lyssavirus, specie Rabies virus, present in the saliva of infected animals. It is a disease transmitted by the inoculation of the virus by the biting or licking of infected mammals. Two cycles stand out in rabies: the urban cycle, which the main transmitter is the dog, and the rural cycle, in which the main transmitter is the kind of vampire bat *Desmodus rotundus*. This paper refers to the first isolation of the

Rabies virus and identification of the rabies virus antigenic variant using the technique of monoclonal antibodies in cheiroptera specie *Myotis nigricans*, a specie of insectivorous Vespertilionidae family, coming from the neighborhood of Itapuã, Salvador-Ba, and sent to the laboratory of anger. The diagnosis was carried out by direct immunofluorescence and virus isolation in mouse brain, followed by serological typing by monoclonal antibodies

KEYWORDS: rabies, virus, bat, insectivorous

INTRODUÇÃO

Morcegos representam importante papel na transmissão de raiva. Almeida *et al.* (1994) diagnosticaram raiva em 289 morcegos da área metropolitana da região Sudeste, no período de janeiro de 1988 a dezembro de 1992, identificando 2 exemplares insetívoros da espécie *Nyctinomops macrotis* positivos, representando 0,69% das amostras avaliadas. Martorelli *et.al.* (1995) relataram um caso positivo de raiva em morcego insetívoro *Myotis nigricans*, no município de Ribeirão Pires, grande São Paulo. Silva *et. al.* (1999) isolaram o vírus rábico em 4 morcegos insetívoros *Molossus ater*, da família Molossidae, oriundos do município de Araçatuba, São Paulo. Em mais uma ocorrência de morcego insetívoro, *Nyctinomops macrotis*, Passos *et. al.* (1998) relataram a primeira ocorrência de raiva nessa espécie no município de Diadema-SP, próximo a represa Billings. Utilizando a técnica de anticorpos monoclonais, Albas *et. al.* (2009) avaliaram 18 amostras positivas de morcegos do estado de São Paulo, identificando 15 amostras (82,3%) como variante 3, compatível com amostras do morcego *Desmodus rotundus*, 3 amostras (16,7%) como variante 4, compatível com amostras oriundas de morcego *Tadarida brasiliensis*.

RELATO DO CASO

Foi remetido ao laboratório de raiva do LACEN-Ba um quiróptero , proveniente do município de Salvador-Ba, condomínio Alphaville, bairro de Itapuã, capturado após agredir uma criança na ponta do dedo.

A amostra foi processada pelas técnicas de imunofluorescência direta e isolamento viral em cérebro de camundongos jovens, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e o Instituto Pasteur-SP, sendo positivo nas duas provas. A amostra também foi avaliada pela técnica de anticorpos monoclonais, sendo o resultado compatível com a variante 4, conforme o painel de 8 anticorpos monoclonais, padronizado pelo CDC-Atlanta-USA e distribuído aos laboratórios regionais de raiva,

pelo Instituto Pasteur-SP. A identificação da espécie do morcego foi procedida com o uso da chave de identificação de Taddei e Vizzoto, sendo a mesma caracterizada como *Myotis nigricans*, espécie insetívora da família Vespertilionidae, de hábitos bastante urbanizados que se abriga em tocas, forros, sótãos, fendas, caixas de ar condicionado e frestas de construção civil, adquirindo assim, facilmente, hábitos sinantrópicos.

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O diagnóstico positivo de raiva em morcegos na área urbana demonstra a mudança do perfil epidemiológico desta enfermidade, consequência do desequilíbrio ambiental com a destruição dos abrigos naturais destes animais, ocasionando migração dos mesmos para essas áreas, onde abrigo e alimento estão disponíveis, ocasionando risco de introdução do vírus rábico em animais e no homem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBAS, A. *et al.* Perfil antigênico do vírus da raiva isolado de diferentes espécies de morcegos não hematófagos da Região de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, **Rev. Soc. Bras. Med. Trop.**, vol.42, n. 1, p.15-17, fev. 2009.
- ALMEIDA, M. F. *et al.* Diagnóstico laboratorial de raiva em quirópteros realizado em área metropolitana na região sudeste do Brasil, **Rev. Saúde Pública**, v. 28, n. 5, p.341-344, out. 1994.
- BATISTA, H. B. C. R. *et al.* Canine rabies in Rio Grande do Sul caused by an insectivorous bat rabies virus variant. **Acta Scientiae Veterinariae**, v. 37, n. 4, p. 371-374, 2009.
- LANGONI, H. *et al.* Morcegos não-hematófagos na cadeia epidemiológica de transmissão da raiva, **Vet. e Zootec.**, v.14, n.1, p. 43-46, jun. 2007.
- MARTORELLI, L. F. A. *et al.* Isolamento do vírus rábico de morcego insetívoro *Myotis nigricans*. **Rev. Saúde Pública**, v. 29, n. 2, p. 140-1, 1995.
- PASSOS, E. C. *et al.* Isolamento do vírus rábico em morcego insetívoro, *Nyctinomops macrotis*, no Município de Diadema, SP (Brasil), **Rev. Saúde Pública**, v. 32, n. 1, p.74-76, fev. 1998.
- SILVA, L. H. Q. *et al.* Isolamento do vírus rábico em *Molossus ater* (Chiroptera: Molossidae) no Estado de São Paulo, **Rev. Saúde Pública**, v. 33, n. 6, p. 626-628, 1999.

159. INFECÇÃO POR *Leishmania sp* EM CÃES DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRASIL – RESULTADOS PRELIMINARES

Acácio Duarte Pacheco¹, Valéria Marçal Félix De Lima¹, Fernanda Müller de Oliveira¹, Cárís Marone Nunes¹, Mary Marcondes¹.

1- Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Faculdade de Medicina Veterinária de Araçatuba – acacio@fmva.unesp.br.

RESUMO

Um total de 491 amostras provenientes de cães atendidos no Centro de Controle de Zoonoses de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, foram submetidas ao ELISA para detecção de anticorpos anti-*L. chagasi*, observando-se três animais positivos. A PCR do sangue total dessas amostras identificou DNA de *Leishmania sp* em um cão, confirmando assim a presença do agente em cães na cidade de Florianópolis.

PALAVRAS-CHAVE: Leishmaniose, ELISA, PCR

***LEISHMANIA sp* INFECTION IN DOGS OF FLORIANÓPOLIS, SANTA CATARINA, BRAZIL – PRELIMINARY RESULTS**

ABSTRACT

A total of 491 samples obtained from dogs at the Zoonoses Control Center of Florianópolis, Santa Catarina, Brazil, were submitted to ELISA for detection of anti-*L. chagasi* antibodies. Three dogs were positives and PCR of whole blood confirmed the presence of *Leishmania sp* DNA in one dog, thus confirming the presence of the agent in Florianópolis.

KEYWORDS: Leishmaniasis, ELISA, PCR

INTRODUÇÃO

Considerada uma das seis principais endemias mundiais, a leishmaniose visceral é descrita atualmente em mais de 88 países. Até então apenas com casos esporádicos da doença, a região sul do Brasil registrou o primeiro surto de leishmaniose visceral canina em 2009, na município de São Borja, RS. O Estado de Santa Catarina teve os primeiros casos autóctones de leishmaniose tegumentar em seres humanos identificados em 1990, com pacientes das áreas rurais de Coronel Freitas e Quilombo, interior do Estado, apresentando manifestações mucocutâneas da doença (São Thiago; Guida, 1990). Entre 1998 e 2005 novos surtos ocorreram no Estado (Lima-Filho; Steindel, 1998; Rosseto et al, 2006). Apesar da ocorrência de

casos autóctones de leishmaniose tegumentar em seres humanos no Estado de Santa Catarina, não existem, até o presente momento, estudos visando a identificação de leishmaniose em cães.

MATERIAL E MÉTODOS

Amostras de sangue foram colhidas, com o consentimento dos proprietários, de 491 cães levados ao Centro de Controle de Zoonoses do município de Florianópolis. Todas as amostras foram submetidas à sorologia para pesquisa de anticorpos anti-*L. chagasi* pela técnica de ELISA segundo Lima et al. (2003), sendo consideradas positivas as que obtiveram densidade ótica (DO) superior ao ponto de corte (0,270). Estas foram então submetidas a PCR para confirmação da doença. Para a PCR, o DNA do sangue total foi extraído com QIAamp DNA *blood* (Qiagen®), segundo instruções do fabricante. Assim, o fragmento de kinetoplasto de *Leishmania* sp. foi amplificado utilizando-se oligonucleotídeos iniciadores descrito por Rodgers et al. (1990), que amplificam 120 pb. O resultado foi visualizado em gel de poliacrilamida 8%, e corado com nitrato de prata.

RESULTADOS

A população de cães avaliada era proveniente de 56 bairros do município de Florianópolis, e era constituída por 337 (68,6%) fêmeas e 151 (31,4%) machos, com idade variando de 6 meses a 12 anos, com média de 36 meses. A maior parte dos cães (83,8%) não possuía definição racial. Em três cães (0,6%) foram identificados anticorpos anti-*Leishmania* sp. pela técnica de ELISA. Estes eram provenientes de três bairros distintos, sendo um do bairro Jardim Atlântico (Cocker Spaniel, macho, 10 anos), o segundo do bairro Agrônômica (SRD, fêmea, 3 anos) e o terceiro do bairro Santa Mônica (SRD, macho, 3 anos). A técnica de PCR confirmou a presença do DNA de *Leishmania* sp. no sangue cão proveniente do bairro Santa Mônica.

DISCUSSÃO

Apesar do baixo número de animais sororeagentes para a doença na população estudada, os resultados demonstram a presença do parasita em alguns cães, evidenciando a necessidade de uma investigação mais acurada para que sejam adotadas medidas preventivas, reduzindo desta forma a possibilidade de surtos em uma população até então considerada endêmica para leishmaniose visceral e tegumentar. As amostras séricas serão testadas ainda por Reação de

imunofluorescência indireta e será realizado o sequenciamento das amostras de DNA obtidas por PCR a fim de confirmar a espécie de *Leishmania* envolvida.

AGRADECIMENTOS: A FAPESP pela concessão da bolsa de Pesquisa (Processo nº 2010/17168-3) e ao CCZ de Florianópolis pela disponibilidade de colheita das amostras.

REFERÊNCIAS

LIMA, V.M.F.; GONÇALVES, M.E.; IKEDA, F.A. et al. Anti-leishmania antibodies in cerebro spinal fluid from dogs with visceral leishmaniasis. **Brazilian journal of medical and biological research**. v.36, p.485-489, 2003.

BRASIL. Ministério da saúde. Secretaria de vigilância em saúde. Departamento de vigilância epidemiológica. Brasília, Ministério da Saúde, 2010. 810p.

RODGERS, M.R.; POPPER, S.J.; WIRTH, D.F. Amplification of kinetoplast DNA as a tool in the detection and diagnosis of *Leishmania*. **Experimental Parasitology**, v.71, p.267-275, 1990.

SÃO THIAGO, P.T.; GUIDA, U. Leishmaniose Tegumentar no Oeste do estado de Santa Catarina, Brasil. **Revista da Sociedade Brasileira Medicina Tropical**, v. 23, p.201-203, 1990.

LIMA FILHO, J.H.C.; STEINDEL, M. Aspectos clínicos e epidemiológicos da leishmaniose cutânea no Estado de Santa Catarina. **Arquivo Catarinense de Medicina**, v.27, n.1-4, p.25-31, 1998.

160. LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE CASOS DE LEISHMANIOSE CANINA NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA (JAN/ 2009 – JUN/2011)

Renata Mondêgo de Oliveira¹, Venir Lia Frazão¹, Deborah Cristina Marquinho Silva¹, Ianne Roberta dos Santos Cardoso¹, Jessica Stefane Costa¹, Izaías Polary Bezerra¹.

¹Acadêmicos de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão – remondego@yahoo.com.br

Resumo: Este trabalho teve como objetivo realizar um levantamento epidemiológico dos casos de leishmaniose canina na cidade de São Luís – MA. Foram coletados dados no Setor de Triagem do Centro de Controle de Zoonoses de São Luís, no período de janeiro de 2009 a junho de 2011. Verificou-se que em 2009 foi relatado o maior número de casos dentre os anos analisados, sendo o distrito do Tirirical o mais afetado em todos eles.

Palavras-chaves: Tirirical, Leishmaniose, epidemiologia.

EPIDEMIOLOGICAL SURVEY OF CANINE LEISHMANIASIS CASES IN THE CITY OF SÃO LUÍS - MA (JAN / 2009 - JUN/2011)

Abstract: This study aimed to conduct an epidemiological investigation of cases of canine leishmaniasis in São Luís - MA. Data were collected in Sector Screening Center Animal Control of São Luís, from January 2009 to June 2011. It was found that in 2009 was the largest number of reported cases from the years analyzed, and the district of Tirirical the most affected in all of them.

KEYWORDS: Tirirical, Leishmaniasis, epidemiology.

Introdução:

A leishmaniose é uma antroponose de grande importância na saúde pública. No Brasil, sua distribuição é ampla, sendo que no Maranhão, observa-se um dos maiores focos endêmicos (Funasa, 2011). Pode apresentar várias formas clínicas, e seu diagnóstico pode ser feito com base nas características da lesão e através de técnicas parasitológicas e imunológicas. Conhecer a população animal afetada pela leishmaniose é de fundamental importância no estabelecimento de medidas eficazes ao seu controle (Gontijo e Carvalho, 2003). Desta forma, realizou-se um levantamento da ocorrência de leishmaniose na cidade de São Luís, de modo a compreender a epidemiologia da doença neste local.

Material e métodos:

O levantamento foi feito no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da cidade de São Luís. Os dados, obtidos no Setor de Triagem, são referentes ao período de janeiro de 2009 a junho de 2011, sendo separados de acordo com a distribuição dos casos nos distritos sanitários da cidade: Centro, Itaqui-Bacanga, Coroadinho, Cohab, Bequimão, Tirirical e Vila Esperança.

Resultados:

O ano de 2009 apresentou maior número de casos registrados quando comparado aos anos seguintes (572 casos), representando 48,2% do total de casos no período analisado. Em 2010, esse percentual diminuiu para 36,3% (430 casos) e até a primeira quinzena do mês de junho do ano de 2011, 15,5% (185 casos). Em relação à distribuição dos casos nos distritos sanitários da cidade de São Luís, verificou-se que o distrito do Tirirical concentrou o maior número dos casos nos três períodos analisados, totalizando 569 notificações desde 2009. Em contrapartida, o distrito do Itaqui-Bacanga, apresentou a menor quantidade de notificações (17). Em ordem crescente a partir do distrito com menor frequência, temos: Vila Esperança (36), Centro (43), Coroadinho (51), Bequimão (98) e Cohab (172) (Tabela 1).

Tabela 1 – Casos de leishmaniose canina distribuídos pelos distritos da cidade de São Luís – MA no período de janeiro/2009 a junho/2011.

Distritos	2009		2010		2011	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%
Centro	21	3,67%	18	4,19%	4	2,16%
Itaqui-Bacanga	7	1,22%	6	1,39%	4	2,16%
Coroadinho	19	3,32%	25	5,81%	7	3,78%
Cohab	89	15,56%	61	14,19%	22	11,89%
Bequimão	66	11,54%	19	4,42%	13	7,03%
Tirirical	256	45,28%	223	51,86%	87	47,03%
Vila Esperança	18	3,15%	14	3,26%	4	2,16%
Outras localidades	93	16,26%	64	14,88%	44	23,79%
Total	572		430		185	

Discussão:

A maior prevalência de casos no distrito do Tirirical pode ser explicada por diversos fatores, uma vez que as áreas afetadas mostraram características diversas. As áreas com características rurais, com presença de animais silvestres nas adjacências dos domicílios, aliada a áreas de condição sanitária insatisfatória faz com que haja uma tendência para abundância de vetores e reservatórios. Já nas áreas urbanas, sem proximidade com a mata, e com poucos relatos de presença de animais silvestres, o elevado número de casos pode ser justificado pela expansão que a Leishmaniose tem apresentado no ambiente urbano nas últimas décadas, o que também tem sido observado em São Luís (Barbosa et al., 2010).

Conclusão:

A emergência da leishmaniose como um crescente problema de Saúde Pública, deve-se principalmente a fatores demográficos e ecológicos. A migração e urbanização contribuem fortemente para o aumento da doença. As precárias condições sanitárias, a presença de animais domésticos, atuando como reservatórios do parasito e fonte alimentar para os flebotomíneos, no domicílio e peridomicílio, além da capacidade de adaptação do vetor ao ambiente urbano são fatores fundamentais no estabelecimento e expansão da doença.

Referências:

BARBOSA, D.S.; ROCHA, A.L.; SANTANA, A.A. et al. Soroprevalência e variáveis epidemiológicas associadas à leishmaniose visceral canina em área endêmica no município de São Luís, Maranhão, Brasil. **Ciência Animal Brasileira**, v. 11, n. 3, p. 653-659, jul-set, 2010.

FUNASA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Situação epidemiológica: Leishmaniose visceral.** Disponível em:

<<http://www.funasa.gov.br/internet/desai/programasAcoesSaudeVigilanciaAmbiental.asp>>. Acesso em: 02 de janeiro de 2011.

GONTIJO B., CARVALHO M. L. R. Leishmaniose Tegumentar Americana. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, n. 36, p. 71-80, jan-fev, 2003.

161. OCORRÊNCIA DE AGLUTININAS ANTI - *Leptospira interrogans* EM CÃES DE APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS, 2008

Alana Flávia Romani¹, Valéria de Sá Jayme², Leonardo Aparecido Guimarães Tomaz³, Thaís Miranda Silva Freitas⁴, Alana Lucena Oliveira⁴, Cláudia Peixoto Bueno⁵

1 Docente da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Campus de Jataí

2 Docente da UFG – Escola de Veterinária e Zootecnia – Goiânia

3 Médico Veterinário da Agência Goiana de Defesa Agropecuária

4 Discente de Medicina Veterinária da UFG

5 Docente da Universidade Estadual de Goiás

RESUMO

Avaliou-se a ocorrência de aglutininas anti-*Leptospira interrogans* em cães recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses de Aparecida de Goiânia em 2008. Amostras de sangue de 360 cães foram processadas pela técnica de soroaglutinação microscópica, encontrando-se positividade de 9,7%. O sorovar Canicola (10 / 28,5%) foi o mais prevalente, seguido de Pyrogenes (7 / 20%) e Autumnalis (5 / 14,2%). A presença de anticorpos aglutinantes para diferentes sorovares de *Leptospira* spp. nas amostras caninas testadas aponta para a importância da infecção na espécie e para seu papel como potencial fonte de infecção.

PALAVRAS CHAVE: cão, *Leptospira interrogans*, sorovares, prevalência

Anti - *Leptospira interrogans* agglutinins occurrence in dogs serum from Aparecida de Goiânia, Goiás, 2008

ABSTRACT

This study evaluated *anti-Leptospira interrogans* agglutinins occurrence in dogs collected by the Zoonosis Center Control (Aparecida de Goiânia/Goiás/Brazil) during 2008. Blood samples were collected from 360 dogs and processed using microscopical seroagglutination test. The results showed 9,7 % positive tests. The Canicola serovar (10 / 28.5%) was the most prevalent, followed by Pyrogenes (7 / 20%) and Autumnalis (5 / 14.2%). The agglutinating antibodies's presence to different *Leptospira* spp. serovares in canine samples tested showed the infection's importance in species and the potential infection's source.

KEY WORDS: dog, *Leptospira interrogans*, serovars, prevalence

INTRODUÇÃO

A leptospirose, zoonose de importância mundial que afeta diversas espécies animais, é causada pela infecção por *Leptospira interrogans sensu lato*. Em meios urbanos, os cães apresentam alto potencial zoonótico devido a sua proximidade com os humanos. É consenso que a leptospirose crônica em cães continua sendo um problema de saúde pública em países em desenvolvimento (Sykes et al., 2011). Considerando-se a importância da zoonose e o papel da espécie canina, objetivou-se avaliar a ocorrência da infecção em cães do Centro de Zoonoses (CCZ) de Aparecida de Goiânia, Goiás e verificar o perfil de reações sorológicas positivas a diferentes sorovares de *Leptospira* spp.testados.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas amostras de soro de 360 cães apreendidos por busca domiciliar pelo CCZ de Aparecida de Goiânia. Empregou-se a soroaglutinação microscópica, que foi considerada positiva quando ocorreu, no mínimo, 50% de aglutinação, em diluições iguais ou superiores a 1:100. O maior título que apresentou reação foi considerado o sorovar prevalente para cada animal.

RESULTADOS

Do total de 360 (100%) soros testados, 35 (9,7%) apresentaram-se positivos para uma ou mais variedades de *Leptospira interrogans*. Dentre as 35 amostras positivas para *Leptospira* spp, o sorovar Canicola (10 / 28,5%) foi o mais prevalente, seguido de Pyrogenes (7 / 20%) e Autumnalis (5 / 14,2%). Também apresentaram reação os sorovares Patoc, Andamana, Hardjo, Icterohaemorrhagiae, Gryppotyphosa, Shermani, Australis, Sentot e Butembo.

DISCUSSÃO

A prevalência de 9,7% foi menor do que as relatadas por Magalhães et al. (2006) e Modolo et al. (2006), que encontraram 13,1% e 15,5%, respectivamente. Diante da natureza da amostragem por conveniência adotada neste trabalho, não foi possível colher amostras pareadas a fim de acompanhar a evolução do título dos anticorpos. A maior frequência de reações ocorreu com o sorovar Canicola. Romani et al. (2008) também detectaram maior frequência do sorovar Canicola em cães de Goiânia. O segundo sorovar para o qual se obteve maior número de reações foi o Pyrogenes. Sua importância também foi demonstrada em outros trabalhos (Magalhães et al., 2006; Modolo et al., 2006). O sorovar Autumnalis foi o terceiro mais frequente nos cães deste estudo. Batista et al. (2005) alertaram para ausência de imunidade cruzada entre os diferentes sorovares e para o fato de que no mercado a maior parte das vacinas é composta apenas por Canicola e Icterohaemorrhagiae.

CONCLUSÃO

A presença de anticorpos aglutinantes para diferentes sorovares de *Leptospira* spp. nas amostras caninas testadas aponta para a importância da infecção na espécie e para seu papel como potencial fonte de infecção.

Agradecimentos: À técnica Maria de Lurdes da Luz Carvalho pelo auxílio na execução dos exames laboratoriais e ao veterinário do CCZ de Aparecida de Goi Denizard André de Abreu Delfino por ceder as amostras analisadas.

REFERÊNCIAS

- MAGALHÃES, D. F.; SILVA, J. A.; MOREIRA E. C.; WILKE, V. M. L.; HADDAD, J. P. A.; MENESES, J. N. C.. Prevalência de aglutininas anti-*Leptospira interrogans* em cães de Belo Horizonte, Minas Gerais, 2001 a 2002. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, Belo Horizonte, v.58, p. 167-174, 2006.
- MODOLO, J. R.; LANGONI, H.; PADOVANI, C. R.; SHIMABUKURO, F. H.; MENDONÇA, A. O.; VICTORIA, C.; SILVA, W. B. Investigação soropidemiológica de leptospirose canina na área territorial urbana de Botucatu, São Paulo, Brasil. **Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science**, São Paulo, v. 43, n.5, p. 598-604, 2006.
- ROMANI, A. F.; PARREIRA, I. M.; MARQUES, A. E.; CARVALHO, M. L. L.; JAYME, V. S. Detecção de anticorpos anti-*Leptospira* spp. em cães de Goiás, 2000 a 2008. In: IV Congresso do Centro-Oeste de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, 2008, Goiânia. **Ciência Animal Brasileira** - suplemento n 1, nov. 2008, 2008. p. 272-274.
- SYKES, J.E.; HARTMANN, K; LUNN, K.F.; MOORE, G.E.; STODDARD, R.A.; GOLDSTEIN, R.E. 2010 ACVIM Small Animal Consensus Statement on Leptospirosis: Diagnosis, Epidemiology, Treatment, and Prevention. **Journal of Veterinary Internal Medicine**, Melbourne, v. 25, p.1–13, 2011.

162. PEERFIL DE SENSIBILIDADE *IN VITRO* AOS ANTIMICROBIANOS DE ISOLADOS DE *STAPHYLOCOCCUS* SPP. OBTIDOS DA SALIVA DE CÃES

JUSCIÊNE BAGAGI MOURA¹, ALEXSANDRA BEZERRA DE CARVALHO¹, NÁDIA APARECIDA DE SOUZA¹, DIELSON DA SILVA VIEIRA¹, JURACI COELHO RAMOS JÚNIOR², MATEUS MATIUZZI DA COSTA¹

¹Universidade Federal do Vale do São Francisco – juscikoelho@hotmail.com

²Clínica Veterinária do Vale do São Francisco.

RESUMO

Este trabalho avaliou a ação antimicrobiana *in vitro* sobre *Staphylococcus* spp. isoladas da saliva de cães com piodermatite e otite atendidos na cidade de Petrolina (PE), sendo testadas frente a 12 antimicrobianos utilizados na clínica médica veterinária. Foram isoladas 29 *Staphylococcus* spp., destas, quatro foram sensíveis a todos os antimicrobianos, três apresentaram resistência a apenas um antimicrobiano e 22 amostras (76%) foram multiresistentes. A resistência encontrada é alarmante e sugere a possibilidade de transmissão direta dos cães ao homem, podendo ser uma fonte de infecção significativa, principalmente para crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas.

PALAVRAS-CHAVES: resistência, drogas, cavidade oral

PEERFIL SENSITIVITY *IN VITRO* OF ISOLATED TO ANTIMICROBIAL OF *STAPHYLOCOCCUS* SPP. OBTAINED FROM THE SALIVA OF DOGS

ABSTRACT

This study evaluated the antimicrobial activity *in vitro* against *Staphylococcus* spp. isolated from the saliva of dogs with pyoderma and otitis met in the city of Petrolina (PE), and tested against 12 antimicrobials used in veterinary medicine. 29 were isolated *Staphylococcus* spp. Of these, four were susceptible to all antimicrobials, three were resistant to only one antimicrobial and 22 samples (76%) were multiresistant. The resistance encountered is alarming and suggests the possibility of direct transmission from dogs to humans, can be a significant source of infection, especially for children, the elderly and immunosuppressed.

KEYWORDS: endurance, drugs, oral cavity

INTRODUÇÃO:

Bactérias do gênero *Staphylococcus* spp. podem colonizar o ser humano e transferir genes de resistência a outros organismos da microbiota normal, apesar de não ser definida claramente em qual extensão o uso de antimicrobianos em animais contribui para a resistência na medicina humana, já existem evidências de que estas cepas podem circular do animal para o homem e o ambiente (Cizman, 2003). Existe um potencial zoonótico apresentado por estas, comumente relacionado a lesões invasivas, como mordidas por cães ou cateteres contaminados, entretanto, é possível uma infecção não invasiva do cão para o homem, elevando a importância do tratamento eficaz de cães, especialmente daqueles em contato próximo a pessoas imunossuprimidas, muito jovens ou idosas (Tanner et al., 2000).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram coletadas 29 amostras de saliva (*swabs* de algodão estéril em meio *Stuart*) de cães com otite e piodermatite, atendidos na cidade de Petrolina (PE) no ano de 2011. As amostras foram semeadas em Ágar sangue a 5% (isolamento), sendo identificadas por meio de características morfológicas, bioquímicas e tintoriais. O perfil de sensibilidade foi determinado por meio do método de difusão em disco Kirby-Bauer modificado, com as drogas: penicilina(PEN10µg), ampicilina(AMP10µg), cefalexina (CFE30µg), estreptomicina (EST10µg), gentamicina (GEN10µg), ciprofloxacino (CIP05µg), eritromicina (ERI15µg), sulfazotrim (SUT25µg), doxiciclina (DOX30µg), tetraciclina (TET30µg), cefalotina (CFL30µg), ceftriaxona (CRO30µg). Após a leitura dos halos foi determinado o perfil de sensibilidade e o índice de resistência bacteriana múltipla aos antimicrobianos (IRMA).

RESULTADOS

Tabela 1. Resumo do número e porcentagem das amostras que apresentaram resistência.

Grupo	β -Lactâmicos					Aminoglicosídeos		Quinolonas	Macrolídeos	Sulfas	Tetraciclínas	
Antimicrobianos	PEN	AMP	CFE	CFL	CRO	EST	GEN	CIP	ERI	SUT	DOX	TET
Amostras (n)	15	14	04	02	05	10	06	05	10	20	10	16
Resistentes (%)	52%	48%	14%	7%	17%	34%	21%	17%	34%	69%	34%	55%

Das 29 *Staphylococcus* spp. isoladas, quatro foram sensíveis a todos os antimicrobianos utilizados, três apresentaram resistência a apenas um antimicrobiano e 22 amostras (76%) foram multiresistentes.

DISCUSSÃO

As amostras foram obtidas de animais com otite e piodermatite, que apresentaram resistência bacteriana envolvidas nestas enfermidades. Tendo em vista o hábito de “lambadura” desses animais, a transmissão direta ao ser humano é favorecida, fator que também facilita a possível migração bacteriana para a mucosa oral, inicialmente envolvidas na piodermatite e otite canina, ou ainda, pode ser levado em consideração à ocorrência espontânea de bactérias resistentes na mucosa oral, pois de acordo com Hoekstra e Paulton (2002) e Guardabassi et al (2004) a resistência bacteriana se deve ao tratamento empírico de infecções estafilocócicas de enfermidades como: piodermatites, infecções no trato respiratório, urinário, gastrointestinal e otite canina, que indiretamente pode levar a resistência da flora bacteriana não envolvida em processos patogênicos, como a mucosa oral.

CONCLUSÃO

A quantidade de *Staphylococcus* spp. resistentes encontradas na saliva de cães com piodermatite e otite é alarmante e sugere a possibilidade de transmissão direta pela saliva aos seus proprietários. Podendo ser uma fonte de infecção significativa para crianças, idosos e pessoas imunossuprimidas, independentemente da origem das bactérias resistentes.

Nota: Aprovado pelo Comitê de ética no dia 26/09/2011 (Protocolo: 28/260911).

REFERÊNCIAS

- CIZMAN M. The use and resistance to antibiotics in the community. **International Journal of Antimicrobial Agents**. Birmingham, v.21, n.4, p.297-307, 2003.
- GUARDABASSI L., SCHWARZ S., LLOYD D. H. Pet animal as reservoirs of antimicrobial-resistant bacteria. **Journal of Antimicrobial Chemotherapy**, London, v.54, p.321-332, 2004.
- HOEKSTRA K. A., PAULTON R. J. L. Clinical prevalence and antimicrobial susceptibility of *Staphylococcus aureus* and *Staphylococcus intermedius* in dogs. **Journal of Applied Microbiology**, Oxford, v.93, p. 406-413, 2002.
- TANNER M.A., EVERETT C.L., YOUNG D.C. Molecular Phylogenetic Evidence for Noninvasive Zoonotic Transmission of *Staphylococcus intermedius* from a Canine Pet to a Human. **Journal of Clinical Microbiology**, Washington, v.38, n.4, p.1628–1631, 2000.

163. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO ANTERIOR E UTILIZAÇÃO DE PRÓTESE EM *Chelonoidis carbonaria* (LINNAEUS, 1766) - RELATO DE CASO

GUILHERME DIAS ARAUJO¹, LUCAS VILELA PERRONI², RICARDO LOPES DA CRUZ², LEONARDO DE BARROS PERES SOUZA², KARINA BARBOSA DE SOUZA²,
CLÁUDIO YUDI KANAYAMA³

5. Graduando em Medicina Veterinária, Universidade de Uberaba, Uberaba, Minas Gerais, Brasil.
6. Médico Veterinário, residente do Hospital Veterinário de Uberaba (UNIUBE/FAZU/ABCZ).
7. Docente do Curso de Medicina Veterinária, Instituto de Estudos Avançados em Veterinária “José Caetano Borges”, Universidade de Uberaba (UNIUBE/FUNDRAGRI-FAZU/ABCZ).

RESUMO

Um *Chelonoidis carbonaria* foi atendido apresentando fratura transversal completa e exposta do úmero do membro anterior esquerdo. O animal foi submetido a amputação do membro. Rodízios foram utilizados como próteses e fixados com resina autopolimerizável na placa córnea peitoral direita e esquerda do plastrão. A prótese foi efetiva para a locomoção do animal e apresenta como alternativa satisfatória nos casos de amputação de membro anterior.

PALAVRAS-CHAVE: jabuti, amputação de membro, prótese

LIMB AMPUTATION AND PROSTHESIS IN *Chelonoidis carbonaria* (LINNAEUS, 1766) - CASE REPORT

ABSTRACT

A *Chelonoidis carbonaria* was treated presenting exposed complete transversal fracture of the left front limb humerus, with slough of distal extreme of the limb. The animal underwent limb amputation. Casters were used as prosthesis and fixed with self-polymerizable resin on the right and left pectoral cornea plates of the plastron. The prosthesis was effective for locomotion of the animal and presented as a satisfactory alternative in cases of front limb amputation.

KEYWORDS: tortoise, limb amputation, prosthesis

INTRODUÇÃO

Traumatismos são ocorrências comuns em répteis silvestres, tanto em vida livre quanto em cativeiro (Mader e Bennett, 2004). Em um estudo realizado com *Chelonoidis* sp., no Rio de Janeiro, os traumas esqueléticos representam 22% dos registros (Bruno et al., 2011). Geralmente, fraturas de ossos longos em répteis, são resultantes por ataques de cães ou roedores (Mader e Bennet, 2004; Jepson, 2010). Em alguns casos, a amputação do membro é a alternativa de escolha, dependendo da gravidade, estado e tempo de evolução da ferida (Wilkinson et al., 2004). Após a amputação do membro, é possível adição de prótese para locomoção do animal (Mader e Bennett, 2004). O relato a seguir discorre sobre a amputação de membro anterior com posterior utilização de prótese em jabuti piranga (*Chelonoidis carbonaria*).

RELATO DO CASO

Foi atendido em um hospital veterinário de Uberaba, um jabuti piranga, macho, adulto, com histórico trauma no membro anterior esquerdo. Ao exame clínico, o animal apresentava ferida exuberante, com exposição óssea do úmero do membro anterior esquerdo, já necrosado e fraturado transversalmente em seu terço distal. A porção do membro, distal ao foco de fratura, não se encontrava mais aderida à ferida. O animal foi encaminhado ao bloco cirúrgico. Após antissepsia, com gluconato de clorexidina (2%), da ferida, realizou-se indução anestésica do animal com associação de cetamina (15 mg.kg⁻¹), midazolam (1,5 mg.kg⁻¹) e morfina (2 mg.kg⁻¹) e, posteriormente, manutenção anestésica com anestesia infiltrativa perineural do plexo braquial, com lidocaína 2% (0.5 ml), e isoflurano 2%. Como técnica cirúrgica, foi realizada desarticulação do úmero à escápula e ao osso coracoide, com debridamento de todos tecido necrosado adjacente. A sutura compreendeu miorrafia da musculatura regional, “X”; abolição de espaço morto, “zigue-zague”; sutura de pele, “longe-perto-perto-longe”, com fios de nylon 2-0 e 3-0 para pele. No pós-operatório utilizou-se enrofloxacin, 5 mg.kg⁻¹, durante 30 dias e cloridrato de meloxicam, 0,2 mg.kg⁻¹, durante 10 dias, intramuscular, em intervalo de 24 horas. Após o procedimento cirúrgico, foi implantada uma prótese em cada placa córnea peitoral esquerda e direita do plastrão, num total de duas, fixadas com resina acrílica autopolimerizável. As próteses são rodízios giratórios de 32 mm de diâmetro e 14 mm de largura de roda, de material plástico e base metálica para fixação. Logo após o procedimento de fixação das próteses, o animal apresentou locomoção retilínea e curvilínea o que permitiu acesso ao alimento e em terreno cimentado, com terra e gramado satisfatoriamente.

DISCUSSÃO

A inexistência de um membro locomotor em jabutis sobrecarregará os restantes, já que devem suportar o pesado casco e serem aptos a locomover o animal por terrenos rústicos (Cubas e Baptistotte, 2007). Ainda que não seja comum haver fraturas expostas ou cominutivas em ossos longos de répteis, elas geralmente são resultado de trauma ou doença óssea metabólica (Mader e Bennett, 2004). Osteomielite é uma afecção comum em répteis, embora seja mais lítica que proliferativa do que são em mamíferos (Wilkinson et al., 2004). Em casos de necessidade de amputação do membro anterior, Jepson (2010) relata que o membro pode ser amputado no nível médio do úmero, o que não foi possível ser realizado no presente caso, já que só não estava instaurada osteomielite em pequena porção do terço proximal do úmero do animal. A prótese de rodízio é recomendada por Mader e Bennett (2004), cuja função é auxiliar na locomoção juntamente com os membros restantes e evitar a erosão do plastrão, o que poderia causar lesão e dor ao animal.

CONCLUSÃO

A utilização de rodízio como prótese foi efetivo para a locomoção do animal em diversos tipos de terrenos, apresentando-se como a alternativa em *Chelonoidis carbonaria* nos casos de amputação do membro anterior.

REFERÊNCIAS

- BRUNO, S. F.; MELLO A. L. G.; STURM, B. R.; VASCONCELOS, T. C. B. Clínica de répteis: estudo retrospectivo no setor de animais silvestres e exóticos da Faculdade de Veterinária da UFF no período de janeiro de 1999 a dezembro de 2009. **Revista CFMV**, Brasília, v. 17, n. 54, p. 34-43, set.out.nov.dez. 2011.
- CUBAS, P. H.; BAPTISTOTTE, C. Chelonia (Tartaruga, Cágado e Jabuti). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. **Tratado de Animais Selvagens**. São Paulo: Roca, 2006, p. 86-119.
- JEPSON, L. Jabutis e Cágados. In: JEPSON, L. **Clínica de Animais Exóticos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 358-411.
- MADER, D. R.; BENNET, R.A. Surgery. Soft tissue, orthopedics and fracture repair. In: MADER, D. R. **Reptile Medicine and Surgery**. 2 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2004, p.281-287.
- WILKINSON, R; HERNANDEZ-DIVERS, S.; LAFORTUNE, M.; CALVERT, I.; GUMPENBERGER, M.; MCARTHUR, S. Diagnostic Imaging Techniques. In: MCARTHUR, S., WILKINSON, R.; MEYER, J. **Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles**. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, 187-238.

164. ANAPLASMOSE EM *Procyon cancrivorus*: RELATO DE CASO

Jusciêne Bagagi Moura¹, Danniele de Granville Duarte², Nádia Aparecida de Souza¹,
Hugo Leonardo Coelho Ribeiro³, Márcia Bento Moreira¹

¹Universidade Federal do Vale do São Francisco– juscikoelho@hotmail.com

²PETLAB – Laboratório Veterinário.

³Universidade Estadual de Feira de Santana.

RESUMO

Este relato descreve a ocorrência de anaplasmosse em *Procyon Cancrivorus*, conhecido popularmente como guaxinim ou “mão pelada”. Após contenção física realizou-se o exame clínico constatando mucosas pálidas, letargia e infestação intensa de ectoparasitas (carrapatos *ixodídeos*), alterações no exame hematológico e no exame de pesquisa por hemoparasitas confirmou a anaplasmosse (*Anaplasma platys*).

Palavras-chaves: mão pelada, anemia, guaxinim

ANAPLASMOSIS IN *PROCYON CANCRIVORUS*: CASE REPORT

ABSTRACT

This report describes the occurrence of anaplasmosis in *Procyon Cancrivorus*, popularly known as raccoon or "naked hand". After physical restraint was carried out clinical examination finding pale mucous membranes, lethargy and intense infestation of ectoparasites (ixodid ticks), changes in blood test and review of research by hemoparasites confirmed anaplasmosis (*Anaplasma platys*).

KEYWORDS: bare hand, anemia, raccoon

INTRODUÇÃO

A anaplasmosse é uma doença causada por bactérias *Gram* negativas pleomórficas, intracelulares obrigatórias. Devido a uma reestruturação taxonômica baseada em análises filogenéticas, este gênero pertence desde o ano de 2001 à família *Anaplasmataceae*, ordem *Rickettsiales*, onde a transmissão ocorre por carrapatos *ixodídeos* sendo vários os hospedeiros vertebrados domésticos e selvagens potencialmente susceptíveis a esta bactéria (Dumler et al., 2001). A ocorrência desta doença está intimamente ligada à existência de vetores e hospedeiros reservatórios em determinadas regiões. Assim, a doença associada a vetores tende a surgir em áreas

geográficas com características ambientais e faunísticas favoráveis à interação dessas espécies (Ferreira, 2008).

RELATO DE CASO

No mês de abril de 2009, um *Procyon Cancrivorus*, conhecido popularmente como guaxinim ou “mão pelada”, adulto, macho, foi atendido pela nossa equipe na cidade de Petrolina (PE). Após contenção física realizou-se o exame clínico constatando mucosas pálidas, letargia e intensa ectoparasitose por carrapatos ixodídeos, sendo feita a coleta sanguínea por venopunção da jugular externa. O sangue foi encaminhado ao laboratório para realização de exame hematológico e pesquisa de hemoprotozoários. No hemograma foi possível observar anemia normocítica normocrômica, eosinopenia relativa e absoluta, trombocitose, hiperproteinemia, anisocitose, policromasia e metarrubricito 1% (Tabela 1). No esfregaço sanguíneo foi possível observar a *Anaplasma platys* (Fig. 1), na forma de pequenos cocos escuros parasitando os eritrócitos.

Tabela 1. Valores hematológicos do *Procyon Cancrivorus*.

ERITROGRAMA		LEUCOGRAMA	
Eritrócitos	5,23 x10 ⁶ /mm ³	Leucócitos	6.100 /mm ³
Hemoglobina	11,33 g/dl	Neutrófilos	
Hematócrito	34 %	Mielócitos	0 %
VGM	65,00 fl	Metamielócitos	0 %
CHGM	33,32 g/dl	Bastonetes	0 %
		Segmentados	67 %
		Linfócitos	28 %
		Monócitos	4 %
Plaquetas	554.000 /mm ³	Eosinófilos	1 %
Proteína plasmática	8,6 g/dl	Basófilos	0 %

Fig. 1- *Anaplasma platys* em inclusão intra eritrocitária.

DISCUSSÃO

A anemia normocítica normocrômica resulta na diminuição da sobrevivência eritroide, acompanhada da variação no tamanho dos glóbulos vermelhos (anisocitose) que ocorre em virtude do aumento de células jovens, a qual é acompanhada também por policromasia, sendo um indicativo de boa resposta medular. A presença de metarrubricitos sugere disfunção mieloproliferativa, indicando um processo de regeneração intensa dos eritrócitos. Todas essas alterações geralmente ocorrem em

anemias hemolíticas imunomediadas (Sink, 2006; Figuera, 2007). Os dados hematológicos sugerem uma anemia imunomediada tendo como agente causal a *Anaplasma platis*, conforme achado no esfregaço sanguíneo. A incidência de carrapatos sugere a possibilidade do contato com animais domésticos portadores do agente etiológico, já que a captura ocorreu em área urbana e a transmissão desta bactéria se dá pela saliva do *ixodídeo*, inoculada no momento da ingestão sanguínea (Ferreira, 2008).

CONCLUSÃO

A fim de reduzir a ocorrência de doenças transmitidas por *ixodídeos*, é importante o diagnóstico, controle e prevenção de todos os animais expostos ao risco (áreas endêmicas ou exposição a ectoparasitas), inclusive os animais silvestres.

REFERÊNCIAS

DUMLER, J.S., BARBET, A.F., BEKKER, C.P.J. et al. Reorganization of genera in the families *Rickettsiaceae* and *Anaplasmataceae* in the order *Rickettsiales*: unification of some species of *Ehrlichia* with *Anaplasma*, *Cowdria* with *Ehrlichia* and *Ehrlichia* with *Neorickettsia*, descriptions of six new species combinations and designation of *Ehrlichia equi* and 'HGE agent' as subjective synonyms of *Ehrlichia phagocytophila*. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**. ISSN 1466-503, v. 51, p.2145–2165, 2001.

FERREIRA, M.F. **Parasitoses caninas transmitidas por ixodídeos**. 2008. Lisboa, 99f. Dissertação (Mestrado integrado em Medicina Veterinária) – Curso de Pós-graduação em Ciências Veterinárias, Universidade técnica de Lisboa.

FIGHERA, R.A. Anemia Hemolítica em Cães e Gatos. **Acta Scientiae Veterinariae**. v.35 (Supl 2), p. 264-266, 2007.

SINK, C.A. **Urinálise e Hematologia Laboratorial para Clínicos de Pequenos Animais**. 1 º edição. São Paulo: Editora Rocca, 2006. 111p.

165. ANATOMIA DO CORAÇÃO DO TAMANDUA-MIRIM (*Tamandua tetradactyla*)

Valdelice de Lourdes Correa Pinheiro¹, Érika Renata Branco², Breno Costa de Macedo¹, Luiza Corrêa Pereira³, Luana Virgínia Pantoja Ruivo¹, Ana Rita de Lima²

¹ Acadêmico de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia.

² Docente e Doutora da Universidade Federal Rural da Amazônia.

³Mina Bauxita Paragominas - Pará.

RESUMO

Com o objetivo de contribuir para a expansão do conhecimento da anatomia do tamanduá mirim (*Tamandua tetradactyla*), estudou-se 4 animais (2 machos e 2 fêmeas) provenientes da área de Mina Bauxita Paragominas – PA doado após morte por causas naturais. Os espécimes foram fixados com formaldeído a 10% e posteriormente, dissecados, iniciando com uma incisão na cavidade torácica seguido da identificação do coração e a separação deste dos pulmões para seu estudo isolado. Este foi então dissecado, fotografado e esquematizado. Constatou-se **que** o coração do tamanduá-mirim possui aspectos anatômicos semelhante ao padrão já estabelecido para animais domésticos e mamíferos em geral.

PALAVRAS-CHAVES: anatomia, tamandua-mirim, coração

THE LESSER ANTEATER'S HEART ANATOMY (*Tamandua tetradactyla*)

ABSTRACT

Aiming to contribute to the knowledge expansion of the lesser anteater's anatomy (*Tamandua tetradactyla*), it was studied 4 animals (2 males and 2 females) donated by the Paragominas Bauxite Mine after death from natural causes. The specimens were fixed in 10% formalin solution and then, dissected from an incision in the thoracic cavity of the animals. The heart was identified and separated from the lungs to an isolated study. It was dissected, photographed and schematized. It was found that the lesser anteater's heart is anatomically similar to the pattern already established for domestic animals and mammals in general.

KEYWORDS: anatomy, lesser anteater, heart

INTRODUÇÃO

O coração é uma bomba que tem como função conduzir o tecido sanguíneo através dos vasos levando nutrientes para todos os tecidos. É um órgão oco, cônico e comprimido. É constituído de quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos, direitos e esquerdos, separados pelos septos. (Dyce et al., 1997)

O *Tamandua tetradactyla* é um xenartra da família Myrmecophagidae, insetívoro de hábitos predominantemente noturnos cuja alimentação é constituída, principalmente de formigas e cupins. (Cubas et al., 2007). Esta espécie pertence a um dos grupos de animais menos estudados anatomofisiologicamente de modo que o presente estudo objetivou descrever a anatomia do coração deste animal, formando base para estudos posteriores.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram estudados 4 animais (2 machos e 2 fêmeas), provenientes da área de Mina Bauxita Paragominas-PA sob autorização SEMA-PA Nº 455/2009 e 522/2009, doados após óbito por causas naturais. Os animais foram fixados por meio de infusões intramusculares de solução aquosa de formaldeído a 10%, bem como em todas as cavidades, com posterior submersão dos animais em mesma solução, por um período de sete dias. Posteriormente, foi feita a incisão da cavidade torácica dos espécimes, a identificação do coração e a separação deste do pulmão para seu estudo isolado. Este foi então dissecado, fotografado e esquematizado.

RESULTADOS

O coração do tamanduá é envolto pelo pericárdio e apresenta a forma de cone alongado. Localiza-se na cavidade torácica em íntima relação com os pulmões sendo constituído por dois átrios e suas respectivas aurículas e dois ventrículos (direitos e esquerdos), sendo o átrio direito menor que o esquerdo e o ventrículo esquerdo mais espesso e desenvolvido que o direito. Na base do coração, observou-se a emergência do tronco pulmonar que sai do coração pelo ventrículo direito e se bifurca em duas artérias pulmonares (direita e esquerda). No átrio direito, encontra-se a abertura das veias cava cranial e caudal. No átrio esquerdo, há a desembocadura das veias pulmonares. Na base do coração, observa-se a aorta, mais calibrosa e de parede mais espessa. Na face interna, o coração apresenta as aurículas revestidas por músculos pectiniformes e os ventrículos com músculos papilares sustentando as cordas

tendíneas, além das trabéculas septo marginais, que se estendem da parede do septo interventricular até a base do músculo papilar. Na face auricular apresenta o sulco interventricular paraconal e na face atrial apresenta o sulco interventricular subsinuoso.

DISCUSSÃO

A morfologia e topografia observada no coração do *Tamandua tetradactyla* apresenta-se similar a descrita por **Dyce et al, (2004) e para os mamíferos em geral também estando em acordo com o descrito por Pareja, et al (2008)** no tamanduá-bandeira. Embora conste na literatura algumas diferenças relacionadas, sobretudo a topografia e a desembocadura dos vasos da base do coração em alguns mamíferos como a paca, que apresenta duas veias cavas craniais (direita e esquerda); estas diferenças não foram observadas no *T. tetradactyla* que apresenta a conformação típica com presença apenas de veia cava cranial e caudal.

CONCLUSÃO

A anatomia do coração do tamanduá-mirim apresenta-se semelhante ao padrão já estabelecido para animais domésticos e mamíferos em geral.

REFERÊNCIAS

- AVILA, B.H.P; MACHADO, M.R.F; OLIVEIRA, F.S. Descrição anátomo-topográfica do coração da paca (*Agouti paca*). **Acta Scientiae Veterinariae**, v.2, n.38, p. 191-195, 2010.
- CUBAS, Z. S.; SILVA, J.C.R.; CATÃO-DIAS, J.L. **Tratado de animais selvagens**. São Paulo: Roca, 2007 402-406 p
- DYCE, K. M.; SACK, W. O. ; WENSING, C. J. G. **Tratado de anatomia veterinária**. 3.ed. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 2004.
- PAREJA, C. N; ARENÁZIO, F; CRUVINEL, C.A.T et al. Aspectos anatômicos do coração do tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*, Linnaeus, 1758). In: XXXV Congresso Brasileiro de Veterinária, 2008, Gramado. Anais do XXXV Congresso Brasileiro de Medicina Veterinária, 2008.

166. AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA GESTACIONAL DE SERPENTE

Epicrates cenchria (JIBÓIA VERMELHA)

Viviane Campos Garcia^{1,2}, Mirian Halasc Vac³, Ana Paula Lopes de Moraes⁴
Rosângela de Souza¹, Giuseppe Puerto¹, Selma Maria Almeida Santos⁵.

¹Museu Biológico- Instituto Butantan – vivigarcia@butantan.gov.br

²FMVZ-USP- Mestrado Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres

³IVI – Instituto Veterinário de Imagem

⁴FMVZ-USP-Mestrado na Clínica Veterinária

⁵Laboratório de Ecologia e Evolução- Instituto Butantan

RESUMO

A evolução do processo gestacional em serpentes é pouco estudada em animais vivos. A ultrassonografia é um método fácil e não invasivo que permite avaliar e determinar as fases reprodutivas e a gestação. Este trabalho teve o objetivo de descrever o processo gestacional de uma serpente vivípara, *Epicrates cenchria*, através de avaliação ultrassonográfica.

PALAVRAS-CHAVES: *Epicrates cenchria*; serpentes; ultrassonografia

SONOGRAPHIC PREGNANCY EVALUATION OF SNAKE

Epicrates cenchria (RAIMBOW BOAS)

ABSTRACT

The evolution of snake pregnancy process is poorly studied in live animals. Ultrasonography is a not invasive and easy method that makes it possible to evaluate and determine the reproductive phases and the pregnancy. This study had the objective to describe the pregnancy process of the viviparous snake *Epicrates cenchria* by means of ultrasound evaluation.

KEYWORDS: *Epicrates cenchria*; snakes; ultrasonography

INTRODUÇÃO

O processo gestacional em serpentes é pouco descrito em animais vivos. Nas serpentes maduras, os ovários apresentam os folículos em duas fases: fase quiescente (sem vitelo) e fase ativa (com vitelo). O vitelo presente nos folículos alimenta o desenvolvimento do embrião até a formação e o nascimento (Pizzatto et al., 2006).

Com o avanço de métodos ultrassonográficos é possível avaliar e determinar de forma não invasiva a fase folicular e a gestação de serpentes (Stetter, 2006). O objetivo desse trabalho foi descrever o processo gestacional de uma serpente da espécie *Epicrates cenchria*.

MATERIAL E MÉTODOS

Uma fêmea de *Epicrates cenchria* foi pareada (21/06/11) com dois machos da mesma espécie para observar cópula e gestação. Após um mês realizou-se o primeiro exame ultrassonográfico (15/07/2011) e em seguida, foram realizadas mais duas avaliações (21/10/11 e 09/12/11). Foi utilizado o aparelho My Lab Five Vet para as avaliações ultrassonográficas.

RESULTADOS

Durante o processo gestacional iniciado em junho de 2011 foram realizados três exames ultrassonográficos. No primeiro exame realizado em 15 de julho de 2011 (inverno) visibilizou-se 10 folículos medindo entre 4,12 X 2,19 cm (Fig.1). No segundo exame realizado no dia 21 de outubro (primavera) visibilizou-se 10 filhotes medindo entre 5,65 X 2,58 cm (Fig.2). No terceiro exame, realizado no dia 09 de dezembro (primavera), os filhotes estavam completamente formados. Os ovos apresentavam 8,43 cm (Fig.3A) e a presença de vitelo foi visibilizada em apenas um ovo (Fig.3B). No dia 25 de dezembro nasceram 10 filhotes: 9 vivos e 1 morto.

Fig.1- Imagem ultrassonográfica demonstrando estrutura ovalada hiperecogênica e homogênea, medindo 4,12 X 2,19 cm (Cortesia Esaote – CIMEX). Fig.2- Imagem ultrassonográfica demonstrando estrutura ovalada, medindo 5,65 X 2,58 cm, porção hiperecogênica homogênea – vitelo e imagem tubular com região periférica hiperecogênica – feto (Cortesia Esaote – CIMEX). Fig.3A- Imagem ultrassonográfica demonstrando estrutura ovalada, medindo 8,43 cm, ovo com feto bem calcificado – coluna vertebral (Cortesia Setor de Ultrassonografia- HOVET-USP). Fig.3B- Imagem ultrassonográfica demonstrando ovo com vitelo (Cortesia Setor de Ultrassonografia- HOVET-USP).

DISCUSSÃO

A cópula ocorreu em junho durante a vitelogênese secundária, quando os animais foram pareados. A vitelogênese secundária foi visibilizada em julho (primeiro exame ultrassonográfico) com início do desenvolvimento embrionário. O segundo exame visibilizou os embriões e a sua completa formação foi determinada no terceiro exame. O nascimento dos 10 filhotes ocorreu em dezembro. Todas as informações corroboraram Pizzatto (2006), que observou a vitelogênese secundária de junho a dezembro, a presença de embriões de agosto a novembro, e filhotes recém-nascidos de dezembro a fevereiro. Neste trabalho pudemos constatar o período de seis meses de gestação.

CONCLUSÃO

O exame ultrassonográfico é uma ferramenta diagnóstica de grande utilidade para avaliar e determinar o processo gestacional da serpente *Epicrates cenchria*, podendo corroborar as informações acerca do período reprodutivo e a gestação.

REFERÊNCIAS

- PIZZATTO, L. **Ecomorfologia e Estratégias Reprodutivas nos Boidae (Serpentes), com ênfase nas espécies Neotropicais**. Campinas, 2006. 151p. Tese (Doutorado, Ecologia) – Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas.
- PIZZATTO, L.; ALMEIDA-SANTOS, S.M.; MARQUES, O.A.V. Biologia Reprodutiva de Serpentes Brasileiras. In: OLIVEIRA, M.E.; BARRETO, L. **Herpetologia no Brasil**. Belo Horizonte: Sociedade Brasileira de Herpetologia, 2006. v.2, p.201-221.
- STETTER, M.D. Ultrasonography. In: MADER, D.R. **Reptile Medicine and Surgery**. 2.ed. U.S.A.: Saunders Elsevier, 2006. cap.37, p.665-674.

167. CORRELAÇÃO ENTRE AS CARACTERÍSTICAS CITOOLÓGICAS VAGINAIS E OS PERFIS DE PROGESTINAS FECAIS DURANTE O CICLO ESTRAL EM VEADO-CATINGUEIRO (*Mazama gouazoubira*)

Chrissie Prado Junqueira de Faria¹, Marina Suzuki Cursino¹, José Maurício Barbanti Duarte¹.

¹ Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos, Departamento de Zootecnia, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Universidade Estadual Paulista, Brasil.

RESUMO

Hormônios ligados à reprodução, como a progesterona relacionam-se diretamente com as mudanças citológicas vaginais. Dessa forma, a técnica de citologia vaginal proporciona um meio simples e rápido de diagnóstico das fases do ciclo estral, sendo um recurso pouco invasivo e de baixo custo. As alterações citológicas vaginais não foram tão bem definidas como se nota na maioria dos carnívoros e roedores. Entretanto, foram observadas correlações entre: progestinas fecais com células parabasais ($r = - 0,1238$ e $p < 0,05$) e com células intermediárias ($r = + 0,1807$ e $p < 0,05$). Sendo assim, foi proposta a hipótese da existência de um perfil citológico vaginal para esta espécie, podendo ser um método de escolha de diagnóstico de fases de ciclo estral em *Mazama gouazoubira*.

PALAVRAS-CHAVE: *Mazama gouazoubira*, citologia vaginal, progestina fecal

Correlation between the vaginal cytology features and profiles of fecal progesterone during the estrous cycle in brown brocket deer (*Mazama gouazoubira*) on captive

ABSTRACT

Hormones related to reproduction, such as progesterone relate directly to the vaginal cytological changes. Thus, the technique of vaginal cytology provides a simple and rapid diagnostic of the estrous cycle phases, being a minimally invasive and a low cost resource. The vaginal cytological changes were not as well defined as seen in most carnivores and rodents. However, correlations were observed: fecal progestagens with parabasal cells ($r = - 0.1238$ and $p < 0.05$) and intermediate cells ($r = + 0.1807$ and $p < 0.05$). Therefore, we proposed the hypothesis of the existence of a vaginal cytology profile for this species, which can be a diagnostic method of choice of the estrous cycle phases in *Mazama gouazoubira*.

KEYWORDS: *Mazama gouazoubira*, vaginal cytology, fecal progestagens

INTRODUÇÃO

O veado-catingueiro é o cervídeo brasileiro mais abundante. Deste modo, estudos desenvolvidos nessa espécie são interessantes, pois favorecem a posterior aplicação em outras ameaçadas de extinção (DUARTE & GARCIA, 1997). Nos animais selvagens, os métodos não invasivos de monitoramento dos parâmetros endócrino-reprodutivos como a dosagem de metabólitos fecais esteróides são os de eleição. Entretanto, há outras formas de monitoramento de ciclo estral de caráter pouco invasivo, como a citologia vaginal que proporciona um meio simples e rápido de diagnóstico de fases (BANKS, 1991). O objetivo deste trabalho foi observar se existe uma relação entre o perfil citológico vaginal, os níveis de progestinas fecais e o comportamento sexual durante o ciclo estral em veado catingueiro.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados diariamente durante 60 dias em cinco fêmeas: esfregaços vaginais, colheita de amostras fecais e observação de comportamento estral. A caracterização celular procedeu segundo Herron (1977) e a contagem diante da análise de 100 células/lâmina. As amostras fecais coletadas foram imediatamente armazenadas a -20°C. O processamento das amostras ocorreu, seguindo as etapas de homogeneização e extração dos metabólitos fecais como descrito por Graham et al. (2001). O estado comportamental foi verificado através da observação de comportamentos reprodutivos, segundo os referidos por Santos et al. (2001). As correlações entre os níveis dos metabólitos fecais de progesterona e as porcentagens das diferentes populações celulares foram analisadas através do teste de correlação de Pearson e as diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando $p < 0,05$.

RESULTADOS

A contagem de células superficiais em fase de estro foi de 34,9 % a 57,6 % (IC 95 %) e a apresentação de cio comportamental foi observada nos mesmos períodos em que ocorreu o aumento das células superficiais (Figura1).

Figura1. Perfil da concentração de metabólitos fecais de P4 [ng/g fezes] (linha) e percentual de células superficiais (barras) da fêmea 5. A seta laranja indica os dias de observação do comportamento de cio.

Analisando os dados, foi possível obter correlação negativa entre progesterinas fecais e células parabasais ($r = -0,1238$ e $p < 0,05$) e correlação positiva entre progesterinas fecais e células intermediárias ($r = +0,1807$ e $p < 0,05$) (Tabela 1).

Variável	Por Variável	Correlação	Contagem	Significância
P4	P	-0,1238	295	0,0336*
P4	I	0,1807	295	0,0018*
P4	S	-0,0933	295	0,1098

Tabela 1. Correlação entre a porcentagem das células vaginais e progesterógeno fecal de todas as fêmeas (P- célula parabasal, I- célula intermediária, S- célula superficial, P4- progesterina fecal) .

DISCUSSÃO

As alterações citológicas vaginais nem sempre apresentaram consistentes durante as fases do ciclo estral. Porém, pode ser observado um aumento citológico superficial nas fases de estro, corroborando assim com o estudo em *Cervus timorensis* descrito por Mezang-Nalley (2008). Também foi observada uma correlação, positiva entre progesterona e células intermediárias e negativa entre progesterona e células parabasais. Este achado encontra apoio na literatura em estudo colpocitológico realizado em Leão Africano (SILVA et al., 2005).

CONCLUSÃO

Foi possível observar correlações significativas entre tipos celulares e concentrações de progesterinas fecais ao longo do ciclo estral, demonstrando assim que existe uma relação destes parâmetros. A colpocitologia demonstrou ser mais exata para a detecção de cio em relação à observação de comportamento, possuindo um custo mais baixo e um tempo de resultado mais curto que a dosagem hormonal. Dessa forma, essa técnica de diagnóstico de fases do ciclo estral em *Mazama gouazoubira* pode ser um método de escolha desde que exista um manejo de adaptação e aprimoramento da metodologia aplicada.

REFERÊNCIAS

- BANKS, W. Histologia Veterinária Aplicada. 2.ed., São Paulo: Manole, 1991. 565 p.
- DUARTE J.M.B. & GARCIA J.M. 1997. Reprodução assistida em Cervidae
- GRAHAM, L. H.; SCHWARZENBERGER, F.; MÖSTL, E.; GALAMA, W.; SAVAGE, A. A versatile enzyme immunoassay for the determination of progestagens in feces and serum. Zoo Biology, New York, 20: 227-236, 2001. HERRON, M. A. Feline vaginal cytologic examination. **Feline Practice**, v. 7, p. 36-39, 1977.
- MEZANG-NALLEY, M.; BELLI H.; ARIFIANTINI, I. Vaginal Cytology in Timor Deer Hind (*Cervus Timorensis*) under Natural Estrus Cycle. In: TROPENTAG, 2008, Hohenheim. **Resumos...** Hohenheim: Foxit Reader, 2008.
- SANTOS, G. L.; CERAVOLO, L.; SOUZA, S.; DUARTE, J. M. B. Sazonalidade reprodutiva e duração do ciclo estral e do cio de fêmeas de veado catingueiro (*Mazama gouazoubira*) sob condições de cativeiro. In. **CONGRESSO INTERNACIONAL**
- SILVA, G.C.O., Barbare P.E.B., ZACCARIOTTI, R.L., CORRÊA, S.H.R., OLIVEIRA C.A. & GUIMARÃES M.A.B.V. Estudo da correlação das características citológicas vaginais e os níveis séricos de estradiol e progesterona em leão africano (*Panthera leo*) mantidos em cativeiro. **Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci.**, v.43(2), p. 227-232, 2005.

168. DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO DIAFRAGMA DO SAGUI-DE-TUFO-BRANCO (*CALLITHRIX JACCHUS*)

Luana Célia Stunitz da Silva¹, Thais Borges Lessa¹, Maria Vitória Piemonte Constantino¹, Paulo Ramos da Silva Santos¹, Carlos Eduardo Ambrósio², Pedro Primo Bombonato¹

¹Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP-SP – luanastunitz@usp.br

²Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, USP-SP

RESUMO

Neste estudo para caracterizar a morfologia do diafragma na espécie *Callithrix jacchus*, foram utilizados 4 animais adultos, 2 machos e 2 fêmeas, que vieram a óbito por causas naturais. Após a dissecação dos animais o diafragma foi mensurado para sua largura e comprimento com o uso de um paquímetro, e coletado amostras da porção muscular para a histologia sendo coradas com Hematoxilina-Eosina e Tricrômio de Masson. A topografia e a presença de três aberturas no diafragma corroboram com a literatura para outros mamíferos. A presença de um centro tendíneo em “V” difere de outras espécies, como o porquinho-da-india. Não houve diferenças entre os sexos para as mensurações. O uso de colorações distintas permitiu maior acuidade na análise da porção muscular.

PALAVRAS-CHAVES: primatas, diafragma, *Callithrix jacchus*

MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF DIAPHRAGM OF WHITE-TUFTED-EAR-MARMOSET (*CALLITHRIX JACCHUS*)

ABSTRACT

In this study to characterize the morphology of the diaphragm in *Callithrix jacchus*, we used 4 adult animals, two males and two females, which they died of natural causes. After the dissection of animals the diaphragm was measured for its length and width using a caliper, and the muscular portion of the collected samples for histology and stained with Hematoxylin-Eosin and Masson. The topography and presence of three openings in the diaphragm corroborate the literature for other mammals. The presence of a tendinous center “V” differs from other species such as guinea pig. There were no gender differences for measurements. The use of coloration allowed more accurate analysis of the muscular portion.

KEYWORDS: primates, diaphragm, *Callithrix jacchus*

INTRODUÇÃO

As pesquisas envolvendo o músculo diafragma em primatas não-humanos são escassas, apesar de principalmente o sagui-de-tufo-branco (*Callithrix jacchus*) ser o mais estudado do seu gênero. Diante disso o objetivo deste estudo foi caracterizar a morfologia do diafragma do sagui-de-tufo-branco, analisando as possíveis divergências estruturais entre os sexos.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados quatro espécimes adultos de *Callithrix jacchus*, 2 fêmeas e 2 machos, provenientes de um criadouro comercial e que vieram a óbito por causas naturais. Inicialmente procedeu-se com uma incisão e rebatimento da pele na região do manúbrio até a cicatriz umbilical, com posterior retirada da fáscia subcutânea e grupos musculares, permitindo o acesso e a subsequente retirada do diafragma. Realizaram-se então as mensurações de largura e comprimento com o uso de um paquímetro e posterior coleta de amostras da porção muscular para a histologia com posterior coloração de Hematoxilina-Eosina e Tricrômio de Masson.

RESULTADOS

O diafragma do sagui-de-tufo-branco possui concavidade para o tórax e convexidade ao abdome, estando caudalmente ao pulmão e coração, fixo a este pelo ligamento frenicopericárdico, e cranialmente ao fígado, fixo a este pelos ligamentos coronário e falciforme. No centro tendíneo, parte central de tecido conjuntivo fibroso, existia o forame da veia cava caudal e na porção muscular, parte carnosa periférica, ocorria o hiato esofágico e o hiato aórtico. Ainda nesta porção notou-se a presença de três divisões: a parte esternal, a parte costal e os pilares diafragmáticos, direito e esquerdo. A média da largura do diafragma foi de $5,4 \pm 0,17$ cm, sendo para machos de $5,4 \pm 0,4$ cm e para fêmeas $5,415 \pm 0,57$ cm, e o comprimento médio foi de $6,24 \pm 0,249$ cm, sendo para os machos de $6,156 \pm 0,688$ cm e para as fêmeas $6,331 \pm 0,937$ cm. Não havendo diferenças significativas entre os sexos. Na histologia foi observado a presença do epimísio e endomísio, com a fibra muscular esquelética do diafragma apresentando estriações transversais, devido à alternância de faixas escuras e claras. Os núcleos apresentavam-se ovalados formando aglomerados periféricos nas células.

DISCUSSÃO

A topografia e estrutura dos diafragmas analisados para a espécie *Callithrix jacchus* foi de encontro com as descrições presentes na literatura (Harrison, 2005). Com relação à porção muscular a observação de fascículos simétricos ora vistos corrobora com Pompeu et al (1992). O formato em “V” do centro tendíneo observado é similar ao encontrado para o gambá-de-orelhas-brancas e para o rato-albino, contudo difere do formato em “U” no porquinho-da-índia (Cassel et al., 2002).

CONCLUSÃO

A topografia e a estrutura do diafragma do sagui-de-tufo-branco corroboram com a literatura para os mamíferos, mas o centro tendíneo em “V” difere do encontrado em outras espécies. Não houve diferenças entre os sexos para a largura e o comprimento do diafragma. O uso de duas colorações histológicas distintas permitiu maior acuidade nas análises realizadas das porções musculares.

Agradecimentos: Ao criadouro AJBSoares e à Médica Veterinária Marta Brito Guimarães.

Nota: Comitê de Ética: Protocolo 1995/2010 FMVZ-USP.

REFERÊNCIAS

- CASSEL, F. D.; SOARES, J. C.; TORREJAIS, M. M. et al. Anatomical Study of the Diaphragm of the Opossum (*Didelphis albiventris*). **Anatomia, Histologia, Embryologia**, v.31, n. 3, p.132–138, 2002.
- HARRISON, G.R. The Anatomy and Physiology of the Diaphragm. In: BRAUNWALD, E.; HAUSER, S.L.; LONGO, D.L.; FAUCI, A.S.; KASPER, D.L.; JAMESON, J. L.; LOSCALZO, J. **Princípios de Medicina Interna**. 16.ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2005, p.45-58.
- POMPEU, E.; LIBERTI, E.A.; OSAKA, J.T. et al. The rabbit's diaphragm innervation. **Revista Brasileira de Ciências Morfológicas**, v.9, n. 1, p. 33–36, 1992.

169. ESTUDO ANATÔMICO DA TRAQUEIA E PULMÕES DO SAUIM *Saguinus midas* (Linnaeus, 1758)

Kylma Chagas^{1*}; Valdelice Pinheiro¹; Ana Rita de Lima²; Luiza Corrêa³; Érika Branco²;
Ana Cláudia Alexandre de Albuquerque¹

¹Acadêmica de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia.

²Docente e Doutora de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural da Amazônia.

³Mina Bauxita Paragominas - Pará. Médica Veterinária. Mestranda.

RESUMO

Estudou-se em 2 exemplares de sauins (*Saguinus midas*) a morfologia da traqueia e do pulmão, doados pela Mina Bauxita Paragominas ao Laboratório de Pesquisa Morfológica Animal (LaPMA). Os exemplares foram armazenados em solução aquosa de formoldeído a 10%, dissecados e efetuada retirada da traqueia e do pulmão. A traqueia foi dividida em três regiões (terço cranial, médio e caudal), mensurada a altura e largura, perante uso de paquímetro digital (Dc-6 Western), assim como foi realizada contagem dos anéis traqueais, totalizando 32 unidades em cada animal. Quanto ao pulmão, registrou-se os seguintes lobos: cranial, médio, caudal e acessório (lado direito) e cranial porção cranial e caudal e lobo caudal (lado esquerdo).

PALAVRAS CHAVES: sauim, anatomia, traqueia, pulmão

ANATOMICAL STUDY OF THE TRACHEA AND LUNGS OF SAUIM *Saguinus midas* (Linnaeus, 1758)

ABSTRACT

It was studied the trachea and lungs morphology of two sauins specimens. The animals were donated by the Paragominas Bauxite Miner to the Morphological Laboratory Animal Research (MLAR) from Federal Rural University of Amazonia – UFRA. The specimens were stored in 10% formalin, dissected and then, the trachea and the lungs were removed. The trachea was divided into three regions (cranial, middle and caudal third). It was measured its height and width using a digital caliper and we also counted the tracheal rings (32 units on each animal). We registered the following lobes in the lungs: cranial, middle, caudal and accessory (right side) and right cranial (cranial and caudal portion) and left caudal lobe (left side).

KEYWORDS: sauin, anatomy, trachea, lung.

INTRODUÇÃO

O *Saguinus midas*, conhecido popularmente como Sauim, está incluído na família *Callithricidae* (*Platyrrhini*, *Primates*) taxonomicamente os mais complexos entre os primatas neotropicais. Esta espécie ocorre na Guiana Inglesa, Suriname, Guiana Francesa e no norte do Brasil (Hershkovitz, 1977). A traqueia, tubo flexível, cartilaginoso e membranoso, que se estende caudalmente da laringe (cartilagem cricóide), ao nível da segunda vértebra cervical, até o nível da quinta vértebra torácica, dorsal à base do coração, apresentando uma porção cervical e torácica (Getty et al., 1986a; Dyce et al., 2004; Kealy & McAllister, 2005) e em conjunto com os brônquios principais direito e esquerdo formam um contínuo tubo que conduzem ar entre a laringe e os bronquíolos para os pulmões (Dyce et al., 2004). Os pulmões são órgãos respiratórios, pares, direito e esquerdo, que ocupam considerável espaço da cavidade torácica, estão divididos em lobos, no qual o pulmão direito possui quatro lobos (cranial, médio, caudal e o intermediário) e o esquerdo que possui dois lobos (cranial e caudal) (Getty et al., 1986a). Diante do exposto, esse trabalho objetivou descrever a anatomia da traqueia e do pulmão do sauim (*S. midas*), pelo fato de não haver na literatura tais dados importantes que possam ser usados como fins terapêuticos.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em dois exemplares de sauins (*S. midas*), fêmeas, adultas, de vida livre, que vieram a óbito por atropelamento, provenientes da área de Mina Bauxita Paragominas, sob autorização de nº 485/2009, 522/2009, doado ao LapMA da UFRA. Fez-se perfusão nos animais por via intramuscular com solução de formoldeído a 10% bem como armazenados na mesma, com a finalidade de conservação. Posteriormente realizou-se dissecação da região torácica seguida da retirada da traqueia e do pulmão sob auxílio de instrumentos básicos de dissecação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As traqueias foram divididas em terço cranial, médio e caudal, realizando-se mensuração da largura (latero-lateral) e da altura (dorso-ventral), sob auxílio de paquímetro digital (Dc-6 Western). Em uma das fêmeas o terço cranial da traqueia apresentou 4 mm (largura) e 2 mm (altura), no terço médio 3 mm (largura) e 1 mm (altura) e no terço caudal 1 mm (largura) e 1 mm (altura). Na outra fêmea encontramos no terço cranial 3 mm (largura) e 3 mm (altura), no terço médio 2 mm (largura) e 3 mm (altura) e no terço caudal 2 mm (largura) e 1,5 mm (altura). Na contagem dos anéis

traqueais, do primeiro ao último, no sentido craniocaudal, cada exemplar revelou 32 anéis. O comprimento da traqueia em uma das fêmeas foi de 4,65 cm, enquanto que na outra foi de 4,1 cm. O pulmão dos animais mostrou-se segmentado com sete lobos, no qual o lado direito era formado pelos lobos: cranial, médio, caudal e acessório e no lado esquerdo sendo formado por três lobos: cranial porção cranial e caudal e lobo caudal, assemelhando-se como o descrito em carnívoros domésticos e suínos (Dyce et al., 2004). Quanto aos anéis traqueais dos *S. midas*, estes revelaram formato de “C”, diferindo do apresentado em caprinos, no qual apresentam forma de “U” (Getty et al., 1986b).

CONCLUSÃO

Concluimos, diante do exposto, que as vias aéreas inferiores do sauim adulto assemelha-se com o descrito em carnívoros domésticos e suínos em relação ao número de lobos.

REFERÊNCIAS

- DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de anatomia veterinária**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. p.310-311.
- GETTY, R.; SISSON, S.; GROSSMAN, J. D. **Anatomia dos Animais Domésticos**. 5.ed. vol.1. Guanabara Koogan, 1986a. Cap. p. 868, 870.
- GETTY, R.; SISSON, S.; GROSSMAN, J. D. **Anatomia dos Animais Domésticos**. 5.ed. vol.2. Guanabara Koogan, 1986b. 1474 p.
- HERSHKOVITZ, P. **Living New World Monkeys (*Platyrrhini*) with an introduction to Primates**. vol.1. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1977. 1132 p.
- KEALY, J.K.; McALLISTER, H. **Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat**. St. Louis: Elsevier, 2005. 512 p.

170. EXOFTALMIA POR ABSCESSO INTRA-ORBITAL ODONTOGÊNICO

EM *Cebus apella*

Arianne Pontes Oriá¹, Deusdete Conceição Gomes Junior²; Melissa Hansen Pinna¹,
Fernanda Libório³, Vinicius Dantas³, Alessandra Estrela da Silva Lima¹, Marcus
Nogueira³, Francisco de Assis Dórea Neto⁴, Kátia Requião³

¹ Universidade Federal da Bahia – veterinarioufba@yahoo.com.br

² Universidade Estadual Paulista

³ Médico Veterinário

⁴ União Metropolitana de Educação e Cultura

RESUMO

A exoftalmia é decorrente de qualquer lesão orbital expansiva que curse com deslocamento do bulbo do olho a frente. Comumente ocorre por alterações neoplásicas, sendo raramente ocasionada por ascensão de microrganismos da cavidade bucal. Neste trabalho relatamos um caso de exoftalmia em *Cebus apella* devido a abscesso intraorbital odontogênico e sua resolução terapêutica.

Palavras chave: enucleação, exenteração, primata

EXOPHTHALMOS BY INTRAORBITAL ODONTOGENIC ABSCESS IN *Cebus apella*

ABSTRACT

Exophthalmos is caused by any expansive orbital injury that curse with offset of the eye forward. Commonly occurs by neoplastic changes, being rarely caused by the rise of microorganisms of the oral cavity. In this work we report a case of exophthalmos due to intraorbital abscess in *Cebus apella* and its therapeutic resolution.

KEYWORDS: enucleation, exenteration, primate

INTRODUÇÃO

A exoftalmia é o sinal clínico mais comum associado a doença orbital (HOLMBERG, 2008). Ocorre por lesão orbital expansiva, que causa deslocamento do bulbo do olho à frente, tornando-o proeminente. Em humanos e animais, o deslocamento do bulbo do olho pode ocorrer por celulite orbital/abscessos intraorbitais de origem odontogênica, os quais são raros e normalmente estão relacionados a infecção ascente oriunda dos dentes molares superiores (ALLAN et al., 1991; HOLMBERG, 2008). Apresentamos um relato de exoftalmia ocular em *Cebus apella*.

RELATO DE CASO

O paciente proveniente do Centro de triagem de Animais Silvestres (CETAS/IBAMA), Salvador, Bahia, foi retirado do recinto coletivo e encaminhado para atendimento especializado. Observou-se caquexia e exoftalmia com intenso desconforto. Os parâmetros fisiológicos encontravam-se dentro da normalidade. Os dentes caninos estavam seccionados com evidente exposição pulpar. Ao exame ocular foi visualizado, no olho direito, exoftalmia severa, blefaroedema, hiperemia conjuntival, ausência de mobilidade do bulbo do olho, teste de ameaça negativo, reflexo pupilar direto e consensual ausentes e ceratite ulcerativa central por lagoftalmia. O olho esquerdo não apresentava anormalidades. Solicitou-se hemograma completo, citologia da conjuntiva, radiografia dentária e tomografia computadorizada, sendo prescrito azitromicina a cada 12 horas por 10 dias.

O hemograma revelou anemia e leucocitose intensa. O rx indicou abscesso periodontal no canino superior direito. A avaliação tomográfica identificou conteúdo retrobulbar, sugestivo de processo neoplásico. A análise citológica revelou processo inflamatório. Optou-se por realizar exenteração da órbita direita e após 15 dias, com melhora do quadro clínico geral, foi submetido a novo procedimento anestésico para extração do dente canino ipsilateral da exenteração. Um novo hemograma revelou diminuição da leucocitose. O laudo da histopatologia indicou miosite supurativa aguda. A cultura demonstrou presença de *Proteus sp.*, *Streptococcus beta-hemolítico*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus sp* e Difteróides, sendo sensíveis a ação da gentamicina

Devido ao quadro clínico e aos resultados da cultura e antibiograma, optou-se por utilizar a gentamicina a cada 12 horas por 21 dias consecutivos. O paciente apresentou melhora clínica e até o momento não apresenta complicações.

DISCUSSÃO

Corroborando com Fecchio et al. (2009) diversos fatores podem ter contribuído para o diagnóstico tardio da enfermidade. Dentre eles o tamanho e a quantidade de animais nos recintos, a falta de conhecimento científico e, sobretudo a adaptação dos animais selvagens à manifestação clínica tardias das doenças.

A ocorrência de *Proteus sp.* e *Escherichia coli* pode ser atribuída ao sinergismo microbiano, que possibilita uma infecção secundária devido a imunossupressão causada pelo agente inicial (*Streptococcus beta-hemolítico*). O hábito da espécie em levar as mãos nas mucosas, estimulado pelo comportamento estereotipado em virtude

do estresse causado pela remoção de seu hábitat, transporte, convívio com humanos, manejo e carências alimentares, pode ter favorecido a proliferação dos microrganismos supracitados (CLEFF e colaboradores, 2008).

Neste paciente, de acordo com as avaliações realizadas, ocorreu ascensão de microrganismos do abscesso dental a órbita, conforme descrito em humanos por Allan et al. (1991), possivelmente por extensão direta. Este fato foi comprovado pela observação de comunicação alvéolo-órbita e a presença de *Staphylococcus* sensível a gentamicina na raiz dentária e na secreção ocular.

CONCLUSÃO

Acreditamos que as medidas tomadas no presente caso foram suficientes para resolução do processo patológico. O paciente realiza suas funções vitais normalmente, e recentemente foi reintegrado ao grupo, onde se comportou de maneira comum aos da sua espécie.

Referências:

- ALLAN, B. P.; EGBERT, M. A; MYALL, R. W. T. Orbital abscess of odontogenic origin. Case report and review of the literature. *Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*, v. 20, p. 268-270, 1991.
- CLEFF, M. B.; SOARES, M. P.; MADRID, I. M. et al. Candidíase cutânea em *Cebus apella* (macaco-prego). **Ciência Animal Brasileira**, v. 9, n. 3, p. 791-795, 2008.
- HOLMBERG, B. J. Ophthalmology of exotic pets. In: SLATER, D. H. **Slatter's fundamentals of veterinary ophthalmology**. 4. ed. Saunders: Philadelphia, 2008, p. 428.
- FECCHIO, R. S.; ROSSI Jr., J. L.; FERRO, D. G. et al. "Medicina preventiva aplicada à odontologia em animais selvagens". **Nosso Clínico**, v. 12, p. 44-52, 2009.

171. HEMATOLOGIA DO JURARÁ (*Kinosternon scorpioides*, LINNAEUS, 1766)

Ericka Bruna Galvão¹, Diego Moraes Soares¹, Alana Lislea de Sousa², Daniel Praseres Chaves², Antonia Santos Oliveira², Lianne Polliane Fernandes Araujo³.

¹Universidade Estadual do Maranhão – brunnagalvao@hotmail.com

²Médicos Veterinários - Docentes UEMA.

³Mestranda em ciência Animal-UEMA.

RESUMO

O jurará (*Kinosternon scorpioides*), é um pequeno cágado da ordem Chelonia e família Kinosternidae. Esta espécie vem sofrendo declínio populacional em virtude de caças indiscriminadas e alterações ambientais. O conhecimento do padrão sanguíneo normal é de grande importância para auxiliar no diagnóstico de patologias bem como para o desenvolvimento de planos apropriados de manejo e conservação da espécie.

PALAVRAS-CHAVE: Hematologia, répteis, *Kinosternon scorpioides*

MORFOLOGY OF THE BLOOD CELLS OF JURARÁ (*Kinosternon scorpioides*, LINNAEUS, 1766)

ABSTRACT

The swear (*Kinosternon scorpioides*), is a small turtle Chelonia order Kinosternidae and family. This species has suffered population declines due to indiscriminate hunting and environmental change. Knowledge of the standard normal blood is of great importance for the diagnosis of diseases and to develop appropriate plans for management and conservation of the species.

KEYWORDS: Hematology, reptiles, *Kinosternon scorpioides*

INTRODUÇÃO

A avaliação hematológica é de grande valor na investigação de doenças em répteis, assim como para indicar alterações fisiológicas entre animais de vida livre e em adaptação ao cativeiro (Divers et al., 1996). Portanto o conhecimento do estado fisiológico destas populações é necessário para que se faça o desenvolvimento apropriado de planos de manejo e conservação. Em virtude da carência de estudos sobre esta espécie, pesquisas estão sendo desenvolvidas para a descrição morfológica e quantitativa de células sanguíneas, que se constituíram os objetivos deste trabalho.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se 30 animais adultos, machos e fêmeas clinicamente sadios, oriundos do Criadouro Científico para Pesquisa em *K. scorpioides*, licenciado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis/ IBAMA-MA (Licença nº 1899339/2008). Colheu-se sangue com heparina sódica por venopunção do seio venoso cervical. Os esfregaços sanguíneos foram corados com Rosenfeld modificado, para contagem diferencial de leucócitos e caracterização morfológica das células. 20µl de sangue foi diluído em 200µl de PBS 1x + azul de toluidina, para a contagem total de leucócitos e eritrócitos, através da câmara de Neubauer. O volume globular foi obtido através da centrifugação de tubo capilar contendo aproximadamente 50µL de sangue a 1000 RPM por 5 minutos e lido na tabela específica. A concentração de proteínas plasmáticas foi obtida em refratômetro a partir do plasma sanguíneo. A concentração de hemoglobina foi obtida através do método de cianometahemoglobina, utilizando kit comercial. Os índices hematimétricos de CHCM e VGM foram calculados segundo Matos & Matos (1985).

RESULTADOS

Os valores médios encontrados para hematócrito $19\pm3,20$ %, proteínas totais $4,3\pm1,34$ g/dL, hemácias $2,9\pm0,98 \times 10^6/\text{mm}^3$, hemoglobina $4,51\pm1,39$ g/dL, VGM $62,44\pm27,53$ fL, CHGM $23,01\pm7,96$ g/dL., leucócitos totais $3,18\pm0,74 \times 10^3/\text{mm}^3$. As hemácias, são elipsoidais; o citoplasma cora-se de róseo; o núcleo é central, oval a arredondado, contém cromatina de aspecto denso e cor púrpura. (**Fig.1- A**). Os eosinófilos, são células arredondadas, com grânulos citoplasmáticos eosinófilos esféricos e núcleo excêntrico de formato variável (redondo ou oval); heterófilos, também são arredondados, de citoplasma basofílico e núcleo variando de redondo ou oval; monócitos tem sua forma arredondada com núcleo variando, de arredondado, oval ou lobado, sendo esta última a forma mais frequente. A cromatina nuclear é pouco condensada; os linfócitos variam entre tamanhos grandes ou pequenos. São células redondas que podem aparecer irregulares. Têm núcleo central, geralmente redondo e cuja cromatina nuclear encontra-se densamente agregada e fortemente corada de púrpura. (**Fig.1- B, C, D e E**).

Figura 1: Hemácias de jurará (*Kinosternon scorpioides*) (A), Eosinófilo (B), Linfócitos (C), Monócito (D) e Heterófilo (E), de jurará, *Kinosternon scorpioides*.

DISCUSSÃO

A morfologia das hemácias do jurará foi semelhante aos aspectos morfológicos obtidos por Thrall et al (2007), para répteis. Da mesma forma, as características morfológicas obtidas para, eosinófilos, heterófilos, monócitos e linfócitos, estão de acordo com o padrão descrito por Thrall et al (2007) e Garcia-Navarro & Pachaly (1994) para répteis.

CONCLUSÃO

As células sanguíneas do jurará são morfologicamente semelhantes às de outros quelônios, porém os valores hematológicos diferem da maioria dos répteis da mesma ordem Chelonia.

REFERÊNCIAS

- GARCIA-NAVARRO, C. E. K.; PACHALY, J. R. **Manual de Hematologia Veterinária**. São Paulo: Varela, 1994. p.13.
- DIVERS, S. J.; REDMAYNE, G.; AVES, K. Haematological and biochemical of 10 green iguanas (*Iguana iguana*). **The Veterinary Record**, London, v. 138, n. 3, p. 203 - 205, 1996.
- THRALL, M. A. *et al.* **Bioquímica clínica de répteis**. In: _____, **Hematologia e bioquímica clínica veterinária**. 1. ed. São Paulo: Rocca, 2007. p. 248-264; 461-466.

172. INFLUÊNCIA DO SEXO NA BIOQUÍMICA SÉRICA DE JIBOIAS AMAZÔNICAS (*Boa constrictor constrictor*), PARÁ, BRASIL

Dennis José da Silva Lima¹, Verena C. Ferreira², Keitty Araújo dos Reis², Andre Marcelo C. MENESES².

¹HOVET/UFRA, Belém/PA - dennis_lima.vet@hotmail.com

²HOVET/UFRA, Belém/PA.

RESUMO

Objetivou-se com esta pesquisa verificar a diferença nos valores bioquímicos séricos de jibóias amazônicas levando em consideração o sexo do animal. Foram colhidas 62 amostras de sangue de jibóias amazônicas (34 de machos e 28 de fêmeas), posteriormente foram realizadas dosagens séricas de proteína total, albumina, globulina, ALT, AST, fosfatase alcalina, DHL, ácido úrico, cálcio e fósforo. Os valores foram analisados estatisticamente pelo teste de Krukal-Wallis e ANOVA. A atividade sérica de FA foi a única que mostrou ter diferenças significativas, sendo maior nos machos.

PALAVRAS-CHAVE: *Boa constrictor*, jibóia, patologia clínica, bioquímica sérica, sexo

GENDER INFLUENCE ON AMAZON SERUM BIOCHEMISTRY BOA CONSTRICTORS (BOA CONSTRICTOR CONSTRICTOR), PARÁ, BRAZIL

ABSTRACT

The objective of this research was to determine the difference in values of serum biochemical Amazonian pythons taking into account the sex of the animal. Blood samples from 62 Amazonian pythons were collected (34 males and 28 females) and subsequently performed serum total protein, albumin, globulin, ALT, AST, alkaline phosphatase, LDH, uric acid, calcium and phosphorus. The values were statistically analyzed by Krukal-Wallis test and ANOVA. The serum activity of AF was the only one that had shown significant differences, being higher in males.

KEYWORDS: *Boa constrictor constrictor*, clinical pathology, biochemistry, sex

INTRODUÇÃO

A concentração da maioria dos constituintes sanguíneos nos répteis apresenta variações fisiológicas importantes, que podem ser ocasionadas por vários fatores como

alimentação, disponibilidade de água, temperatura, idade, sexo, condição nutricional e outros (Campbell et al 2006).

Objetivou-se com esta pesquisa verificar as diferenças que ocorrem nos valores bioquímicos séricos (proteína total, albumina, globulina, ALT, AST, fosfatase alcalina, DHL, ácido úrico, cálcio e fósforo) de jibóias amazônicas influenciados pelo sexo do animal.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizadas 62 amostras de sangue de *Boa constrictor constrictor*, sendo 34 amostras de espécimes machos e 28 de fêmeas, todos criados em cativeiro no município de Santo Antônio do Tauá/PA. A presente pesquisa teve autorização do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio e SISBIO. As amostras de sangue foram obtidas por cardiocentese obedecendo as recomendações descritas por Mitchel (2009). Posteriormente, foram dosadas a quantidade sérica de proteína total, albumina, globulina, alanino aminotransferase (ALT), aspartato amino transferase (AST), fosfatase alcalina (FA), desidrogenase láctica (DHL), ácido úrico, cálcio e fósforo, utilizando aparelho automático de bioquímica. Os testes de ANOVA e Kruskal Wallis foram aplicados para verificar se houve diferenças significativas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores obtidos estão disponibilizados na Tabela 1. Dentre os dez parâmetros que foram analisados, apenas a fosfatase alcalina mostrou ter diferenças estatísticas significantes (ANOVA-p = 0,0254 e Kruskal Wallis-p = 0,0414), onde o valor médio e desvio padrão foi superior nos machos em comparação com as fêmeas. Segundo Campbell et al (2006) a atividade desta enzima é utilizado principalmente para avaliar a função hepática de diversas espécies de animais, porém, não é considerada órgão específica, sendo amplamente distribuída pelos tecidos corporais, que segundo Lassen (2006), em condições normais, incluem os intestinos, rins, placenta e atividade osteoblástica. Nesta última, a atividade de FA elevada é observada principalmente em animais jovens. No presente estudo a atividade de FA avaliada isoladamente, não demonstra ser indicativo de lesão hepática, pois após realizar a avaliação de outras enzimas hepáticas pesquisadas (ALT, AST, DHL) verificou-se que estas sofreram discretas variações durante a comparação, não sendo encontrada uma correlação fisiológica para este aumento de atividade de FA, além disso, os valores de proteína total e frações estiveram dentro dos valores preconizados por Kolesnikovas et al

(2006). Portanto, confirma os achados anteriores e descarta a possibilidade de lesão hepática, demonstrando que a atividade de fosfatase alcalina é superior nos espécimes machos, podendo ter sua origem de liberação em qualquer outro tecido em que esta é produzida, com exceção do fígado.

Tabela 1 - Valores bioquímicos séricos de *Boa constrictor constrictor* levando em consideração o sexo do animal. 2012.

Parâmetro	Machos	Fêmeas
Ácido úrico (mg/dL)	6,37 ± 4,55	5,78 ± 3,92
Albumina (g/dL)	2,67 ± 0,60	2,75 ± 0,59
ALT (U/L)	10,50 ± 8,70	10,24 ± 8,18
AST (U/L)	15,91 ± 7,23	17,24 ± 10,82
Cálcio (mg/dL)	20,21 ± 2,18	20,52 ± 5,02
DHL (U/L)	386,91 ± 182,28	442,61 ± 209,44
FA (U/L) *	136,83 ± 64,96	88,22 ± 48,31
Fósforo (mg/dL)	4,24 ± 0,63	4,40 ± 0,59
Globulina (g/dL)	3,77 ± 0,90	3,32 ± 1,23
Proteína total (g/dL)	6,44 ± 0,98	6,07 ± 1,26

* Parâmetro em que foi observada diferença estatística significativa ($P < 0,05$) entre machos e fêmeas em ANOVA, Kruskal Wallis, e nos pós testes: Teste t e comparações de Student-Newman-Keuls.

CONCLUSÃO

Os valores do presente estudo foram compatíveis com os valores de referência disponíveis. Foi observado que apenas a fosfatase alcalina mostrou ter diferenças significativas, sendo maior nos machos. Esta foi a primeira pesquisa abordando a bioquímica sérica de jibóias e a influência do sexo no Estado do Pará.

REFERÊNCIAS

- KOLESNIKOVAS, C. K. M.; GREGO, K. F.; ALBUQUERQUE, L. C. R. Ordem Squamata. In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. **Tratado de animais selvagens**. São Paulo: Roca, 2006, p.58-67.
- CAMPBELL, T. W.; DENICOLA, D.; FETTMAN, M.J. et al. Bioquímica sérica de répteis. In THRALL, M. A.; BAKER, D. C.; CAMPBELL et al. **Hematologia e bioquímica clínica veterinária**. São Paulo: Roca, 2006, p.462-466.
- LASSEN, E. D. AVALIAÇÃO LABORATORIAL DO FIGADO. In THRALL, M. A.; BAKER, D. C.; CAMPBELL, T. et al. **Hematologia e bioquímica clínica veterinária**. São Paulo: Roca, 2006, p. 340-341
- MITCHELL, M. A. Snakes. In MITCHELL, M. A. **Manual of Exotic Pet Practice**. St. Louis, Missouri, Cap. 7. Elsevier Saunders, 2009.

173. LEVANTAMENTO DE ENDOPARASITOSE DE FELÍDEOS DO PARQUE ZOOBOTÂNICO DE TERESINA-PIAUÍ

Vanessa Rodrigues Costa Fontinele¹; Elisângela Freitas de Andrade¹, Francelino Neiva Rodrigues¹, Kennya Cristina Damasceno de Jesus¹, Maria Liliane Ximendes Azevedo¹, Ivete Lopes de Mendonça²

¹ Graduando (a) de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí

² Prof. Dra. do Centro de Ciências Agrárias no Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária (DCCV)

RESUMO

Os felinos selvagens são animais susceptíveis a hospedarem parasitas. Os endo e ectoparasitas apresentam uma grande importância para esses animais, já que estes parasitas possuem potencial zoonótico, principalmente em áreas próximas a reservas florestais e áreas destinadas à exposição de animais. Por isso torna-se necessário um acompanhamento permanente nos animais que habitam essas áreas, bem como a adoção de medidas profiláticas que mantenham essas parasitoses sob controle.

Palavras-chave: felinos silvestres, cativeiro, parasitas, zoológico.

RISING OF ENDOPARASITOSE OF FELÍDEOS OF THE PARQUE ZOOBOTÂNICO OF TERESINA-PIAUÍ

ABSTRACT

The wild felines are animal susceptible they accommodate her parasites. The endo and ectoparasitas present a great importance for those you encourage, since these parasites possess potential zoonótico, mainly in close areas to you reserve forest and areas destined to the exhibition of animals. Therefore he/she becomes necessary a permanent accompaniment in the animals that inhabit those areas, as well as the adoption of measures profiláticas that you/they maintain those parasitoses under control.

KEYWORDS: wild felines, captivity, parasites, zoo

INTRODUÇÃO

Os zoológicos desempenham funções importantes como a conservação da fauna silvestre e principalmente quando se trata de espécies ameaçadas de extinção, entre outros (Figueiredo, 2001).

O cativeiro de animais induz ao estresse, diminuindo a capacidade imunológica e propiciando o surgimento de parasitoses. As contínuas modificações ambientais favorecem a disseminação de doenças, principalmente as transmitidas por vetores (Birchard; Sherding, 1998). As doenças parasitárias nos felinos podem estar ligadas à alimentação, água contaminada, disseminação de parasitas pelos tratadores e a ocupação anterior do recinto por outro animal contaminado (Muller et al. 2005). Os animais contendo endo e ectoparasitas podem oferecer risco de contaminação às pessoas que entram em contato com os mesmos (Chandler et al., 1988).

Canídeos e felídeos silvestres podem ser parasitados por diferentes gêneros de parasitos, entre eles endoparasitas como *Giardia* sp., *Toxocara* spp., *Capillaria* sp., *Cystoisospora*, *Trichuris* spp. e *Diocotophyma renale* e ectoparasitas como carrapatos e pulgas (Botelho, 2004; Herrera, 2004; Fiorello, 2005).

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram analisadas 30 amostras fecais dos felídeos, identificadas, armazenadas e levadas para o Laboratório de Sanidade Animal da Universidade Federal do Piauí (LASAN, UFPI), onde foram realizados os exames coproparasitológicos, utilizando as técnicas de Willis, método de Hoffmann e de Baermann. Os ovos observados foram identificados segundo características descritas em literatura e/ou comparados com imagens da bibliografia pertinente ao assunto.

RESULTADOS

Observou-se nas amostras analisadas infecção elevada de ovos do ascarídeo *Toxocara* spp. no gato mourisco (*Puma yaguarondi*) e jaguatirica (*Leopardus pardalis*), também foi encontrado ovos do tipo Strongyloidea *Ancylostoma* sp., oocistos de protozoários de cestódeos, em menor quantidade. Na onça pintada (*Panthera onca*), nos leões (*Panthera leo*) e na suçuarana (*Puma concolor*) foram encontrados ovos do tipo Strongyloidea *Ancylostoma* sp em pouca quantidade. Já nas fezes do tigre real de bengala (*Panthera tigris tigris*) apresentou em pequenas quantidades ovos de *Ancylostoma* sp, *Toxocara* spp e de cestódeo. Evidenciou-se também que em algumas

amostras houve associação de espécies de parasitas, sendo mais comum as de *Toxocara spp* e *Ancylostoma sp*.

DISCUSSÃO

Em estudo realizado por Muller et al. 2005 no Parque Ecológico Zoobotânico de Brusque, 80% dos felídeos estavam infectados com *Toxocara spp*. Esse alto índice é devido às características dos ovos de *Toxocara spp* permanecerem viáveis por longos períodos no ambiente, sob condições adequadas de temperatura, umidade e luminosidade, podendo provocar reinfecção nos animais.

CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos percebe-se que é necessário a realização de exames coprológicos periódicos nos felídeos e intensificar medidas de controle, como a vermifugação periódica para que não ocorra disseminação de parasitas.

REFERÊNCIAS

- BIRCHARD, S.J.; SHERDING, R.G. **Manual Saunders: clínica de pequenos animais**. São Paulo: Roca, 1998.
- BOTELHO, J.R.; LINARDI, P.M.; COUTINHO, M.T.Z.; CARDOSO, V.A. **Ácaros ixodídeos de mamíferos silvestres da região da hidrelétrica de Samuel, Rondônia, Brasil**. Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 13(1): 326, 2004.
- CHANDLER, E.A.; HILBERY, A.D.R.; GASKELL, C.J. **Medicina e terapêutica de felinos**. São Paulo: Manole, 1988.
- FIGUEIREDO, I. C. S. **Histórico dos Zoológicos no Mundo**. In: WEMMER, C.; TEARE, J. A.; PIOKETT, C. Manual do Biólogo de Zoológico Para Países em Desenvolvimento. São Carlos: Sociedade de Zoológicos do Brasil – SZB. p. vii - x, 2001.
- FIORELLO, C.V., ROBBINS, R.G., MAFFEI, L.M.S., WADE, S.E. **Parasites of free-ranging small canids and felids in the Bolivian Chaco**. Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 37(2): 130-134, 2005.
- HERRERA, H.M., DAVILA, A.M., NOREK, A., ABREU, U.G., SOUZA, S.S., ANDREA, P.S., JANSEN, A.M. **Enzootiology of *Trypanosoma evansi* in Pantanal, Brazil**. Veterinary Parasitology, 125: 263-275, 2004.

MULLER, G.C.K., GREINERT, J.A. and SILVA FILHO, H.H. **Frequência de parasitas intestinais em felinos mantidos em zoológicos.** Arq. Bras. Med. Vet. Zootec., Aug. 2005, vol.57, no.4, p.559-561. ISSN 0102-0935.

174. LINFOMA MULTICÊNTRICO ESPONTÂNEO EM HAMSTER SÍRIO

(*Mesocricetus auratus*)

Valéria Veras de Paula¹, Sidnei Miyoshi Sakamoto¹, Silvia Aparecida Cavalcanti de Queiroz¹, Kilder Dantas Filgueira¹

¹Universidade Federal Rural do Semiárido (Mossoró-RN) –
kilderfilgueira@bol.com.br

RESUMO

Em hamster, as neoplasias espontâneas não são frequentes. Objetivou-se descrever um caso de linfoma, neste animal, com ocorrência natural. Um hamster possuía aumento de volume subcutâneo. Realizou-se o exame físico no roedor seguido de citologia da área lesionada. Clinicamente foi verificado tumor em região escapular do membro torácico direito. Microscopicamente, observou-se material oriundo de linfonodo, infiltrado por linfócitos neoplásicos. O quadro clínico-laboratorial foi compatível com linfoma multicêntrico. A descrição desta patologia em hamster contribui para os dados relacionados às neoplasias dos roedores.

PALAVRAS-CHAVES: neoplasia, linfócito, roedor

SPONTANEOUS MULTICENTRIC LYMPHOMA IN SYRIAN HAMSTER

(*Mesocricetus auratus*)

ABSTRACT

In hamsters, spontaneous neoplasms are not frequent. The objective was to describe a case of lymphoma in that animal, with a natural occurrence. A hamster presented increased subcutaneous volume. The rodent's physical examination was performed, followed by cytology of the injured area. Clinically, a tumor in the scapular region of the right forelimb was verified. Microscopically, there was material from lymph nodes and infiltrated by neoplastic lymphocytes. The clinical and laboratory picture were consistent with multicentric lymphoma. The description of this disease in hamsters is important data contribution related to neoplasm in rodents.

KEYWORDS: neoplasm, lymphocyte, rodent

INTRODUÇÃO

Os hamsters correspondem a roedores amplamente mantidos em cativeiro, seja como espécie de laboratórios, zoológicos ou exemplares de estimação (Pessoa, 2007). Embora os hamsters sejam extremamente sensíveis a indução experimental de

neoplasias, não é frequente o aparecimento dessas de modo espontâneo (Trotte et al., 2010). Podem-se verificar naturalmente tumores endócrinos, gastrointestinais, hematopoiéticos e tegumentares (Pessoa, 2007). Dentre as neoplasias do tecido linfóide, cita-se o linfoma. Este se revela com a forma cutânea ou multicêntrica, sendo a última caracterizada usualmente pelo acometimento dos gânglios linfáticos (Filgueira et al., 2010). Objetivou-se descrever um caso de linfoma, com apresentação espontânea e padrão multicêntrico, em hamster.

MATERIAL E MÉTODOS

Um hamster Sírio (*Mesocricetus auratus*), de pelagem dourada, fêmea, com um ano e dois meses de idade, possuía o histórico de aumento de volume subcutâneo. O proprietário informava rápido crescimento da lesão. O roedor foi submetido ao exame físico. Optou-se por realizar citologia por punção aspirativa da área acometida.

RESULTADOS

O animal apresentava um tumor localizado na região escapular do membro torácico direito. A lesão exibia 12,3 cm de diâmetro, com abrangência subcutânea, sendo macia, séssil e com superfície externa eritematosa e hipertérmica. Preconizou-se a suspeita clínica de abscesso ou neoplasia. Microscopicamente, foi observado material representativo de linfonodo. Havia grande quantidade de linfócitos atípicos.

Estes revelaram citoplasma basofílico e vacuolizado, com núcleos desnudos e macronúcleolos. Algumas células demonstravam-se multinucleadas. Logo, o quadro clínico e laboratorial foi compatível com linfoma multicêntrico. Após a obtenção do resultado do exame laboratorial, o proprietário não retornou com a paciente.

DISCUSSÃO

A incidência de neoplasias em hamsters varia de 4 a 50% (Pessoa, 2007). Este amplo intervalo oscila conforme a região analisada e pelo fato das investigações ocorrerem normalmente em animais com idade avançada, os quais são mais suscetíveis as neoplasias (Trotte et al., 2010). No presente relato, o aparecimento do linfoma foi caracterizado como insólito, pois não se observou o mesmo na população local de hamsters, estando assim compatível com o valor mínimo do intervalo percentual anteriormente citado. Além da associação com o envelhecimento do animal reforça-se também a hipótese de etiologia viral, onde o linfoma pode surgir até um ano após a exposição ao agente infeccioso (Santos et al., 2002; Pessoa, 2007). Para o

caso em questão, não se determinou a causa da neoplasia. A linfadenopatia periférica é o achado mais comum do linfoma multicêntrico. O tumor também pode abranger baço, fígado, intestino e rim. A disseminação para a medula óssea e aumento no número de células mononucleares sanguíneas pode indicar uma evolução para leucemia (Santos et al., 2002). No animal em discussão, não se verificou, clinicamente, a distribuição do linfoma além dos linfonodos periféricos. Contudo, a ausência de retorno com o roedor prejudicou a condução do caso no sentido de estabelecer o estadiamento do linfoma. Devido à escassez de uma terapia reconhecida para as neoplasias hematopoiéticas de hamster, o prognóstico se torna ruim (Filgueira et al., 2010). Logo, possivelmente a paciente descrita veio a óbito, embora não tenha sido acompanhada a evolução clínica da doença.

CONCLUSÃO

A descrição do linfoma multicêntrico em hamster torna-se importante no sentido de contribuir com os dados relacionados às neoplasias dos roedores.

REFERÊNCIAS

- FILGUEIRA, K.D.; FIGUEIRÔA, L.V.A.; PAULA, V.V. Linfoma cutâneo em hamster Sírio (*Mesocricetus auratus*). In: CONGRESSO BRASILEIRO DA ANCLIVEPA, XXXI., 2010, Belém. **Anais...** Belém: Anclivepa-PA, 2010.
- PESSOA, C. A. Rodentia – roedores de companhia (hamster, gerbil, cobaia, chinchila, rato). In: CUBAS, Z.S.; SILVA, J.C.R.; CATÃO-DIAS, J.L. **Tratado de animais selvagens – medicina veterinária**. São Paulo: Roca, 2007, Cap.xxviii, p.432-474.
- SANTOS, V.M.; LIMA, M.A.; MARQUEZ, D.S. et al. Spontaneous B-cell lymphoma in hamster. **Medicina**, v.35, p.179–183, 2002.
- TROTTE, M.N.S.; PINTO, L.W.; SANTOS, B.F. et al. Spontaneous renal adenocarcinoma in a Syrian hamster (*Mesocricetus auratus*): frequency, morphological and immunohistochemical findings. **Brazilian Journal of Veterinary Pathology**, v.3, n.2, p.123–126, 2010.

175. MENSURAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO EM COELHOS

Amália Turner Giannico¹, Suelen Berger Baldotto¹, James Newton Bizetto Meira de Andrade², André Tavares Somma¹, Leandro Lima¹, Fabiano Montiani-Ferreira¹.

¹Universidade Federal do Paraná – amaliagiannico@uol.com.br

²Universidade do Estado de Santa Catarina

RESUMO

A mensuração direta da pressão arterial sistêmica (PAS) pode ser feita por diferentes métodos, sendo o mais tradicional a ultrassonografia Doppler e, mais recentemente, o oscilométrico. A proposta do presente trabalho foi avaliar o uso do sistema oscilométrico na mensuração da PAS sistólica, diastólica e média de coelhos saudáveis. Tais valores ainda não foram relatados em coelhos empregando este método. O sistema oscilométrico foi eficiente em mensurar tais medidas. Os resultados obtidos foram $145,78 \pm 34,71$ mmHg para a PAS sistólica, $86,10 \pm 19,83$ mmHg para a PAS diastólica e $104,80 \pm 19,40$ mmHg para a PAS média. A PAS sistólica obtida com o sistema oscilométrico foi semelhante à já descrita como PAS normal para o sistema Doppler.

PALAVRAS-CHAVE: Coelho, pressão arterial sistêmica, cardiologia veterinária

MEASUREMENT OF THE SYSTEMIC BLOOD PRESSURE IN RABBITS BY OSCILLOMETRIC METHOD

ABSTRACT

Direct measurement of blood pressure (BP) can be done by different methods. The most traditional is Doppler ultrasonography, but, recently, the oscillometric method has become more common. The purpose of this study was to evaluate the use of the oscillometric system in measuring systolic, diastolic and mean BP in healthy rabbits. The oscillometric system proved to be an efficient method to acquire BP data and provided the following results: $145,78 \pm 34,71$ mmHg for systolic BP, $86,10 \pm 19,83$ mmHg for diastolic BP and $104,80 \pm 19,40$ mmHg for mean BP. Systolic BP was similar to those described as normal using the Doppler system.

KEYWORDS: Rabbit, blood pressure, veterinary cardiology

INTRODUÇÃO

A pressão arterial sistêmica (PAS) é um dos mais importantes parâmetros de avaliação do sistema cardiovascular (Calçada et al., 2006). O diagnóstico de doenças

cardiovasculares em coelhos de estimação tem aumentado devido ao aumento da expectativa de vida destes animais (Orcutt, 2006). A PAS pode ser aferida por método direto ou indireto (Mucha e Camacho, 2003). Para os métodos indiretos (não-invasivos) podem ser empregados a ultrassonografia Doppler, testes oscilométricos e fotopletismográficos (Brown e Henik, 2002). Há apenas alguns trabalhos na literatura descrevendo a avaliação da PAS em coelhos com o uso do sistema Doppler (Orcutt, 2006; Pariaut, 2009), e nenhum que utilize o sistema oscilométrico. Nosso objetivo foi mensurar a PAS com o aparelho oscilométrico veterinário (petMAP) em 10 coelhos da raça Rex e Nova Zelândia, e comparar os valores obtidos aos descritos como normais na literatura, com o uso do Doppler.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados 10 coelhos saudáveis, sendo três da raça Rex e sete da raça Nova Zelândia (total de seis fêmeas e quatro machos), com peso médio de $3,47 \pm 0,59\text{Kg}$ e idade variando entre 4 a 6 meses. A PAS foi aferida utilizando um aparelho oscilométrico (petMAP; CardioCommand Inc., Tampa, FL, EUA). Os animais foram colocados em decúbito esternal, com uso de manguito de largura igual a 30% a 40% da circunferência do membro utilizado (torácico esquerdo). Foram realizadas seis aferições consecutivas e a média entre elas foi considerada para mensurar a PAS sistólica, diastólica e média. A análise estatística e inferencial foi realizada por meio do programa StatView (SAS, Cary, NC, EUA). Para comparação dos dados entre os sexos e entre as raças foi empregado o teste-*t*. Valores de $P < 0,05$ foram considerados significativos.

RESULTADOS

As médias dos valores da PAS dos 10 coelhos foram $145,78 \pm 34,71$ mmHg para a PAS sistólica, $86,10 \pm 19,83$ mmHg para a PAS diastólica e $104,80 \pm 19,40$ mmHg para a PAS média. Não houve diferença estatística entre raças para os valores de PAS, mas entre sexos observou-se uma diferença significativa nas pressões diastólica e média, com fêmeas tendo maiores valores em todos os parâmetros.

DISCUSSÃO

A média da PAS sistólica encontrada com o dispositivo oscilométrico foi de $145,78 \pm 34,71$ mmHg, que está dentro dos valores normais descritos em pesquisas com o sistema Doppler, como valores entre 90 a 135 mmHg (Orcutt, 2006) e 120 e 180

mmHg (Pariaut, 2009). A literatura não apresenta valores de referência para PAS diastólica e média com Doppler em coelhos, e acreditamos que isso deva ocorrer pela dificuldade e imprecisão na mensuração realizada com este sistema. Já o sistema oscilométrico permitiu a aferição da PAS diastólica e média com maior precisão e de forma bastante simples. Apesar de haver diferença significativa entre os sexos, acreditamos ser necessário novos estudos focados nesta diferença com um número amostral maior de animais para determinar sua veracidade.

CONCLUSÃO

O uso do sistema oscilométrico (petMAP) em coelhos forneceu parâmetros da PAS sistólica confiáveis e semelhantes aos descritos na literatura empregando o sistema Doppler, além de proporcionar uma avaliação da PAS diastólica e média de mais fácil aquisição e mais precisa do que o sistema Doppler. Acredita-se que os valores encontrados possam contribuir com a literatura e venham a auxiliar no atendimento destes animais.

REFERÊNCIAS

- BROWN, S. A.; HENIK, R.A. Hipertensão sistêmica. In: TILLEY, L. P.; GOODWIN, J. K (Eds.). **Manual de cardiologia para cães e gatos**. 3ªed. São Paulo: Roca, 2002. cap. 16, p.313-319
- CALÇADA, D.; FRAZÃO, J.; SILVA, D. **Pressão arterial**. Lisboa. 2006. Monografia (Licenciatura em Engenharia Biomédica). Instituto Superior Técnico, Lisboa, 2001
- MUCHA, C. J.; CAMACHO, A. A. Determinação da pressão arterial. In: BELENERIAN, G. C.; MUCHA, C. J.; CAMACHO, A. A. (Ed.) **Afecções cardiovasculares em pequenos animais**. São Caetano do Sul: Interbook, 2003, cap.7, p.68-71.
- ORCUTT, C. J. Cardiovascular disorders. In: MEREDITH, A.; FLECKNELL, P. (Eds.). **Manual of rabbit medicine and surgery**. Gloucester (UK): BSAVA, 2006. cap. 10, p.96–102
- PARIAUT, R. Cardiovascular physiology and diseases of the rabbit. **Veterinary Clinics of North America: Exotic Animal Practice**, v. 12, n. 1, p. 135–144, 2009.

176. MORFOMETRIA MACROSCÓPICA DO CORAÇÃO DO SAGUI-DE-CARA-BRANCA (*Callithrix geoffroyi*)

LUANA CÉLIA STUNITZ DA SILVA¹, PEDRO PRIMO BOMBONATO¹

¹Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP-SP – luanastunitz@usp.br

RESUMO

Neste estudo avaliamos a morfometria macroscópica do coração de cinco espécimes de *Callithrix geoffroyi* (sagui-de-cara-branca) que vieram a óbito por causas naturais, sendo 3 machos e 2 fêmeas, para a obtenção de informações de carácter morfológico que possam tanto fundamentar discussões do ponto de vista funcional e quanto para a utilização na clínica veterinária. As mensurações realizadas abarcaram a altura ventricular, os diâmetros látero-lateral e dorso-ventral e as espessuras dos ventrículos direito e esquerdo. A partir de todas as medidas resultantes podemos concluir que ocorre um padrão morfométrico cardíaco para a espécie *Callithrix geoffroyi*, servindo assim de informação no conhecimento da anatomia do sistema cardiovascular nesta espécie.

PALAVRAS-CHAVES: primatas, coração, *Callithrix geoffroyi*

MACROSCOPIC MORPHOMETRY OF HEART OF WHITE-FRONTED-MARMOSET (*CALLITHRIX GEOFFROYI*)

ABSTRACT

This study we evaluated the macroscopic morphology of the heart of five specimens of *Callithrix geoffroyi* (white-fronted-marmoset) that had died of natural causes, 3 males and 2 females, to obtain the morphological information that can support discussions the functional point of view and for use in the veterinary practice. The measurements carried out encompassed the height ventricular, diameters latero-lateral and dorsal-ventral and the thickness of the right and left ventricles. From all we can conclude that measures resulting pattern in the knowledge of the anatomy of the cardiovascular system in this species.

KEYWORDS: primates, heart, *Callithrix geoffroyi*

INTRODUÇÃO

Apesar de existir estudos sobre a arquitetura do coração em diversas espécies de mamíferos não foram encontradas na literatura descrições macroscópicas do coração específicas do sagui-de-cara-branca (*Callithrix geoffroyi*). Assim o objetivo deste estudo foi o de descrever a morfometria do coração da espécie *Callithrix geoffroyi*, não somente para a obtenção de informações de carácter morfológico que possam fundamentar discussões do ponto de vista funcional, mas também na produção de informações para a utilização na clínica veterinária.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados cinco espécimes de *Callithrix geoffroyi*, 3 machos e 2 fêmeas, com massa corpórea entre 251 e 390 gramas, oriundos de um criadouro comercial de animais selvagens, e que vieram a óbito por causas naturais. Os animais foram inicialmente dissecados na região torácica com posterior rebatimento dos arcos costais bilateralmente para a exposição do coração e sua subsequente retirada da cavidade torácica. Possibilitando desta forma as suas mensurações, todas sendo realizadas utilizando um paquímetro digital (Starrett799®). Para a altura ventricular foi tomada como ponto de referência a região entre o seio carotídeo e a veia cava caudal e como segundo ponto o ápice da face atrial do coração. Para a mensuração do diâmetro látero-lateral e dorso-ventral empregou-se a maior medida ventricular possível. E as espessuras dos ventrículos direito e esquerdo foram medidas no ponto médio de cada parede ventricular livre após seu corte longitudinal.

RESULTADOS

Os saguis-de-cara-branca apresentaram uma média de $15 \pm 1,29$ mm para a altura ventricular, sendo para os machos média de $15,13 \pm 0,84$ mm e para as fêmeas de $14,81 \pm 2,27$ mm. Para o diâmetro látero-lateral obteve-se uma média de $14,13 \pm 0,88$ mm, sendo para machos $14,47 \pm 0,89$ mm e para fêmeas $13,63 \pm 0,82$ mm. O diâmetro dorso-ventral resultou numa média de $16,28 \pm 1,02$ mm, sendo para machos $16,67 \pm 1,18$ mm e fêmeas $15,69 \pm 0,49$ mm. Para o ventrículo esquerdo a espessura média foi de $3,59 \pm 0,6$ mm, em que para os machos a média foi de $3,46 \pm 0,8$ mm e para fêmeas de $3,78 \pm 0,2$ mm, e para o ventrículo direito a média da espessura foi de $1,11 \pm 0,08$ mm, sendo para machos $1,14 \pm 0,1$ mm e fêmeas $1,08 \pm 0,04$ mm.

DISCUSSÃO

Os valores ora encontrados para a altura ventricular, para o diâmetro látero-lateral e para a espessura do ventrículo esquerdo são similares aos observados e descritos na literatura para duas outras espécies do gênero *Callithrix*, *Callithrix jacchus* (sagui-de-tufo-branco) e *Callithrix penicillata* (sagui-de-tufo-preto) (Santos, 2010; Silva et al., 2011). Em contrapartida quando se observa o valor do diâmetro dorso-ventral nos saguis-de-cara-branca nota-se que o mesmo é maior, e o valor da espessura do ventrículo direito é menor quando ambos são comparados com os valores relatados tanto para o sagui-de-tufo-branco como para o sagui-de-tufo-preto (Santos, 2010; Silva et al., 2011).

CONCLUSÃO

Podemos concluir que ocorre um padrão morfométrico cardíaco para a espécie *Callithrix geoffroyi* a partir dos resultados obtidos, servindo assim de informação no conhecimento da anatomia do sistema cardiovascular nesta espécie.

AGRADECIMENTOS: Ao criadouro AJBSoares e à Médica Veterinária Marta Brito Guimarães.

Nota: Comitê de Ética: Protocolo 1995/2010 FMVZ-USP.

REFERÊNCIAS

SILVA, L. C. S.; MORALES, C. J.; BIASI, C.; et al. Morfometría macroscópica del corazón de titís-de-tufo-negro (*Callithrix penicillata*). In: VII Congresso Colombiano, XXXII Chileno, XIII del Cono Sur de Morfologia, 2011, Santa Marta. **Anais...** Santa Marta: VII Congresso Colombiano XXXII Chileno XIII del Cono Sur de Morfologia, 2011.

SANTOS, R. S. **Estudo morfofuncional de corações de *Callithrix jacchus***. 2010. São Paulo, 66f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

177. PERFIL COPROPARASITOLÓGICO DE AVES SILVESTRES MANTIDAS EM CATIVEIRO EM CRIADOURO CONSERVACIONISTA, CAMPINA GRANDE DO SUL-PR

Rafaelle Cristine Dea¹, Juliana Skalski¹, Paulo José Ribeiro¹, Fernando Basso¹

¹ Graduandos-Universidade Federal do Paraná – rafa_cris_dea@hotmail.com

RESUMO

Por meio da realização de exames coproparasitológicos, buscou-se identificar a presença de parasitas gastrointestinais em aves silvestres mantidas em um criadouro conservacionista localizado em Campina Grande do Sul - PR. Foram examinadas 15 amostras de fezes de 11 espécies de aves mantidas no local, das quais 86,66% foram positivas. Os parasitas diagnosticados foram *Strongyloides* sp, *Heterakis* sp, *Strongyloidea*, *Ascaridia* sp e *Capillaria* sp. Os resultados chamam a atenção para a importância da prevenção das parasitoses em aves em cativeiro.

PALAVRAS-CHAVES: Aves silvestres, exames coproparasitológicos, criadouro conservacionista

COPROPARASITOLOGICAL PROFILE OF WILD BIRDS KEPT IN CONSERVATION BREEDING, CAMPINA GRANDE DO SUL – PR

ABSTRACT

Through coproparasitologic tests, we sought to identify the presence of gastrointestinal parasites in wild birds kept in a conservation breeding located in Campina Grande do Sul - PR. We examined 15 fecal samples of 11 species of birds kept on site, of which 86.66% were positive. The parasites were diagnosed *Strongyloides* sp, *Heterakis* sp, *Strongyloidea*, *Ascaridia* sp and *Capillaria* sp. The results draw attention to the importance of prevention of parasitic diseases in captive birds.

KEYWORDS: wild birds, coproparasitologic tests, conservation breeding

INTRODUÇÃO:

Dentre os inúmeros problemas sanitários enfrentados pelas aves silvestres mantidas em cativeiro, as doenças parasitárias se enquadram como uma das mais frequentes devido ao estresse, que diminui a capacidade imunológica do animal. Seus efeitos produzem infecções normalmente subclínicas, mas podem levar a óbito. De acordo com MARIETTO-GONÇALVES et al. (2009), aves silvestres e exóticas podem ser parasitadas por *Ascaridia* spp., *Heterakis* spp. e Tricurídeos, cistos de *Balantidium*

spp., *Blastocystis* spp. e *Entamoeba* spp. e oocistos de Coccídeos, sendo que estes últimos são as estruturas parasitárias mais encontradas. O presente estudo teve como objetivo traçar um perfil parasitológico das aves de um criadouro conservacionista visando diagnosticar a presença de endoparasitos.

MATERIAL E MÉTODOS

As amostras utilizadas neste estudo foram coletadas no dia 19 de agosto de 2009 nos recintos do Criadouro Conservacionista Onça-Pintada, localizado em Campina Grande do Sul - PR. Um pool de fezes foi coletado diretamente do solo de cada recinto. As amostras foram identificadas, mantidas sob refrigeração e examinadas pelas técnicas de WILLIS e MOLLAY e de HOFFMAN, PONS e JANER. Ao todo foram avaliadas 15 amostras, sendo três amostras de fezes de arara-canindé (*Ara ararauna*), duas amostras de arara-azul (*Anodorhynchus hyacinthinus*), duas de gralha-azul (*Cyanocorax calruleus*) e uma de cada uma das seguintes espécies: maracanã-de-colar (*Primolius auricollis*), jacu (*Penelope argyrotus*), tucano-de-bico-preto (*Ramphastus vitellinus*), araçari-castanho (*Pteroglossus castanotis*), tucano-de-bico-verde (*Ramphastus dicolorus*), tucano-toco (*Ramphastus toco*), guará (*Eudocimus ruber*), ganso-canadense (*Branta canadensis*).

RESULTADOS

Das 15 amostras examinadas, 13 (86,66%) foram positivas em algum dos testes. Foram encontrados ovos e adultos de *Strongyloides* sp nas amostras de maracanã-de-colar, jacu, tucano-de-bico-preto, arara-canindé, em uma das amostras de arara-azul e em duas de gralha-azul (46,66% do total de amostras); oocistos de *Eimeria* sp nas amostras de tucano-de-bico-verde, nas duas de gralha-azul e em uma de arara-canindé (26,66%); ovos de *Heterakis* sp nas amostras de araçari-castanho e tucano-toco (13,33%) e ovos de Strongyloidea na amostra de araçari-castanho e em uma das amostras de arara-canindé (13,33%). Ovos de *Ascaridia* sp e *Capillaria* sp foram encontrados em uma das amostras de arara azul (6,66%). Foi encontrado um ovo de piolho na amostra de jacu e ácaros do ambiente na de arara-azul. Na amostra de ganso-canandense encontraram-se vermes adultos que não puderam ser identificados. Uma amostra de arara-canindé e a de guará foram negativas.

DISCUSSÃO

A alta prevalência de parasitoses é esperada em animais silvestres em cativeiro, uma vez que estes estão expostos a uma maior pressão de infecção devido ao

ambiente confinado. Além disso, fatores como o estresse do cativeiro, a alimentação e a presença de doenças infecciosas tornam essas aves mais susceptíveis a parasitoses (FIGUEIROA et al, 2002). Ainda assim a alta percentagem de amostras positivas foi bastante superior ao encontrado em trabalhos semelhantes. Fatores que possivelmente contribuíram para esse resultado são o pequeno número de amostras examinadas e o fato dos animais abrigados nesse criadouro serem provenientes de apreensões do tráfico de animais, caça e criação ilegal, e, portanto, muitas vezes já chegarem bastante debilitados ao local e mais susceptíveis a doenças.

CONCLUSÃO

Estes dados preliminares do estudo reforçam a necessidade do monitoramento contínuo de amostras fecais das aves mantidas em criadouros com o intuito de prevenir doenças e melhorar a sanidade dos recintos. A limpeza diária das instalações, a diminuição da densidade populacional e cuidados com a higiene alimentar são de grande importância para garantir um melhor status sanitário em condições de cativeiro.

REFERÊNCIAS

- FIGUEIROA LYRA DE FREITAS, M. et al . Parásitos gastrointestinales de aves silvestres en cautiverio en el estado de Pernambuco, Brasil. **Parasitol. latinoam.**, Santiago, v. 57, n. 1-2, janeiro 2002 . Disponível em <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-77122002000100012&lng=es&nrm=iso>. acesso em 30 janeiro 2012.
- MARIETTO-GONÇALVES, G. A.; MARTINS, T. F.; LIMA, E. T.; LOPES, R. S.; ANDREATTI FILHO, R. L. Prevalência de endoparasitas em amostras fecais de avessilvestres e exóticas examinadas no Laboratório de Ornitopatologia e no laboratório de Enfermidades Parasitárias da FMVZ-UNESP/Botucatu, SP (Nota Científica). **Ciência Animal Brasileira**, v. 10, n. 1, p. 349-354, jan./mar. 2009.

178. PSEUDO-HERMAFRODITISMO EM JABUTI PIRANGA (*Chelonoidis carbonaria*): RELATO DE CASO

Leane Souza Queiroz Gondim¹, Rogério Fernando Jesus¹, Paulo César Costa Maia¹,
Jenice Gonçalves de Farias¹

1- Escola de medicina Veterinária e Zootecnia - Universidade Federal da Bahia. E-mail: leanequeiroz@yahoo.com.br

RESUMO

O pseudo-hermafroditismo é uma condição de intersexo que pode ocorrer em diversas espécies animais, inclusive em répteis. Este trabalho apresenta um relato de pseudo-hermafroditismo em jabuti piranga (*Chelonoidis carbonaria*) na Bahia. O animal apresentava ao exame clínico um pênis diminuto com uma glândula proeminente e durante a necropsia foi observado a presença de gônada interna feminina com diversos ovos em estágio de vitelogênese e um ovo totalmente formado. Pouco se conhece a respeito das causas desta anormalidade em répteis, porém pode estar relacionada a temperatura de incubação de ovos.

PALAVRAS-CHAVES: jabuti, *Chelonoidis carbonaria*, pseudo-hermafroditismo

PSEUDOHERMAPHRODITISM IN RED-FOOTED TORTOISE (*CHELONOIDIS CARBONARIA*): CASE REPORT

ABSTRACT

The pseudohermaphroditism is an intersex condition that can occur in several animal species, including reptiles. This paper presents a report of pseudohermaphroditism in red-footed tortoise (*Chelonoidis carbonaria*) in Bahia. The animal had a clinical examination with a small penis and prominent glans and during necropsy was observed the presence of internal female gonads with various eggs in stage of vitellogenesis and a egg fully formed. Little is known about the causes of this abnormality in reptiles, but may be related to incubation temperature of eggs.

KEYWORDS: tortoise, *Chelonoidis carbonaria*, pseudohermaphroditism

INTRODUÇÃO

O estudo de répteis vem crescendo em importância, tanto por questões conservacionistas quanto pela utilização destes como animais de companhia. O Jabuti

piranga (*Chelonoidis carbonaria*) é considerado um dos répteis mais criados em cativeiro, por seu um animal resistente e de fácil manejo (PINHEIRO; MATIAS, 2004). Diversos répteis têm a determinação do sexo influenciada pela temperatura de incubação dos ovos. Nos quelônios, o desenvolvimento de fêmeas ocorre quando os ovos são incubados em altas temperaturas e dos machos em baixa temperatura. Os jabutis possuem dimorfismo externo evidenciado nos machos adultos pela presença de uma concavidade no plastrão e uma cauda de maior comprimento. Já nas fêmeas, o plastrão não possui concavidade, a cauda é curta e o escudo cloacal tem formato de chanfradura (GOULART, 2004).

O Pseudo- hermafroditismo é uma condição de intersexo na qual estão enquadrados os animais que possuem apenas um tipo de gônada e característica sexual externa de outro sexo (MEMON, MICKELSEN, 2004). Em répteis, este tipo de intersexo já foi descrito em quelônios, porém pouco se conhece a respeito das causas desta anomalia (CONCEIÇÃO et al., 2009).

RELATO DE CASO

Um jabuti piranga (*Chelonoidis carbonaria*) de 4,5 Kg, com prolapso de pênis, foi encaminhado ao ambulatório. Ao exame físico o animal apresentava prolapso peniano com necrose e durante a palpação da cavidade celomática foi observado a presença de massas de formato arredondado. O animal foi submetido ao exame radiográfico em duas incidências (latero lateral e ventro dorsal) para uma melhor visualização das massas, e foi verificada a presença de vários ovos dentro da cavidade celomática. No dia seguinte o animal veio a óbito e foi realizada a necropsia. Após a abertura do celoma, foi visualizada a presença de gônadas femininas (ovários direito e esquerdo), ovidutos, além de diversos ovos em fase de vitelogênese e um ovo totalmente formado. Externamente este animal possuía um pênis diminuto, em relação ao tamanho do animal, o qual se encontrava necrosado.

DISCUSSÃO

Pouco se conhece a respeito da ocorrência de hermafroditismo em jabutis, porém uma das possíveis causas para a ocorrência deste tipo de anormalidade é a submissão dos ovos durante o segundo trimestre de desenvolvimento do ovo a diferentes variações de temperatura, a qual pode influenciar na determinação do sexo do indivíduo (VITT; CAUDWELL, 2009).

Este animal relatado é um pseudo-hermafrodita feminino, pois ele possui gônadas femininas (ovários direito e esquerdo) e órgão sexual externo masculino (pênis diminuto). Provavelmente, a presença da gônada feminina influencia no dimorfismo do intersexo, já que neste caso, o animal possuía características externas de fêmea, como plastrão liso, cauda curta e escudo cloacal em formato de chanfradura.

CONCLUSÃO

Este trabalho relatou a ocorrência de um pseudo-hermafroditismo feminino em jabuti piranga (*Chelonoidis carbonaria*). Esta anormalidade é rara, entretanto já foi descrita nesta espécie. Mais estudos são necessários para elucidar as causas de intersexo em répteis.

REFERÊNCIAS

- CONCEIÇÃO, A. M.; ALMEIDA, B. M.; BRASILEIRO, M. T. R. et al. Hermafroditismo em jabuti piranga (*Geochelone carbonaria*). **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.61, n.6, p.1478-1481, 2009.
- GOULART, C. E. S. **Herpetologia, herpetocultura e medicina de répteis**. Rio de Janeiro: LF Livros de Veterinária, 2004. 329p
- VITT, L. J.; CAUDWELL, J. P. **Herpetology: An introductory biology of Amphibians and reptiles**. Elsevier Inc., 2009. 697p.
- MEMON, M.A.; MICKELSEN, D.W. Distúrbios hereditários e congênitos dos sistemas reprodutivos do macho e da fêmea. In: Ettinger, S.J.; Feldman, E.C. (Eds). **Tratado de medicina interna de pequenos animais**. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 2156 p.
- PINHEIRO, F.P.; MATIAS, C.A.R. Fauna silvestre apreendida e resgatada no estado do Rio de Janeiro no ano de 2003. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE DE ZOOLOGICOS DO BRASIL, 28., 2004, Rio de Janeiro, RJ. **Anais...** Rio de Janeiro: Fundação RIOZOO, 2004.

179. RAMIFICAÇÕES DA ARTÉRIA CELÍACA DO SAGUI-DE-TUFO-PRETO (*Callithrix penicillata*)

Luana Célia Stunitz da Silva¹, Pedro Primo Bombonato¹

¹Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, USP-SP – luanastunitz@usp.br

RESUMO

Neste estudo avaliamos as ramificações da artéria celíaca na espécie *Callithrix penicillata* (sagui-de-tufo-preto) a fim de contribuir para o enriquecimento da anatomia comparativa. Para tanto utilizamos 10 animais adultos, 5 machos e 5 fêmeas, os quais vieram a óbito por causas naturais. Após a injeção de neoprene látex na aorta e seu posterior endurecimento procedeu-se com a dissecação minuciosa na área da artéria celíaca, resultando na observação da origem da artéria lienal, artéria hepática, artéria gástrica esquerda, artéria frênica caudal, de ramos para a glândula adrenal esquerda, de um ramo para a mesentérica caudal e para a vascularização do intestino delgado.

PALAVRAS-CHAVES: primatas, artéria celíaca, *Callithrix penicillata*

BRANCHES OF CELIAC ARTERY OF BLACK-TUFTED-EAR-MARMOSET (*CALLITHRIX PENICILLATA*)

ABSTRACT

In this study we tried to assess the ramifications of the celiac artery in *Callithrix penicillata* (black-tufted-ear-marmoset) to contribute to the enrichment of comparative anatomy. For this purpose we used 10 adult animals, 5 males and 5 females, which they had died of natural causes coming from a commercial breeding of wild animals. After the injection of neoprene latex in the aorta and its subsequent hardening proceeded with a thorough dissection of the area of celiac artery, resulting in the observation of the origin lienal artery, hepatic artery, left gastric artery, caudal phrenic artery, branches to the left adrenal gland, one branch to caudal mesenteric and to vasculature of the small intestine.

KEYWORDS: primates, celiac artery, *Callithrix penicillata*

INTRODUÇÃO

Diante da carência de informações de cunho anatômico da espécie *Callithrix penicillata* (sagui-de-tufo-preto), mesmo apesar de tais animais serem empregados na

biomedicina e mantidos como animais de estimação, procuramos então avaliar as ramificações da artéria celíaca a fim de contribuir para o estudo da anatomia comparativa e oferecer subsídios em procedimentos clínico-cirúrgicos nesta espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

Utilizamos nesta pesquisa 10 primatas adultos da espécie *Callithrix penicillata* (sagui-de-tufo-preto) que vieram a óbito por causas naturais, sendo 5 machos e 5 fêmeas, com idade média de 6,7 anos e média de 274 g, procedentes de um criadouro de animais selvagens. Inicialmente realizamos a dissecação na área da aorta torácica para sua canulação e injeção de neoprene látex em vermelho, em sentido abdominal, com posterior acondicionamento dos animais em cubas contendo solução de formol 10% por um mínimo de 72 horas, para em seguida efetuar a dissecação e visualização da artéria celíaca e de seus ramos.

RESULTADOS

Em todos os animais analisados a artéria celíaca foi o primeiro ramo abdominal da aorta, com origem isolada e estando imediatamente cranial à artéria mesentérica cranial. Em 40% dos casos houve a emissão da artéria frênica caudal a partir da artéria celíaca e em outros 40% ocorreu a origem de um ramo para a glândula adrenal esquerda. Já em 70% foi possível observar que ocorria a emissão de um pequeno ramo que confluía em sentido caudal para se anastomosar com a artéria mesentérica caudal. E em 40% dos animais notou-se a presença de ramos que se anastomosavam com a vascularização do intestino delgado. Em 70% a artéria celíaca originava a artéria lienal, artéria gástrica esquerda e artéria hepática, mas em contrapartida em 30% houve a emissão em dois animais de um tronco comum que originou as artérias hepática e gástrica esquerda, e em um caso a artéria hepática forneceu a artéria gástrica esquerda.

DISCUSSÃO

A origem de forma isolada da artéria celíaca nos animais analisados corrobora com o estudo conduzido por Silva et al (2011) e com 70% das descrições efetuadas no sagui-de-tufo-branco realizadas por Albuquerque et al (1972). A observação da origem da artéria frênica caudal a partir da artéria celíaca já se encontra descrita, por exemplo, nos suínos e gatos (Nickel et al., 1979) o que corrobora com os achados no estudo ora efetuado. Porém não foi encontrado relatos na literatura da observação de ramos para

a glândula adrenal esquerda ora vistos. Assim como visualizado neste estudo a artéria celíaca encontra-se trifurcada em artéria gástrica esquerda, artéria lienal e artéria hepática no mico-de-cheiro (Silva et al., 2011). Por outro lado em saguis-de-tufo-branco relata-se a existência de uma bifurcação com a origem das artérias lienal e hepática e de um tronco gastrolienal (Albuquerque et al., 1972).

CONCLUSÃO

O conhecimento acerca das variações da artéria celíaca no sagui-de-tufo-preto possui importância teórica e prática na biomedicina e em procedimentos clínico-cirúrgicos nesta espécie animal.

AGRADECIMENTOS: Ao criadouro AJBSoares e à Médica Veterinária Marta Brito Guimarães.

Nota: Comitê de Ética: Protocolo 1995/2010 FMVZ-USP.

REFERÊNCIAS

- ALBUQUERQUE, J. F. G.; FILHO, A. F.; BORELLI, V. Ramificações da artéria celíaca no sagui (*Callithrix jacchus*). In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ANATOMIA, IX., 1972, Florianópolis. **Anais...** Santa Catarina, 1972.
- NICKEL, R.; SCHUMMER, A.; SEIFERLE, E.; et al. **The viscera of the domestic mammals**. 2. ed. Berlin: Verlag Paul Parey, 1979. 401 p.
- SILVA, M. R. M.; LIMA, A. R.; JUNIOR, A. C. C. L. et al. Descrição morfológica dos ramos colaterais viscerais da aorta abdominal do macaco-de-cheiro. **Ciência Rural**, v. 41, n. 1, p. 94-100, 2011.

180. SÍNDROME VESTIBULAR EM FILHOTES DE ONÇA-PINTADA (*Panthera onca*) CAUSADA POR ENROFLOXACINA: RELATO DE CASO

Milton Mikio Morishin Filho¹, Manoel Lucas Javorowski², Diogo da Motta Ferreira³, André Rodrigo Lopes⁴, Saulo Daniel Pampu⁵.

^{1,3,4,5} Universidade Tuiuti do Paraná - milton.morishin@utp.br

² Zoológico Municipal de Curitiba

RESUMO

Relatam-se três casos de síndrome vestibular em filhotes de onça-pintada em período de amamentação. Durante esta fase, a progenitora apresentou lesões nas mamas que inicialmente sugeriu quadro de mastite ou escoriações provocadas pelos filhotes. Foi inicializado o tratamento com enrofloxacin, e neste período, os filhotes apresentaram sinais de inclinação da cabeça e déficit visual. Após a interrupção na administração de enrofloxacin houve regressão desses sinais até a recuperação total.

PALAVRAS-Chave: neurologia; felinos; sistema nervoso central

VESTIBULAR SYNDROME IN YOUNG JAGUARS (*PANTHERA ONCA*) CAUSED BY ENROFLOXACIN: CASE REPORT

ABSTRACT

We report three cases of vestibular syndrome in Young jaguars in the breast-feeding period. During this phase, the mother had breast lesions that initially suggested mastitis or abrasions caused by the young. It was started a treatment with enrofloxacin, and in this period, the little jaguars showed signs of head tilt and visual deficits. After stopping the administration of enrofloxacin, the regression of the signs was seen until complete recovery.

KEYWORDS: neurology; feline; central nervous system

INTRODUÇÃO

Geralmente, a doença vestibular central é associada a diferentes etiologias (1). Os sinais clínicos resultam de distúrbios que afetam o tronco cerebral e estruturas associadas e os gatos geralmente apresentam inclinação da cabeça, estrabismo ventrolateral, e ataxia assimétrica (2).

As etiologias mais comuns são: cinomose, peritonite infecciosa felina (PIF), *Toxoplasma*, bactérias, *Cryptococcus neoformans* (1) e deficiência de tiamina (3).

O diagnóstico é baseado pela tomografia computadorizada, ressonância magnética do cérebro, análise do líquido cefalorraquidiano (1), hemograma completo, bioquímico sérico (4), urinálise e radiografias de tórax (1).

RELATO DO CASO

Foram atendidos três filhotes de onça-pintada em fase de lactação com sinais de síndrome vestibular. Apresentavam inclinação de cabeça para o lado esquerdo; nistagmo horizontal; queda; rolamento; andar em círculo; vocalização; déficit visual; midríase; ausência de resposta à ameaça; propriocepção diminuída em membros torácicos e pélvicos; reflexo flexor torácico e pélvico presente; reflexo patelar normal e dor superficial em membros torácicos e pélvicos.

A mãe dos filhotes, uma onça adulta com 17 anos, peso estimado em 70 kg, vacinação desatualizada, desverminação atualizada, estava sendo tratada para uma suposta mastite clínica diagnosticada através de inspeção visual, devido à dificuldade de manejo. Foi administrada 300mg de enrofloxacin, via oral, a cada 24 horas durante 7 dias. Os filhotes apresentaram a sintomatologia neurológica aguda a partir do 5º dia de tratamento da mãe. Após o 7º dia, o tratamento foi suspenso pela suspeita de intoxicação dos filhotes por enrofloxacin através do leite materno.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram realizados exame neurológico e exames complementares: hemograma completo; exame bioquímico (ALT, FA, GGT, Uréia e Creatinina); e PCR para cinomose.

RESULTADOS

Nada digno de nota em exames complementares. Não foram realizados outros exames sorológicos, análise de líquido ou neuroimagem, devido à dificuldade de manejo. Quarenta e quatro horas após a interrupção do tratamento, os filhotes apresentaram melhora clínica.

DISCUSSÃO

Após a contenção química da onça mãe, foi constatado que as lesões nas mamas foram originadas pelos próprios filhotes, não havendo a necessidade de se utilizar a enrofloxacin. Não existem relatos de sinais neurológicos devido à intoxicação por enrofloxacin em onças.

A enrofloxacin é um antimicrobiano de amplo espectro e o uso de altas doses causa degeneração retiniana e cegueira (5). O leite é um alimento lipofílico e pode aumentar significativamente a biodisponibilidade (que já é de 80%) e a concentração sistêmica da droga (6).

CONCLUSÃO

Não estão estabelecidos níveis seguros para a administração da enrofloxacin em animais silvestres gestantes e lactentes, assim como em gatos.

REFERÊNCIAS

- 1 Platt, S.R. [2009]. **The emergency head tilt**. Disponível em: <<http://www.omnibooksonline.com>>. Acesso em: 22/05/2011.
- 2 LeCouteur, R.A.; Vernau, K.M. **Feline Vestibular Disorders**. Journal of Feline Medicine and Surgery, n.1, p.71-88, 1999.
- 3 Penderis, J. **Companion Animal Practice: Common cranial nerve disorders in dogs and cats 3**. CN VIII to XII In Practice, n.25, p.342-49, 2003.
- 4 Pellegrino, F. **Enfermedades Vestibulares en el Gato: Fisiopatología y Diagnóstico**. Asociacion Argentina de Medicina Felina. 2009. Disponível em: <<http://www.vetpraxis.net>>. Acesso em: 15/05/2011.
- 5 Cavalcante, L.F.H.; Gouvêa, A.S.; Marques, J.M.V. [2009]. **Degeneração retiniana em gatos associada ao uso de enrofloxacin**. Acta Veterinaria Brasílica, v.3, n.2, p. 62-68.
- 6 Martinez, M.; Mcdermott, P.; Walker, R. [2006]. **Pharmacology of the Fluorquinolones: a perspective for the use in domestic animals**. Vet. J., n.172, p. 10-28.

181. STRAIN E STRAIN RATE LONGITUDINAL EM LOBO-GUARÁ

(*Chrysocyon brachyurus*)

Adriana Cristina da Silva¹, Ruthnéa Aparecida Lázaro Muzzi¹, Matheus Matioli Mantovani¹, Rosane Marques de Resende¹, Leonardo Augusto Lopes Muzzi¹,
Guilherme Oberlender¹.

¹Universidade Federal de Lavras – adrianagudi@gmail.com

RESUMO

Em animais silvestres há poucas informações na literatura sobre alterações cardiovasculares, devido a dificuldade de realização de exames diagnósticos. Assim o presente trabalho descreve os dados obtidos para as variáveis de deformação miocárdica longitudinal *Strain* e *Strain Rate* mensuradas pelo *Speckle Tracking* bidimensional em um lobo-guará, uma vez que dados semelhantes para a espécie estão ausentes na literatura.

PALAVRAS-CHAVES: Canídeos, Ecocardiografia, *Speckle Tracking*

LONGITUDINAL STRAIN AND STRAIN RATE IN MANED WOLF

(*Chrysocyon brachyurus*)

ABSTRACT

In wild animals there is little information at the literature about cardiovascular changes due to difficulty of performing diagnostic exams. Then, this work describes the data obtained for longitudinal myocardial Strain and Strain Rate measured by two-dimensional Speckle Tracking in a maned wolf, since there is an absence of similar data at the literature for the species.

KEYWORDS: Canids, Echocardiography, Speckle Tracking.

INTRODUÇÃO

O lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) é o maior canídeo da América do Sul, habitando as regiões de cerrado no Brasil, Perú, Paraguai, Argentina e Bolívia. Devido às dificuldades associadas com a realização de exames em animais silvestres, há pouca informação disponível sobre alterações do sistema cardiovascular em lobos-guará (Estrada et al., 2009).

Strain (St) and *strain rate* (SR) são medidas utilizadas para avaliar a magnitude e a taxa da deformação miocárdica, respectivamente. Estas podem ser obtidas pela ferramenta ecocardiográfica *Speckle Tracking* bidimensional (2D STE) (Chetboul,

2010). Em cães, 2D STE tem sido utilizada para o estudo do de índices sistólicos como rotação, St e StR radial, longitudinal e circunferencial (Chetboul et al., 2007; 2008; Wess et al., 2011).

O presente trabalho objetiva descrever, a obtenção de valores para St e StR longitudinal, por meio da ferramenta ecocardiográfica 2D STE, em lobo-guará, uma vez que não há na literatura descrição dessas variáveis para a espécie.

RELATO DO CASO

Foi encaminhado ao setor de cardiologia do Hospital Veterinário da Instituição um lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*) jovem, de 29,0 kg, macho, para avaliação ecoDopplercardiográfica. O exame foi realizado após anestesia com cetamina (10mg/kg/IM) associado à midazolan (0,5 mg/kg/IM). Foi utilizado um aparelho de ecoDopplercardiografia (MyLab 40, Esaote®), com transdutores de varredura setorial eletrônica multifrequencial de 4-10 Hz e com acompanhamento eletrocardiográfico no monitor, cujos eletrodos foram colocados na parte distal dos membros torácicos e pélvicos. Para a obtenção do St e StR longitudinal foi utilizado o software xstrain Esaote®10.0. Foi realizada a ecocardiografia convencional (Estrada et al., 2009) e obtidas imagens bidimensionais no corte apical quatro câmaras esquerdo para avaliação off-line pelo 2D STE (Chetboul et al., 2007; Wess et al., 2011). Os valores foram dispostos como média e desvio padrão e utilizado o pacote estatístico SPSS for Windows 17.0 para a realização das análises.

DISCUSSÃO

As mensurações obtidas pela ecocardiografia convencional (Modo-M, bidimensional, Doppler a cores, contínuo e pulsado) apresentaram valores similares aos previamente relatados na literatura (Estrada et al., 2009). Quanto aos valores de St e StR longitudinal, estes foram semelhantes aos valores obtidos em cães no trabalho de Wess e colaboradores (2011) e estão dispostos na tabela 1.

Tabela 1: Valores de *Strain* e *Strain Rate* longitudinal (média ± desvio padrão) miocárdio em lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*).

Segmento	<i>Strain</i> (%)	<i>Strain Rate</i> (1/s)
Endocárdio	-13,14 ± 9,36	-2,05 ± 1,30
Epicárdio	-13,89 ± 6,22	-1,14 ± 0,39
Média Geral	-13,52 ± 7,88	-1,60 ± 1,05

CONCLUSÃO

O presente trabalho auxilia a estabelecer valores de referencia para o St e StR longitudinal em lobos-guará. Desta forma, estes índices estabelecidos podem ser utilizados no diagnóstico de alterações cardíacas, uma vez que não há informação disponível na literatura sobre avaliação da função miocárdica por meio da ferramenta ecocardiográfica 2D STE.

REFERÊNCIAS

- ESTRADA, A. H.; GERLACH, T. J.; SCHMIDT, M. K. et al. Cardiac Evaluation of Clinically Healthy Captive Maned Wolves (*Chrysocyon brachyurus*). **Journal of Zoo and Wildlife Medicine**. v.40, n.3, p. 478–486, 2009.
- CHETBOUL, V. Advanced techniques in echocardiography in small animals. **Veterinary Clinics Small Animal**. v.40, n.4, p. 529-543, 2010.
- CHETBOUL, V.; SERRES, F.; GOUNI, V. et al. Radial strain and strain rate by two-dimensional speckle tracking echocardiography and the tissue velocity based technique in the dog. **Journal of Veterinary Cardiology**. v.9, n.2, p. 69-81, 2007.
- WESS, G.; KELLER, L. J. M.; KLAUSNITZER, M. et al. Comparison of longitudinal myocardial tissue velocity, strain, and strain rate measured by two-dimensional speckle tracking and by color tissue Doppler imaging in healthy dogs. **Journal of Veterinary Cardiology**. v.13, n.1, p. 31-43, 2011.

182. SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DA CAPARAÇA E PARCIAL DO PLASTRÃO EM *Chelonoidis carbonaria* (LINNAEUS, 1766) POR RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL - RELATO DE CASO

GUILHERME DIAS ARAUJO¹, KARINA BARBOSA DE SOUZA², CLÁUDIO YUDI KANAYAMA³

8. Graduando em Medicina Veterinária, Universidade de Uberaba, Uberaba, Minas Gerais, Brasil.
9. Médico Veterinário, residente do Hospital Veterinário de Uberaba (UNIUBE/FAZU/ABCZ).
10. Docente do Curso de Medicina Veterinária, Instituto de Estudos Avançados em Veterinária "José Caetano Borges", Universidade de Uberaba (UNIUBE/FUNDRAGRI-FAZU/ABCZ).

RESUMO: Um *Chelonoidis carbonaria* foi atendido com sinais clínicos de dermatites pós-queimadura por toda a área de carapaça, plastrão e membros, além áreas de erosão no casco com soluções de continuidade com as placas ósseas subjacentes. O animal foi submetido a retirada de todas as placas córneas, queimadas e erodadas, com subsequente antissepsia do arcabouço ósseo, sendo substituídos por aplicação de fita adesiva rayon/viscose e posterior resina acrílica autopolimerizável. Instituiu-se antibioticoterapia e fluidoterapia intra celomática. A substituição do casco por resina foi eficiente e promoveu recuperação do animal.

Palavras-chave: jabuti, casco, resina autopolimerizável

COMPLETE REPLACEMENT OF THE CARAPACE AND PARTIAL REPLACEMENT IN PLASTRON *Chelonoidis carbonaria* (LINNAEUS, 1766) BY ACRYLIC RESIN CASE REPORT

ABSTRACT

A *Chelonoidis carbonaria* presented with clinical signs of dermatitis after burn throughout the area of the carapace, plastron and members, and eroded areas on the hull with solutions of continuity with the underlying bony plates. The animal was submitted to the removal of all horny, burning and/or eroded, with subsequent antiseptis of the bone framework, replaced by applying tape rayon/viscose and acrylic

resin. Antibiotic therapy was instituted and intra coelomic fluid. The replacement of the shell resin was efficient and promoted full recovery of the animal.

KEYWORDS: tortoise, shell, acrylic resine

INTRODUÇÃO

Jabutis piranga (*Chelonoidis carbonaria*) são répteis de hábitos terrestres comumente vistos na clínica de animais selvagens (Jepson, 2010). Por apresentarem locomoção lenta e dificultada, jabutis não apresentam respostas adequadas a determinadas agressões, como o contato direto com objetos incendiados, o que pode provoca queimaduras graves, inclusive no casco, comprometendo a sobrevivência do animal (Cubas e Baptistotte, 2006; Santos et al., 2009). A implantação da terapia adequada para o restabelecimento do animal nesses casos é um desafio a ser seguido pelo médico veterinário. O presente trabalho relata a correção de dermatite por queimadura em jabuti piranga por resina acrílica autopolimerizável.

RELATO DO CASO

Foi atendido em um hospital veterinário de Uberaba, um jabuti, fêmea, adulta, com histórico de queimadura por poliestireno fundido. Ao exame clínico, o animal apresentava dermatite pós-queimadura por toda a extensão da carapaça e plastrão, sendo que placas córneas vertebrais, costais, marginais, gulares e umerais apresentavam solução de continuidade com as placas ósseas adjacentes. Como medidas terapêuticas, realizaram-se, retirada dos escudos já, parcialmente, desprendidos e erodados, posteriormente, antisepsia do casco com gluconato de clorexidina (2%); aplicação de camada de fita adesiva de rayon/viscose e, sobre essa, resina acrílica autopolimerizável por toda a carapaça e plastrão, com exceção da região da placa córnea abdominal esquerda. Como terapia antimicrobiana associou-se ceftiofur na dose de $2,2 \text{ mg.kg}^{-1}$ intramuscular (IM), durante 30 dias com intervalo de 24 horas associado a gentamicina na dose de 5 mg.kg^{-1} , IM, com intervalo de 72 horas, num total de três aplicações, bem como a aplicação de solução salina estéril (25 ml.kg^{-1}), intracelomática, durante cinco dias, com intervalo de 24 horas. O animal apresentou boa adaptação ao novo casco, não apresentando nenhum sinal clínico de osteíte e permanecendo com ingestão de água e alimentos ideal, além de não haver déficit de locomoção.

DISCUSSÃO:

Martinez-Jimenez e Hernandez-Divers (2007) relatam que as causas mais comuns afecções de tegumento de quelônios são mordidas, feridas traumáticas e queimaduras por calor. Em casos de exposição de placas ósseas do casco do animal, a utilização de resinas, epóxis ou acrílicas, são indicadas como alternativa de reparo, ainda que materiais de fibra de vidro também possam ser utilizados (Hnilica, 2011). A antissepsia realizada no arcabouço ósseo exposto é recomendada por MacArthur e Hernandez-Divers (2004) antes que se aplique qualquer material semi-permanente, assim como Mader (2006) indica a camada de fita adesiva rayon/viscose, para que não haja contato direto da resina com a ferida, evitando comprometimento da cicatrização. A utilização de ceftiofur e gentamicina como terapêutica antimicrobiana resultam em boa associação já que o primeiro é de amplo espectro e o segundo de ação predominante contra gram-negativos, alvo principal na situação do referente caso (Cubas e Joppert, 2008).

CONCLUSÃO

Confere-se satisfatório a utilização de resina acrílica autopolimerizável como material de substituição de placas córneas lesadas em *Chelonoidis carbonaria*.

REFERÊNCIAS

- CUBAS, P. H.; BAPTISTOTTE, C. Chelonia (Tartaruga, Cágado e Jabuti). In: CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. **Tratado de Animais Selvagens**. São Paulo: Roca, 2006, p. 86-119.
- CUBAS, Z. S.; JOPPERT, A. M. Terapêutica de Animais Selvagens. In: ANDRADE, S. F. **Manual de Terapêutica Veterinária**. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. p. 661-718.
- HNILICA, K. **Small Animal Dermatology: a color atlas and therapeutic guide**. 3 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2011
- JEPSON, L. Jabutis e Cágados. In: JEPSON, L. **Clínica de Animais Exóticos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p 358-411.
- MARTINEZ-JIMENEZ, D.; HERNANDEZ-DIVERS, S. J. Emergency Care of Reptiles. **Veterinary Clinics Exotic Animal Practice**, v.10, [s.n.], p. 557-585, 2007.
- MADER, D. R. **Reptile Medicine and Surgery**. 2 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2006, 1242 p.
- MCARTHUR, S.; HERNANDEZ-DIVERS, S. Surgery. In: MCARTHUR, S., WILKINSON, R.; MEYER, J. **Medicine and Surgery of Tortoises and Turtles**. Oxford: Blackwell Publishing, 2004, 403-460.
- SANTOS, A. L. Q., SILVA, L. S.; MOURA, L. R. Reparação de fraturas de casco em quelônios. **Bioscience Journal**, v.25, n.5, p. 108-111, 2009.

183. SURTO DE MEGABACTERIOSE EM PERIQUITOS (*Melopsittacus undulatus*) EM ITAPORANGA D'AJUDA – SERGIPE – BRASIL

Alexsandro Machado Conceição¹, Silvia Letícia Bomfim Barros¹, Gabriel Isaías Lee Tuñón², Matheus Ismerim Silva Santos³, Allisson Fabiano Silva Ferro⁴,
Diego Santos Tavares⁴

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária, Faculdade Pio Décimo/SE

² Discente do curso de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Sergipe

³ Técnico de Laboratorial, Universidade Federal de Sergipe

⁴ Docente do curso de Medicina Veterinária, Faculdade Pio Décimo/SE

RESUMO

Relata-se a ocorrência de megabacteriose ocorrido num criadouro comercial de periquitos (*Melopsittacus undulatus*) no município de Itaporanga D'Ajuda, Sergipe, Brasil.

PALAVRAS-CHAVES: *Macrorhabdus ornithogaster*; criadouro comercial; surto

MEGABACTERIOSIS IN BUDGERIGARS (*MELOPSITTACUS UNDULATUS*) IN THE MUNICIPALITY OF ITAPORANGA D'AJUDA – SERGIPE – BRAZIL

ABSTRACT

Its report the first documented case of megabacteriosis occurred in a commercial of budgerigars (*Melopsittacus undulatus*) in the Municipality of Itaporanga D'Ajuda – Sergipe – Brazil.

KEYWORDS: *Macrorhabdus ornithogaster*; commercial breeding; Outbreak

INTRODUÇÃO

A megabacteriose é uma doença gastrointestinal que afeta várias espécies de aves e que tem como agente etiológico o *Macrorhabdus ornithogaster*, caracterizada por perda de peso, regurgitação intermitente, penas eriçadas, presença de grãos mal digeridos nas fezes e morte (SCANLAN e GRAHAM, 1990). A principal fonte de infecção são aves portadoras assintomáticas (CUBAS e GODOY, 2005; PHALEN, 2006).

O presente trabalho tem por objetivo relatar a ocorrência de megabacteriose em uma criação comercial de periquitos (*Melopsittacus undulatus*) no município de Itaporanga D'Ajuda, Sergipe.

RELATO DE CASO

Uma investigação clínica passou a ser realizada em um criadouro de periquitos (*Melopsittacus undulatus*), localizado no município de Itaporanga D'Ajuda/ Sergipe, devido à apresentação de um alto índice de mortalidade. Na anamnese foi relatado que, um mês antes da apresentação de óbitos, 50 novas aves foram adquiridas e introduzidas no criadouro sem realização de quarentena. Os periquitos enfermos apresentavam diarreia crônica, regurgitação, penas eriçadas e emagrecimento.

Na investigação diagnóstica foram realizados testes de imunofluorescência direta para *Chlamydophila psittaci* e para *Salmonella* spp, exames parasitológicos de fezes (cinco amostras colhidas aleatoriamente) e necropsia de quatro periquitos que apresentavam grau avançado de debilidade.

Os exames laboratoriais efetuados foram negativos e as únicas alterações verificadas durante a necropsia foram dilatação proventricular, palidez da superfície externa do ventrículo e dos intestinos e a presença de alimentos não digeridos no trato gastrointestinal. Impressões em lâmina do proventrículo, coradas com Gram evidenciaram a presença de estruturas bacilares com braço terminal em forma de "y" condizentes com *Macrorhabdus ornithogaster*.

Diante do achado, instituiu-se o tratamento com nistatina (100.000 UI/L na água de beber, *ad libitum*, durante 30 dias), vinagre de maçã diluído em água de bebida (solução pH 6.0, SID, durante 15 dias), prebiótico (mananoligossacarídeo) e probióticos (*Saccharomyces cerevisiae*).

Os animais responderam de forma satisfatória ao tratamento, havendo resolução completa dos casos, e até um ano após o tratamento não foi observada recidiva.

DISCUSSÃO

As formas bacilares observadas no presente estudo estão de acordo com os achados de Tomaszewski (2003), que relata o aparecimento de formas bacilares apresentando um braço terminal em forma de "y" em análise de impressão em lâmina do proventrículo corado pelo método de Gram. Essa constatação é condizente com a descrição da megabactéria feita por Scanlan e Graham (1990) sendo um dos parâmetros usados na citologia para indicação da presença de *M. ornithogaster*.

Segundo Phalen (2006), a anfotericina B (100 mg/kg, via oral, *bid*, durante 30 dias) constitui a droga mais indicada no tratamento da megabacteriose, uma vez que outros antifúngicos parecem não obter resultados satisfatórios. No entanto, Marlier et al. (2006), obtiveram resultados significativos com a nistatina na dose de 300.000 UI/kg/dia, o que demonstra o acerto na escolha da terapia utilizada, que associado ao emprego do vinagre de maçã, utilizado com finalidade de promover acidificação do trato digestório, mostrou-se ser eficiente, uma vez que todos os animais responderam ao tratamento de forma satisfatória.

CONCLUSÃO

Para evitar a exposição das aves ao *M. ornithogaster*, torna-se de fundamental importância a instituição da prática da quarentena e a realização de exames de fezes em todos os animais recém adquiridos.

REFERÊNCIAS

- CUBAS, Z.S.; GODOY S.N. Medicina y patología de aves de compañía. In: Aguilar, R.; Hernandez-Divers, S.M.; Hernandez-Divers, S.J. **Atlas de Medicina, Terapéutica y Patología de Animales Exóticos**, Buenos Aires: Inter-Médica, p.213 – 262, 2005.
- MARLIER, D.; LEROY, C.; STURBOIS, M. et al. Increasing incidence of megabacteriosis in canaries (*Serinus canaries domesticus*). **Veterinary Journal**, v.172, p.549-552, 2006.
- PHALEN, D.N. Influence of *Macrorhabdus* in clinical disorders. In: Harrison, G.J., Lightfoot, T. (eds). **Clinical Avian Medicine**, Palm Beach: Spix Publishing Inc., v.2, p.705-710, 2006.
- SCANLAN, C.M.; GRAHAM, D.L. Characterization of a Gram-positive bacterium from the proventriculus of budgerigars (*Melopsittacus undulatus*). **Avian Diseases**, v.34, p.779-786, 1990.
- TOMASZEWSKI, E.K.; LOGAN, K.E.; SNOWDEN, K.F. et al. Phylogenetic analysis identifies the "megabacterium" of birds as a novel anamorphic Ascomycetous yeast, *Macrorhabdus ornithogaster* gen. nov, sp. nov. **International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology**, v.53, p.1201-1205, 2003.

184. VASCULARIZAÇÃO ARTERIAL DO SISTEMA GENITAL FEMININO DO GATO MARACAJÁ (*Leopardus Wiedii*)
VASCULARIZATION SYSTEM OF FEMALE GENITAL MARGAY (*Leopardus wiedii*)

Ana Caroline Carvalho Santos¹, Ailton Mendes Conde Junior², Sergio Paulo Lima Guerra³, Luana de Oliveira Lopes⁴, Dayseanny de Oliveira Bezerra¹, Aíla Alves Rocha Vieira¹

¹ Estudantes de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí (UFPI) – ailarv@gmail.com

² Professor Adjunto do Departamento de Histologia e Embriologia - UFPI.

³ Médico Veterinário técnico do Laboratório de Técnicas Histológicas da UFPI.

⁴ Bióloga vinculada ao Projeto de Pesquisa de Animais Silvestres do Centro de Triagem do Ibama do Piauí.

RESUMO

A espécie *Leopardus wiedii*, conhecida popularmente como gato maracajá. Os informes da literatura sobre o assunto nos felinos são escassos e incompletos, Assim, este trabalho objetiva estudar o comportamento das artérias responsáveis pela irrigação sangüínea dos órgãos do sistema reprodutor feminino do gato maracajá (*L. wiedii*). Os animais doados foram cadastrados, identificados pesados, utilizando-se balança de precisão. Foram fixados, submetidos a técnicas de dissecação clássica e fotografados. A vascularização dos órgãos do sistema genital estudados do gato Maracajá (*L. wiedii*) é semelhante ao descrito na literatura para outras espécies.

PALAVRAS-CHAVES: Felino, silvestre, anatomia reprodutiva

ABSTRACT

The species *Leopardus wiedii*, popularly known as margay. The reports from the literature on the subject in cats are scarce and incomplete. This work aims at studying the behavior of the arteries responsible for blood supply of the organs of the female reproductive system of the margay (*L. wiedii*). The animals were donated registered, identified heavy, using a precision scale. Were fixed, subjected to classical dissection techniques and photographed. The vascularization of the genital organs of the system studied the margay (*L. wiedii*) is similar to that described in the literature for other species.

KEYWORDS: Cat, wild, reproductive anatomy

INTRODUÇÃO

A espécie *Leopardus wiedii*, conhecida popularmente como gato maracajá, é um animal selvagem da fauna brasileira, considerado de pequeno porte (Konecny, 1989). Os informes da literatura sobre o assunto nos felinos são escassos e incompletos, apesar destes espécimes serem tradicionalmente utilizados como modelos experimentais (Silva, 2004). Baseado nisso, este trabalho objetiva estudar o comportamento das artérias responsáveis pela irrigação sangüínea dos órgãos do sistema reprodutor feminino do gato maracajá (*L. wiedii*), consistindo em importantes subsídios à clínica e cirurgia da reprodução.

MATERIAIS E MÉTODOS

Após a assinatura do termo de doação e obtenção dos animais no IBAMA-PI, os animais foram cadastrados e identificados quanto à espécie, data de recebimento e possível causa “*mortis*”. Posteriormente, foram pesados, utilizando-se balança de precisão. Foram fixados com formaldeído tamponado a 10% e, após 24h de fixação e submetidos a técnicas de dissecação clássica descrita por Mandarin de Lacerda (1994). A irrigação arterial do aparelho reprodutor feminino foi cuidadosamente dissecada, identificada e fotografada. Informações pertinentes à vascularização de órgãos genitais femininos em gato maracajá (*Leopardus wiedii*) não foram encontradas. Desta forma, discutiremos nossos resultados com as informações referentes a este assunto em gatas domésticas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na espécie estudada observou-se que os vasos arteriais destinados ao ovário provinham da porção abdominal da aorta, localizados entre a artéria renal e a artéria mesentérica caudal, seguindo um trajeto tortuoso em direção ao ovário. Resultados semelhantes foram encontrados por Getty(1986) e Miglino et al. (2001). Porém, Trautmann; Fiebiger (1942) descrevem que as artérias destinadas aos ovários são procedentes das artérias espermática interna e uterina. O útero é suprido pela artéria uterina que se origina da divisão de um ramo cranial da artéria urogenital, que por sua vez, surge da artéria pudenda interna (Figura 01). Resultado também encontrado por Getty(1986) e Stone et al.(1998). Porém, de acordo com Miglino (2011), Dyce(1990) e Silva et al (2004) a artéria uterina origina-se das artérias vaginais como um único ramo, que por sua vez divide-se em uma série de pequenos ramos até a parede do referido órgão. A artéria vaginal supre a vagina e origina-se de um ramo caudal da artéria urogenital, que descreve um arco à medida que segue em direção à parte cranial da

vagina (Figura 01). Em relação a sua distribuição, ela corre ventrocaudalmente na parede lateral da vagina e ramifica-se em seu segmento caudal. Semelhante ao encontrado por Getty (1996).

Figura 02: Vista ventral da artéria vaginal da gata maracajá (*Leopardus wiedii*), mostrando sua origem e distribuição.

Observamos: **A.** Artéria uterina; **B.** Artéria vesical caudal; **a1, a2, a3 e a4.** Ramos da artéria uterina; **C.** A. vaginal; **c1 e c2.** Ramos da artéria vaginal.

CONCLUSÃO

A vascularização dos órgãos do sistema genital estudados do gato Maracajá (*Leopardus wiedii*) é semelhante ao descrito na literatura para outras espécies.

REFERÊNCIAS

- DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. **Tratado de anatomia**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1990. p. 365.
- GETTY, R.; SISSON, S.; GROSSMAN, J. D. **Anatomia dos animais domésticos**. 5.ed. Rio de Janeiro: Interamericana. v. 2, p. 1536-1538, 1986
- KONECNY, M.J. **Movement Patterns and food habits of four sympatric carnivore species in Belize, Central America**. *Advances in Neotropical Mammology*. Brill, Leiden, pp 243-264, 1989.
- MIGLINO, M.A; SILVA, R.S.; MACHADO, R.F. **Artérias destinadas ao útero e tuba uterina em gatas (*Felis catus*)**. *Braz. J. vet. Res. anim. Sci., São Paulo*, v. 38, n. 2, p. 55-61, 2001.
- SILVA, R.M.; MIGLINO, M.A.; SANTOS, T.C.; GONÇALVES, G.F.; CUSTÓDIO, A.T; **Vascularização arterial dos cornos uterinos em gatas gestantes sem raça definida (*Felis catus* Linnaeus, 1758)**. *Brazilian Journal of Veterinary Research*
- TRAUTMANN, A.; FIEBIGER, T. J. **Histologia y anatomia microscópica comparada de los animales domésticos**. 7.ed. Barcelona: Labor, 1942.p. 325-333.

185. ANFOTERICINA B SUBCUTÂNEA NO TRATAMENTO DA ESPOROTRICOSE FELINA

Aline Moreira Rodrigues¹, Beatriz Wanderosck Carvalho¹, Raphael Francisco Dutra
Barbosa da Rocha¹, Carolina Oliveira Araújo Pereira¹, Paula Gonçalves Viana¹,
Isabella Dib Ferreira Gremião¹

1Laboratório de Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses em Animais Domésticos -
Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas / Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) –
isabella.dib@ipec.fiocruz.br

RESUMO

O presente estudo descreve a resposta terapêutica ao uso da anfotericina B subcutânea (ANF B SC) em 17 gatos com esporotricose refratária ao itraconazol oral. Os animais foram submetidos a administrações de ANF B SC, associadas ao itraconazol, uma vez por semana até a cura clínica. O protocolo utilizado foi eficiente em 6 (35,3%) casos, porém recidiva, estagnação e progressão do quadro clínico também ocorreram, além de formação de abscesso estéril local. O esquema terapêutico proposto pode se tornar uma opção no tratamento da esporotricose felina.

PALAVRAS-CHAVES: Felinos, Esporotricose, Tratamento, Itraconazol, Anfotericina B

SUBCUTANEOUS AMPHOTERICIN B FOR THE THE TREATMENT OF FELINE SPOROTRICHOSIS

ABSTRACT

The present study describes the therapeutic response of the subcutaneous amphotericin B (SC ANF B) in 17 cats with sporotrichosis refractory to oral itraconazole. The animals were administered SB ANF B, associated with itraconazole once a week, until clinical cure. The protocol used was effective in 6 (35.3%) cases, but relapse, stagnation and clinical progression also occurred, as well as the formation of local sterile abscess. The proposed treatment regimen may be an option in the treatment of feline sporotrichosis.

KEYWORDS: Felines, Sporotrichosis, Treatment, Itraconazole, Amphotericin B

INTRODUÇÃO

O itraconazol (IT) é o fármaco de escolha em gatos e humanos com esporotricose. Contudo, em alguns casos não se observa a resposta clínica esperada.

A anfotericina B (Anf B) é recomendada no tratamento de micoses sistêmicas severas ou progressivas, e nas formas severas de esporotricose. Relatos da utilização de Anf B na esporotricose felina (EF) são escassos. Três casos de terapia pela via endovenosa (EV) em gatos foram descritos, porém sem sucesso (Gremião et al., 2011). Contudo, não foram encontrados, na literatura, relatos de seu uso pela via subcutânea (SC) na EF. Este estudo teve como objetivo avaliar a resposta terapêutica ao uso da ANF B SC em casos de EF refratária ao IT oral.

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi aprovado pela CEUA/Fiocruz. Foi utilizada uma amostra de conveniência, sendo realizado um estudo interventivo em gatos com diagnóstico definitivo de esporotricose, apresentando lesões cutâneas e/ou mucosas persistentes após dois meses ao tratamento oral com IT 100 mg/dia. ANF B (Anforicin®; Cristália) foi diluída em 10 ml de água destilada (5 mg/mL). O gato era submetido à sedação e após a antissepsia, a pele da região interescapular era tracionada para inserção de um cateter periférico. A solução glicofisiológica 1:1 era administrado no espaço subcutâneo. O volume de solução era definido através de características individuais dos animais como grau de flacidez da hipoderme, estado do tecido celular subcutâneo, quantidade de tecido adiposo no espaço subcutâneo e resistência do tecido a distensão. O volume calculado de anfotericina B (0,1 mL/Kg) era administrado lentamente através do injetor de câmara flexível do equipo. Amostras de sangue foram coletadas para análises hematológicas e bioquímicas antes e durante a terapia com ANF B. O farmaco foi aplicado semanalmente até a cicatrização das lesões. O IT oral foi mantido durante o estudo e por um mês após a cura clínica.

RESULTADOS

Foram feitas de 1 a 20 aplicações de ANF B (mediana=4), com o volume de ANF B variando de 0,3 a 0,6 mL (mediana= 0,5) e o volume de solução glicofisiológica 1:1 variando de 100 a 300 mL (mediana=200). O aumento da concentração plasmática de uréia foi observado em 9 animais (52,9%, n=17). As demais análises bioquímicas encontravam-se dentro dos parâmetros de normalidade. Dos 17 gatos tratados com ANF B SC, 6 (35,3%) obtiveram cura clínica, em 4 (23,5%) houve a formação de abscesso estéril, 3 (17,6%) abandonaram o tratamento, em 2 (11,8%) houve estagnação do quadro clínico, em 1 (5,9%) houve recidiva e em 1 (5,9%) houve progressão do quadro clínico. Não ocorreram óbitos durante o período do estudo.

DISCUSSÃO

Poucos são os relatos sobre a utilização da ANF B na esporotricose felina. Foram descritos três casos de terapia com ANF B EV em gatos com esporotricose. Contudo, em nenhum desses casos obteve-se resposta terapêutica satisfatória (Gremião et al., 2011). Além da nefrotoxicidade, sua utilização por via EV é limitada pela dificuldade de administração e ocorrência de alterações vasculares e circulatórias (Malik et al., 1996). Portanto, optamos pela administração da ANF B SC, a qual não havia sido descrita na terapêutica da EF. O IT foi mantido, pois estudos demonstraram que a combinação de ANF B com antifúngicos orais foi mais eficaz que quando utilizada isoladamente (Gremião et al., 2011). Observou-se aumento da concentração plasmática de uréia em 9 gatos, conforme previamente descrito em casos de criptococose tratados com ANF B SC (Malik et al., 1996). No atual estudo, observamos a cura clínica em 6 dos 17 gatos submetidos à infusão de ANF B SC associada ao IT. As administrações semanais foram bem toleradas pelos pacientes, a técnica foi prática e o material necessário de fácil aquisição. Irritação local ou abscesso estéril podem ocorrer após a administração de ANF B SC (Malik et al., 1996). No presente estudo, 4 gatos apresentaram abscesso estéril no local da infusão, sendo realizada a drenagem do mesmo e suspensa a administração SC.

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a efetividade da ANF B SC associada ao IT em casos de gatos com esporotricose que apresentem resposta clínica insatisfatória ao tratamento IT oral. Embora o número de casos estudados não permita resultados mais conclusivos, o tratamento pode ser considerado uma alternativa na terapêutica dessa doença.

REFERÊNCIAS

GREMIÃO, I.D.F.; SCHUBACH, T.M.P; PEREIRA, S.A. et al. Treatment of refractory feline sporotrichosis with a combination of intralesional amphotericin B and oral itraconazole. **Australian Veterinary Journal**, v. 9, p. 346-351, 2011.

MAILK, R.; CRAIG, A.J.; WIGNEY, D.I. et al. Combination chemotherapy of canine and feline cryptococcosis using subcutaneously administered amphotericin B. **Australian Veterinary Journal**, v. 73, p. 124-128, 1996.

186. AVALIAÇÃO DA RESPOSTA TERAPÊUTICA AO IODETO DE POTÁSSIO NA ESPOROTRICOSE FELINA

Érica Guerino Reis¹, Jéssica Sepúlveda Boechat¹, Alessandra Vieira Pereira¹, Elaine Waite de Souza¹, Sandro Antonio Pereira¹, Tânia Maria Pacheco Schubach¹

¹Laboratório de Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses em Animais Domésticos - Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas / Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) – erica.reis@ipec.fiocruz.br

RESUMO

Para a avaliação da resposta terapêutica ao iodeto de potássio na esporotricose felina, realizou-se um estudo interventivo com 48 gatos com esporotricose. Os gatos foram submetidos à terapia com iodeto de potássio em cápsulas (via oral) na dose entre 2,5 e 20 mg/kg, uma vez ao dia. A cura clínica foi obtida em 47.9% dos gatos. Em comparação com estudos prévios realizados com itraconazol e solução saturada de iodeto de potássio (SSKI), o tratamento com iodeto de potássio em cápsulas se apresentou como uma alternativa no tratamento da esporotricose felina.

PALAVRAS-CHAVES: Iodeto de Potássio, Esporotricose, Gatos, *Sporothrix schenckii*, Cápsulas

EVALUATION OF THERAPEUTIC RESPONSE TO POTASSIUM IODIDE IN FELINE SPOROTRICHOSIS

ABSTRACT

In order to evaluate the treatment of feline sporotrichosis with potassium iodide, an intervention study was conducted in 48 cats with sporotrichosis. All cats received potassium iodide capsules, 2.5 – 20 mg/kg, once a day. The cure rate was 47.9%. Compared to previous studies with itraconazole and iodide (SSKI), potassium iodide capsules is an alternative for feline sporotrichosis treatment.

KEYWORDS: Potassium iodide, Sporotrichosis, Cats, *Sporothrix schenckii*, Capsules

INTRODUÇÃO

No Rio de Janeiro, a epidemia de esporotricose com transmissão zoonótica está em curso há mais de 12 anos. Durante mais de 100 anos os iodetos foram considerados a terapia de eleição na esporotricose, sendo substituídos pelos azólicos

devido a efeitos adversos. Apesar do itraconazol ser a terapia de escolha, um elevado número de gatos apresentam resposta clínica insatisfatória ou longa duração de tratamento (Pereira et al., 2010; Gremião et al., 2011). A utilização de iodeto de potássio (cápsulas) em gatos poderá fornecer alternativas para a escolha de um esquema terapêutico viável, com possível redução do período de tratamento e de recidivas. Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a efetividade e a segurança do iodeto de potássio via oral em gatos com esporotricose.

MATERIAL E MÉTODOS

Os procedimentos do estudo foram aprovados pela CEUA/Fiocruz (registro LW 50/10). Foi utilizada uma amostra de conveniência, sendo realizado um estudo interventivo em gatos com esporotricose confirmado pelo isolamento de *S. schenckii* em cultura no período de abril de 2010 e julho de 2011. Os gatos foram submetidos à terapia com iodeto de potássio em cápsulas (via oral) na dose entre 2,5 mg/kg e 20 mg/kg, uma vez ao dia. O escalonamento da dose do fármaco foi realizado com 2,5 mg/kg/sid durante 5 dias. Doses de 5 mg/kg, 10 mg/kg, 15 mg/kg e 20 mg/kg foram introduzidas a cada 5 dias até resposta clínica satisfatória ou presença de efeito adverso. O animal foi acompanhado mensalmente através de exames clínico e laboratorial.

RESULTADOS

De 48 gatos incluídos no estudo, a cura clínica foi obtida em 47,9%, em 37,5% ocorreu falência terapêutica, 10,4% abandonaram o tratamento e 4,2% foram a óbito, sem associação com a esporotricose. Efeitos adversos clínicos foram observados em 52,1% dos casos, sendo a hiporexia o mais frequente. Treze gatos apresentaram leve aumento nos níveis das transaminases hepáticas durante o tratamento. Dentre estes, seis apresentavam sinais clínicos sugestivos de hepatotoxicidade. Apenas um gato apresentou reativação da doença na mucosa nasal três meses após a alta.

DISCUSSÃO

O iodeto de potássio em cápsulas foi capaz de curar clinicamente 47,9% dos gatos com esporotricose incluídos no estudo utilizando-se doses mais baixas em relação às reportadas na literatura (Dunstan et al., 1986; Mackay et al., 1986). Embora o fármaco promova efeitos adversos clínicos, seu uso representa uma opção terapêutica viável já que o percentual de cura nesse estudo foi similar aos estudos

prévios com itraconazol (Pereira et al., 2010) e tais efeitos adversos são reversíveis com a diminuição da dose ou interrupção temporária da mesma. Em adição, a frequência de efeitos adversos laboratoriais foi baixa. Tais efeitos promoveram alterações de grau leve das transaminases hepáticas que retornaram a níveis normais com a diminuição da dose ou interrupção temporária do fármaco. O único caso de recidiva foi na mucosa nasal, conforme relatado com outros antifúngicos e observado por Gremião et al. (2011), o que pode sugerir que esta área é de difícil manejo terapêutico.

CONCLUSÃO

A porcentagem de cura clínica foi similar a de estudos prévios com o itraconazol, o que sugere que o iodeto de potássio volte a ser uma alternativa no tratamento da esporotricose felina. Ensaio clínico devem ser conduzidos com o intuito de comparar a eficácia e segurança do iodeto de potássio e itraconazol oral. Em termos de saúde pública, uma resposta favorável ao iodeto de potássio em gatos com esporotricose pode contribuir para a ampliação das opções terapêuticas desta micose, assim como reduzir indiretamente os riscos da transmissão entre os animais e destes ao ser humano.

REFERÊNCIAS

- DUNSTAN, R.W.; LANGHAM, R.W.; REIMANN, K.A. et al. Feline sporotrichosis: a report of five cases with transmission to humans. **Journal of the American Academy Dermatology**, v. 15, p. 37-45, 1986.
- GREMIÃO, I.D.F.; SCHUBACH, T.M.P; PEREIRA, S.A. et al. Treatment of refractory feline sporotrichosis with a combination of intralesional amphotericin B and oral itraconazole. **Australian Veterinary Journal**, v. 9, p. 346-351, 2011.
- MACKAY, B.M.; MENRATH, V.H.; RIDLEY, M.F. et al. Sporotrichosis in a cat. **Australian Veterinary Practitioner**, v. 16, p. 3-5, 1986.
- PEREIRA, S.A., PASSOS, S.R.L., SILVA, J.N. et al. Response to azolic antifungal agents for treating feline sporotrichosis. **Veterinary Record**, v. 166, p. 290-294, 2010.

187. NOVO PROTOCOLO PARA PRODUÇÃO DO PLASMA RICO EM PLAQUETAS EM CÃES

Grazielle Anahy de Sousa Aleixo¹, Maria Cristina de Oliveira Coelho¹, Lilian Sabrina Silvestre Andrade¹, Moacir Bezerra Andrade¹, Ana Luiza Neves Guimarães, Flávia Correa Maia¹

¹Universidade Federal Rural de Pernambuco – grazyaleixo@hotmail.com

RESUMO

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um produto sanguíneo usado para potencializar a cicatrização tecidual. Com este trabalho, objetivou-se criar e avaliar um novo protocolo para a produção do PRP em cães. Foram coletados amostras de sangue de 20 cães, sendo o material centrifugado a 1200 rpm durante 10 minutos e posteriormente, a 1600 rpm por 10 minutos. Os resultados demonstraram que houve aumento de 449,02% na plaquetometria. O protocolo foi testado em outros 20 animais, sendo constatado que o mesmo era reproduzível. Conclui-se que o novo protocolo elaborado foi eficiente para a produção do PRP com sangue de cães.

PALAVRAS-CHAVES: concentrado de plaquetas, fatores de crescimento, cicatrização

NEW PROTOCOL FOR PRODUCTION OF PLATELET-RICH PLASMA IN DOGS

ABSTRACT

Platelet-rich plasma (PRP) is a blood product used to enhance tissue healing. This work aimed to create and evaluate a new protocol for production of PRP in dogs. Blood samples from 20 dogs were collected, and the material was centrifuged at 1200 rpm for 10 minutes and thereafter at 1600 rpm for 10 minutes. The results showed that there was an increase of 449.02% in platelet count. The protocol was tested in 20 other animals, which revealed that it was reproducible. It was concluded that the developed protocol was efficient for production of PRP with dog's blood.

KEYWORDS: platelet concentrates, growth factors, wound healing

INTRODUÇÃO

Entende-se por Plasma Rico em Plaquetas (PRP), um produto obtido através da centrifugação de sangue autólogo, que resulta em uma maior concentração de plaquetas em um menor volume de plasma (Vendramin et al., 2006). O principal intuito de obter uma maior quantidade de plaquetas é devido a existência de substâncias em seu interior (fatores de crescimento) que participam da reparação tecidual por

promoverem quimiotaxia, proliferação e diferenciação celular (Bolta, 2007). Nas primeiras tentativas de produção eram utilizados equipamentos de autotransusão (Jameson, 2007). Depois foram desenvolvidos aparelhos automáticos, entretanto visando reduzir os gastos, outros protocolos foram criados utilizando centrífugas convencionais (Rossi Junior e Souza Filho, 2004).

Objetivou-se com essa pesquisa criar e avaliar a eficácia de um novo protocolo para a produção do plasma rico em plaquetas (PRP) com sangue de cães.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram obtidos de cada paciente (20 cães ao total) um tubo de sangue de 4,5 mL com citrato de sódio para produção do PRP. Outro tubo de 2 mL com EDTA foi preenchido para realizar o hemograma e plaquetometria no sangue total.

O frasco para produção do PRP foi submetido a 1200 rotações por minuto (rpm) durante 10 minutos em uma centrífuga laboratorial. Na sequência, o plasma e zona de névoa foram aspirados e transferidos para outro tubo e o material centrifugado novamente a 1600 rpm/10 minutos. Em seguida, descartava-se 80% do sobrenadante, permanecendo apenas a parte mais concentrada em plaquetas. A plaquetometria do PRP e sangue total foi efetuada pelo método de contagem direta.

A comparação das médias foi realizada pelo teste de F ao nível de 1% de probabilidades. Posteriormente, o mesmo protocolo foi testado em outros 20 cães para avaliar o seu índice de reprodutibilidade.

RESULTADOS

Após o processamento das amostras de sangue e ao comparar a plaquetometria alcançada no PRP com relação ao sangue basal, foi possível constatar um aumento médio de 449,02% (Tabela 01).

Tabela 01: Resultados do teste de F ao nível de 1% de probabilidades.

TRATAMENTO	PLAQUETOMETRIA
Plasma rico em plaquetas (PRP)	1303000
Sangue Total	236750

Para confirmar que o protocolo foi eficiente, aplicou-se tal método em outros 20 animais para observar a reprodutibilidade do mesmo (Tabela 02).

Tabela 02: Plaquetometria no PRP dos 20 animais da 1ª (EI) e 2ª etapa (EII).

Estatísticas	Animais EI	Animais EII
Média	5,489	5,374
Limite Superior*	5,805	5,786
Limite Inferior*	5,174	4,962

DISCUSSÃO

Para a centrifugação, optou-se pelo uso de 1200 e 1600 rpm, porque eram executáveis na centrífuga utilizada e por estarem dentro da média de outros trabalhos, apesar de não terem sido encontrados artigos com as mesmas velocidades. A necessidade de aumentar a centrifugação no segundo processo, foi baseado no fato de que Barroso et al. (2007), descrevem que uma segunda rotação mais intensa separa melhor o plasma pobre em plaquetas do PRP.

Em todos os animais foi possível incrementar a contagem plaquetária em cinco vezes com relação ao sangue basal. Segundo Marx (2004), deve ocorrer um incremento na plaquetometria de quatro a cinco vezes em relação ao sangue total, e, portanto todas as amostras podem ser consideradas PRP.

As relações entre a plaquetometria no PRP dos animais EI e EII (Tabela 02), apresentaram resultados com limites de confiança cruzando entre si, o que demonstrou que o procedimento se repetiu no EII, corroborando com os dados de Vendramin et al. (2006), no qual os PRPs produzidos após a definição de um protocolo foram reprodutíveis.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o protocolo elaborado para a obtenção do plasma rico em plaquetas (PRP) em animais da espécie canina foi eficiente e reprodutível.

REFERÊNCIAS

- BARROSO, C. S. T.; BENITO, J. C.; PUIG, A. G. Calidad del plasma rico en plaquetas. **Ver. Esp. Cir. Oral y Maxilofac.**, v. 29, n. 4, p. 240-248, 2007.
- BOLTA, P. R. Z. Use of platelet growth factors in treating wounds and soft-tissue injuries. **Acta Dermatoven APA**, v. 16, n. 4, p. 156- 165, 2007.
- JAMESON, C. A. Autologous platelet concentrate for the production of platelet gel. **Labmedicine**, v. 38, n. 1, p. 39- 42, 2007.
- MARX, R. E. Platelet-rich plasm: evidence to support its use. **J. Oral Maxillofac. Surg.**, n. 62, p. 489-496, 2004.
- ROSSI JUNIOR, R.; SOUZA FILHO, M. A. P. Obtenção de trombina autógena: proposta de um protocolo simplificado e de fácil reprodução clínica. **Revista Paulista de Odontologia**, v. 26, n. 5, p. 4-9, 2004.
- VENDRAMIN, F. S.; FRANCO, D.; NOGUEIRA, C. M. et al. Plasma rico em plaquetas e fatores de crescimento. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 33, n. 1, p. 24-28, 2006.

188. ANÁLISE DE FATORES DE RISCO PARA DIABETES MELLITUS EM CÃES: ESTUDO DE CASO-CONTROLE PAREADO

Álan Gomes Pöppl¹, Bruna Meyrer¹, Guilherme Luiz Carvalho de Carvalho¹, Itatiele Farias Vivian¹, Luis Gustavo Corbellini², Félix Hilário Díaz González³

¹ Hospital de Clínica Veterinária (HCV/UFRGS) – gomespoppl@hotmail.com

² Laboratório de Epidemiologia Veterinária (EpiLab/UFRGS)

³ Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias (LACVet/UFRGS)

RESUMO

Diversos fatores de risco ao desenvolvimento de diabetes mellitus em cães vem sendo identificados. Foi realizado um estudo caso-controle pareado com um total de 246 pacientes (razão caso-controle = 1:1,2) pareados por raça, sexo, idade e local de atendimento, avaliando diferentes fatores de risco ou proteção ao desenvolvimento da doença por meio de entrevistas telefônicas. Os fatores dieta desequilibrada (HR = 4,86, IC 95% 2,2 – 10,7) e sobrepeso (HR = 3,5, IC 1,6 – 7,5) foram identificados como fatores de risco ao desenvolvimento de diabetes em cães.

PALAVRAS-CHAVES Dieta, sobrepeso, resistência à insulina

ANALYSIS OF RISK FACTORS OF CANINE DIABETES MELLITUS: A MATCHED CASE-CONTROL STUDY

ABSTRACT

Many risk factors for canine diabetes mellitus have been identified. A breed, sex and age matched case-control study was performed with 246 patients (case-control ratio 1:1.2) evaluating different risk, or protection, factors to canine diabetes by means of telephonic interviews. Unbalanced diet (HR = 4.86, IC 95% 2.2 – 10.7) and overweight (HR = 3.5, IC 1.6 – 7.5) were identified as risk factors to canine diabetes mellitus.

KEYWORDS: Diet, overweight, insulin resistance

INTRODUÇÃO

A diabetes mellitus canina (DMC) é uma doença multifatorial que vem sendo associada, assim como em humanos e felinos, à uma série de fatores ambientais, como dieta hipercalórica, sobrepeso, sedentarismo e periodontite (Klinkenberg et al., 2006, Rand et al., 2004). O objetivo deste estudo foi identificar possíveis fatores de

risco ao desenvolvimento de diabetes, assim como eventuais fatores de proteção através de um estudo caso-controle na região metropolitana de Porto Alegre.

MATERIAL E MÉTODOS

A população alvo deste estudo incluiu 110 cães diabéticos (casos) com diagnóstico entre 2004 e 2011, atendidos no serviço de atendimento em endocrinologia de pequenos animais de um hospital veterinário universitário e em um serviço particular. Para cada caso do estudo, pelo menos um cão da mesma raça, sexo e idade (controles) foram selecionados randomicamente no mesmo local de atendimento do caso, num total de 136 controles (razão caso-controle de 1:1,2). Os donos dos casos e controles foram contatados por telefone e as entrevistas aplicadas por três entrevistadores treinados. Nem os donos nem os entrevistadores foram informados sobre as hipóteses do estudo (duplo-cego). O questionário foi composto de 16 perguntas de múltipla escolha sobre aspectos relacionados aos hábitos alimentares, atividade física, condição corporal e saúde oral, além de mais duas perguntas dicotômicas sobre histórico de castração e/ou pancreatite. Os donos de casos foram orientados a responder baseado no modo de vida anterior ao diagnóstico de DMC. Uma regressão logística univariada condicional foi realizada com objetivo de selecionar potenciais fatores de risco ou proteção associados ao desenvolvimento de diabetes em cães. Somente variáveis com valor de $p < 0,2$ foram oferecidas no modelo de regressão multivariada, construído com processo de seleção *forward* seguido de um modelo final que foi construído usando processo de seleção manual *backward* com as variáveis com um valor de $p < 0,05$ (Wejdmark et al., 2011). A análise foi realizada com programa SAS 9.2 sendo estudo aprovado na Comissão de Ética na Utilização de Animais (projeto número 18336).

RESULTADOS

Dois fatores de risco foram identificados ($p < 0,01$) no modelo final: sendo eles: dieta desequilibrada (dieta caseira, ou dieta caseira + ração comercial), e sobrepeso (condição corporal 4 ou 5 numa escala de 5 pontos). A análise de riscos indicou um HR (*hazard ratio* – razão de chances) de 4,85 (IC 95% = 2,2 – 10,7) para dieta desequilibrada, e um HR de 3,5 (IC 95% = 1,6 – 7,5) para sobrepeso.

DISCUSSÃO

Estes achados são consistentes com o estado da arte atual sobre predisposição a diabetes mellitus em cães (Rand et al., 2004), e refletem que os fatores de risco encontrados neste estudo são semelhantes aos identificados em estudos Europeus (Klinkenberg et al., 2006, Wejdmark et al., 2011). Ambos os fatores mostraram-se independentes na análise de correlação de matrizes, explicando uma à outra em menos de 50%, como já observado por German (2006), além de serem indutores de resistência à insulina em cães, felinos e em humanos (Rand et al., 2004).

CONCLUSÃO

Assim, assumimos que a alimentação de cães com uma dieta desequilibrada, bem como a manutenção de uma condição de sobrepeso/obesidade, são importantes fatores de risco em ao desenvolvimento de DMC.

REFERÊNCIAS

- GERMAN, A. J. The growing problem of obesity in dogs and cats. **Journal of Nutrition**, v. 136, p. 1940S-1946S, 2006.
- KLINKENBERG, H.; SALLANDER, M. H.; HEDHAMMAR, A. Feeding, exercise and weight identified as risk factors in canine diabetes mellitus. **Journal of Nutrition** v. 136, p. 1985S-1987S, 2006.
- RAND, J. S.; FLEEMAN, L. M.; FARROW, H. A. et al. Canine and feline diabetes mellitus: nature or nurture? **Journal of Nutrition**, v.134, p. 2072S-2080S, 2004.
- WEJDMARK, A. K.; BONNET, B.; HEDHAMMAR A. et al. Lifestyle risk factors for progesterone-related diabetes mellitus in Elkhounds – a case-control study. **Journal of Small Animal Practice**, v. 52, p. 240-245, 2011.

189. DISRUPTORES ENDÓCRINOS E HIPERTIREOIDISMO FELINO

Rafael Passetti Cerqueira¹. Márcia Marques Jericó²

¹. Estudante de Medicina Veterinária – Universidade Anhembi Morumbi.

². Universidade Anhembi Morumbi.

RESUMO

O hipertireoidismo é uma doença de importância crescente na clínica de felinos, mais frequente em animais de meia idade e idosos, com sintomatologia variável. Um fator que vem sendo muito correlacionado ao hipertireoidismo é a presença de substâncias químicas, consideradas disruptores endócrinos, nas embalagens de produtos alimentícios úmidos para felinos domésticos, enlatados ou em sachês. Um elemento encontrado nestes produtos é o bisfenol A, que causa diminuição da afinidade da triiodotironina (T3) aos seus receptores, aumentando a produção de TSH e, consequentemente, gerando hiperplasia do tecido tiroideano. Esta revisão tem como objetivo avaliar a influência destas substâncias no organismo dos felinos.

PALAVRAS-CHAVE: hipertireoidismo, disruptores endócrinos, bisfenol A

ENDOCRINE DISRUPTORS AND FELINE HYPERTHYROIDISM

ABSTRACT

Hyperthyroidism is a disease of increasing importance in feline medical clinic, more common in middle-aged and elderly animals, with variable symptomatology. A factor that has been closely correlated to hyperthyroidism is the presence of chemicals considered to be endocrine disruptors on the packages of moist food products for domestic felines, canned and in sachets. An element found in these products is bisphenol A, that causes decreased affinity of triiodothyronine (T3) to its receptors, increasing the production of TSH and thus generating hyperplasia of the thyroid tissue. This review aims to evaluate the influence of these substances in the body of cats.

KEYWORDS: hyperthyroidism, endocrine disruptors, bisphenol A

INTRODUÇÃO

Os disruptores endócrinos são substâncias exógenas que alteram a homeostase de hormônios endógenos. Sabe-se da interferência destas substâncias no desencadeamento de diversas enfermidades, em humanos e animais.

O consumo de ração úmida em sachês ou enlatados é considerado como uma das causas fundamentais para o aumento dos casos de hipertireoidismo. O objetivo desta revisão é avaliar a importância dos disruptores endócrinos na etiologia desta doença.

MATERIAL E MÉTODOS

Nos felinos domésticos sabe-se o bisfenol A, presente no revestimento interno de embalagens de rações úmidas, é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do hipertireoidismo, ainda mais, pelo fato da presença de elevado teor de gordura nestes alimentos, favorecer a liberação do bisfenol A, por afinidade.

No Brasil, o número de casos de hipertireoidismo tem aumentado, assim como ocorreu em muitos países mais desenvolvidos, sendo previsível que o diagnóstico da enfermidade passará a aumentar significativamente a partir desta década.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os disruptores endócrinos agem substituindo os hormônios, bloqueando a sua ação natural, ou ainda, aumentando ou diminuindo a sua quantidade original, alterando as funções endócrinas (Santamarta, 2001; Guimarães, 2005).

Coincidente com a INTRODUÇÃO de éteres difenílicos polibromados (PBDEs) como retardantes de chamas em diversos equipamentos constatou-se que o hipertireoidismo felino aumentou dramaticamente (Tanabe, 2004).

O bisfenol A é eliminado via glucoronidação (Potterger et al., 2000), que é mais lenta em gatos (Court; Greenblatt, 2000), o que faz com que a exposição ao BPA seja mais prolongada nos pacientes felinos. O bisfenol A diminui as concentrações circulantes de T3 em ratos, por sua vez, por ausência de retro-alimentação negativa, pode levar ao aumento da secreção do TSH e resultar no aumento da produção do hormônio tireoideano, eventualmente levando ao bócio (Tohei et al, 2001).

CONCLUSÃO

Pode-se concluir que os produtos enlatados para alimentação de felinos tem se configurado como um importante fator desencadeador da enfermidade. No Brasil, o uso desta dieta está cada vez mais popularizado, além do aumento da população felina nos últimos anos. É fundamental elencar o hipertireoidismo como possibilidade diagnóstica em felinos com sintomas inespecíficos, especialmente animais de meia idade a idosos e com predileção pelo alimento úmido. Por estas considerações, é esperado o aumento do número de casos diagnosticados desta enfermidade nos próximos anos, tornando o hipertireoidismo cada vez mais freqüente na rotina clínica dos médicos veterinários.

REFERÊNCIAS

Court, M. H.; Greenblatt, D. J.. Molecular genetic basis for deficient acetaminophen glucuronidation by cats: UGT1A6 is a pseudogene, and evidence for reduced diversity of expressed hepatic UGT1A isoforms. *Pharmacogenetics*;10, 2000.

Cunningham, J. G. Textbook of Veterinary Physiology. 4 Ed. Philadelphia: W.B Saunders Company, 2004.

Guimarães, J. R. P. F. Disruptores endócrinos no meio ambiente: um problema de saúde pública e ocupacional. São Paulo, 2005.

Peterson, M.E. Hyperthyroidism. In: Ettinger, S. J.; Feldman, E. C. Textbook of Veterinary Internal Medicine, 5. ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company, 2000.

Pottenger, L. H.; et al. The relative bioavailability and metabolism of bisphenol A in rats is dependent upon the route of administration. Toxicol Sci, p. 54:3–18, 2000.

Reche Júnior, A.; et. al. Hipertireoidismo em felinos: revisão de literatura e estudo retrospectivo. Revista Científica de Medicina Veterinária Pequenos Animais e Animais de Estimação, v. 5, n. 14, p. 16-21, 2007.

Santamarta, J. A ameaça dos disruptores endócrinos. Revista Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre: v.2, n.3, jul.2001.

Tanabe, S. PBDEs, an emerging group of persistent pollutants (Editorial). Marine Pollution Bulletin, v49, p.369-370, 2004.

Tohei, A.; et. al.. Bisphenol A inhibits testicular functions and increases luteinizing hormone secretion in adult male rats. Experimental and Biology Medicine (Maywood, N. J.), v. 226, n. 3, p. 216-221, 2001.

ESTUDO DO DHEA-S EM CÃES COM ERLIQUIOSE

Pâmela Bongiovanni Catandi¹, Mariana Cristina Hoepner Rondelli², Thiago Demarchi Munhoz², Joice Lara Maia Faria³, Mirela Tinucci Costa⁴

1- graduanda em Medicina Veterinária pela FCAV/UNESP/Jaboticabal, 2- pós-graduando(a) em Medicina Veterinária pela FCAV/UNESP/Jaboticabal., 3- Profa. Dra. do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Uberaba (UNIUBE, MG), 4- Profa. Dra. do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinária da FCAV/UNESP/Jaboticabal.

RESUMO

A erliquiose canina é uma doença grave que pode levar a óbito, tanto por suas alterações hematológicas como clínicas, que justificam o caráter catabólico multifatorial da doença. Alterações orgânicas graves podem comprometer o metabolismo de adaptação dos cães ao ambiente, funções agregadas às glândulas adrenais. Assim, esta pesquisa visa avaliar a concentração sérica de sulfato de dehidroepiandrosterona (DHEA-S) em cães infectados por *Ehrlichia canis* (n=15). Os resultados mostraram que não houve diferença significativa nas concentrações do DHEA-S entre os Grupos, embora se tenha observado que nos cães doentes as concentrações do DHEA-S foram mais elevadas.

PALAVRAS-CHAVE: cães, *Ehrlichia canis*, DHEA-S

ASSESSMENT OF DHEA-S IN DOGS WITH EHRlichiosis

ABSTRACT

Canine ehrlichiosis is a severe disease that leads to death, both for its hematologic and for clinical changes which justify the multifactorial catabolic character of the disease. Severe organic alterations may damage the adaptative metabolism of dogs to the environment, functions aggregate to the adrenal glands. Thus, this research aims to assess the concentration of sulphate dehydroepiandrosterone (DHEA-S) in dogs infected with *Ehrlichia canis* (n = 15). There were no significant differences in the concentrations of DHEA-S between groups, although the concentrations of DHEA-S in infected dogs were increased.

KEYWORDS: dogs, *Ehrlichia canis*, DHEA-S

INTRODUÇÃO

A erliquiose, causada pela bactéria gram-negativa *Ehrlichia canis* e transmitida pelo carrapato *Rhipicephalus sanguineus* (Lappin, 2006), representa um grave problema de saúde para os cães. É uma doença catabólica que deprime a saúde do animal, podendo comprometer o organismo. Aparentemente o DHEA-S (sulfato de

dehidroepiandrosterona) está envolvido na resposta do organismo ao estresse, sendo considerado, portanto, um hormônio imunomodulador (Morgan et al., 2009). O DHEA-S é um precursor esteroide sintetizado a partir do colesterol e secretado pela zona reticular adrenocortical, principalmente em resposta ao ACTH (Fischli et al., 2008). É um hormônio que estimula linfócitos T auxiliares e a produção de citocinas (Morgan et al., 2009). Este estudo pretende avaliar o estresse envolvido na erliquiose por meio da dosagem de DHEA-S.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram utilizados soros criopreservados (-20°C) de cinco cães em fase aguda da infecção experimental por *E. Canis* (Faria et al., 2011), confirmada por imunofluorescência e nPCR. Além destes, outros cinco soros de cães saudáveis (controles) e cinco soros de animais infectados naturalmente pelo parasita, estes últimos com sinais clínicos da fase aguda de erliquiose e confirmação por Dot-ELISA e nPCR. Os soros foram empregados nas dosagens de DHEA-S, por kit comercial ELISA, seguindo-se as orientações do fabricante (*In Vitro*, 55060).

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) obtendo o protocolo nº 008218/11.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores obtidos das dosagens de DHEA-S estão apresentados na Tabela e Figura 1.

Tabela 1 – Valores de DHEA-S sérico (µg/mL) e suas respectivas representações gráficas obtidos em soros de cães saudáveis (controle), infectados experimentalmente (IE) e infectados naturalmente (IN) por *E. Canis*.

Ao se analisarem os resultados encontrados, observam-se valores mais elevados de DHEA-S nos soros dos cães infectados, particularmente nos infectados

naturalmente (IN) do que nos controle. Quando esses resultados, agrupados pelas médias, foram submetidos ao teste de Tukey (Tabela 2), não se constataram diferenças significativas entre os Grupos em relação às dosagens de DHEA-S. Adicionalmente, pode-se observar que as concentrações do DHEA-S variaram bastante entre os grupos experimentais e mesmo de cão para cão dentro de um mesmo grupo, sugerindo que existam particularidades entre a *E. canis* e seu hospedeiro.

Tabela 2 – Teste de Tukey para as médias dos valores de DHEA-S

Tukey	Média	N	Grupo
A	0.3938	5	III
A	0.2071	5	II
A	0.0509	5	I

Médias com a mesma letra não apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey a 5%

CONCLUSÃO

Não houve diferença entre os valores do hormônio DHEA-S entre os grupos, contudo, os valores nos cães doentes foram mais elevados do que nos controles.

AGRADECIMENTOS: À FAPESP pelo auxílio (2010/11630-7) e bolsas (2010/02676-3 e 2011/06693-2) concedidas à esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- LAPPIN, M.R. Erliquiose Canina. In: NELSON, R.; COUTO, G. **Medicina Interna de Pequenos Animais**. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. p. 1229-1231.
- MORGAN, C.A. et al. Relationships among plasma dehydroepiandrosterone and dehydroepiandrosterone sulfate, cortisol, symptoms of dissociation, and objective performance in humans exposed to underwater navigation stress. **Biological Psychiatry**, 2009.
- FISCHLI, S.; JENNI S.; ALLEMANN S. et al. Dehydroepiandrosterone sulfate in the assesment of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis. **The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism**, v.93, p.539-42, 2008.
- FARIA, J.L.M.; MUNHOZ, T.D.; JOÃO, C.F. et al. *Ehrlichia canis* (Jaboticabal strain) induces the expression of TNF- α in leukocytes and splenocytes of experimentally infected dogs Amostra *Ehrlichia canis* (Jaboticabal) induz a expressão de TNF-a em leucócitos e esplenócitos de cães experimentalmente infectados. **Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária**, Jaboticabal, v. 20, n. 1, p. 69-72, 2011.